


C H F


I 6 O O





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4899/A









Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4899/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4899/A





Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4899/A


4899/A

L. XLVI


16/p

PEREDA (Petrus Paulus)  
E











52601

PETRI PAVLI

PEREDAE SETA-  
BENSIS, DOCTORIS

MEDICI, ET APVD

*Valentinos publici Medicinæ  
professoris.*

IN MICHAELIS IOANNIS

Paschalij methodum curandi Scholia,  
exercentibus medicinam  
maximè vtilia.

*Ad Illustrissimum & Reuerendissimum dominum Gasparem  
à Chiroga, Archiepiscopum Toletanum, Hispaniarum  
primate, & sacrosanctæ fidei Catholicæ  
primum cognitorem.*



L V G D V N I,  
EX OFFICINA IVNTARVM  
ET  
PAVLI GVITTII.  
M. D. LXXXVII.



THE FIRST PART

OF THE HISTORY

OF THE

ROYAL

ACADEMY

OF SCIENCES

AND ARTS

IN FRANCE

FROM THE

FOUNDATION

OF THE

ACADEMY

IN 1636

TO THE

PRESENT

STATE



ILLI

ET R

MIN

Ad



liber

me

ma

ma

ma

ma

ma

ma

ma

ma

ma

ma

ma





ILLVSTRISSIMO

ET REVERENDISSIMO DO-

MINO GASPARI A CHIROGA,

*Archiepiscopo Toletano, Hispaniarum primati,*

*& fidei Catholicæ primo cognitori,*

*Petrus Pereda medicus,*

*fælicitatem.*



OGITANTI mihi, Præsul amplissime, cui studiorum meorum primitias consecrarem, occurrebant multi, quibus me multum debere cognoscebam : quibusque honestè me, labores meos, totâque familiam committere possem. Deerat autem aliis magnarum rerum cognitio, quam mihi ad hanc rem apprimè necessariam videbam, aliis auctoritas, quæ meas lucubrationes ab omni reprehensione contineret: aliis denique prudentia, quæ diuturno rerum usu & experientia comparata, non parum utilitatis meo operi videbatur allatura. Quibus quidem omnibus, vitæ integritas, facilitas morum, generis splendor maximus, & summa in-



erant ornamenta virtutis. Tu tamen vnus ex  
omnibus præcipuè occurristi, in quem visa  
est natura, ex aliis haustas virtutum dotes  
transfudisse: & qui præter generis nobilita-  
tem, augustam quidem illam, & plane re-  
giam, multiplici rerum scientia, auctoritate,  
& prudentia reliquos anteires. Quid enim  
memorem tuam in ferendis laboribus con-  
stantiam? in regendis clientum animis soler-  
tiam? in gubernandis populis sagacitatem?  
Quid referam beneficia, quibus me tibi de-  
uinctum sentio, cum fratrem meum in fidem  
tuam recepisti, & receptum maximis hono-  
ribus affecisti? Tacebo ne humanitatem, qua  
vnus maximè excellis? Dum enim quantos  
in litteris feceris progressus contemplor, te  
earundem ornamentum intueor: dum mul-  
tarum disciplinarum perfectam cognitio-  
nem mihi ob oculos pono, quem tibi ante-  
ponam nescio. Denique vbi in omni virtutis  
genere præstantiam suspicio, tam exiguum  
tempus ad ista referenda doleo. Quæ ita  
esse, vel me tacente dignitatis gradus, in  
quem tanto optimorum hominum applau-  
su euectus es, necessariò comprobatur. Illi  
enim soli ad istam dignitatem, & honoris  
locum efferuntur, quibus maxima est cum  
virtute coniuncta sapientia, cum sapientia  
huma



humanitas, & cum humanitate summa  
christianæ religionis obseruatio. Hæc Phi-  
lippum Hispaniarum regem æquissimum,  
vbi Archiepiscopus renuntiatus es, non la-  
tuerunt. Hæc Toletanæ ciuitatis non igno-  
rauit auctoritas. Hæc nullum genus homi-  
num, etsi immane & barbarum effugerunt.  
Omnes enim tuam probitatem, humanita-  
tem in pauperes, facilitatem in amicos, & in  
cæteros integritatis splendorem agnoscunt.  
Atque, vt hæc omittā, ne videar meridiano  
soli accensam facem attulisse, & rem per se  
nobilē sermonis humilitate obscurasse. scias  
velim, me, Valētinæ vrbis medicum tui per-  
petuò obseruantissimum, vt medicinæ can-  
didatis meo quocunque labore gratum fa-  
cerem, Methodum quandam medendi à  
Paschalio huius vrbis quondam medico in-  
signi conscriptam, emendatiorem excude-  
re, & scholiis illustriorem efficere voluisse.  
Qua in re quos sim æmulos habiturus, non  
ignoras. videor enim multos iam mihi blat-  
terantes, & turpia effutientes audire, meque  
acriter accusantes, quod hæc scholia eo so-  
lum nomine ediderim, vt huic graui medi-  
co, & aliis practicis facerem iniuriam, non,  
vt studiosam iuuetutem, immenso quodam  
schedarum onere, citra rationem oppres-



sam, & multoties prauè edoctam meis vigi-  
liis subleuarem. Aliquos præterea deieran-  
tes, ostentationis graua, non communis uti-  
litatis ratione hunc laborem suscepisse. Scio  
& fore alios, qui suo modo studeant ali-  
quam mihi infamiae notam inferre. Quos  
omnes te patrono quantum asperner, ani-  
mus ipse, quem tua nobilitas ad hæc scri-  
benda fecit, testatur. Spero enim me tua hu-  
manitate, fide, & nomine tanquam Militia-  
dis clypeo testum, intrepidè omnes aduer-  
sarium ictus elusurum neque futurum es-  
se quemquam, qui, si te mihi, operique meo  
defensorem audierit, non penitus obmu-  
tescat, & eos, quos in me antea dentes acue-  
rat, non facile obtundat. Hos igitur, Præsul  
Amplissime, primos labores meos, rudes sa-  
nè & impolitos, meæ tamen in te obseruan-  
tiæ, & voluntatis sempiternæ monumenta  
accipies, eosque pro tua sapientia ita foue,  
ut, qui me tui semper studiosissimum audie-  
runt, iidem intelligant quo tibi magis de-  
berem, denuò te maiora apud me beneficia  
collocasse. Experientur enim ij lectis scho-  
liis fortasse, communi utilitati à me fuisse  
inseruitum, & ob eam rem facilius, quod à  
te postulo, perpetrasse. Quod ut facias, te ve-  
hementer etiam atque etiam rogo, efficies  
enim



enim vt qui in puluere & tenebris diutissi-  
me vixi, excusso nunc puluere, & fugatis te-  
nebris, per te in loca clariora euadā, omnē  
que laborem contemnam, si hunc tibi gra-  
tum cognouerim. Vale litterarum decus, &  
ornamentum, & totius Hispaniæ fidus ful-  
gentissimum, tuūque Peredam nominis  
tui, & gloriæ propugnatorem acerrimum, vñ  
fratrem quem apud te habes, & quem tibi  
esse charissimum cognosco, ama. Id si fece-  
ris, & me tibi iam maximè deuinctum sum-  
mo beneficio in perpetuum obligabis,

& ad maiora aggredienda nunc  
quasi dormientem  
excitabis.

\*

4





# AMICI AD VINCENTIVM

G I S B E R T I V M.

## C A R M E N.

**Q**uæris quid Gisberte noui sit: nil ego præter  
Hoc vnum scio (namque alijs, quæ plurima vulgus  
Nunc hominum narrat, non est cur immorer, ad te  
Cum scribam magni Hippocratis, doctique Galeni.  
Scripta volutantem, ve l quæ sunt seria cumque  
Arctantem breuibus chartis, atque ordine pulchro.)  
Alta igitur cum concepisset mente Pereda,  
Est Asclepiadum qui vnus, fœtum, & pariturus  
Iam esset, eum excipere ipsa sinu malè sana refugit.  
Tellus, pallenti inuidia stimulata medentum:  
Sic, qua concepit fœtum, non edidit vrbe  
Egregij mens culta viri: partus tamen ipse  
Aureus hanc urbem inuisit, quæ flore medentum  
Collado tumet, vni cupit ille probari,  
Quem stupet hæc, & deinde omnis mirabitur ætas:  
Tèque adit in lucem nunc æditus, atque salutat  
Nomine non solum nostro, doctique parentis,  
Verum et iam Bonifantis amici, quem auguror olim  
Artis Thæbeæ sidus fulgere coruscum.  
Tu hunc partum Gisberte fove, defende, meretur.

MICHAË



MICHAELIS IOANNIS  
PASCHALII AD  
inuidum.

C A R M E N.

**I**Am nouus exorior: iam depositaq; senecta  
Humo tollentem splendida colla vides:  
Me tamen exuta nitidum prodire senecta  
Palles? tu palles ergo nitore meo?  
Aeterno o vtinam tu iam squallore tegare:  
Exuias liceat nec posuisse tibi.  
At contra aeterno niteat splendore Pereda,  
Cuius sic maculas tersit, amica manus.



PAVLI ASTORIS DERTVSEN-  
SIS PHILOSOPHIÆ CANDIDATI  
de sui magistri scholiis.



EPIGRAMMA.

**H**ippolyti lacera ut vidit, disiectaque passim  
Membra Dens, pulchris qui nittet usque comis:  
Ingemuit, casum iuuenis miseratus acerbum,  
Atque salutari contigit illa manu.  
Præsentem sensisse Deum quæ tacta, & in auram  
Hanc ipsam vitæ mox rediisse ferunt.  
Impete barbarico sic, & compage soluta  
Artis Phæbe, tuæ, membra Pereda legit:  
Hippocratis pandensque sinus, & laxa Galeni  
Aequora percurrent, hinc opem, & inde petit.  
Nec magis Hippolytus tibi, quam tu Phæbe Pereda  
Debes, inuentum qui tibi servat idem.

PETRVS



PETRVSPEREDA  
LECTORI SALVTEM.



**M**EDICINA, quæ tota est practica, cum habeat finem opus aliquod, nempe sanitatis consecutionem in duas præcipuas partes diuiditur: quarum vna sanitatem præsentem tuetur: & altera, curando morbos, eam restituit. Curatio morborum ab empiricis experientia, à methodicis verò communitatibus quibusdam perficitur. Quorum curatio non recte procedit, quia nec omnes morbi curantur experientia, neque curamus hominem vniuersalem. Proinde Hippocrates, Galenus, & alij docti viri methodo rationali, quæ ex indicationibus constat, morbos curant. Sic multi libros ediderunt, in quibus morborum docent curationem methodo rationali. Inter quos Michael Paschalius enumeratur, vir sua ætate doctus, & expertus: cuius liber per omnium manus circumfertur, & ex ipso multi morborum remedia desumunt. Cæterùm cum hic vir doctus scripserit tempore, quo multæ falsæ barba



barbarorum sententiæ vigeant, & veritates Galeni, quas modò multorum annorum lectione habemus, erāt occultæ. Proinde in eius librum, qui inter alios breuiora, & vſitata habet remedia (quod optimū est) ſcholia ſcribere decreui: vt ex iis, quæ ipſe rectè docuit, & quæ addita à nobis ſunt ex rei natura, optima & legitima fieret morborum curatio. Tu lector amicè hæc accipe, neque morosè reprehendas.

ELEN







# ELENCHVS BREVIS EORVM, QVÆ SINGVLIS

CAPITIBVS CONTINENTVR.



Primus numerus caput, Secundus folium indi-  
cat: a. primam paginam: b. secundam.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D</b> e pilorum decidentia  | cap. i. fol. i. a |
| De morbo Gallico   | 2. 11. b          |
| De vlceribus capitis manantibus, & curatione<br>pediculorum capitis, & aliarum partium | 3. 17. a          |
| De dolore capitis à quacunque causa contingat ipsum do-<br>lore affici                 | 4. 23. a          |
| De phrenitide  | 5. 24. b          |
| De lethargo  | 6. 29. b          |
| De vertigine   | 7. 31. b          |
| De morbo comitali  | 8. 33. b          |
| De melancholia   | 9. 38. b          |
| De incubone  | 10. 42. a         |
| De ijs qui amore insaniunt   | 11. 43. a         |
| De apoplexia   | 12. 45. b         |
| De paralyfi, Latinis resolutione   | 13. 48. a         |
| De conuulsione   | 14. 50. b         |
| De tremore   | 15. 54. b         |
| De ophthalmia  | 16. 55. a         |
| De imbecillo aspectu   | 17. 58. a         |
| De albugine oculorum   | 18. 59. b         |
| De   |                   |



|  |           |
|--|-----------|
| De suffusione  | 19. 59.b  |
| De dolore aurium   | 20. 61.a  |
| De sanguinis è naribus profluvio                                 | 21. 62.b  |
| De rubedine faciei   | 22. 65.b  |
| De dolore dentium, atque etiam de ipsis denigratis & mobilibus   | 23. 67.a  |
| De angina  | 24. 68.b  |
| De coriza, catarrho, raucedine, & tussi                          | 25. 71.a  |
| De orthopnea, asthma, dyspnea                                    | 26. 74.a  |
| De peripneumonia & pleuritide                                    | 27. 76.b  |
| De sanguinis sputo   | 28. 81.a  |
| De empyemate, id est, suppuratione & tabe                        | 29. 83.a  |
| De palpitatione cordis & syncope                                 | 30. 86.a  |
| De imbecillitate ventriculi, & de dolore & inflammatione eiusdem | 31. 90.b  |
| De singultu  | 32. 93.a  |
| De appetentia immodica, quam medici caninam appellare solent     | 33. 94.a  |
| De cibi fastidio   | 34. 94.b  |
| De cholera   | 35. 97.a  |
| De diarrhœa  | 36. 99.b  |
| De lyenteria   | 37. 104.a |
| De dysenteria  | 38. 106.a |
| De tenesmo   | 39. 109.a |
| De cholico dolore, & ileo  | 40. 110.a |
| De inflammatione hepatis   | 41. 115.b |
| De obstructione hepatis  | 42. 117.b |
| De ictero  | 43. 119.b |
| De hydrope   | 44. 122.a |
| De lienis obstructione   | 45. 127.a |
| De suppressione urinae   | 46. 128.a |
| De renum calculo & vesicæ  | 47. 131.a |
| De   |           |



|   |           |
|---|-----------|
| De ardore vrinae                        | 48. 137.b |
| De mictu sanguinis                      | 49. 140.a |
| De diabete                              | 50. 140.b |
| De lumbricis                            | 51. 142.b |
| De hæmorrhoidibus                       | 52. 145.b |
| De procidentia ani                      | 53. 149.b |
| De procidentia vteri                    | 54. 150.b |
| De immodicis mensibus                   | 55. 151.b |
| De suppressis mensibus                  | 56. 155.a |
| De vteri suffocatione                   | 57. 158.b |
| De mola vteri                           | 58. 160.b |
| De partu laborioso, & secundis detentis | 59. 161.b |
| De ramice                               | 60. 164.a |
| De arthritide                           | 61. 167.a |

## INDEX CAPITVM

Secundi libri.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>D</b> E synocho  | cap. 1. 172.b |
| De febre ardenti  | 2. 180.a      |
| De tertiana exquisita   | 3. 183.b      |
| De tertiana notha   | 4. 187.a      |
| De quotidiana   | 5. 188.a      |
| De quartana   | 6. 189.a      |
| De febribus compositis  | 7. 192.a      |
| De hectica  | 8. 192.b      |
| De febre pestilenti   | 9. 198.a      |
| De exanthematibus, quæ à nostris medicis variolæ &<br>morbilli dicuntur | 10. 205.b     |

FINIS.



Nos Ioannes Dymas Loris  
Dei & Apostolicæ sedis gratia Bar-  
cinonensis Episcopus Viso exami-  
ne ac approbatione infrascripto-  
rum doctorum fratris Ioannis Pe-  
drolo ordinis Carmelitarū, & Lau-  
rentij à sanct Ioan societatis Iesu, &  
fratris Francisci Ferdinandi ordinis  
Sancti Francisci, concedimus li-  
centiam imprimendi prædictum li-  
brum in nostra dioecesi, die vigesi-  
ma quinta Maij. 1579.

Ioannes Ep̃s Barcinonensis.

F I N I S






# PETRI PAVLI PEREDÆ

SETA BENS I,

doctoris Medici: & apud Valentinus publi-  
ci medicinæ professoris, in Michaëlis  
Ioannis Paschalij methodum cu-  
randi, scholia: studiosis me-  
dicinæ maximè vti-  
lia.

*De pilorum decidentia, in quo multa continentur ty-  
ronibus necessaria ad curationem omnium  
morborum. CAP. I.*



Decidentia pilorum (quam caluitiem *Descriptio*  
appellamus) affectio capitis est, qua  
vniuersi eius capilli defluunt. Proue- *Causa*  
nit ea aut ob cutis raritatem, aut ob  
humoris defectum, ex quo ipsi gene-  
ratur, atq; nutriuntur. Porro si a cu-  
tis laxitate id cōtingat, promptè & à  
calore, & à frigore caput læditur:  
quod raritatis proprium signum est.

Sin ex alimenti defectu, primum extenuantur, deinde cōci-  
dunt vniuersi. Quam rem in iis, qui tabe laborant, quotidie *Signa*  
cernimus euenire, maximum inde argumētum desumentes;  
decidentium pilorum ob alimenti defectum tabis indicium  
esse. Huiusmodi affectio morbi Gallici symptoma plerun-  
que est, vbi non tam ex prædictis sit causis, quam ex humo-  
rum corruptela: à qua & Alopeciam, & Ophiasim fieri Gal.  
existimat. Quo in casu cutis colorem spectare oportet. Nam  
si pro naturæ modo albidio sit, pituitæ soboles erit morbus:  
sin pallidior, bilis flauæ: sin nigrior, atræ bilis: sin rubicūdior,  
sanguinis. Sed anteaquam vitam etiam cōsiderabimus prius,



## DE CVRAND. MORB.

*Curatio.* tamen scientes, quæ qualem humorem soleant adaugere. *Pi-*  
*Primò* lorum decidentia (nam de vero caluitio hîc non agimus) *cu-*  
*Victus ra-* ratur, primùm, si a sanguine fiat, victu refrigerante & exsic-  
*tio.* cante, & sanguinem minuente: si a flaua bile, victu refrige-  
 rante & humectante, vt sunt aer frigidus arte paratus, nem-  
 pe floribus, herbis, & liquoribus, si naturalis nō reperiatur:  
 cibus sit ptisana hordeacea, lactuca, cucurbita, portulaca,  
 & ius pulli refrigeratum, illis vel similibus. Nocent huic ca-  
 lida, vt piper, cinnamomum, eruca, cape, & similia. Si fiat à  
 pituita, curatur primùm victu calfaciente, & siccante. Qua-  
 re exercitatio, & motus præsertim ventriculo vacuo maxi-  
 mē huic prodest, quemadmodum & vsus rerum calidarum,  
 vt sunt piper, crocus, cinnamomum, fœniculus, & similia: fri-  
 gida, quæ pituitam augent, nocent: vt pisces, herbæ frigidae,  
 & legumina omnia præter cicera. Si ab atra bile fiat, primùm  
 curatur victu calfaciente, & humectante, & quiete, & aere  
 simili veris, & iure gallinæ, & arietis, cū borragine, vel bu-  
 glossa. Quæ atram bilem augent, huic incommoda sunt, vt  
 caro bubula, hircina, leporina, & ceruina, caseus antiquus,  
 & omnia salsa. In omni tamen pilorum decidentia, quæ hu-  
 mores corrumpunt, diligentissimē vitanda sunt, vt inordi-  
 nata ratio sumendi cibos, veluti si cibus difficilioris conco-  
 ctionis præcedat alterum facilioris. Fugienda etiam est ci-  
 borum multitudo in eadem mensa, tum cibatio post crudi-  
 tatem, necnon exercitatio immodica statim ab esu: lac deni-  
 que, & butyrum, si aliis alimentis, præsertim piscibus immi-  
 xta comendantur, vitari debent: quoniam maximē humores  
 corrumpunt, elephantiasimque efficere solent.

*Secundò* Deinde curetur decidentia pilorum sanguinea per sectio-  
*Sectio re-* nem basilicæ dextræ, educaturq; sanguinis quātitas respon-  
*na.* dens plenitudini: habeaturque ratio præcipua roboris facul-  
 tatis, secundò magnitudinis morbi, vt Gal. lib. de rat. curandi  
 per sanguinis missionem docuit: quanquā Hippocrat. 4. de  
 rat. vict. in morbis acutis, præter illa duo, ætatem floridam  
 addit, & Galenus in commentario quartum considerandum  
 esse iudicat, videlicet aeris dispositionem. Hæc tamē omnia  
 sub duobus primis comprehenditur.

*Tertiò* Tertiò, post sanguinis missionem euacuetur bilis flaua se-  
*Purgatio.* quenti potione, qua etiam sanguinis feruor, & caliditas im-  
 modica remittitur: ℞. medullæ cassiæ fistulæ recens per se-  
 tam extractæ, & medullæ tamarindorū in aqua mentæ prius  
 infusorū, si fuerit ventriculi imbecillitas, an. ʒ. ʒ. rhabarba-  
 ri electi infusi per noctem in aqua endiuivæ ʒ. j. electuarij de  
 suc



succo rosarum. 3. ij. ʒ. decoctionis florum cordialium. q. s. misce, & fiat potio sumenda in aurora.

An verò sumpto medicamento purgante ante opus inceptum sit semper dormiendū, discrimen est inter autores: eo-  
rum tamen verior pars vult parum esse dormiendū sumpto medicamento purgante benigno & liquido: diutius tamen post medicamentum potens & liquidum multò: diutius post medicamentum medium inter liquidum & solidum; quod à nostris medicis dicitur bolus. Maxime verò dormiendum erit sumpto medicamento siue benigno, siue potenti, in formam pilularem, quia primum minori calore eget, dum reducitur de potentia ad actum: vltimum verò maiori.

Opere autem incepto semper somnus nocet, nisi sit immoderatum opus, egēs restrictione. Post opus sufficiens per horam ante prandium ad lauandum ventriculum, & intestina, bibat ʒ. iij. iuris sine sale, vt noster Valentinus mos est, vel ʒ. iij. decocti hordei cum cortice addēdo ʒ. j. sacchari: quo decocto Itali vtuntur. In prandio parce comedat, & à prandio dormiat. Die verò sequenti mundificentur intestina sequenti, vel simili clystere. ʒ. decocti foliorum maluarum, violarum, siclae, furfuris & hordei. ʒ. xv. olei rosati. ʒ. iij. sacchari rubei. ʒ. ij. salis. ʒ. j. misce, & fiat clyster: & si opus fuerit, adde diacatholiconis ʒ. j.

Si fuerit pilorum decidentia à flaua bile, euacuanda est medicamentis cholagogis; prius tamen facta illius leni concoctione. Nolo in praesentia demonstrare, quid sit concoctio, neq; quomodo medicorum coctio fieri soleat in duplici transmutatione, naturali videlicet (quæ circa alimenta versatur, nihil aliud est, quam alteratio nutrimenti ad propriam qualitatem nutriti) & altera, quæ in putrida substantia versatur, & est alteratio cessare faciens putredinē manente substantia; autore Galeno vltima parte artis parue. Nolo etiam hîc ostendere, an omnis humor præter sanguinem corruptus, vel putridus, vel ad nutrimentū ineptus egeat secundā concoctione: neque libet mihi explicare, an tenuis humor, qualis est flaua bilis indigeat ea, vt reuera indiget: quæ an fieri debeat per reductionem ad mediam substantiam in crassatione (vt crassus humor concoquitur attenuatione) non est præsentis instituti. Quidam ex recentioribus volunt tenuem humorem calidis & attenuantibus medicamentis concoqui, quibus dedit ansam errandi comment. 2. 4. lib. 1. Aphor. quo loco Gal. docet concoctionem in morbis acutis (si necessaria sit) faciendam esse melicrato decocti origani,



## D E C V R A N D. M O R B.

mentastri, pulegij & similium. Alij volūt tenuem humorem per se nulla cōcoctione egere, contra quos est auctoritas Hippocr. Gal. & aliorum auctorum, ratio, & experientia crisis factæ. 7. vel 14. die morborum, qui fiunt à flaua bile: quæ in eorum initio bona esse nō potest propter priuationem concoctionis. Concoctio enim, autore Gal. lib. 1. de crisis, celeritatem, & certitudinē iudicij ostendit. Villanouanus contra Manardū, & contra alios docet nullū humorem corruptum, putridum, & ineptum nutritioni, cōcoqui posse. Hæc omnia in expos. 22. aph. lib. 1. tractanda sunt: nobis tamen hoc loco sufficit, humores neq; a natura, neque ab arte rectē euacuari posse nō præcedente concoctione: quæ licet à calore natiuo præcipue fiat, alia tamen multa coadiuuant, vt sunt syrapi, decocta, succi, & aquæ, quæ vias aperiendo in obstructione (quæ in omni febre dependēte ex putredine humorum inuenitur) vel reducēdo substantiam rei cōcoquendæ ad mediocritatē, vel illius acrimoniam & intemperiem corrumpēdo præparant. Quilibet igitur humor ante vacuationem concoctione eget, crassus tamen difficilius cōcoquitur. Sed vt sit tyronibus omnibus notus catalogus medicamentorum omnium humores concoquentium, quæ sequuntur adiecimus.

*Medicamenta humorem biliosum concoquentia sunt,  
quæ sequuntur.*

Primò omnia medicamēta frigida, à primo ordine vsque ad tertium, siue sint in forma decocti, vel succi, vel aquæ: quibus vsi sunt Arabes, & alij multi. Neque quorundam iuniorum ratio de vi perniciosa plumbi, & æris, quibus destillantur aquæ vi ignis, obstat. Cū etiam omnia medicamenta composita fiant illis vasis: dum tamen decocta & succi inueniri possint, eis est vtēdum, propter maiorem facultatem. Aquæ omnes fermē præter rosaceam, violaceam & vitis, carent proprio odore, & sapore. Vbi tamen aquis vtendum est propter defectum simplicium, vel ægrotantium gustum, augenda est quantitas earum. Sunt etiam medicamenta hæc in forma melicrati (quo Græci vtēbātur propter sacchari inopiam, vel in forma syruporum, quibus nos vtimur) propter sacchari copiam, & ægrorum delectationem, præcipue in morbis calidis: nam multi fieri solent syrapi cum melle in

*In phar-* morbis frigidis. Pestilentes tamen pharmacopolæ, si syrapios  
*macopolas.* frigidos melle vel saccharo rubro conficiant, ægros interficiunt: quos poena capitali puniendos censeo.

*Flauā bi-* Simplicia flauam bilem concoquentia (quæ officinarum  
*tem conco-* more scribūtur, ne à pharmacopolis vnum pro alio infirmis  
*quentia.* trib



tribuat) sunt hæc: Endiuiæ, Cichorea, Lactuca, Portulaca, Cucurbita, Vermicularis, Semperuiua, Virga pastoris, Solatrum, Umbilicus Veneris, Nenuphar, & alia similia. Composita, sunt syrupus acetosus. S. syrup. endiuiæ. S. syr. de iuibis, oxysacchare. S. syr. endiuiæ comp. syr. violarum. syr. rosarum. syr. de succo acetosæ. syr. de agresta. syr. de pomis. syrup. acetositis citri, syrup. acetositis limonum, syrup. de nenuphare. syrup. de papauere: iulep rosarum & violarum.

Simplicia, quæ pituitam concoquere valent calfaciendo, Pituitam attenuando, incidendo, & aperiendo meatus, sunt fœniculum, petroselinum, hyssopus, scabiosa, betonica, capillus veneris, pulegium, calamentum, satireja, menta, serpillum, origanum, melissa, pæonia, mel, & similia.

Composita, sunt syrupus acetosus s. rhodomel, syrup. de bizantiis, oxymel. s. syrup. de liquiritia. syrup. capillorum veneris. syrup. acetosus compos. syrup. de hyssopo. oximel compos. syrup. de stichados. syrup. de eupatorio. syrup. de absinthio. syrup. de prassio, & oximel scilliticum.

Simplicia, quæ atram bilem concoquere valent, sunt borrago, buglossa, lupulus, fumus terræ, scolopendria, ceterac, tamarisca, rubea tinctorum, & similia. Composita, sunt syrup. borraginis, syrup. buglossæ, syrup. de pomis, syrup. de fumo terræ, s. & comp. quamuis comp. pro parte sit purgans. Syrup. regis Sabor ex Mesue cap. de melancholia sanguinea. syrup. de epithimo. Concoquuntur humores calidi & tenues breui tempore: frigidi & crassi longiori: exhibendo semel, vel bis, vel ter in primis humoribus, videlicet tenuibus, qui parua egent concoctione. In crassis autem & frigidis, multo tempore. Quare errant qui in omni morbo perpetuo ter exhibent hæc medicamenta, cum quandoque fieri possit vacuatio ab arte sine concoctione ab eadem facta, quando talis à natura perfecta est: *Error exhibetium syrupos.*

Dosis tamen syruporum vnaquæque est ʒ. j. cum semisse vsque ad duas, & aquarum est trium vnciarum. Carpetani solent, & optimè, tantum dosim vnam syruporum & aquarum præscribere: etsi opus fuerit maiori concoctione, secundam, quandoque tertiam & quartam dosim præscribunt. Nos vero Valentini tres simul doses describere solemus, quæ morem non laudo, cum sæpe maior sit sufficiens minor concoctione, sæpe maior sit necessaria, ut prædiximus. Galli autem syrupos aquis miscent, addentes sacchari parum, & puluerem aliquem: quam mixtionem lento igne confectam syrupum aromatizatum appellant, Concoquetur bilis flaua Valentino more sic. ʒ. syrup. endiuiæ. s. & oxysaccharæ. s. an. ʒ. iij. misce.



## DE CVRAND. MORB.

item ʒ. aquarū cichoreæ, endiuæ & lactucæ an. ʒ. iij. misce. Eodē modo dabitur forma syrporū & aquarum pituitā vel atram bilē concoquentium, quamuis (vt prædiximus) maiori egeant concoctione pituitosi humores, maxima verò atrabiliarij. ¶ His itaque concoctis humoribus fiat eorum vacuatio propriis & necessariis medicamentis, tum simplicibus, tum compositis, quorum catalogum nota.

*Purgātia* Simplicia purgātia flauam bilem sunt hæc, rhabarbarum, *flauam bilem.* scammonium, myrobalani citrini, cassia fistula, māna, tamarindi, succus rosarum, aqua casei, & aloe. Composita verò sunt, electuariū de succo rosarū, elect. diaprunis solutiuum, elect. de psyllio, quo non vtuntur Valentini: hiera. s. pilulæ de hiera. s. pilulæ de rhabarbaro, pilulæ aureæ, pilulæ aggregatiuæ, quamuis bilem mixtam cum pituita euacuent, quemadmodum & elect. diaphenicon, cuius vis non transit hepar.

*Pituitam.* Simplicia medicamenta pituitam purgantia sunt agaricus, turbit, myrobalani chebuli, emblici, bellirici, coloquintida, euphorbium, esula, hermodactyli: Composita, sunt diaphenicon, electuariū indum vtrunque, benedicta hiera. s. & composita, pilulæ de hiera, elephanginæ, aggregatiuæ, de agarico, cochia de hermodactylis maiores, lucis fœtida, stomachicæ, sine quibus esse nolo.

*Atram bilem.* Simplicia purgantia atram bilē, sunt myrobalani indi, lapis armenus, lapis lazuli, sena, epithimum, polypodium, sunt tamē præter iuniores, qui damnant lapidē armenū, quia nō cognoscitur: & lapidē lazuli, propter eius vehementiam. Si tamen bene præparetur lapis lazuli, & lauetur, est medicamentum cardiacū, cum confectio Alchermes Regum hoc lapide etiā bene lauato cōstet. Cōposita, sunt diasene, cōfectio medicaminis, quod scripsit Hamēc, Hierā Rufi, pilulæ inde, pilulæ de fumo terræ, de lapide armeno, de lapide lazuli.

*De lapide lazuli.*

Formula purgantium medicamentorum compositorum, quarum tres purgant bilem flauam, tres pituitam, aliæ verò tres atram bilē dictæ sunt: perpetuo tamē non est exhibenda similis quantitas, cum varianda sit secundum naturā agri & humoris: certa enim rei quātitas neq; calamo scribi potest, neq; lingua proferri: imo quod difficilius est, idem homo in diuersis ætatibus diuersam habet naturā, vt constat ex Hip. aph. 20. secundi lib. quibus iuuenibus aliis, &c. Et propterea optime Hip. libello de purgantibus medicamentis docuit, quæ a medico sunt consideranda in purgandis humoribus: quibus etiam egeat interrogationibus: vbi etiam docuit alimenta nō recte adhibita morbū efficere, quanto magis medicam



dicamenta, à quibus potentiùs alteratur nostrum corpus.

*Prima formula potionis purgantis flauam bilem.*

*Potio.*

℞. medullæ cassiæ fistulæ recens per setam extractæ 3. vj. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuie 3. j. squinanti ʒ. iij. elect. de succo rosarum 3. iij. syrup. violarum 3. j. decocti florum cordialium, quod S. misce, & fiat potio.

*Secunda formula buccellarum (quas bolos appellant) purgantium flauam bilem.*

℞. medullæ cassiæ fistulæ recens per setam extractæ, vel *Boli.* loco eius diaprunis simp. 3. ss. elect. de succo rosarum 3. iij. sacchari quod s. misce, & fiant septem bucellæ, & plures, si opus fuerit.

*Tertia formula pilularum purgantium eandem bilem flauam.*

℞. massæ pilularum aurearum 3. j. diagridij optimi ʒ. iij. *Pilulæ.* fiant cum aqua endiuie pilulæ septem, & aurentur, si diues fuerit. Poterit æger, si non potest deglutire pilulas, neq; portionem bibere, aut detinere, ad euacuandâ bilem flauam accipere ʒ. v. vel vij. diagridij optimi cum 3. j. syrup. violati, vel cum 3. j. confervæ violarum, vel borraginis, vel rosarum, vel cum iure sine sale. Poterit etiam si abhorret à medicaminibus mali saporis, accipere 3. ij. syrup. rosarum alexandrinarum, vel rhodomellis earundem rosarum.

*Prima formula potionis purgantis pituitam.*

℞. diacatholiconis 3. ss. elect. indi maioris 3. iij. rhodomel *Potio.* lis 3. j. aquæ fœniculi, quod s. misce, & fiat potus.

*Secunda formula buccellarum purgantium pituitam.*

℞. diaprunis simp. 3. vj. agarici trochiscati 3. j. elect. indi maioris 3. iij. sacchari, q. s. misce, & fiant septem bucellæ, seu boli.

*Boli.*

*Tertia formula pilularum purgantium eandem pituitam.*

℞. pilularum de agarico & de hiera simp. an. 3. ss. diagri- *Pilulæ.* dij. ʒ. iij. cum aqua fœnic. fiant pilulæ vij. & aurentur.

*Prima formula potus purgantis atram bilem.*

℞. medullæ cassiæ recenter per setam extractæ 3. vj. con- *Potio.* fectionis medicaminis Hamec & diasenæ. an. 3. iij. syrup. borraginis 3. j. decocti florum cordialium, addendo 3. ss. epithymi & folliculorum sene, q. s. misce, & fiat potus, fieri potest cum sero caprino decoctum.

*Secunda formula bolorum purgantium atram bilem.*

℞. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ per setam 3. ss. *Boli.* pulueris epithymi 3. j. cōfectionis medicaminis hamec. 3. iij. & ss. sacchari, q. s. misce, & fiant boli vij. saccharo cooperti,

*Tertia formula pilularum purgantium atram bilem.*



*Pilule.*

24. pilularum de fumo terræ & indarum, an. 3. s. diagridij  
 g. iij. cum sero caprino fiant pilulæ vij. & aurêtur, si nō fue-  
 rit pauper. Similibus formulis vti poteris addendo, vel mi-  
 nuendo quantitatem medicamentorū purgantium tam sim-  
 plicium quam cōpositorum, secundum variam quātitatem,  
 & naturam humorum, & ægri: vnum est tamen maxime cō-  
 siderandū, ne tempore, quo purgare volumus ægrū miscea-  
 mus plura medicamenta siue simplicia, siue composita: nam  
 tempore breui multorum medicamentorum mixtura non  
 potest vnicam temperaturā, & formam acquirere. Actio illa,  
 quam medici barbari fermentationem appellant, sufficienti  
 & longo tēpore eget, quamuis interdum maiori, interdum  
 minori, secundum variam naturam simplicium, temporis, &  
 regionis. Quēadmodū theriaca magna ad sui generationē,  
 seu fermentationem sex, vt minimum, eget mensibus, antea  
 tamen dum recens, & non fermentata esset, somnum indu-  
 cit a 3. s. vsque ad j. 3. postea verò corruptis formis & tempe-  
 ramentis omnium simplicium, introductaq; vnica forma, &  
 temperatura, calida est in fine secundi ordinis. Compositum  
 enim medicamentū purgans si recens fuerit, non potest fœ-  
 licem & optatum finem inducere: nam prius vnum medica-  
 mentum purgabit altero, quandoque vnum impediet opus  
 alterius. Quare errant medici nostri in purgandis ægris va-  
 ria medicamenta miscentes, cum sufficiat vnū, aut alterum,  
 etiam si humor euacuandus sit mixtus, cum inueniri possit  
 medicamentum vnicam temperaturam & formam habens,  
 quod purgare valeat mixtum humorem. Quemadmodum  
 diaphanicon, & pilulæ aggregatiuæ. Sed quia in vsu medi-  
 camentorum purgantium timor est, ne maior copia humo-  
 ris educatur quā conueniat, ad quā facultas necessariō sol-  
 uitur, cum cuiusq; vacationi sit annexus casus virtutis, a-  
 liquando quoq; ab immodica purgatione fiunt alij affectus  
 præter naturam, vt febris: Quare perpetuō vacuatio parca  
 tutior est immodica: natura enim sæpe vel euacuat, vel resol-  
 uit derelictum a medicamento humorem: immodica tamen  
 & laboriosa purgatio fere semper fieri solet a medicamentis  
 prauam ac venenosam qualitatem habentibus: benigna e-  
 nim & salubria, vt cassia fistularis, rhabarbarum, manna, ta-  
 marindi, & myrobalani omni tempore, omni ætate, & etiam  
 vterum gerentibus audacter tribui possunt.

*Error quo  
 rindam.*

Si scire cupis quæ sint benigna, & quæ valētia, & qua hæc  
 egeant præparatione & correctione, Mésues suo i. lib. doctis-  
 simè tradit, & post ipsum breui epitome Ioannes Tagautius  
 duob



duobus libris de purgantibus medicamentis simplicibus, quorum priori vniuersales canones Mesuæ collegit, posteriori vero simplicia omnia medicis summe necessaria quinquaginta quinque capitibus scripsit, & illorum veram cognitionem etiam cum Græcis demonstrat, & aliis paucioribus componuntur omnia ferme medicamenta purgantia, quorum dosis in forma elect. raro excedit ʒ. iij. & in forma pilularum ʒ. j. quamuis si clementibus & benignis tantum componantur, dosis augeri possit.

Ad integram tamen & veram huius rei cognitionem (præter ea quæ Mesues suo antidotario, & Arnaldus de Villanova, & nunc eruditus Fuchsius suo Nicolai Myrepsij opere medicamentorum scripta reliquerunt) notare numerum sequentium medicamentorum purgantium, præcipue eorum, quibus nostræ officinæ, & nos vti-mur. Hic tamen quantitatem scammonij, esulæ, colocynthidis, hellebori, & similibus potentium, vncia vnius electuarius, & drachmæ vnius pilularum demonstrabo, quod non parum necessarium est medico: aliò qui tanquam cæcus in foueam caderet. Animaduertendum tamen est ʒ. g. xxiiij. continere, quamuis multi granis. xx. constare velint, apud primos ʒ. constat xxxiiij. ʒ. vel viij. ʒ. scire etiam oportet in construendis electuariis ʒ. iij. puluerum indigere lb. j. mellis, aut sacchari.

Diaphanicon Mesuæ tota compositio constat lib. vj. scammonij quantitas est viginti duarum drachmarum: errant ergo qui duodecim drachmas tantum miscēt. Huius electuarij quælibet vncia constat viginti duobus granis scammonij: propter dactylos tamē eius vis nō trāsit hepar. Dosis eius est a drachmis quatuor & semis vsq; ad drachmas decē & semis. Error nō nullorum.

Electuarij rosarum compositio Mes. constat libris tribus, & vnciis octo, scammonij quantitas est duodecim drachmarum: quælibet vncia huius electuarij habet grana decem & nouem scammonij cum dimidio: cuius dosis sunt drachmæ quinque.

Confectionis medicaminis, quod scripsit Hamec Mes. constat libris quinque cōpositio, scammonij quātitas est drachmarum duodecim: quælibet vncia huius electuarij habet grana tredecim cum dimidio scammonij, dosis eius est a drachmis duabus vsque ad quatuor.

Electuarij indi maioris Mes. compositio constat libris sex: habet hæc compositio præter alia potenter purgātia drachmas duodecim scammonij: & eius quælibet vncia habet grana duodecim scammonij: dosis est drachmarum quatuor.

Elect



## DE CVRAND. MORB.

Electuarij indi minoris cōpositio constat libris quatuor, habetque drachmas duodecim scammonij: quælibet igitur vncia huius electuarij habet grana decem & octo scāmonij, dosis est drachmarum quatuor & semis apud Mesuen, licet videatur maior inesse vis huic, quàm electuario indo maiori.

Electuarij diaprunis solutiui Nic. quælibet libra habet drachmas septem scāmonij: quare quælibet eius vncia habebit grana triginta octo scammonij: dosis eius est drachmis duabus vsque ad vnciam semis, quamvis Nic. vnus castaneæ quantitatem tribuat.

Electuarij de succo rosarum Nic. compositio libris duabus cōstat, habetque drachmas duodecim scammonij, quare quælibet eius vncia habet triginta sex grana scammonij, dosis est à drachmis duabus vsque ad quatuor. Nicol. tamen castaneæ quantitatem tribuit.

Benedictæ. s. Nic. compositio est trium librarum cum dimidia, habet hoc medicamentum drachmas quinque scammonij, & drachmas decem esulæ: quælibet eius vncia grana octo cum dimidio scammonij habet, & grana decem & septem esulæ, dosis est ad modum castaneæ Nicolao, aliis à drachmis duabus vsque ad vnciam vnam.

HieraLogodionis Nico. compositio est librarum duarum & octo vnciarum, eius quælibet vncia habet scammonij minùs quàm duo grana, & colocynthidis grana triginta sex. Dos is est Nicolao ad modum castaneæ, aliis tamen à drachmis duabus & semis, vsque ad drachmas quatuor: quæ in clysteribus verò datur, vncia vna & semis.

Electuarij Sebesten Mōtagnanæ compositio est trium librarum & trium vnciarum, & eius quælibet vncia habet grana sex cum dimidio scammonij: dos is est drachmarum quinque vel sex.

Electuarij Elefscoph Mes. compositio est libræ vnus cum dimidia, habetque drachmas sex scammonij, & totidē turbit, eius quælibet vncia habet scammonij & turbit an. viginti quatuor grana. Dos is est à drachmis tribus & semis vsque ad quatuor & semis.

Electuarij de psyllio Mes. compositio constat libris quatuor cum dimidia, & eius quælibet vncia habet scammonij grana viginti sex, & tertiam partem grani: dos is est à drachmis tribus vsque ad drachmas quatuor & semis,

Electuarij de psyllio Montagnanæ cōpositio constat libris octo, habetq; eius quælibet vncia scammonij grana viginti quatuor. Dos is est à drachmis quatuor vsque ad quinque.

Pil



# LIBER PRIMVS.

6

Pilularum aurearum Nic. compositio est trium vnciarum, habet scammonij drachmas quinque, habetque drachma earum scammonij grana quindecim: dosi est a drachma vna vsque ad scrupulos quatuor. Nicolaus dat nouem vel vndecim ad magnitudinem ciceris, huius magnitudinis septem habet quaelibet drachma.

Pilularum aggregatiuarum Mesu. compositio est sex vnciarum, & duarum drachmarum: habet scammonij drachmas sex, & quaelibet drachma habet scammonij grana octo & tres quartas grani vnius. Dosi est a drachma vna vsque ad drachmam vnam & semis.

Pilularum fumariae Auicennae compositio est vnciarum trium, & trium drachmarum, habet drachmas quinque scammonij, & earum quaelibet drachma grana tredecim, & tertiam partem grani vnius: dosi est a scrupulis iij. vsque ad drachmas ij.

Pilularum foetidarum Mesu. compositio est vnciarum septem, & drachmarum duarum, habet scammonij drachmas tres, & esulae drachm. duas, & colocynthidis drachmas quinque: quaelibet drachma earum habet scammonij grana tria & tres quartas grani vnius, & esulae grana duo cum dimidio, & colocynthidis grana sex, & quartam grani vnius purgant potenter. Quare errant qui cum Rhase cap. de resolutione dant drachmas duas & ss. cum earum dosi sit a drachma vna vsque ad scrupulos quatuor.

Pilularum mezereon Mesu. compositio est vnciarum duarum, habetque drachmas quinque mezereon, & quaelibet drachma earum grana viginti duo cum dimidio: quare earum vsus est suspectus, nisi in morbis magnis & praesente virium robore: dosi est a scrupulis duobus vsq; ad drachmam vnam.

Pilularum hermodactylorum maiorum Mesu. compositio est vnciarum octo, habet quaelibet drachma earum colocynthidis grana sex, & tres quartas grani, & euphorbij grana tria cum dimidio, & hermodactylorum grana sex & tres quartas grani: dosi est a drachma vna vsque ad drachmas duas.

Pilularum hermodactylorum minorum Mesu. compositio est vnciarum trium, quae habet scammonij drachmas duas & semis, & earum quaelibet drachma scammonij grana septem cum dimidio, & hermodactylorum grana quindecim. dosi est a drachma vna vsque ad drachmas duas.

Pilularum Arabicarum Nic. compositio est vnciarum vndecim, habet scammonij drachmas octo, & quaelibet drachma scammonij grana sex cum dimidio: dosi est ab vncia vna vsque ad vncias duas.

Pil



# DE CVRAND. MORB.

Pilularum cochiarum Rhase compositio est vnciarum trium & drachmæ vnius, & quartæ partis drachmæ vnius, habet scammonij drachmas duas & semis, & colocynthidis drachmas tres & quartam drachmæ vnius, & turbit drachmas quinque, & quælibet drachma habet scammonij grana sex, & ferme bis tertiam partē grani vnius, & colocynthidis ferme octo grana, & turbit grana propē quindecim. Quare *Error quod errant qui cum Rhase cap. de cephalalgia drachmas duas & vnam.* semis dant, cum earum dosis sufficiens sit drachmæ vnius.

Pilularum indarum Mes. compositio est vnciarū septem, & drachmarū quatuor: habet hellebori drachmas quinque, & colocynthidis drachmas quatuor, & eius quælibet drachma hellebori grana sex, & colocynthidis grana quatuor, & quatuor quintas vnius grani: dosis Mes. est a drachmis duabus vsque ad drachmas tres, quamuis drachma vna nostris temporibus sufficiat, vt multis placet.

Pilularum de lapide lazuli Mes. compositio est vnciarum septem, drachmarum quatuor, habet scammonij & hellebori nigri. an. drachmas duas & semis: & earū quælibet drachma scammonij & hellebori. an. grana tria: dosis est drachmarum duarum cum aqua casei, & succedit foelix vacuatio.

Pilularum de Agarico Mes. compositio est vnciarū trium habet colocynthidis drachmas duas, & turbit drachmas quinque, & earum quælibet drachma colocynthidis grana sex, & turbit grana quindecim: dosis est Mes. drachmarum duarum, alij verò dant scrupulos quatuor tantum.

Pilularum de elaterio Nico. Compositio est sex vnciarum cuius dimidiū est elaterium: quare quælibet drachma habet grana triginta sex elaterij, & ideo potētē purgāt, & nō sunt in vsu. Dosis est ab scrupulo vno vsque ad drachmam vnam.

Pilularum de opopanace Mes. compositio est vnciarum septem & quatuor drachmarum: habet scammonij drachmas duas, & colocynthidis drachmas quinque, & earum quælibet drachma colocynthidis grana sex, & scammonij grana duo, & quintas duas grani: dosis est a drachma vna vsque ad drachmam vnam & semis.

Pilularum de Euphorbio Mes. compositio est duarum vnciarū: habet hellebori & colocynthidis an. drachmas duas, & quælibet earum dragma hellebori & colocynthidis. an. grana octo: dosis est a drachma semis vsque ad vnam.

Pilularum sine quibus esse nolo Nico. compositio est vnciarum quatuor: habet scammonij ferme drachmas tres & semis: & earū quælibet drachma scammonij grana octo: dosis est Ni-

colao



colao decem, vel tredecim pilulæ ciceribus similes, & est pō-  
dus drachmæ vnius, & semis, aliis verò est a drachma vna  
vsque ad drachmas duas.

Ex his & similibus quæ à doctoribus scribuntur, scire po-  
test medicus dosim medicamentorum compositorum pur-  
gantium, quamuis simplicium dosim prius oportet cogno-  
scere, etiam si talium in compositis propter correctionem,  
& alia maior quantitas dari potest: scammonium enim so-  
lum & non correctum malo cotoneo rarò datur: si quantitas  
excedat grana septem, in electuario de succo rosarum, vel  
diaprunis solutiuo, passim dantur graua decem & octo, vel  
plura, cum dosis eius sit vnciæ semis.

Vnum tamen est maximè considerandum à nobis, ne uta-  
mur medicamentis potenter, & violenter purgantibus, vt  
sunt scammoniū, colocynthis, helleborus, & similia, nisi ra-  
rò, & in magnis morbis, & cum sunt bene correctæ, præfer-  
tim in febribus, & morbis calidis. Nostri enim temporibus  
(quæ in hoc fœliciora sunt) vti possumus semper etiā in vte-  
rum gerētibus, & pueris, clementioribus, quæ benedicta di-  
cuntur, vt sunt, manna Arabū, cassia fistula, rhabarbarū, my- *Benedicta*  
robalani & tamarindi: tēpore tamen Græcorū pruna dama- *medicamē*  
scena erāt cognita clemētissima in purgādo, & aloe quoque. *ta.*

Facta iam totius euacuatione siue per sanguinis missionē *Redio ad*  
cum oportet, siue per medicamenta purgantia: necesse est e- *curationē.*  
uacuare à parte affecta per partes proximas, scilicet per na- *Derinatio.*  
res vel palatū, præcipue cum est materia pituitosa: de his ta-  
men cap. de apoplexia fiet sermo copiosior. Laborās hoc mor-  
bo sæpe post totius euacuationē mādāt sequentē apophleg-  
matismū (quod nostri barbari medici masticatorium appel-  
lant) præcipue ventriculo vacuo. ℥. pulueris mastichis, si- *Apophleg*  
napis, piperis, pyrethri, zinziberis, origani, thymi, pulegij. *matismus*  
an. 3. ℥. cum syrupo de stichade fiāt pilulæ ad ciceris magni-  
tudinē. Naribus quoq; sæpe tūc admoueat sequēs liquor:  
ore tamē pleno aqua: ne descēdat ad vētriculū prædictus li-  
quor. Cuius hæc est descriptio. ℥. succorū cyclamini, siclæ,  
ceparum, & maioranæ an. 3. ℥. pulueris piperis & castorei an. *Errhinum*  
3. j. misce. His iam factis, raso capite & cōfrictō panno lineo  
præcipue in causā frigida, vbi maiori opus est frictione, ad-  
mouenda sunt parti affectæ olea, vnguenta, & alia medica-  
menta, de quibus Gal. primo de cōpositione secūdum locos,  
& Aetius 6. sermone c. 55. & Paulus 3. lib. Nos tamē duo tan- *Vnguentū*  
tūm vnguenta describemus experta, & optima prius alope- *causæ ca-*  
ciæ, quæ fit à causā calida: posterius ei, quæ fit à frigida. ℥. *lidæ.*  
pul



## DE CVRAND. MORB.

*Causæ frigida.* pulueris corticum auellandarum, amygdalarum, castanearum & nucum tostorum an. 3. j. pulueris stercoris caprarum. 3. ij. olei laurini, & rutæ an. 3. ij. olei rosarum. 3. j. aceti coclearium. j. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum, quo vttere in defluuio hoc pilorum, quod fit à raritate cutis & penuria materiæ pilos generantis: cui etiam confert mixtura ex oleis lentisci, myrtillorum, & omphacino cum laudano. Alterum vnguentum conferens causæ frigida est sequens, 2℥. pulueris vtriusque hellebori, staphisagriae, sinapis, piperis, stercoris columbi, radicum cannarum, & foliorum ficuum an. 3. j. oleorum euphorbij, castorei & rutæ an. 3. ij. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum, quo sæpe vnguatur pars depilata præcedente forti frictione, & incisione aliquarum partium, quæ non est facienda, cum est causa calida.

Postquam de pilorum decidetia egimus, non erit extra præsens institutum in præsentia agere de iis quæ pilos augent, & quæ ipsos aureos efficiunt, & tandem de iis quæ nigros reddunt.

*Aurentia pilos.* Frequens & assidua frictio, & capitis lotio decocto adianti auget pilos, dicitur tricomenes, quia facit luxuriare capillos, & subnasci, vel polytricum, quia creat capillorum multitudinem: & dicitur etiam callitrichon, quod crines denset, crispet, pulchriorisque reddat, ab aliis ebenetrichon appellatur, præcipue genus nigrum, vox enim ebeni capillum significat nigrum: est officinis capillus veneris. Pectinatio etiam assidua idem efficit: & quæ causas pilorum augent præsertim effectricem, vt vinum, & alimenta omnia calida, & vaporosa.

Idem facit lotio frequens decocti agrimonie, corticis ulmi, verbenæ, corticis salicis, absinthij, abrotani, seminis lini combusti, & cineris radicis arundinum, adde in fine parum lactis caprini. Lotio aquæ vitæ addendo parum aquæ rosarum, vel myrthillorum idem solet efficere.

*Aureos reddentia.* Aureos efficiunt capillos multa, quorum nostræ fœminæ satis plenam & certam tenent cognitionem: inter ea tamen, quæ maximam habent vim, est aqua (qua aurum ab argento separatur, & dicitur ab illis fortis) caute tamen est admo- uenda, nam si tangat cutim & carnem, corrodet.

Aqua mellis per distillationem facta vitreo instrumento aureos reddit pilos, & sine cutis & carnis nocumento, quamuis ipsos scindat. Decoctum seu lixiuium ex cinere genistæ seu genestæ, (quam spartum seu spartion appellant, & Arabes albahin seu albrachim) capillos aureos sine dubio efficit,

*Nigros efficietia.* hoc quotidie nostræ Valentiniæ experiuntur.

Nigros capillos multa faciunt, vt Dioscorides, Gal. Paul. & Actius



Aetius volūt, de quibus omnib. in præsētia agere esset pręter nostrum institutum: aliqua tamen experta primò simplicia, deinde composita scribemus: semen myrti, semen papaueris nigri, cortex nucis, cortex mori celli, sumac, alcanā, & lac ficuum, folia cupressi, fumus picis liquidæ, fumaria.

Compositum hoc pilos satis nigros efficit, quorū nigror viginti diebus conseruatur, accipe calcis viuæ integræ (quæ dicitur gleba) libra j. ß. infundatur in aqua per diem facta noua infusione quinquies, eiectionis prioribus aquis, postea reiecta aqua adde illi calci lotæ lithargirij puluerizati 3. j. ß. horis sex, & tali mixtura vnge pilos nocte ponendo desuper folium brasicæ, vel pannum lini: postea præcedenti eorum leui frictione, seu agitatione lauentur sapone & lixiuio cōmuni clementi: est expertum. Hoc quoque medicamentum ipsos nigros reddit. Accipe lixiuij potentis, quo saponarij vtuntur lib. j. pulueris lithargyrij. 3. j. bulliant simul, donec pili candidi illo liquore nigrescant, facto sæpe & sensim experimento, deinde conseruetur liquor, quo actu calido, cum opus fuerit, poteris nigros facere capillos, interponendo pectinem inter cutim & capillos, quos, cum denigrati fuerint, exsiccare, & aqua callida ablui oportet.

### Scholium.

**D**ecidentia pilorum, quàm caluitiem.) Pili veræ partes non sunt, quia vita carent, & vero nutrimento. Cum tamen habeant propriam circumscriptionem in corpore, & partes cor & per se consistere possint: inter partes numerantur à Gal. 2. de temporis dicā. peramentis, ubi inter veras nostri corporis partes, eorum temperamētum inquit: & 14. methodi, ubi pilorum defectum morbum in numero partium deficiente appellat. His pilis (qui in corpore generationem habent necessariam, ex excrementorum euacuatione) abutitur natura ad ornatum & tegumentum: vt in illis, qui in capite, & mento implantantur, videre est. Qui verò in supercilijs habentur, humores a capite per frontem defluentes, ne oculos ingrediantur, prohibet: sicut pili palpebrarum exigua corpuscula. Cum ergo decorem inter alia pili in nobis concilient, meritò eorum curam suscipimus, corrigentes affectus, qui in eis præter naturam euenire solent. In pilis consideramus substantiam (hoc est ipsos pilos) in defluuium pilorum, caluitie, Alopecia, & Ophiasis: colorem verò in vitiligine. Defluuium pilorum si largè sumatur, omnia vitia, in quibus pili deficiunt, comprehendit: Quid sit propriè tamen (de quo nunc agimus) tantum significat omnium pilorum def. ctū. Hic morbus est in numero deficiente, nō quia deficiat vera pars, sed quia deficit pars ad ornatū corporis necessaria: ac proinde, & quot cum



# DE CVRAND. MORB.

modis su- cum deficit, est restituenda, ac si esset una ex partibus, quæ veræ sunt.  
matur. Habet morbus hic duas causas. Raritatem cutis unam, & alteram  
Causæ de- defectum nutrimenti. Raritatem cutis cognoscemus. 1. Quia pili, qui  
fluvii pi- exciderunt, eandem quam antea habebant, crassitiem servant: non e-  
lorum. nim sunt extenuati, cum alimentum eis non defecerit. 2. ex causa ali-  
qua, quæ præcessit, rarefaciente cutem: med. scilicet calido, aut lotione  
aliqua calefaciente. Si nutrimenti defectus causa est, eum colliges. 1.  
ex tenuitate pilorum, excrementum enim, quod cuti advenit, est paucum  
& exigue apponitur. 2. ex morbo præcedente: solet enim in plurimum  
hoc defluuium febrem ardentem, aut Tabem sequi, de eo enim Gal. 1.  
de comp. med. secundum locos cap. 2. sic scribit: consuevit hæc circa pi-  
los oblatio, sæpe iis qui egrotarunt accidere, raro autem citra morbum.

Quid cal- Caluities defluuium pilorum est, sed in Sincipite tantum ob cutis  
uities, & duritiem, & siccitatem eueniens: proinde qui in pueritia hanc cutē ha-  
eius causa, bent multum siccā, in senectute calui fiunt: unde non recte Arist. cal-  
uitiem dixit fieri ob inopiam humoris calidi: neque Hieme. ob raritatem  
cutis, neque Argenterius ob defectum terre excrementi: reuera enim  
in caluis excrementum non deficit, non potest tamen penetrare ob cutis  
densitatem, ac proinde Gal. aliquando caluitiem ad defectum humorum  
refert, non quod deficiant, ut diximus: sed quia non possunt penetrare,  
Duplex & sic videtur deficere. Atque hæc est caluities ætatis discursu facta:  
Caluities. est enim altera vi morbi in iuuentute etiam eueniens, potissimum mu-  
lieribus ex raritate cutis & defectu alimenti. Hanc autem à prima di-  
stingues, quia caluities ratione ætatis adueniens, sensim fit, quia sensim  
cutis densatur: illa, quæ vi morbi accidit, affatim & repente scitur.

Quid sit Alopecia & Ophiasis sunt casus pilorum capitis, non omnium, sed  
alopecia aliquorum, unum in duobus est malum: distinguitur tamē ob figurā,  
& ophia- & squammas: nam in ophiassi læsa capitis pars serpenti assimilatur,  
sis. squammosa que est. Quæ ab occipite duorum digitorum latitudinē non  
Causa alo excedens, usque ad aures serpit. At alopecia (quæ à vulpe nomen acce-  
pecie & pit) nullam propriam habet figuram: & in ea cutis squammis caret.  
ophiasis. utraque affectio fit à vitiosis humoribus per vitiosos humores seu cor-  
ruptos non intelligēs cum Ronoletio tenues & serosos, sed sanguinem  
prauum, biliosum, pit. aut melancholicū: ex eo enim (cum minus recte  
mutetur, & nutriat) non assurgunt excrementa, quæ sunt materia pi-  
lorum: possumus etiam per vitiosos humores, aduſtos, aut praua qua-  
Curatio litate infectos intelligere. Vitiligo est cutis deprauatus color.

Vitiligo Curabis supradictos affectus hoc modo, à defluuiis pilorum incipiēs.  
quid. hoc. n. cum sit morbus in numero partium deficiēte, curabitur restituēdo  
Curatio partē quæ deficit: quæ cum ex excremento tertiæ concoctionis tanquā  
defluuii pi ex materia generetur, oportebit alimētū attrahere parti, ut ea nutrita,  
lorum. excrementis abundet. Opus præterea erit cutē roborare, & reducere ad  
moderatā densitatem. Hæc cōmodè præstābimus medicamentis calefa-  
ciēte



cientibus (sic enim legendum est, & non humectantibus, ut legitur 2. de Corrigitur comp. secundum locos cap. 2.) modicè adstringentia permiscentes, calida locus Galem enim attrahent sanguinem, et sic sua substantia caliditatem cutis (si aliter leni, quæ est) temperabit, cum temperatum, aut minus calidum, id quod magis calidum est refrigeret. Iam ergo astate raso capite, & hieme tonsis capillis, frictione utemur leui, ut ex attrahito sanguine calida intemperie curata, roboretur cutis, & ad mediocrem densitatem restituatur. Deinde oleis lentiscino, mirrhino, aut nosiro hispano, cum ladano ad vnguenti formam reductis vngemus caput. Præterea in hoc defluuiio pilorum, non est Sanguinis sanguis mittendus ratione affectus: quia neque raritas cutis, neque demissioni affectus alimenti euacuationem postulant: neque est purgandum, quia non defluuium contingit ex cacochimia, & si in renis vitiosus sit sanguis prædicta exerpilorum. cebibus remediari non propter affectum pilorum, sed venarum: ac proinde non videtur audiendus auctor, cum dicit pilorum defluuium à sanguine Reprehensum, curari sanguinis missione: non enim video, quo modo à sanguine, dicitur aut alio humore oriri possit.

Etot.

Caluities si ratione ætatis contingat, non potest curari, quia neque curatur densitas à stecitate procedens: at caluities in morbo orta, ea ratione, caluitiei ne, quæ alopecia, curari solet.

Alopecia et ophiasis cum ex vitiosis humoribus malè partem nutriendis proveniant, curantur, purgantes peccantem humorem: Quem ex Ophiasis cutis colore cognoscet: cutis enim in qua desideratur pili, humoris redundantis admittit colorem. Id etiam deprehendes ex antea facta vita, natura hominis, & anni tempore. Neque omittenda hoc in loco erit sanguinis missio, si affectus venarum postulet, hoc est sanguis vitiosus. & si obiectio. Obiectio. cias Gal. hoc remedium omisisse, respondeo, consultò id fecisse, tantum agens de partis affectu. Post purgationem ad Apophlegmatismos accedes: hi enim ex ventriculis cerebri & renis aliquantulum euacuabunt. Utinò administrabis topica, hoc est localia medicamenta. Quæ constabunt ex medicamentis discutientibus prauos humores cutis, & attrahentibus sanguinem. Qualia sunt Thapsia mixta cum cerato ex oleo confecto, ut eius calida vis tepescat: synapi etiam, Euphorbium & alia valè calida, temperata tamen, ne exulcerent. hoc in loco advertere oportet, nos non agere de pilorum defluuium à morbo Gallico eueniente, de quo postea disputaturi sumus.

Colorem in pilo curabimus, remedium applicantes vitiligini quod aliter Curatio vitiliginis in pilo. mentum cuti adhærens dissipet, & attrahat sanguinem: ut parte rectè tracta color nutrita, excrementum colorem in pilo mutet.

An verò sumpto medicamento purgante. Cum nullum medicamentum purgans actu, cognitum extet, nisi fortè pilula de chamelea Dioscoridis: sed omne potentia, purgandi facultatem habeat, inde habuit ortum controuersia, quæ quaeritur: An post assumptionem medicamenti An ab assumptione purgantis sit dormiendum. Bætius semper, Valentini tantum in solis sumptione.

b

med



**medicamē-** medicamentis somnum imperant. Ego verò existimo medicamentum si-  
**ti purgan-** ue liquidum sit, siue solidum etiam in vigilia in actum reduci. Nisi vē-  
**zis sit dor-** tricus sit languidus: tunc enim in omnibus medicamentis somnus uti-  
**miendum.** lis est, longior in solidis, breuior verò in liquidis.

Cur post Opere autem incepto semper somnus.) Multis rationibus dormien-  
**assumptio-** dum non est, quando humor attractus à medicamento purgante, inceptit  
**nem medi-** expelli. 1. Quia cum excretio per alium sit actio voluntaria, in somno,  
**camenti** (in quo oriatur animalis facultas) non fiat, sequentiūque ea incōmoda,  
**purgantis** quæ ex humore in ventriculo & intestinis violenter detento sequi solēt,  
**non sit dor-** angustia, morsus, cardialgia & similia alia. 2. Quia in somno ex reuo-  
**miendum.** catione sanguinis ad interna, replentur venæ, per quas humor peccans à  
 medicamento trahitur. 3. Quia tempore somni calor, reuocans, mutabit

An ab as- medicamentum in familiarem humorem. Consuetudo autem, quam ser-  
**sumptione** uabant auctor & sui temporis medici, ius gallinæ insulsum tribuentes  
**medicamē-** ante prandium, iam aboleta est, & merito: quia reuera ius gallinæ, aut  
**ti purgan-** arietis non extergit: imò impedit purgationem, obtundendo vim medica-  
**zis sit ali-** menti. Medicamentum autem extergendi vim habens à nobis tribui so-  
**quid exhi-** let in die purgationis, aut in sequenti die. Si in die purgationis tribua-  
**bendum.** tur, statim post medicamenti assumptionem id fiat, quando medicamen-  
 tum est validum: ut nulla eius portio in ore ventriculi maneat, vel ut  
 medicamentum ad fundum ventriculi descendat, in his hominibus qui  
 ab amaris sentiunt molestiam, & in his qui facile vomunt. Die sequen-  
 ti, quando medicamentum validum est, decocto hordei cum cortice &  
 pauco saccharo, aut alio extergente utimur propter dictam rationem.  
 Quod si purgatio diminuta præcessit, clysterem extergentem, & pur-  
 gantem, ex diacatholicon, benedicta, aut confectioe hamec infundes.

Si fuerit pilorum decidentia à flaua bile.) Humores in corpore, qui-  
**Quid sit** dam sunt turgentes, & alii in aliqua parte firmati. Turgentes humores  
**humor tur** dicuntur illi qui in loco putredinis, tantam tenuitatem & acrimoniam  
**gens.** contraxerunt, ut irritata expultrice partium facultate, eos hinc inde  
 expellat, unde turgentia duas habet conditiones. Prima, ut humor hinc  
 inde moueatur, eo modo quo animal coitum appetens. 2. est, ut pars irri-  
 tetur ad expellendum. Ac proinde Hip. Turgentiam aliquando collo-  
 cat in humoribus, cum 4. Aph. sent. 1. eos turgere scribit: & aliquan-  
 do in parte 3. de fracturis sent. 18. ita ut partem turgere nil aliud sit,

**Quid sit** quàm incitari ad rei molestæ expulsionem. Humores firmati illi sunt,  
**humor non** qui in aliqua quiescunt parte, obstructi, ut in febris: aut inculcati,  
**turgens.** ut in tumoribus præter naturam. Iam si humor turgeat, statim hoc est  
 in principio morbi, purgante medicamēto educendus est, ex Hip. 2. Aph.  
 sent. 2. indicatione sumpta ex eius tenuitate, ob quam nec ab obstru-  
**Purgatio** ctione eius transitus impeditur. Quod non est difficile intellectu illi, qui  
**humoris** non ignorat, obstructionem in vena, aut arteria non claudere omnino  
**turgentis.** meatum: Dices nonne Gal. 1. Aph. com. ultimo in turgentia occasionem

arrip



arripit propinandi decoctum ex thymo, origano, hyssopo, aut alio simili, quod vehementem extenuandi facultatem habeat? Respondeo, Galenum supradictis uti medicamentis, non propter obstructionem, ut ipsam aperiant ad purgandum, quoniam hoc etiam seruandum est in humoribus non turgentibus: sed quia aliquando, turgente humore in principio non potest purgare, quia medicamentum deficit, tunc accepta hac occasione, exhibet aperientia, ut obstructione aliquantulum aperta, cesset putredo, & cum ipsa turgentia. Si humor sit in parte firmatus, purgandus non est, quin coctio precedat: iuxta præceptum Hippocr. 1. aph. sent. 22. Purgatio ubi concocta medicari (quod est purgare) præcipit, quod semper obseruandum est etiam in multo humore, cum purgatio concoctionem imperis non turdiat, & coctio quietem requirat. hæc autem concoctio à natura fit, quæ gentis, semiputrem humorem alterat, reducat ad benignum id quod potest: reliquum verò tanquã inerte expellens, ut in Cr. sibus experitur: quo tempore solam instituiimus victus ratione. Quod si natura non expellit, aut non integrè expellit, tunc debet medicus ei suppetias ferre, & purgatione facta eius defectum supplere, aliter sequetur recidiva, ut aph. 12. lib. 2. nos docet. ut autem id commodè præstare possimus aduertenda est sententia Hip. 9. lib. 2. aph. quæ sic habet, Corpora quæcunque quispiam purgare voluerit, oportet fluida facere: quod est, ante assumptionem medicamenti purgantis, debet corpus præparari. Quinque autem Quinque modis fieri solet corporis præparatio: prima cum ante assumptionem medicamenti vomitu, aut deiectione per aluum purgatis, aqua tepida, & paratur lubricantibus medicamentis consuetam reddimus naturam ad tales e-corporis ad uacuationes: quam præparationem tanquam notam omissam fuisse ab purgatione Hippocrate scribit Galen. 4. aph. com. 13. Secundò Præparamus corpus nem, humectantes ipsum, alimentis, potu, balneo & quiete: quando helleboro purgare volumus 4. aph. sent. 13. ne in violentia motus sequatur conuulsio, ob consensum, qui est inter orificium ventriculi & cerebrum. 3. Præparatio exercetur, quando humorem crassum attenuamus, sicut 4. cum glutinosum incidimus. Plima verò nil aliud est, quàm meatuum apertio, quæ vilebitur aliquibus coincidere cum 3. & 4. quia incidere glutinosos humores, & attenuare crassos, nil aliud est, quàm aperire. reuera tamen res est diuersa: aperimus enim obstructionem, at incidimus & attenuamus, etiam si non sit obstructio. Hæc autè corporis præparatio varia, non solis medicamentis, sed alimentis etiã & potu exercenda venit: nam quid proderit assumere medicamentum humorem attenuas, si carnem hircinam, vinum crassum, & alia, quæ crassos generare solent humores non omittimus? Ac proinde non mirandum, si medicamentum purgans, etsi optimum, non agat, aut si euacuet, cum torminibus tamen An sit præ & mala tolerantia. Præter dictas corporis præparationes, quas arte parandus præstamus ad humores comòdè purgandum: nullã aliã à Gal. aut Hip. humor re- legimus scriptã: proinde existimo errare eos medicos, qui humore tenui nui,



# DE CVRAND. MORB.

præparant, eum incrassando: quia si humorem crassum attenuamus, ut liberè educatur, quæ ratione adducti humorem biliosum, qui ex sua natura tenuis est, incrassabunt? Respondent aliqui, eius præparatione non esse incrassationem, sed acrimoniæ retusionem. Quod falsum esse hinc intelliges, humor biliosus post coctionem debet purgari iuxta sententiam Hipp. lib. 1. aph. 22. & cum in coctione bilis, victa à natura mitior reddatur, ut Galen. lib. 2. de rat. vic. in mo. acutis com. 44. docet, superfluum ergo erit labor eorum, qui temperare conantur bilem, ut eam expulsionem præparent. Quid autem debeamus in tenui humore efficere, breui accipe. Si humor tenuis peccat tenuitate, incrassandus est, ut crassior & frigidior factus non penetraret, & hoc nomine minorem inferat molestiam, ut in dolore colico à bile factò videre est. Quia bilis si non qualitate, sed quantitate peccet, ita ut corpore educenda sit, varia eget præparatione: si sit in pectore, ut in pleuritide contingit, attenuanda erit, consilio Gal. propter eam rationem, quam capite de pleuritide videre poterit: si verò humor tenuis in asperis pulmonum arteriis, à capite distillans inclusus maneat, cum in tussi impetu aeris educi debeat, aliquantulum incrassandus est, ne ab aëre ob tenuitatem diuulsus, ibidem immoretur. de his tamen præparationibus humoris tenuis non agimus, quia non fiunt eo consilio, ut humorem medicamento purgante euacuemus: quem si purgare intendimus, nulla procuratione eget, sicut neque aqua in hydrope. Quod si in tertiana & ardenti febre, quæ à bile fiunt, attenuantibus utimur, ea propter humorem crassum, obstruentem præstamus: non enim humor tenuis obstruere potest, ut lib. 2. agentes de febribus explicabimus. Ex dictis intelliges, errare eos, qui syropos, humores concoquere affirmant, cum humoris coctio à sola natura fiat: nisi dicamus concoquere illa medicamenta, quæ seruant naturæ vim, & calidum innatum. Syrupi verò, quos hi concoquentes appellant, corpus præparantes ducèdi sunt, ut paulò supra docuimus.

**Syrupus duplex.**

Primò omnia medicamenta frigida.) Medicamentum, quo corpus ad purgationem paramus, syrupus nominatur. Hic duplex est, vnus clarificatus in officinis seruari solitus, qui nil aliud est, quàm medicamentum liquidum ex succis, aut aliis plantarum partibus, cum humore aliquo percoctis, & mellitis, aut saccaratis, ad saporis gratiã, aut custodiæ diuturnitatem. Talis est syrupus fumi terræ, borraginis, & similes alii, quorum dosis est. ℥. ij. cum duplo decocto aliquarum herbarum. Alter Apozima dicitur, quod medici in ægrorum domibus præscribunt ex decoctis herbarum & radicum cum melle aut saccaro. Paratur etiam ex aquis,

An liceat & ex syrupis officinarum, decoctis tamen, permixtisque seminibus aut uti aquis trociscis. Solent multi aquis per alambicum extractis cum saccaro, aut distillatis aliis syrupo clarificato uti: ut corpus præparent. Qui mos non placet Musæ, & aliis scrupulosis hominibus, variis rationibus adductis. Quidã ex eo quod aquæ per alambicum extractæ caliditatem contrahant, ac proinde



proinde in his destillatis aquis, solum concedunt calidarum usum & non frigidarum, nisi frigida aqua seruet odorem rei, à qua destillatur (ut est aqua rosarum) tunc enim concedunt ipsam. Alii harum aquarum usum non probant, existimantes eas ex aere aut plumbo prauam acquirere qualitatem. Horum rationes leues sunt: prædictæ enim aquæ neque calorem acquirunt, neque qualitatem ex aere aut plumbo. Non acquirunt calorem, quia non vruntur, & ita si calefiunt, statim illa caliditas euanescit: non acquirunt prauam qualitatem, quia neque plumbum, neque æs tunc liquantur. Existimo ego non esse vrendum his aquis stillatiuis, eo quod solum medicamenti tenuem partem continent, cum nos aliquando crassam & roborantem desideremus: tum quia succus potentius agere solet. Verum est, coactos aliquando vti debere stillatiuis aquis, in penuria herbarum, qualem non habemus in hac Valentina ciuitate.

Simplicia flauam bilem) Hæc medicamenta neq; concoquentia sunt, neq; his debemus præparare corpus ad purgationem bilis: ut ex superioribus didicisti. Adde hæc esse frigida, & proinde augere obstructionem.

¶ Pilularum de fumo terræ.) Tria hoc loco animaduertit auctor: Examinā- Primum tempore quo purgare volumus, non esse miscenda plura medi- tur tria- camenta purgantia, quia tempore breui non potest fieri fermentatio, ac quæ aduer- proinde non poterunt in vnā formam venire. Secundum compositū me- tit auctor. dicamentum recens non posse recte purgare, quia prius vnum altero pur- gabit, & vnum impedit opus alterius. Tertium in purgationibus tu- tiorem esse euacuationem parcam, immodicā. Hæc ille. Quæ trutinā po- stulant. Quod primò admonet, non potest constare. Quamuis enim me- An vten- dicamenta composita, in officinis seruata, fermentationem patiuntur: po- dum pur- tißimum æstatis tempore, quam colligimus ex eorum ebullitione, non gantibus proinde ut eis vtamur, expectandū erit, ut fermentatio absoluta sit. Nam in eorum ante ipsam & postea, imò vigente etiam fermenta- tione, ipsis vtimur cum fermenta- felici successu. Neque enim tunc medicamenti vis impedita est. Secunda tione. admonitio etiam est falsa. Galen. enim lib. quos quibus & quando pur- gare oportet cap. vltimo, agens de mixtione medicamentorum purgan- Aequalis- tium præcipit, ut medicamenta purgantia, quæ miscentur, sint consen- purgatio- tientia, ut æqualis fiat purgatio. Est autem æqualis, quando medica- quid sit. menta simul operantur, aut quando cessante vno ab actione, alterum in- cipit: ita ut fiat vna continua euacuatio. Nam si vno cessante, longo post tempore alterū incipiat agere, est inæqualis euacuatio, ac proinde dam- nanda, quia vires, quo tempore refici debent, conflictantur. Qua in par- Mala lo- te admoneo lectorem, ut in versione Loquillati aduertat vltimum caput quillati libri, Quos, & quando purg. oportet, ita enim malè versum est, ut latina versio. lecti contrarium habeat ab iis, quæ in græca continentur. Vltima ad- In immo- monitio auctoris seruanda est. Si autem contingat immodica purgatio, dica purga- quam ex defectu virtutis colliges: succurrere poteris frictione parcium tione quid- extremarum. Offam etiam panis bis cocti, aut regii à nostris dicti in op- faciendum.



# DE CVRAND. MORB.

simo vino intinctam offeres. Eiusdem etiam panis interiora vino ebriata, & cinamomo inspersa, supra ventriculum appones.

## De morbo Gallico. CAP. II.

*Descriptio morbi Gallici.*

**H**ic morbus Gallicus, quem & Hispanum & Neapolitanum nominant, nostro sanè malo hisce temporibus affectus notissimus, antiquioribus vero ne per omnium quidē notus: detestandus tamen perpetuò, qui cum a pudendis incipiat, in linguā terminatur vario & dolorum & pustularum prouentu, ac præcipuè noctu corpus discrucians. Fit autem a quatuor humoribus a naturali temperie per exustionem in malignam quandam naturam degenerantibus, a contagio vt plurimum primò affectis. Deprehenditur hoc malum, quia in pudendis a principio pustulæ apparent, crustis obtectæ, siccæ & lactea nōnunquam sanie manantes. Iam & in fronte, & circa radices capillorū pustulæ, seu veriùs dixeris, tubercula diuersi coloris oriuntur, modò citra vilius medicamenti opem desiccata, modò hinc inde frequenter renascētia. In capite summa inest grauitas, in collo, humeris atque adeò omnibus articulis perpetuus cruciatus, dolorificis ibi tumoribus præter naturā obortis: quū cum difficile discutiantur, tardēque suppurentur, in nodos sæpe ac durities migrant. Ad extremum fauces palatūque & insuper lingua nigris foetidisque erumpentibus pustulis turpiter exeduntur.

*Victus ratio.*

Hic morbus curatur primò victu humectate, & in actiuis temperato, vel parum calido: quæ atram bilē efficiunt, maxime nocent, vt caro leporina, bubula, hircina, & ceruina, caseus antiquus, omnia salsa, & legumina: similiter quæ faciliè putrescunt, vt pisces, & lac. Conferunt, quæ bonum succum efficiunt, vt panis optimi tritici, pullus gallinaceus, gallina, caro arietina hispanica, vitulina, hœdi, conturnicis & similiū: de quibus libello de bono & malo succo, libris de tuenda valetudine & de facultatibus alimentorū multa à Galeno tradita sunt copiosissime: perpetuò tamen cōsiderandæ sunt vires ægri, & morbi magnitudo. cōsideranda quoque est sententia Hippocratis i. lib. aphor. quibus semel, aut bis, &c. in cibandis omnibus ægris, vtatur, si potest, exercitatione, præsertim vētriculo vacuo, abstineat venere & animi perturbationibus, quæ bilē atrā augent, vt sunt ira, tristitia & similes.

*Sanguinis missio.*

Secundò, sanguinis missione, præsertim si fuerit morbus recens: vbi vires sunt maiores secta vena iecoraria, aut comuni, vt sanguinis copia respondeat plenitudini, fiatque vacuo



vacuo ventriculo & intestinis, nisi timeatur subita suffocatio, aliquando bis aut ter sanguis est mittendus.

Tertio concoctione per hæc vel similia. ℞. syrupi fumarie. *Syrupus præparas.* s. & borraginis. an. ℥. vj. syrupi fumarie comp. & epithymi an. ℥. ij. misce. Item. ℞. aquarum fumarie, borraginis, lupulorū, & quinque radicum. an. ℥. viiij. misce, facta iam concoctione, diebus nouem.

Quarto vacuatione atræ bilis per hoc, vel simile medicamentū. ℞. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ. ℥. vj. confectionis medicaminis quod scripsit Hamec. ℥. iij. s. diachartami. ℥. ij. s. syrup. borraginis ℥. j. decocti florum cordialium, quod s. misce, & fiat potus. Vel ℞. pilularum de fumo terræ, & hermodactylorū maiorū an. ℥. s. diagridij ḡ. iij. cum aqua buglossæ, fiant pilulæ vij. Deinde per aliquot dies roboretur ventriculus, & partes principes, sanguisque purior efficiatur electuario diarhodon Abbatis, vel conserua borraginis, aut buglossæ cum aqua, aut decocto borraginis, vel buglossæ, vel fumi terræ. Fiat quoque bis, vel ter in mense corporis purgatio, his, aut similibus pilulis. ℞. pilularum de fumo terræ, hermodactylorum maiorum, & indarum. an. ℥. ij. cum aqua buglossæ: fiant pilulæ xv. adde cuilibet earum granum. j. optimi diagridij, doses tres.

Quinto vtatur exercitio forti & balneo, donec sudet copiose bibat tūc per aliquot dies oleū cōmune quantitatis. ℥. iij. cū ℥. j. optimi sacchari. His omnib⁹ solet curari Gallicus morbus, si fuerit recens: qui si habuerit pilorū decidentiam, eget præter iam dicta frequenti capitis rāsione, frictione & lotionē frequēti decocto pulegij, stichados, origani, saluie, roris marini & camomillæ, & similiū. Si his omnibus mederi nō possumus huic morbo, adhibebitur syrupus sequēs. ℞. Syrupus Corticis ligni indici, seu Guaiaci in minimas partes diuisi. *Ex decocto guaiack* ℥. viij. Interioris eiusdem similiter incisi. ℥. iij. senæ. ℥. ij. epithymi, polypodij an. ℥. j. fumarie, borraginis, cichorei, rostri porcini, radicū buglossæ. an. m. ij. florū cordialium an. m. j. liquiritiæ, radicum diureticarū. an. ℥. s. fiat decoctum in libris viginti quatuor aquæ optimæ, prius per diem in ea infuso ligno guaiaco ad medietatem secundum artem. Cuius percolati accipe libras decem, & cum quatuor libris sacchari fiat syrupus non perfectè decoctus ad modum mulsæ: cui addes pulueris hermodactylorum. ℥. ij. pulueris diarhodon abbatis ℥. ij. cinnamomi electi ℥. j. Cuius dosis summo mane erunt vncia quinque, vel sex. Hic syrupus in omni tempore etiam *Laus hu-* prægnantibus, & febrientibus est exhibendus intrepidè, *ius Syrupi.*



# DE CVRAND. MORB.

& si opus fuerit, dum bibit hunc syrupū æger, euacua ipsum per pilulas superius scriptas, vel per medicamentum hoc, si non possit deuorare pilulas. ℞. cassiæ fistulæ præparatæ &

*Altera purgatio.* diacatholicon. an. 3. j. confectionis medicaminis Hamec, & diasenæ an. 3. vj. diachartami & conferuæ buglossæ an. 3. iij. syr. borraginis, quod s. misce, & fiat confectio ad modum opiatæ: dosis cochlearia duo semel in hebdomada.

*Aquæ ligni guaiaci.* Si his peractis semper morbus permanferit, forsan curabitur aquis ligni guaiaci, prima valētiori, quæ bibitur bis in die, in aurora & nocte a cœna parca per quinque horas: & altera clementiori seu debili, quæ sola in prandio & cœna, & inter prandium & cœnam erit potus: quarū formæ sunt hæ, quamuis secundum variam naturā morbi, & ægri, temporis, & regionis possint fieri valētiores, vel clemētiores. ℞. ligni guaiaci lima vel torno in minimas partes diuisi lib. j. aquæ optime lib. xx. maneant per diem simul, deinde decoquantur ad medietatē, cuius colatura, reiecta parte terrestri, seruetur in vase vitreo, quæ erit prima potentior, eius dosis est vnciæ quinque, vel sex. Deinde accipe lignū primæ aquæ, & iterum cum libris triginta aquæ decoquatur: donec quinta pars consumatur, & hæc erit secūda remissior prima. Quibus iam bibitis fiant aliæ duæ eiusdē formæ, vel similis, mutata aliquātum natura earū, si opus fuerit. Et finitis aquis secundæ libræ ligni guaiaci, fiant ex tertia & quarta libra eodē modo, donec æger sanetur. Accipiat qualibet hebdomada tres ex pilulis superius scriptis, vel duo cochlearia cōfectionis purgātis.

*Aquæ smylacis asperæ.* Fiunt ad idem efficiendum aquæ ex aspera smylace nostri tēporis, & est sarça parrilla, quæ ab India ad Hispaniam aduehitur, forma earum est. Accipe vncias sex dictæ sarçæ parrillæ conuassatæ, & per diem naturalem insunde in libras duodecim optimæ aquæ, deinde decoquatur ad medietatē, cuius colatura in vase vitreo conseruetur, sumenda mane, & vespere, quantitate vnciarum quinque, & hæc est prima valētior. Deinde accipe eandem similacem asperam prius decoctam, & in libris triginta aquæ decoquito, donec quinta, vel sexta pars consumatur: & hæc erit secunda mīrior ad potum in prandio & cœna, & inter prandium & cœnam. Quibus finitis parētur aliæ eiusdem, vel similis formæ, quemadmodum fiunt ex ligno guaiaco. Tempus accipiendis iis com-  
*Tempus curandi morbum Gallicum.* modius est Ver, deinde Autumnus. Aestas verò est vehemēter inepta & aduersa. Hyems accommodatior æstate, & Vere & Autumno deterior. Nostreis quoque temporibus reper-  
ta est radix chyna, cuius aqua curare solet morbum Gallicū

&



& articularem, de qua liber extat scriptus à doctissimo Ves-  
silio. Lege etiam methodum propinandi decoctum huius  
radicis apud Amatam Lusitanum centuria 2. curat. 31. rectif-  
sime traditam. Viçtus ratio ( dum bibuntur hæ aquæ ) præ-  
scripta est iam superius, quamuis in cœna nullæ carnes sunt  
exhibendæ, sed panis nauticus, vulgò bis coctus, vix passæ,  
vel radix buglossæ condita, vel cucurbita condita: præcipue  
si fuerint Castellani. Semper tamen est sequenda Hippocra-  
tica veritas superius repetita, quibus semel, aut bis, &c.

Curatur quoque morbus hic vsu vini sancti, quâuis bilio- *Vinum*  
sis & dispositis ad hecticam minus, quàm aqua ligni guaiaci *sanctum.*  
côferat. Eius forma hæc est. ℥. corticis ligni indici lima vel  
torno diuisi in partes minimas 3. ix. interioris eiusdem 3. iij.  
folliculorum senæ, epithymi, polypodij an. 3. j. fiat decoctum  
in libris viginti quatuor aquæ ad mediætatem, de cuius co-  
latura accipe lib. decem, quibus probe calefactis adde vini  
generosi lib. quindecim, & omnia simul maneant in vase fi-  
ctili, donec calor absumat, postea conseruetur mixtura in  
vasis vitreis: quibus adde pulueris hermodactylorum vncias  
duas: bibat in aurora & vespere libram semis huius vni loco  
primæ aquæ potetioris, & fiat ex ligno, & cortice iam prius  
decoctis aqua pro potu in prandio & cœna cum libris vigin-  
ti quatuor aquæ, donec quarta pars consumatur, qua bibita  
& vino fiat secundo eodem modo, vt dictum est superius, cum  
de aqua ligni guaiaci agebamus. Hoc tamen breuius quam  
aquæ solæ curare potest etiam antiquum Gallicum morbum.

Si fuerit antiquus, & curatu difficilis, fortiorémque poscat *Antiqui*  
curationem, facta iam clementiori medicina nisi morbi & *diffici-*  
symptomatum magnitudo solitum ordinem inuertat (nam *lis morbi*  
authore Celso lib. 2. non potest vehementi malo succurrere, *curatio.*  
nisi æquè vehemēs auxilium) potentioribus opus erit, inter  
quæ a multis expertum est, & a me laudatū medicamentum  
ex mercurio, brachijs, & alijs partibus externis ad motū or-  
dine cōsueti, cōsistentibus viribus ægri, quia vbi illæ non  
adsunt, non oportet laborare: neque facultas ipsius argenti *Facultas*  
viui est tunc pertimescenda, cum olim sæpe morbis multis *argenti vi*  
leuioribus admoueretur, vt scabiei. Galenus tamen nunquā *ui anti-*  
fecit periculum de eo, an interius sumptum, vel exterius ad- *menda.*  
motum interficiat.

Expertum à nobis vnguentum hoc. ℥. axungie porcine *Vnguen-*  
sine sale 3. iij. oleorum laurini, de lilio & rutæ an. 3. j. *tum.*  
cæ magnæ 3. iij. rubæ tinctorū 3. ij. argenti viui 3. iij. croci,  
cinamomi, an. 3. j. musci & ambre an. g. iij. misce & fiat vn-  
guen



# DE CVRAND. MORB.

guentum. Poterit augeri, vel: minui aucto, aut imminuto mercurio,habita ratione virium ægrotantis, & morbi. Certe rei quantitas neque præfiniri potest, neque scribi, Aliquando sufficit prima vnguenti admotio, aliquando duæ sunt necessariae, aliquando tres, & plures quam sex, quod per sudores,alui excretiones, & oris deprehēdes. Partes quibus admouetur, sunt extremæ, videlicet brachia, tibiæ, spina, & venter versus inferiores partes.

*Quæ partes inungenda.*

At cor & vētriculus omnino custodiantur, ne ab illo medicamento lædatur pars nobilis, vel ei, & toti seruiens. Vnguentum cum admouetur, sit actu bene calidum, & habitaculum, & si non sudauerit, ægri pedibus apponantur lateres calidi cum vino: quod si his nō sudauerit, neque oris excretiones, neque alui deiectiones habuerit, cum iis vel saltem aliqua ex ipsis euacuationibus soleat hoc medicamentum morbum hunc curare: tunc totius suffitu erit opus dempto capite, ne vis venefica per nares & palatū cordi, & aliis partibus noceat. Quare æger stans vestiatur conopæo, quod vulgò dicitur pauallon, capite solo nudo apparente, & inter illius tibiæ supra prunas spargatur sequens puluis. ℞. cinna-  
brij. 3. j. rubeæ tinctorum. cinnamomi, & croci. an. 3. s. misce, & fiat puluis ad primum suffitum, & si opus fuerit, fiant duo vel tres: tunc, in eo etiam tempore vnguenti ex mercurio habeat in ore crySTALLUM, vel aliquem liquorē adstringentem, & repellentem ad detentionem dentium, & oris. Si verò fuerint vlcera, & caliditas, quemadmodum ferme semper esse solēt, lauetur saepe os sequenti mixtione. ℞. aquæ plātiginis 3. iiii. aquæ portulacæ, rosarum, & lactucæ an. 3. ij. s. rhodomellis, syrupi rosarum, & oxysaccharæ. S. an. 3. ij. pulueris aluminis vsti, & mastichis. an. 3. ij. misce: hoc vel simili medicamento curantur oris vlcera. Aliarum verò partium vlcera omnia, si fuerint sine ossium corruptione solēt curari sine medicamentis externis, facta curatione totius corporis per ea, quæ diximus: ossium tamen corruptio cauterio eget, & propria curatione, quæ ab erudito chirurgo administrabitur. Nonnulli in curatione huius morbi antiquissimi, & fortissimi, præter iam dicta vtūtur pilulis addēdo grana aliqua pulueris Ioannis de Vigo: ego nō auderē vti illo puluere, ne in parua quidem quantitate & correcto: quia est corrodens medicamentum: fit ex argento viuo, & aqua, seu lixiuio forti, & potenti, quo aurifices vtuntur. Illius tamē autor Vigo secunda parte sui operis in peste dat duo grana huius pulueris, quæ (ipso dicente) vomitu & ventris profluuiio violenter purgant,

*Puluis Ioannis de Vigo non probatur in pilulis.*

in



in colica quoque grana duo eiusdē pulueris cum drachma semis philonij Romani laudat tanquam vtile & optimum auxilium: eius tamen vis corrodens externis partibus cle- *Puluis* mens est, & sine periculo, & pauci doloris: aliquando tamen *Ioannis de* opus est miscere parum vnguenti albi, ne dolor magnopere *Vigo exte-* intendatur, & ideo vnguento superiori loco argēti viui in- *rius ad mo-* dere parum huius pulueris, potentius hoc esset, & tutius, *tus lauda-* quam interius assumere. Qui deuorandum esse hunc pulue- *tur.* rem censent, aquis frigidis, & cordialibus, & aliis corrigūt. Huius pulueris emēdatio, autore Petro Andrea Matthēolo Senensi fit. ℥. pulueris præcipitati ex Mercurio (qui fit, vt docet idem Matthæolus, libro de ratione curādi morbi Gal *Correctio* lici.) ℥. ij. aquarum plantaginis, & acetosæ. an. ℥. ij. macerētur *pulueris.* per noctem, & summo mane prioribus aquis eiectionis de integro alias eiusdem ponderis super infunde in vase æneo, seu testaceo, ad ignem collides, & non cesses agitare ferrea, vel lignea spatula, donec in puluerē redigantur, ex quo sic correcto poteris pilulas, quæ sequuntur, componere, & fiet maior correctio. ℥. electuarij cordialis Conciliatoris. ℥. s. mar- *Pilula.* garitarum præparatarum, hyacinthorum, pulueris præcipitati, seu Vigonis an. ḡ. v. pulueris diamusci, & diamargaritis frigidis an. ℥. s. fiant ex his catapotia quinque, quæ sumantur ante solis ortum. Hæc enim eodem autore breui tempore Gallici morbi dolores tollunt educendo vomitu & eiectione pituitam, & atram bilem. Plurima aliorum morborum genera idem doctor hoc puluere curauit, addendo diuersa medicamēta, pro ratione diuersorū morborum, quod ego quemadmodū dixi, periculosum existimo, etiam si præter autoritatem Pauli, & Arabis Auicenæ, tot experimētis sit credendum, & cum Hippocrate extremis morbis extrema exquisitē remedia optima sint. Laudat similiter hic autor in hoc, & aliis morbis, qui ex atra bile fiūt, pilulas ex hel leboro, quas Mes. capite de eo ex Haly describit; earum tamen vsus in vere tantum iuuenibus & robustis confert.

## De morbo Gallico. CAP. II.

*Scholium.*

**E**st morbus Gallicus) varia ac diuersæ de Morbi Gallici essen- *Varia sen-* tia apud doctores extant sententiæ. Montanus hunc morbum, in *tentiæ de* temperiem iecoris calidam & siccam, in certa specie nobis ignotam esse *existimat.* Fracastoreus ad humorem pituitosum eum refert: Musa eum morbi Gal *penenum,* & contagionē epydemicalem facit: Hi omnes decipiuntur. Mo- *lici refutā-* tanus quia videmus multoties iecur calidum & siccum, & non inficere tur.

omnes



# DE CVRAND. MORB.

omnes humores : Fracostoreus, quia homines melancholici sanguinei & biliosi, eo afficiuntur. Musa vero, quia hic morbus caret illis symptomatibus, quæ a veneno contingunt, neque plures interficit, neque causam habet communem. His ergo omnis simul cum ortus, & eius originis investigatione, quia ad curationem non est necessaria, breui eius essentiam hac

**Essentia** ratione accipe. Morbi, qui nostrum inuadunt corpus, quidam manifesta  
**morbi gal-** qualitate afficiunt, ut qui calidi, frigidi, humidi, & siccus sunt. Alii vero  
**lici.** toto temperamento, ut venena, & quæ contagione inficiunt, inter quos est morbus Gallicus. Qui nil aliud est, quam Morbus totius substantiæ inficiens iecur & humores in eo contentos. In hac definitione, morbus est genus, quo communicat cum aliis morbis: reliquæ partes definitionis differentiæ sunt: Cum dicimus totius substantiæ, separamus hunc morbum ab aliis, qui manifestæ qualitatis sunt: ultima parte qua cum inficere iecur, & humores in eo contentos diximus, distinguimus, morbum Gallicum, ab aliis morbis etiam totius substantiæ, peste, scabie, ophtalmia,

**Modus** & aliis qui non agunt in iecur, sed alias respiciunt partes. Modus, quo  
**quo gene-** hic morbus generatur, hic est. Etsi contactu, osculis, poculis, peccinibus,  
**ratur mor** vestibulis, linteis, lactatione infantis facto, hic morbus contrahatur ali-  
**bis Galli-** quando: ut plurimum tamen ex venereo congressu ob coniunctam cōuer-  
**cus.** sationem & calorem id contingit. Ex eo enim in pene, aut mulieris pudendo aliqua portio humoris infecti relinquitur, qui aliquando generas vlcus, & aliquando sine vlcere inficit humores proximos, & hi vicinos quo ad iecur concipit illam prauam qualitatem: quam communicat humori cacochoymo, hoc est in massa superfluitate: si talis non reperitur, partem sanguinis inficit, inde sequuntur morbi varii, cum humor infectus non possit gubernari à natura. Hac ratione si sanguis infectionem admittat, sunt phlegmones, & pustulæ rubræ. Si vero vnus ex aliis humoribus, molestus cum sit ad aliquam partem decumbat, faciet pustulas, tumores, dolores & vlcera distincta tamen pro varia humoris natura. verum tamen est, tandem in hoc morbo humores crassos generari, & abundare in corpore: si iecur sit frigidum, pituitam, si calidum, atram bilem. Quæ cum non possit gubernari, neque à natura mutari ob prauam qualitatem detinetur & aduritur, ita ut perueniens ad partes eas exulceret, non parces etiam ossibus ex sua natura duris. hic morbus antiquis medicis ignotus, nostris temporibus Dei beneficio, ut effrenem hominum libidinem reprimeret, apparuit. Quamvis hoc non placeat Vallesio (viro in medicina studioso & docto) qui. 4. Epy. com. 1. hunc morbum veteribus cognitum fuisse confirmat, ex Hippocrate, qui. 3. Epyd. Sec. 3. sent. 4. morbos recenset, quos in morbo Gallico in dies experimur, vlcera sordida, capitis & menti glabritiem sine febre, & cum exulceratione pudendorum, & faucium, ossa etiam excisa & nudata. Mirandum tamen est de tanto viro, hætenus non animaduertisse in morbo tam populari rem aliquam nouam veteribus incognitam, quam poterat ex contagione, causis, & curatione colligere.

Ex

Vallesius  
reprehen-  
ditur.



Ex contagione, quia illa antiquorum vlcera alios non inficiebant, at ea quæ nunc in hoc apparent morbo, contagiosa sunt, & ex ipsis solet sequi profluvium pilorum. Ex causa, quia apud antiquos pilorum decidetia duas tantum habuit causas, ut in primi capitis scholio docuimus: At morbus Gallicus nam tantum habet eis ignotam, nempe vitium excrementi: Tu adde dolores, qui etsi eos expertos habuerit antiquitas, non tamē illi semper exacerbantur nocte, ut in huius morbi doloribus contingit. Curatio præterea hunc morbum novum esse demonstrat. Pustule enim cutis apud illos, purgato corpore cessabant. Quas in hoc morbo nisi totum habitum corporis euacuemus, perseverantes & cum ingētissimo dolore experimur. Dolores apud antiquos anodynus cessabant: at in hoc morbo magis exacerbantur. Et in summa, nisi medicamenta Alexipharmaca, quæ oppugnent pravam morbi Gallici qualitatem, adhibeantur, nunquam curabitur perseverante semper humorum infectione. sunt autem Alexipharmaca similax aspera, indica, lignū Guaiacum & Argentū vivum.

Hic morbus curatur primò victu. male perscribit autor rationem vi Auctoris otus hominibus morbo Gallico affectis, non enim semper debet esse humi lapsus. da, sed aliquando humida, & aliquando sicca. humida cum natura est victus ra sicca, & humor redundans siccus. Sicca verò in natura humida & hu- tio in mor more humido. Neque etiam debet semper alimentum in actiuis qua- bo Galli- litatibus temperatum assumi, cum enim est infectio in bile, refrigerante co. alimento: cum in pituita, aut melancholia, calfaciente viedum est. Quia si imperamus in his alimenta temperata, prout licebit, debent alterari. In corpore frigido calidis, pipere, borragine: in calido frigidis, lactuca, prysana & similibus.

Secundò sanguinis missione. semper constante virtute in Gallico af- Sanguinis fectu sanguinem mittes, si sit plethora, ut euacues: si cacochimia ob san- missio. guinem vitiosum.

Tertiò concoctione. omnem morbum Gallicum in Melancholico hu- Purgatio. more collocat auctor, ac proinde non est mirandum, si syrupi ab præscri- pii eum respiciant. Nos verò qui hunc morbum in omnium etiam alio- rum humorum exuperantiis collocamus, non unum solum, sed eum qui redundat, præparare solemus.

Quartò euacuatione atræ bilis. pro vario humore peccante, & pro- Purgatio. inde infecto, vario medicamento purgante utere: neque sequaris aucto- In morbo rem, semper purgando melancholiam, crassissimè enim errabis, & cum Gallico va maximo ægotantis dispendio. rii sunt

Quintò exercitio forti. morbus Gallicus nostri ævi tyrannis, his fa- morbi, & mulis gaudet, pustulis, vlceribus pudendi, bubonibus, gonorrhæa, deflu- varia syn- uio pilorum, tumoribus præter naturam, & tandè doloribus: ex quibus promata. eius tempora colligimus. Principium, cum pudendi vlcera apparent, lo- Tempora quimur enim modò de his, qui eum cotu contraxerunt. Augmentū cum in morbo inguina inflammantur, & maius augmentum, cum iecur & humores Gallico



## DE CVRAND. MORB.

in eo contenti inficiuntur, statum verò ex totius corporis infectione, quam ex pustulis, doloribus, tumoribus & pilorum destitutio cognoscimus. ubi aduertendū est, hunc affectū, in quocunque tempore coniunctum habere humore. Nam in principio humor fluit ad vlcus, in augmento ad bubonem, quo tempore in iecore humores iam sunt infecti, in statu omnia

**Curatio pu-  
bularum.** mala, quæ in cute apparent, ex humoribus etiam pendent. Qua ratione his omnibus malis succurres, breuiter explicabo. Si pustula in cute appareant, cum oriantur ex humore praua qualitate infecto, ac proinde irritante partes ad sui expulsionem, curandæ sunt, primò sanguinē mittentes in plethora, vt euacuemus, in cacochimia, ob sanguinis vitium: sanguinis autem missio non solum bis aut ter, sed constante virtute, etiam sexies & septies facienda est. Postea purgato humore peccante, tandem ad decoctum ex similace aspera & Guaiaco deueniendum: vt sudoribus habitum corporis euacuemus. Pustulas verò exiccabimus a-

**Curatio vl-  
ceris pu-  
dendi.** qua forti, aut aqua plantaginis cum alumine decocta. Si vlcus sit in pu-  
dendo, cum hoc caliditatem aliquam habeat ex motu & fricatione con-  
tractam, prius auferenda erit lotione ex aqua rosacea, nenupharis, aut  
alia, quæ frigida sit: deinde sordes (quæ impediunt vlcus consolidatio-  
nē) auferes paucopulvere Vigonis cum vnguento albo permixto, vt ex-  
tersio sit sine morsu. Quod si labia vlcus dura sint, aut vlcus difficiliter  
curetur, solo pulvere tunc vtendum erit: quo & extergimus; & partem  
illam callosam consumimus. vlcere mundificato cicatricem induces, mi-  
scens alumen, tartarū, & æruginē, cū vino albo & aqua rosacea, ita vt  
aluminis sit maior quantitas, minor Tartari, & adhuc minor æruginis:  
& si difficulter vlcus cicatricē admittit, vnguento ex mercurio vngenda  
sunt inguina, & pudendū. Hoc enim exiccat vlcera, corrigit inieperiem,

**Curatio & extinguit morbi seminarium.** Bubonē hoc modo curabis. Cū bubo sit  
bubonis. intemperies cū affluxu humoris, habet aliquid factū, & aliquid quod  
ficiat quod sit præuidebis, reuelles aliò humore fluentē ad locū affectū.  
Reuulsio hæc sanguinis missione exercebitur, secta basilica eiusdem partis,  
quæ cū loco affecto rectitudinē seruat. Id verò quod in tumore factū es-  
set, curari debet, euacuatione, quæ sectione venæ pedis eiusdem partis cō-  
modè fit: ultimo applicabis supra bubonē emplastrū diachilonis, puluerē  
iris dispersum, vt digeratur humor per halicū. Quod si nō possit dige-  
ri, sed ad suppurationem mutetur, medicamenta suppuriatua adhibenda  
erunt. Pus autem extrahemus nō quemadmodum chirurgi faciunt me-  
dicamento caustico, aperiens abscessum, quoniam dolorē excitabimus  
magnum, & inde fluxionem ad partem languidam ex sua natura: sed  
scalpello sectionē facies, folium myrthi repræsentate, vt puri via pateat  
ex Gal. 13. metho. cap. 5. Neque enim hæc in parte sequendus est Musa  
ante suppurationem aperiens bubonē, ne dolore excitato augeamus af-

**Curatio fectum.** Gonorrhea sequitur, quæ duplex est, vna propria, in qua assidue  
gonorrheæ. semen emittitur, de qua non agimus modò, altera improprie dicta, cum

per



per pudendum substantia alba fluit, quæ non est semen, sed pus. Quod colligimus, quia semen sine dolore emitti solet, at pus cum dolore, hæc improprie & per similitudinē Gonorrhæa est, quæ in morbo Gallico apparet, ex multis enim vlcusculis in parte interna penis ortis pus egreditur, dolorē sentientes nō solum in illa puris excretionē, sed etiā in pudendi erectione, ob partis vlcerate tentionē. Curatur hæc sanguinis missione primò, ne ob dolorē attracto humore fiat inflammatiō, & ut portio humoris peccantis euacuetur. Quem purgabimus, & vltimò extergemus, cicatricēque inducemus, in vlceribus, decoquētes hordeum cum rosis, eiq; mel rosatum colatum permiscētes. Quo decocto syphone sine piulco sæpe vrinæ meatum lauare oportet, aut hoc alio. ℞. aquæ plantaginis ℥. viij. aquæ rosarū ℥. iij. rhodomellis ℥. ii. collyrii albi rhafis ℥. iij. dissoluatur, & misce. Si sit magnus dolor, collyrium sit cum opio: vrinæ. n. a. crimonia (quia in trāsitu per vlcuscula mordicationem parit) temperanda erit, bibentes decoctionem maluarum & liquiritiæ cum serapio rosaceo aut violaceo. Et si magnus sit ardor, syrupo de mucilaginibus à Matthæo de Gradi. descripto vtēmur, quem capite de ardore vrinæ à me habes descriptum. Solet aliquando in vlceribus prædictis cum multum durat, caruncula innasci, & impedire transitum vrinæ. Quæ curabitur ea ratione, qua Laguna & Amatus Lusitanus docent. Decidentia Curatio pilorum in morbo Gallico ostendit antiquos medicos eum nō cognouisse: decidentia Ipsi. n. vt in l. habes scholio, à duabus tantum causis defluere pilos scripse pilorum in runt, cum in morbo Gallico à nulla ex illis eueniat, sed à prauitate ex morbo Galcrementi. Remedia ad eiusmodi defluuium multa habet Antonius Mu lico. Ita in suo lib. de morbo Gallico inscripto. Ego vnum solum describā, quo si vtaris, prohibebis ne pili dicidant, & excisi renascentur: quod experitissimum habemus, hoc autem est vnguentum ex Mercurio paratum, quo humeri articulos, vertebrae colli, & retro aures inungere debes, quoad in ore iam incipiant vlcera apparere. Tumores præter naturam cessabunt sanguinis missione, seruata rectitudine, facta purgatione, decocto smylacis, & supra tumorem hoc vtens medicamento. ℞. emplastri de ranis & contra durities ana partes æquales, extendantur super alutā ad formā dandā. Dolores in morbo Gallico sine tumore aliquo solent molestiā inferre alicui, aut multis partibus: hi curantur primò sanguinis missione, vt impediamus fluxum humoris ad partem dolentem. 2. humoris peccatis purgatione, & decocto ligni Guaiaci aut smylacis. & si his non cessent, vnguento ex Mercurio partem dolentem vngemus: aut si sit in multis partib⁹ dolor, vniuersalem faciemus vnctionem. Præ Modus quæ terea in supradietis affectibus, decoctū ligni Guaiaci & Smylacis, à nō paratur de his propinatum fuit nō solum vt sudorem moueremus, sed vt prauā mor coctum ex bi qualitatem his medicamentis, quæ illi toto temperamento contrarian. Guaiaco, tur, radicitus (si fieri hoc potest) euelleremus. Solet autem decoctum & smylace variè parari: Aliqui libram ligni in duodecim libris aquæ decoquunt indica.

ad



# DE CVRAND. MORB.

ad medietatis consumptionem. Quibus omisſis, cum vehementem decoctionem imperent, nos duplex ſolemus parare decoctum, vnum (quod vulgo aigua fort. dicitur) decoquentes vsque ad medietatem: quatuor uncias ligni minutatim incisi, & per quatuor horas in duodecim libris aquæ infuſi: ſecundum illud idem lignum in triginta libris aquæ vsque ad tertie partis consumptionem igni lento etiam coquentes. Qua eadem ratione ſmylacem præparamus, primo decocto mane & vesp̄i vtimur, vt sudorem moueamus: ſecundo vero in prandio & cæna loco aquæ conſue-  
ta. Quod tertio quoque die faciendum eſt: vbi aduerte in his decoctis recte adminiſtrandis naturam, ætatem, & tempus anni eſſe conſideranda. Nam ſi hæc calida ſint, in decoctione miſcenda, quæ temperent caliditatem horum medicamentorum, qualia ſunt borrago, & endiuia: ſi vero frigida, quæ aliquantulum augeant calorem, ſtechadem, maioranam & ſimilia miſcebis. Neque oportet hoc in loco aliquorum conſuetudinem ſequi, cum ſyrupis humores præparantibus miſcent ſenam & alia medicamenta purgantia. Ex Hippocrate enim didicimus, decoctionem

Quando poſtulare quietem. Aliquando tamen, quando ſcilicet hic morbus totum liceat in habitum corporis occupari, poſſumus cum multis euacuationibus per morbo gal cutem, vrinam, & alium præcedente ſemper purgatione. Qua ratione lico multis hoc decocto vtimur aliquando. ℞. polypodii, ſenæ & hermodactylorum vii ana. ℥. i. ſ. radicum diureticarum ℥. ii. & borraginis ſumi terræ, cicuta-  
tionis rea, agrimonie an. mani. ligni ſancti minutatim incisi & ſmylacis aſ-  
peræ ana. ℥. iii. ſena, Polypodium, & hermodactyli ponantur in liga-  
tura, & decoquantur omnia in duodecim libris aquæ vsque ad medie-  
tatis consumptionem.

Præterea cum decoctum propinamus, an victus in principio debeat eſſe tenuis aut craſſus, non caret corrouerſia. Itali (ſicut in morbis acutis efficere ſolent) victu vtuntur craſſo, vsque ad diem decimum quartum gallinas, hepata gallinarum, lactes, hædos & ſimilia concedentes: at poſtea panem biſcoctum ſolum, aut cum viſis paſſis. Hiſpani contra victum tenuem laudant in principio, craſſum vero procedente morbo, eo-  
que in progreſſu morbi procurantur multe euacuationes, quas non poterit egrotus in ædia vtens tollerare. Melius tamen faciet, qui cum diſtinctione cibabit: in robuſtis vtens Italorum victu, at Hiſpanorum in his, qui vires habent languidas.

Curatio Si fuerit antiquus & curatu difficilis, Quando tumores & dolores per vnguē perſeuerant, ex quibus colligimus morbum iam eſſe in habitu, deuenien-  
ta. dum eſt ad iunctiones factas vnguento ex Mercurio, ſeu argento vno  
Varia ar- parato: ſolet autem argentum vnum multis modis parari, primo ea ra-  
genti viui tione qua docuit Vigo ſuum præparare puluerem: aſſumentes argentum  
præpara- vnum, idque in alambico vitreo collocantes, cum certa quantitate eius  
tio. aquæ, quæ aurifices aurum ab argento ſeparant, eo vsque percoquentes,  
donec tota humiditas abſumpta ſit, & maſſa remaneat: quæ rupto vitro  
extraet



extracta præcipitatum dicitur. Quo mendum non est in vnguentis, quæ solent ad morbum Gallicum parari, ob eius vehementiam qua exiccat corpus, ita ut febrem inducat hæticam. Iacobus Syluius corio præparat: ponit enim argentum vivum in corio, & exprimit, assumitque eam portum, quæ corium penetravit, quia tenuis est: reliquam crassam tantquam inefficacem relinquens. Aliqui præparant coquentes illud cum aceto. Alii ipsam vrunt in vitro vase sine humore aliquo. Mathiolus præparare solet argenti vivum & præcipitatum Vigonis, aqua plantaginis vel solani, quod nonnulli tanquam rem secretam seruant. In hac Valentina ciuitate præparamus argentum vivum cum axungia porcinæ, quia hæc eius motum retardat, tum quia volumus vrere medicamentum, quod sua frigilitate debet agere. Vnguentum ergo huic rei accommodatum non potest describi, quia pro vario affectu natura & tempore, varie solet parari. vsui tantum tamen nobis hoc est. ℞. Mercurii ℥.iii.℞. Vnguentum extinguitur in axungia porcina sine sale exactissime, olei Laurini & vul- ex argenti pini ana. ℥.iii. cineris vitis ℥.j.℞. theriacæ magnæ ℥.℞. mastichis, & thuris ana. ℥.iii. cerusæ ℥.j.℞. misce, & fiat limmetum ad modum vnguenti: huius compositionis basis est Mercurius, axungia illud extinguit, hoc est facit, ne hinc inde moueatur, & simul temperat ipsum sicut thus & theriaca magna: cinis facit ipsum penetrare, & exicare vlceræ, olea discutunt, cerusa vero ob corpulentiam additur. hoc vnguento inungenda est pars, aut articuli. Neque audiendi sunt, qui existimant humorem, qui tumorem in cute generat, per eandem partem esse euacuandum, cum per ipsam impetum faciat nullum enim inuenies medicamentum, quod eius crassitiam attenuet, præter hoc vnguentum. Argentum enim vivum adiutum aliis medicamentis, ex toto corpore euacuat, suâque frigilitate humores ab habitu corporis repellit interius ad loca euacuationi accommodata. Mathiolus (quem multi sequuntur) ex puluere Vigonis, aqua Pilulæ plantaginis extincto, pilulas construit ex granis quinque istius pulueris, electuario diamargaritonis frigido, confectioe Gentilis contra melancholiam, & syrupo aliquo. Alii bolum componunt ex præcipitato & turæ cardiaca confectioe. Abstineretamen oportet ab his, neque per os assumenda sunt, eo quod exiccant partes principes, & dissenteriam sæpissime inducunt. Si enim habemus medicamenta, quæ humorem secure purgant, cur purgabimus cum periculo? Aliqui hunc morbum curant suffitu ex cinnabrio vulgò vermello: quo etiam medicamento ob vehementiam per suffitum non vtor. Quod si eo utaris, caue ne inspiretur vapor, quia est infestissimus thoraci & nervis.

De vlceribus capitis manatibus, quæ à Græcis achores, & à iunioribus barbaris tineæ dicuntur. Et de euratione pediculorum capitis, & aliarum partium.

CAP



# DE CVRAND. MORB. CAPVT III.

*Descriptio  
vulcerum  
capitis ma-  
nantium.  
Causæ.*



Vas Græci Achores dicunt, Plinius manantia capitis vlcera appellat. Vulgus, quia vestium tineis simillima sunt, capitis tineas nominauit. Est autē, autore Paulo, hic morbus affectio quædam capitis tenuissimis foraminibus cutem perforans, quibus glutinosus humor depellitur. Causam habet nitrosam, salsamque pituitam, seu mixtum quendam humorem, qui partim tenuem sanie, ac mordacem, partim verò crassum succum in se habet: unde si qui excernitur humor tenuis sit, biliosam dominari sanie conicimus, sin crassus, atque glutinosus, pituitam. Pediculorum verò generatio, quam pediculationem Latini, Græci phithiriasin nominant, a calidis sit humoribus, crassis tamē, sed cutim subeuntibus, atque in eius profundo pediculos generantibus. Quod plurimum etiam ruuat, & immundities, & crassorum ciborum, earumque rerum vsus, quæ excrementa ad cutim detrudunt, vt ficus. Morbus per se patet.

*Curatio.  
Vitus.*

Curatur primò hic morbus victu temperato in actiuuis, & humido, & alimentis boni succi: vt pullo gallinaceo, gallina, & similibus. Omnia quæ atram bilem generant, maxime nocent: de quibus capite superiori de curatione morbi Gallici abundè dictum est.

*Concoctio.*

Secundo materiam apparantibus his, & similibus. ℞. syrupi fumarig. S. borraginis. an. ℥. iij. rhodomellis, syrup. endiuie compositi. an. ℥. ij. misce. Item ℞. decocti borraginis, fumarie, radice buglossæ, & petroselini addendo parum epithymi libram vnā semis.

*Purgatio.*

Tertio, vacuantibus per medicamenta conferentia, quæ humorem terrestrem mixtum cum seroso tenui purgant: de quibus superiori cap. disputauimus, vt. ℞. diacatholiconis. 3. vj. confectiois medicaminis Hamec. 3. iij. diacarthami & electuarij de succo rosarū an. 3. j. syr. buglossæ. 3. j. aquæ borraginis quod si misce, fiat potus. Præter hanc primam purgationem est utilis, & necessaria leuis purgatio, bis saltem in mense, inter quas accipiat electuarium diarhodonis abbat, vel conseruam borraginis cum decocto, vel aqua buglossæ, vel borraginis. Hæc & similia tollunt nocumēta, quæ ventriculo, hepati, cordi, & toti corpori inferre solent purgatiā medicamēta, fiat leuis purgatio per pilulas has. ℞. pilularum indarum. 3. iij. agarici trochiscati. 3. ij. cum aqua buglossæ fiant pilulæ quindecim: adde diagridij. ʒ. decem, & aurentur ad vsū, tres pro dosi. Si non potest deuorare pil

*Iteranda  
purgatio,  
modo le-  
uis sit.*



pilulas, vratur hac mixtura. ℞. diacatholicon. & diasenæ.  
an. ʒ. j. diacarthami & confectionis medicaminis Hamec.  
an. ʒ. ʒ. agarici trochiscati ʒ. ij. syr. borraginis. q. s. misce, &  
fiat confectio: dosis cochlearia duo.

Quartò, vacuantibus a parte affecta per loca propinqua, *Detructio.*  
videlicet, per palatum & per nares: vt si succus siclæ admo-  
ueatur naribus, vel puluis piperis, vel mādāt mastichen, vel  
alia cōposita: de quibus capite de apoplexia abūde dicemus.

Quintò, repellentibus, & astringentibus, si incipiant a- *Repulsio.*  
chores, quod lotione assidua partis affectæ, decocto baccha-  
rum myrti, plātaginis, rosarum, portulacæ, & similium fiet:  
vel vngatur bis in die hoc vnguento. ℞. vnguenti albi. ʒ. j. ʒ. s.  
vnguenti rosati santalati. ʒ. ʒ. s. misce.

Sexto, cum morbus est in augmento, vel vigore, per ea, *Resolutio.*  
quæ materiam partis affectæ extrahunt, & dissoluunt: pri-  
mò fiat lotio decocto vrticæ, lapathij, sumariæ, fœnugræci,  
camomillæ, & similium, raso prius capite: & vngatur hoc  
vnguento. ℞. succi lapathij. ʒ. j. olei camomillæ & laurini, *Vnguentum.*  
an. ʒ. j. ʒ. s. olei rosarum. ʒ. ʒ. s. aceti cochlearium. j. sulphuris. ʒ. iij. tuthiæ, spumæ argenti. an. ʒ. j. ceræ quod sufficit, misce, &  
fiat vnguentum. In hoc vlcere & aliis capitis affectibus lau-  
dantur a Galeno primo de compositione medicamentorum  
secundū locos, & a Paulo ʒ. lib. & ab Aetio. 6. sermone mul-  
ta medicamenta: semper tamen a clementioribus est inci-  
piendum, vt sunt duo superiora. In infantibus tamē omnia *Ab ætate*  
sunt suspecta, nisi quæ sequuntur. Primò post rationem vi- *contra in-*  
ctus nutricis debitam, capiti infantis sæpe admouentur se- *dicatio.*  
men sesami mansum, vel medulla, seu interior pars ossium  
mali perfici, vel frictio sæpe fiat carne porcina veteri cum  
cuti, decocta vino albo. Hæc conferunt ad dolorem, & im-  
pediendum incrementum, quamuis omnes ferme cutanei  
morbi capitis impediunt epilepsiam futuram in ipsis. Cū  
egroti nouem iam, aut decem annos nati sunt, fueritque hic  
morbus confirmatus, & factus ab humoribus adustis simili-  
ter, & crassis, cuti adeò contumaciter adhærentibus, vt in se  
quippiam schirrosam habeant, hi post vacationem egent  
medicamenti valentioribus, de quibus Gal. Paulus, & Ae-  
tius locis iam dictis satis plenè scripserunt. Inter quæ sal,  
fæx vini adusta, & arsenicum laudantur, & alia his similia,  
sequens tamen medicamentum spectatum & probatum est *Vnguentum*  
in tinea, & aliis vetustis vlcereb. ℞. vtriusque hellebori, sul- *præstantis*  
phuris viui, atramenti, auripigmenti, calcis viuæ, vitreo- *simum.*  
li, aluminis, gallarum, fuliginis, cineris clauellatarum. an. ʒ.



# DE CVRAND. MORB.

*Vnguen-  
tum, mii.* s. argenti viui extincti, viridis æris. an. 3. ij. fiat ex his puluis,  
& cum sequentibus misceatur. ℥. succorum borraginis, sca-  
biosæ, fumi terræ, & lapatij acuti an. 3. j. s. bulliant omnia, &  
adde fæcis olei antiqui 3. iij. aceti 3. ij. picis liquidæ 3. ij. ce-  
ræ, quod s. misce, & fiat vnguentum quo sine dubio curabi-  
tur hic morbus, dummodo post curationem ipsam fiat bis  
saltem in anno corporis euacuatio, ne natura assueta emit-  
tere à toto ad caput, iterum expellat. Hoc quoque vnguen-  
tum est optimi ℥. gallarum 3. iij. seminis cuscutæ 3. ij. ar-  
senici rubri, aristolochiæ an. 3. iij. salis armoniaci, fuliginis  
furni, sulphuris, amygdalarum amararum, colocynthidis, ra-  
dicis papaueris, foliorum fici, foliorum oliuæ, radicis arun-  
dinis viridis, aluminis, siephnemimitæ, mirræ, aloes, oliba-  
ni an. 3. j. s. fiat ad formam vnguenti cum aceto ad solem.

*Historia.* Hoc quoque est probatum, & habet minorem vim, & in-  
trepide potest medicus vti eo: ℥. cineris capillorum huma-  
norum 3. j. corticum auellandarum combustarum 3. j. s. fæcis  
olei 3. iij. mellis sine spuma 3. iij. mirræ 3. j. s. aloes 3. s. cro-  
ci 3. iij. misce, & fiat vnguentum. Primum ex tribus iam di-  
ctis est potentius, & eo liberata fuit quædam iuuenis, quæ  
quatuordecim annos laborauit hoc morbo.

*Curatio  
cum pileis* Curatur etiam hic affectus a multis doctoribus, & à no-  
tris fœminis nouem pileis, hac forma. Accipe pannum cœru-  
leum laneum, super quem extende picem nigram, & resinam  
pini, & impone capiti raso, actu calidum: ibiq; adhæreat no-  
uem diebus, deinde violenter extrahatur pileum adeo, vt pil-  
li euellantur saltem vulsellis, quas vulgò pinças vocamus,  
vel aliis ferreis instrumentis: postea lauetur caput decocto-  
rerum dictarum, addendo parum hedere: deinde imponatur  
secundum pileum eadem forma: & eodem modo imponatur  
tertium, & quartum, vsque ad nonum, seruando eundem or-  
dinem, & modum in omnibus. Curabitur dubio procul, &  
forfan perpetuò habebit pilorum glabritiem, non secus ac  
si esset verum caluitium: semper tamen saltem per annum  
ab hac curatione fiat frequens corporis purgatio.

*Curatio  
pediculorū  
Victus  
ratio.* Pediculi interficiuntur, & prohibentur ne fiant: primò de-  
bita ratione victus per ea, quæ bonum gignunt succum, &  
sanguinis corruptionem impediunt, & excrementorum au-  
gmentum: quare nimia copia ciborum, & eos immoderatus  
sumendi ordo nocet, similiter & ocium, & alia multa: de qui-  
bus in libris de tuenda sanitate, & libello de bono & malo  
succo agit Galenus. Secundo per sectionem venæ iecora-  
riæ, præcipue si sint rubri pediculi, aut corpus sanguineum.

Tertio



Tertiò vacuantibus materiam putrem, à qua fiunt, per me- *Purgatio.*  
dicamenta propria humori, præcedenti illius concoctione  
per accommodata medicamenta: de quibus omnibus j. cap.  
dictum est: semper tamen prius est cognoscenda causa per  
sua signa. Quandoque sola vestium mutatio satis idonea est  
ad curationem morbi huius. Quartò post vacuationem cu- *Balnea, et*  
ratur balneis aque marinæ, vel decocti lapathij, hederæ, ab- *lotiones.*  
sinthij, lupinorum, & similium. Quibus si addas parum hel-  
lebori & staphisagriæ, maior vis inerit balneo, seu lotioni.

Multa sunt, quæ pediculos necant, vt argentum viuum *Necantia*  
mixtum cum sanguine porci, & admotum scapulis, & parti *pediculos.*  
mediæ inter thoracem & ventriculum. Hoc vnguentum po- *Vnguentis*  
tenter eos necat, si cum zona imponatur corpori, maxime si  
partes multæ corporis eo vngantur: ℥.olei ʒ. iij. Mercurij  
extincti ʒ. j. ceræ ʒ. ss. misce, & fiat vnguentum.

## De dolore capitis à quacunque causa contingat. CAP. IIII.

**D**olor capitis, quæ cephalalgiam Græci vocant, bar- *Descriptio*  
bari sodam, affectus est caput infestans, qui si diutur *& diuisio*  
nus sit, cephalæa appellatur: graue quidem malum *doloris ca-*  
est, & quod vel leui occasione vehemētes excitet accessiones, *pituis.*  
ita vt neq; strepitum, neque vocis vllius vehementiam, neq;  
splendorem tolerare possit infirmus: sed obscuritatem, tran-  
quilitatēque intra cubiculum quærat, idque ob doloris ve-  
hementiam: quippe malleo se nonnulli percuti arbitrantur,  
alij caput distendi, alij aliter affliguntur: idque aut media  
solum capitis parte, & hemicrania dicitur; aut omnibus si-  
mul, atque adeo vel intra caluariam, vel extra, quod inde di-  
iudicare poteris. Quibus enim intra caluariam morbus est,  
iis ad radices oculorum morbus porrigitur.

Prouenit generatim hoc malum, aut ob nudam intempe- *Causæ ge-*  
riem, aut ob succorum redundantiam, aut ob intemperiem *nerales.*  
simul, & succorum copiam, nonnunquam per consensum a-  
liarum partium: sepe etiam a causis externis (quas procatar- *Causæ so-*  
cticas dicunt) vt vitione, frigore, ictu, & ebrietate, aliisque *lius intem-*  
huiusmodi. Si ab intemperie sola acciderit, à frigore qui- *periei.*  
dem, atque calore obortus capitis dolor vehementior erit,  
ab aliis qualitatibus remissior: aut fortasse nullus, nisi frigo- *Signa so-*  
ri aut calori coniungatur. Communem autem notam habe- *lius intem-*  
bit à quacunque fiat intemperie, quod nulla aderit grauitas *periei.*



# DE CVRAND. MORB.

in capite: quæ semper, cum ab humore fit capitis dolor, adesse solet. Si a succorum redundantia contingat dolor capi-

*Causa fan- tis, si quidem a sanguine, causam habet immoderatam vi-  
guinei do- ctus ratione in sanguinem generantis, vel quod ab euacua-  
loris. tionibus, & exercitiis, aliisque rebus eius copiam minuen-*

*Signa fan- tibus cessauit infirmus: cognoscetur id per has notas, rubor  
guinis. in facie adest, & oculis: venæ distenduntur, non maiores tã-  
tùm, sed etiam minores adeò, vt quæ præ tenuitate nullam  
sui phantasiã præbebant conspicuæ fiant. Pulsus magnus  
vehemens ac plenus, vrina subrussa, & crassa, dolor capitis*

*Causa do- grauans. Si a bile, hunc efficere possunt capitis dolorẽ, quæ-  
loris bilio- cunque immoderatẽ vniuersum corpus, atque adeò caput  
fi. & calfaciunt, & siccant, & bilis insuper copiam coaceruant:*

*cuiusmodi sunt ira, dolor, sollicitudo, vigiliæ, labor, exerci-  
tatio, inedia, abstinẽtia, cibi bilem procreantes, ætas vigẽs,  
hominis temperamentum biliosum, æstas, atque alia id ge-*

*Signa bi- nus. Qui sic affecti sunt, dolore acriore, magisque pungen-  
tiosi dolo- te, quam superiores tentantur: os his amarescit, sitiunt, & ge-  
ris. neratim omnia quæ bilem generare diximus, pro notis sint:  
quin ea quoque, quæ in iis quos calor solis infestat, reperiũ-  
tur: accidit autem ipsis morsus interim maior, & pallor fa-*

*Causa do- ciei, siccitasque oculorum, & narium, & linguæ. Si a pituita,  
loris a pi- quæcunque pituitam in capite coaceruant, hanc peperisse  
tuita. affectionem certum est, vt holera, fructus, pisces, lac, aër fri-*

*Signa pi- gidus, vitæque nullis negotiis impedita, ac deses. Quæ o-  
tuita. mnia considerare oportet, & insuper ægri temperamẽtum,  
ætatem, anni tempus, & faciei alborem, vt ab his in morbi*

*Quando notitiam deducamur. Demum si a melancholia: causæ, & si-  
est per cõ- gna ex capite de melancholia petenda sunt. Si per consen-  
sensum a- sum dolor capitis fiat, a ventriculo, vt plurimum oritur, sæ-  
liarum pe etiam ab aliis partibus, vt vtero, hepate, & splene: vbi cõ-  
partium. sideranda sunt signa, quæ primogeneam affectionem ab ea,  
quæ per consensum est, distinguunt: ea sunt, quod pars quæ  
per consensum aliam infestat, prior ipsa laborat, & pro mo-  
do intensiõis & remissionis eius morbi, quod ipsa afficitur.*

*Illa similiter, aut intentius, aut remissiùs affligitur: adde  
quod hæc iugiter, illa quæ per consensum & sympathiam  
ægrotat, non necessariò semper, sed per interpollationẽ con-*

*Causæ & dolet. Affectiones verò, causæ, & signa partium, a quibus per  
signa dolo- sympathiam caput laborat, ex propriis capitibus desumẽn-  
ris capitis da sunt. Si a causis procatacticis, nempe ab vitione, aut ca-  
a causis lore. Causas ex sermone laborantis venabimur, cuiusmodi  
externis. sunt longior in sole mora, aut in balneo, ira, exercitium, rerũ*

cal



calidarum, odoramenta, & flammæ vicinitas. Indicium laborantium, cute attactu calida, & primo statim manus injecta aridior quam primum elucet. Sic præterea affecti, præsertim qui ob ardorem laborant, rubris admodum sunt oculis. Si ab aliis fiat causis externis dolor capitis, eadem vtemur methodo, causas ab ægro exquirētes. Quibus scitis, morbus proculdubio constabit.

Curatur sex remedium generibus dolor hic, si à sanguine sit: primo victus ratione frigida, & sicca, videlicet aere (si sanguinis naturalis non sit) arte refrigerato herbis, floribus, & aquis doloris. cum aceto, vtrosis, myrto, plantagine, violis & similibus. Cibus sit frigidus, & qui paucum generet sanguinem, vt sunt, lac amygdalarum dulcium parum tostorum (ne oleum earum noceat capitis) præsana hordeacea cum iure pulli gallinacei, si opus fuerit, lactuca cocta, & postea cum aceto rosato, similiter cucurbita, & cichorea, & similia maximè conueniunt. Quæ sanguinem multum augent, & calefaciunt, nocent, vt caro & oua. Magis etiam quæ vaporosa sunt, vt vinum, eruca, sinapi, cape, & alia: prima mensa iuuant, quæ aluum lubricant, vt pruna damascena, & vux passæ sine granis. Secunda quæ prohibent vaporum ascensum, claudendo ventriculi orificium, vt sunt caro malorum cotoneorum saccharo condita, mala cotonea, & pyra tosta, & coriandrum præparatum.

Secundo, sanguinis missione, præcedenti ventris lenitione per hunc clysterem, vel similem. ℞. maluarum, foliorum violarum, siclæ, surfuris, mercurialis. an. m. j. fiat decoctum, de quo accipe vncias quindecim, cui adde olei violarum 3. j. olei rosarum 3. ij. cassiæ fistulæ præparatæ & diacatholiconis an. 3. j. salis 3. j. misce, & fiat clyster. Facta iam ventris vacatione, scindatur, si fuerit plenitudo totius, mediâ vena, quæ rectitudinem habet cum capite, quia ad cæphalicam terminatur & ab hepate vacuat per iecorariam, & mittatur sanguis respondens plenitudini. Si verò nō fuerit plenitudo totius, cephalica secetur, nisi ex suppressis mensibus, & hæmorrhoidibus dolor factus fuerit. Tunc enim Tibiæ, vel pedis vena incidenda est, secta vena media primò & secundo humerali, si oportuerit.

Tertio, repellentibus sanguinem fluentem ad caput potestate & actu frigidis, si fuerit in æstate, & æger iuuenis: & in hyeme & sene tantum potestate frigidis, qualia sunt aqua, aut succus rosarum, endiuia, portulacæ, lactucæ, plantaginis, semperuiui, solani, singula per se, vel mixta cum illis, aut



# DE CVRAND. MORB.

*Contra indicat.* cum aceto, & oleo rosarum suturæ coronali facta ratione sepe admoueantur, vel ab alto in modum torrentis impellantur ad maiorem penetrationem, quamuis Galenus ea in parte capitis statim sensit citissimam clarissimamque refrigerationem sola infusione rosacei frigidi. Hæc tamen repellentia, astringentia, & roborantia partem affectam, nocent, si fuerit febris. Inhibent enim transpirationem febrilis vaporis, augentque febrim: nocent quoque cum materia iam partem obfederit, quia ibi eam detinent. Denique si fuerit cephalalgia cum catarrho nocent, quia per compressionem eum augent.

*Salubria medica-  
menta quæ.* Quarto, purgantibus bilem flauam turgentem, aut proximam turgentem medicamentis cholagogis. Pars enim calidior, & tenuior sanguinis in bilem conuertitur. Medicamenta hæc simplicia, & composita multa sunt, de quibus capite i. egimus. Vnum tamen est maxime notandum, huic affectui præter naturam non conferre purgantia medicamenta vehementia, quæ malefica & insalubria dicuntur, sed bona & salubria, vt cassia fistularis, manna Arabum, tamarindi, pruna damascena, rhabarbarum, & myrobalani citrina. Prima enim calefaciunt nimis sanguinem, & eum ad superiora mouent. Altera verò sanguinis feruorem tollunt, bilemque benigne vacuant: vt ℥. cassiæ fistularis recens extractæ, & medullæ tamarindorum, an. ℥. ss. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuæ 3. j. ss. decocti florum cordialium, prunorum damascenorum, iuiubarum, & drachmæ vnius corticum myrobolanorum, citrinarum quod sufficit,

*Potio.* misce, & fiat potus, cui adde syrupi violarum 3. j. Si non possit bibere potum, vel amat magis pilulas, accipiat 3. j. pilularum de rhabarbaro, vel 3. j. pilularum de hiera. S. hæc purgant sine nocumento.

*Pilulæ.* Quinto, sanguinis missione ex vena frontis vacuante materia sanguineam a parte affecta, & materiam biliosam, & sanguineam in capite fixam digerentibus, seu clementer resoluentibus: qualia sunt fœtus capitis ex seminibus altheæ, fœnugræci, lini, floribus camomillæ, meliloti, & similibus in sufficienti aqua coctis. Oleum camomillæ, vel de femine lini, vel lumbricorum, si capiti admoueat, idem faciet. Similiter si pullus gallinaceus, vel paruus canis, vel pulus columborum recens per spinam scissorum, vel pulmō arietis actu calidus.

*Topica.* Sexto, remediis frigidis sanantibus intemperiem calidam relictam in capite ab humoribus calidis: qualia sunt quæ

*Alteratio.* dix



diximus in tertio genere. Hoc quoque vnguentum erit optimum inter hæc genera remediorum. ℞ olei rosarum ℥.j. olei violarū ℥.℥. mucilaginis psyllij. ℥.iiij. aceti rosati cochlearium. j. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum.

Biliosa cephalalgia eisdem sex præsidiorum generibus *Curatio* ratur: primo victu refrigerante, & humectante, prohibente *biliosa.* generationem bilis, aut genitam temperante: qualis est *Victus.* victus febricitantium febre biliosa, frigidior tamen sit victu laborantium cephalalgia sanguinea.

Secundo, venæ humeralis sectione, præcipue si dolor sit *Remissio.* vehemens reuulsionis gratia, ne fiat inflammatio in membranis cerebri, minor tamen copia sanguinis euacuanda est in hac, quam in sanguinea.

Tertio, concoquentibus materiam biliosam medicamentis *Concoctio.* annotatis primo cap. & his: ℞. syrupi rosarum ℥.iiij. oxyfaccaræ. S. ℥.ij. misce. Item ℞. aquarum cichoreæ, endiuia, & acetosæ, an. ℥.iiij. misce, vel ℥.ix. decocti prædictorum, vel similibus medicamentorum.

Quarto, vacuantibus bilem medicamentis cholagogis, de *Purgatio.* quibus vide caput primum vt hoc. ℞. medullæ calliæ fistularis recens extractæ, & medullæ tamarindorum. an. ℥.℥. rhabbari electi infusi per noctem in aqua endiuia ℥.iiij. squinantij. ℥.iiij. diaprunis solutij ℥.iiij. ℥.℥. syr. violarum ℥.j. decocti horum cordialium quod s. misce, & fiat potus: vel si abhorret a potu. ℞. pilularum de rhabbaro, & assaiaret. an. ℥.℥. diagridij. ℥.iiij. cum aqua buglossæ fiant pilulæ septē, & aurentur.

Quinto, & magis tertio post secundum genus repellenti- *Repellen-* bus & refrigerantibus frigidis etiam actu, de quibus dixi- *via.* mus in curatione sanguineæ cephalalgia: quamuis in hac frigidiora conferant.

Sexto, calidam intemperiem alterantibus frigidis, *Refrige-* si raso ex alto influctis: qualia sunt iam dicta in curatione *rentia.* sanguineæ cephalalgia, & fortiora vsq; ad narcotica & stupefacientia tactū. His tamē caute vttere, ne noceas parti *Observa-* principi, & frigida, soporēque altissimū inducas, a quo pauci *tio.* berentur, sed quomodo eis & quando sit vtendum, capite de curanda phrenitide demonstrabitur, & cap. de colico dolore. Naribus quoque sunt ad mouenda frigida, vt aqua rosata, & similia, non nostra camphora, quia calida est.

Pituitosa cephalalgia eisdem sex remediorum generibus *Curatio pi-* curatur. Primo, victu calefaciente, & siccate, vt aere æstiuo, *tuitosa.* vel arte facto per ignem, ac suffitu cinnamomi, garyophyl-  
lor



# DE CVRAND. MORB.

*Vitus.* lorum, & similibum aromatū, vel anthos, vel calendulæ, vel aliorum similibum. Cibus sit panis fermentatus & salsus, habens parum anisi: vel melanthij, vel saccari, vel sit bis coctus. Carnes sint musculosæ, & auium montanarum, & animalium, quæ exercitio vtantur, & non sint pituitosa. Piper, & alia aromata maxime conferunt, & omnia calida, nisi vaporosa sint: vt allium, cæpe, & similia: hæc enim nocent, quia caput feriunt, & vapores sursum ferunt. Quare sinapi, eruca, & crocus (nisi in parua quantitate vt medicamenta) lædunt, pisces, herbæ frigida, & legumina, ciceribus demptis, & tandem pituitosa similiter nocent.

*Concoctio.* Secundo apparantibus pituitam, attenuantibus, & incidentibus: de quibus. i. cap. vt hoc, vel simili. ℞. rhodomellis ℥.vj. oxymellis. S. ℥.iij. misce. Item. ℞. decocti saluæ, fœniculi & petroselini lib. j. s.

*Pacmantis.* Tertio, vacuantibus pituitam medicamentis phlegmagogis, de quibus cap. i. & hoc. ℞. diacatholiconis ℥.v. agarici trochiscati. ℥.j. diaphaniconis. ℥.iij. rhodomellis ℥.j. aquæ fœniculi. q. s. misce & fiat potus: vel si magis amat pilulas. ℞.

*Observatio.* pilularum assaiaret, & cochiarū an. ℥. s. diagridij ḡ. iij. cum aqua sticados fiant pilulæ septem: & aurentur, si fuerit diues. In hac cephalalgia bis & ter est necessaria purgatio, secunda vehementior prima per pilulas cochias, & tertia vehementior secunda per pilulas cochias, & foetidas, vel de opoponaco, vel serapino, aut per potum ex electuario indo maiori, & hiera logodionis, & aliis similibus, præcedēti maiori concoctione ante secundam purgationem per syrupos de duabus radicibus, & de sticados, & oxymelli compositū, & decoctum rerum calidarum: & ante tertiam purgationē præcedat maxima concoctio per syrupum de quinque radicibus, syrupum de sticados. S. & oximel squilliticū cum decocto rerum intense calidarum: vel aquis, vt sunt saluia, ros marinus, sticados, anethum, origanum, & similia. Et quia hæc cephalalgia diuturna est, præter has tres purgationes magnas, utilis erit, & necessaria purgatio frequens sine custodia, clementior siue per scrupulum vnum pilularum cochiarum factis tribus pilulis, siue per cochlearium electuarij indi maioris, vel huius mixturæ: ℞. diaphaniconis & diacatholiconis an. ℥. j. agarici trochiscati & turbit gumosi an. ℥. ij. electuarij indi maioris ℥. s. rhodomellis. q. s. misce, & fiat confectio ad modum opiata.

*Auentio.* Quarto reuellentibus, seu auertentibus deorsum pituitam, quæ sursum per impetum ruit: qualia sunt præterdicta tert



tertio genere, acres clysteres, & balani, seu suppositoria, de quibus capit. de morbo comitiali, & de apoplexia, & partiū extremarum dolorifica vincula, & frictiones valide, & lotio earundem partium decocto rerum capitalium: cuiusmodi sunt ros marinus, salvia, ruta, sticados, & origanum, & similia. Cucurbitulæ ceruici & scapulis affixæ sunt optimæ in hoc genere. Repellentia quoque remisse frigida, & calidis *Repellentia cum astringentibus* mixta sunt vtilia: & etiam in lethargo cum Galeno 13. methodi: vt ℥. aque rosarum ʒ. vna aceti ʒ. s. pulueris castorei ʒ. j. misce.

Quinto, particularis euacuatio post prædictas, & post primam purgationem est necessaria per loca propinqua par ti affectæ, videlicet per palatum & nares: qualia sunt succus siclæ, aut maioranæ naribus instillatus, vel puluis piperis, aut sæpe manducet ex sequentibus apophlegmatismis, seu masticatoriis. ℥. pulueris mastichis ʒ. ij. pyrethri, zinziberis, & galangæ an. ʒ. j. cum syrupo de sticade, aut aqua maioranæ, aut cera fiant globuli ad magnitudinem lupinorum. De his tamen capite de apoplexia copiosius.

Sexto, dissipantibus pituitam capitis, & corroborantibus ventriculum, & totum corpus, ne iterum tanta copia pituitæ gignatur. Electuarium, rosatæ nouellæ vel aromatici rosati Gabr. vel diacimini multis diebus in aurora in quantitate duarum drachmarum cum decocto, vel aqua, vel syrupo capitali commendatur, dissipabit enim pituitam capitis. Idem facit diamusculus dulcis, vel amarus, vel theriaca magna, vel mithridatum. Hæc mixtura erit optima in hoc genere. ℥. diamusculi dulcis ʒ. j. s. diambra ʒ. s. pulueris aromatici rosati Gab. pulueris diagalangæ, & rosatæ nouellæ. an. ʒ. ij. syr. de sticade q. s. misce & fiat confectio, cui adde theriacæ magnæ, & mithridati an. ʒ. j. dosis est cochlearium vnum cum aqua salviæ, vel sticados, vel his simili. Parti dolenti ad mouenda sunt & vngueta calida, & fons ex decocto rerum capitalium. Hoc vnguentum est optimum tunc: ℥. olei rutæ & lauri an. ʒ. j. pulueris euphorbij, castorei, & sticados an. ʒ. s. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum. In diuturno dolore, ne æger in pessimos cerebri morbos incidat, vel in suffusionem (quam cataractam medici barbari appellant) venæ temporum incidantur, sanguisque copiosè per eas egrediatur: hoc tamen auxilium, quanquam multis placet, mihi est suspectum, quia periculosum est, & nostris temporibus inusitatum. Et in eo vtile hoc potentiale causticum, si futuræ coronali admoueatur. ℥. vnguenti rosati ʒ. j. cantharidarum ʒ. ij.



# DE CVRAND. MORB.

*Canteriū.* 3.ij. pulueris sinapis, & stercoris colūbini an. 3. j. misce. Hunc antiquum dolorem curant multa, & parua actualia cauteria aurium. Alij cauteria actu futuræ coronali admovent: hæc enim materiam partis dolentis extrahunt. Alij filo lineo, vel argento per ceruicem traiecto, quod setale vocant, hunc dolorem antiquum curant. Oleum pyrethri & castorei, si capiti admoveatur, optimum est auxilium. Semen quoque rutæ cum castoreo, si cum vino & oleo decoquantur, & parti laboranti apponantur, erit præsens medicamentum. Idem potest efficere cataplasma ex cēturea, betonica, & branca vrsina, si cum vino & oleo fiat.

*Curatio* Cephalalgia, quæ fit ab atra bile curatur, quemadmodum *melancholice.* melancholia, de qua cap. 9. huius libri.

*Curatio* Cephalalgia per consensum totius, vt in febribus, vel partis alicuius, videlicet ventriculi, iecoris, splenis, vel matricis eius, quæ curatur per præcisionem causæ prius curato morbo partis fit per consensum. primò affectæ: nisi symptoma ad se curam trahat: horum tamen suis in locis fiet mentio. Sed quia frequētius fit per consensum ventriculi; tunc si sit multitudo bilis euaporantis, euacuetur. Et comedat panem succo malorum granatorum acidulcium, vel agrestæ, aut acetosæ intinctum, aut cum rob malorum cotoneorum.

*Curatio eius, quæ fit ab æstu.* Cephalalgia ab æstu curatur eodem modo, quo curantur cephalalgia sanguinea, & biliosa vltimo genere remediorū.

*Curatio eius, quæ fit ab æstu.* Cephalalgia a casu, vel ictu, curatur primò tenui victu, prohibēte generationem tumoris præter naturam in parte affecta. Nutriatur ergo lacte amygdalarum, cucurbita, fac-

*vel casu.* Secundo, sanguinis missione per sectionem venæ mediæ, si fuerit plenitudo: vel humeralis, si nō fuerit. Si vulnus sit, cō-

*Sectio venæ.* fule doctū chyrurgum. Si autem tumor fuerit absque vulnere, ab initio parti affectæ oleum rosaceum cum puluere myrtilorum & rosarum est admouendum: vel mica panis cum aceto, & aqua decocta cum eodē puluere: post tertium diem hoc medicamentum est necessarium. ¶ emplastri cōtra con-

*Curatio eius, quæ fit ab ebrietate.* Cephalalgia ab ebrietate quandoque in mortem terminatur, aliquando non: quare ea, quæ Arist. tertia parte pro-

ob



obmutuerit, &c. & quicunque sani dolore capitis, &c.

Curatur hæc cephalalgia primò tenui, aut tenuissimo vi-  
ctu, & prohibente vaporum ascensum. Si vinum in ventricu-  
lo sit, ipsum euomere est necessarium frictione, aut titilla-  
tione radicis linguæ, & oris: digitis propriis, aut calamo o-  
leo madefacto, vel per potum vnciarum trium syrupi aceto-  
si. S. vel per decoctum seminis raphani, aut seminis anethi  
cum syrupo acetofo. S. Si per vomitum vinum non egeritur,  
tunc per vnciam vnam hieræ. S. aut vnciam semis diaphæ-  
niconis euacuetur: deinde dormiat, postea balneum ingre-  
diatur, & partes extremæ oppositæ vinculis & frictionibus  
dolorificis afficiantur, vt ad se trahant atque a parte læsa re-  
uellant: & oxyrhodinum hoc capiti sæpe apponatur: *U. a. Oxyrho-*  
quæ rosarum ʒ. ij. olei rosarum ʒ. j. aceti ʒ. ss. misce. Brasicæ, *dinum.*  
præcipue radix, prohibent futuram ebrietatem, & curant fa-  
ctam. Vltimò alatur pullis gallinaceis, cum agresta, vel ace-  
tosa decoctis pyris, & malis cotoneis tostitis, & in fine mensæ  
pulvere coriandri cum saccharo. Potus sit aqua decoctionis  
coriandri præparati, aut brasicæ.

In cephalalgia tamen antiqua, siue continua, siue cum in-  
termissione, necessaria est frequens purgatio per pilulas cle-  
mentes, seu benignas, quales sunt de Hiera. S. Galeni, & assa-  
iaret & similes a cœna, vt vis earum citius & melius ad ca-  
put ascendat. Neque hoc pugnat Hippocrati, neq; Galicet  
Fuchsius in suis paradoxis aliter sentiat: miscuit enim Gal. *Fuchsius.*  
succum aliorum cum medicamentis caput purgantibus. Qua-  
re Aetius sexto sermone dum minuit croci quantitatem in *Aetius.*  
Hiera, quoniam caput purgat, nõ est laudandus, neque cro-  
cus (vt ipse vult) caput multum percutit, cum, autore Pli-  
nio, qui crocum prius biberint, crapulam non sentiant. *Plinius.*

## De dolore capitis. CAP. IIII.

### Scholium.

**D**olor capitis, quem cephalalgiam. ) Nomine capitis eas Caput  
partes intelligimus, quæ cerebrum continent, proinde omnes siue quid, &  
externæ, siue internæ sunt, considerandæ veniunt. Externæ sunt, Pili, cu-  
tis, pinguedo, membrana carnosæ, et periostrion, quod in hac parte Peri-  
cranium appellari solet. Cranium est pars media. Partes internæ sunt di-  
u- & tenuis meninx, cerebrum, cerebellum, glandula osis cunei. Nervi  
orientes a cerebro, mamillares processus, & aliæ. Ex his partibus, quæ-  
dam sentiunt, quædam sensu destituuntur. Non sentiunt pinguedo, cra-  
nion et cerebrum, reliquæ omnes sentiunt. Quamuis de venis, et arteriis  
controuersia sit ob locum Gal. qui habetur 16. de usu par. cap. 11. vbi re-  
nat



# DE CVRAND. MORB.

nas & arterias sensu omnino expertes facit: ille tamen locus corruptus tibi apparebit, si legas eiusdem lib. cap. 2. ibi enim partes sentientes em-  
Dolor sym merans non omittit venas, et arterias, sicut nec in multis aliis locis. Dolor  
ptoma est. symptoma est, actio scilicet depravata sensus tactus, quia in eo obiectum  
percipimus aliter atque est. Morbus, ad quem sequitur, est soluta conti-  
Morbus. nitas, manifesta, aut occulta. Manifesta sit a rebus contudentibus, et  
secantibus: occulta verò ab intemperie nuda, aut cum affluxu, dummodo  
sit calida, aut frigida, quia humida et sicca medio alio inferunt dolorem:  
fit etiam à tensione ab spiritu, aut humore facta. Quas omnes causas ad  
duas possumus reducere, externas, & internas. Dolorem capitis Gal. du-  
plicem statuit. 3. de loc. affect. cap. 9. distinctum ratione maioris, aut mi-  
noris, vnum recentem, qui cephalalgia, & alterum inueteratum, qui ce-  
cōsideran- phalæa dicitur. In cephalalgia curatione hæc omnia considera. Primum  
da in ce- à qua causa fiat dolor, ut ei prospiciamus: 2. an sit paribus externis, an  
phalalgia internis. Quia si est in externis, facilius curatur, neque postulat ita re-  
curatione. hemencia med. ut dolor à causa interna: præterquam quod hic dolor re-  
quirit ea med. quæ penetrant. 3. An dolor sit proprius cap. hoc est excita-  
tus à causa existente in cap. an vero sit per consensum: ita ut causa sit ex-  
tra cap. in ventriculo, iecore, parte alia, aut toto corpore: hinc enim habe-  
bimus cognitam partem, cui med. sunt applicanda. 4. et ultimum cui in-  
tentos esse oportet, est: An caput sit lægidum, siue naturæ, siue occasione,  
ita ut facile suscipiat causas dolorificas. An vero sit robustum, afficiatur  
autem à magnitudine causæ. Hoc enim animaduersio intelligemus, an ca-  
Sanguis put sit roborandū necne. Signa causarum doloris capitis in cōtextu leges.  
quomodo Curatur sex remediorū generibus.) Sanguis si causa est cepha-  
causa sit lalgia, sua multitudine distendens venas id præstabit. Proinde alimenti  
cephalal- quantitas minuenda, ut paucus sanguis generetur, unde non video, quæ  
gia. ratione exhibeat auctor victū frigidum, nisi ratione consuetudinis id fa-  
Sanguinis ciat: non enim necessum est, ut plethora intemperies calida sit coniuncta.  
missio. Secundò sanguinis missione.) Ante sectionem venæ oportet chy-  
stere euacuare intestina, ne à primis venis substantia inutilis attrahatur.  
In cephalalgia sanguinea complexus est affectuum, sunt autem affe-  
ctus dolor, et plenitudo. Ex his dolor raro vrget, ac proinde curatio à cau-  
sa, plenitudine scilicet est inchoanda. Plenitudo euacuationem postulat:  
cum autem ea quæ euacuant varia sint, inedia, frictio, balneum, purga-  
tio, & sanguinis missio: quo ex his utendum sit, deliberamus ex methodo  
medendi, quam doctissimè Ludovicus Collado præceptor ex variis Gal. lo-  
cis in sua Isagoge ad faciendam medicinam nobis tradidit. Cum ergo ple-  
Delibera- thoræ sit affectus magnus, non poterit inedia, frictio, aut balneo eua-  
tio sangui- cuari, quia hæc sunt parua remedia: postulat ergo non purgationem,  
nis missio- quia hæc cacochymia debetur: sed sanguinis missionem, quæ citò et mul-  
tus. tum euacuat sanguinem redundantem: atque hæc est qualitas remedii.  
Quantitatem eius ex affectu, anni tempore, ætate, & aliis colligemus.

Occasion



Occasionem ex absentia cruditatis ventriculi, & animi deliqui, quæ impediencia sunt. modum verò vtendi (hoc est ex qua vena sanguinem mittere oporteat) colligimus ex loco affecto. Qui cum cerebrum sit, cephalicam secabis. vnde male auctor basilicam incidere iubet. Quasi humeraria non etiam euacuet ex vena cava, ac proinde à toto corpore possumus etiam secare communem, quæ à capite et basilica euacuat. Si dolor capitis ex suppressione mensium, aut hæmorrhoidarum oriatur, distingues. Nam si causa in capite fuerit iam coaceruata, cephalicam secabis: & deinde prædictas mouebis euacuationes, sedato dolore. Si verò tantum fuerit consensus, ex crure secabis venam. Quod si dolor capitis sit cum mensium fluxione, tunc considera, an hæc euacuatio sufficiat ad plethoram deponendam. Si sufficit, non est secanda vena: si non sufficit, ex cephalica eam quantitatem sanguinis euacuabis, quæ vnà cum illa menstrua euacuatione plenitudini satisfaciat.

Tertiò repellentibus sanguinem.) Et si sanguis possit discutientibus euacuari, id non licet in principio, ne ipsum caliditate attrahamus: euacuabimus ergo medicamentis repellentibus. Si distillatio cum dolore coniuncta sit, considera an sit vrgens: si dolor vrgat, vtere repellentibus, si vrgat distillatio non his, sed frictionibus, ligaturis, & similibus. Repellentia autem bregmati applicantur, vt per suturas penetrant.

Quartò purgantibus.) Si cephalalgia sit à plethora, nulla caco-chimia coniuncta, non erit purgandum.

Secundò venæ humeralis.) Aliqui sentiunt in cephalalgia bilio. In biliosa non esse secandam venam: ne agrum ducamus in ebullitionem cholericæ cephalalgorum, euacuato sanguine, qui est frenum bilis. Hos omittimus tanquam secantibus barbaros, in sanguinis missione non solus sanguis, sed etiam innatans bilis est realis euacuetur. Nisi ergo multa sit quantitas bilis, & exigua sanguinis, nam hoc affectu sanguinem mittimus, non vt bilem educamus, id enim purgatio præstat, sed vt reuellemus. Quia vnà cum sanguine viscosa quantitas bilis effluens minuetur, & contrarium acquireret motum.

Sextò calidam intemperiem.) In biliosa cephalalgia aliquando cogimur importunam vigiliam, & magnum dolorem corrigere, sopientes facultatem animalem. Cauere tamē semper oportet, ne intemperiem contrariam frigidam inducamus: Vtemur ergo decocto lactucæ, & giliam. seminis papaueris, miscens chamemelum, gariophyllos, aut cinnamomum ob penetrationem: hisque irrigabimus caput. Si hæc non possunt somnum conciliare, ad radices Mandragoræ, & hyoscyamum, aliæque fortiora, deueniemus. Vngemus etiam tempora oleo violaceo, aut papauerino, aut vnguento populeone, additis granis iii. aut iiii. opii, corrigentes opium oleo styracis, chamemelino & aliis.

Pituitosa cephalalgia.) Cum raro vires consent ob frigiditatem In pituitosi humoris, & cum cruditas sit in ventriculo, & habitus corporis: proinde in hac cephalalgia sanguinem non mittimus. Coquenda ergo est cruditudo non



mittimus ditas primarum venarum rhodomelle, oxymelle simplici, & mulsa, cum sanguine decocto feniculi, capillorum veneris, & stichados in pauca quantitate.

**Purgatio.** Ea cocta purgabitur pilulis ex hiera, ex hiera etiam & mulsa. Cruditatem vero venae cauae fortioribus cocoquemus, syrupis de hyssopo, serpillo, stecados: coctione apparente, valentioribus purgabimus, ut docet auctor.

**Dolor capitis per consensum.** Cephalalgia per consensum.) Dolor capitis aliquando contingit ob consensum totius corporis, qualis est ille, qui in febris potissimum biliosis excitatur, utilagines enim tenuis facile caput petunt. Distingues ergo de febre, est enim intermittens, aut continua. In intermittenti dolor capitis in hora accessionis excitatur. Tuncque non oportet caput irrogare oxyrrhodino. Quia eius frigiditas detinebit vapores, qui post accessionem dolorem conservabunt, qui solet una cum accessione cessare, ac proinde euacuatione non eget: nisi voluerimus eo perdurante uti frictionibus crurum, & ligaturis. Si febris sit continua, aut habet dolorem criticum, aut symptomaticum. Si dolor est criticus, non est sedandus: si symptomaticus, distingue. Si dolor incipit una cum febre, curandus erit sectione venae, & repellentibus, ne dolor attrahat humores ad caput. Si vero dolor non incipiat cum febre, sed post primam aut secundam accessionem: si cessante exacerbatione cessat, non erit curandus: si non cessat, curandus erit ob causam praedictam.

Cephalalgia a casu.) Aliquando in parte interna capitis dolor excitatur ex casu, cui admirabile est medicamentum a Cuidone descriptum. Quod ex iure gallinae, aut (si est pauper) decocto intestinorum, aut ventriculorum (vulgo malcuinae) constat: In quo atterendus est panis, fiat cataplasma, cui misce pulverem ex rosas, mirillis, coriandro preparato, baccis lauri, gariophyllis, cinamomo, loto odorato (vulgo treuol) & albis calidis.

## De Phrenitide. CAP. V.

**Descriptio & divisio.** **P**hrenitis inflammatio est cerebri, aut membranarum eius, cuius tres in uniuersum ponuntur differentiae a Gal. pro numero principum cerebri facultatum.

**Sedes cerebri diuersas laedi scribit.** Prima est, cum sola laeditur imaginatio, quae in priore ventriculo sedem habet. Secunda, cum ratio illaesis aliis corumpitur, quod in medio ventriculo fit. Tertia, cum memoria amittitur manente & imaginatione, & ratione, qui morbus posteriori cerebri parti inest, quae omnia fulsissime a Galeno tractantur iij. de loc. affect.

**Aetius ser. 6. c. 2.** Comitatur autem phreniticos per uigilium: nonnunquam tamen inquietus, & turbulentus quidam somnus ita ut subinde exurgentes exiliant, & vociferentur. Caeterum si sanguinea sit phrenitis ridetes delirant: si biliosa, velut furore quodam perciti sunt. Qui pleniotem signorum notitiam desiderat, adeat Paulum lib. 3.

Oritur



Oritur autem phrenitis, aut à sanguine exuperate, aut à fla- *Caussæ*  
ua bile cerebri substantiam, aut meningas eius imbuente.  
Nonnunquam per consensum à ventriculo fit, aliquando à  
oto, vt in febribus, & paraphrenitis vocatur.

Morbus igitur hic incipiens quinque auxiliorum generi- *Curatio*  
bus curatur: primò victu tenui refrigerante, & astringente, *Victus.*  
vel aqua hordei, prisana hordeacea, aut succo malorum gra-  
natorum, vel limonum, aut lacte amygdalarum tostiarum: cu *Quæ vi-*  
curbita saccharo condita, radice buglossæ condita, pyris, aut *tada sunt.*  
malis cotoneis tostis, vel lactuca, aut cichorea cocta, & cum  
saccharo & aceto præparata. Abstineat omnino a vino, &  
carnibus, bibat aquam hordei, nisi facultas esset imbecilla,  
tunc enim ius pulli, aut gallinæ teneræ est necessarium: in  
declinatione quoque & vinum bene dilutum aqua. Aër si  
frigidus natura non est, arte refrigeretur & humectetur a-  
qua rosarum, aceto, floribus, & herbis per aream sparsis. Ob-  
scurus quoque sit, diuersi enim colores & figuræ nocent. A-  
stantes blandè eum alloquantur, quandoque tamè acerbius  
ipsum increpare debent.

Secundo auertentibus, vt cephalica secta, si non fuerit ple *Auertentia*  
nitudo: nam si adsit, media aut cubiti vena hepatica est secan- *tiæ.*  
da. Aliquando etiam tibiarum, aut pedum venæ sunt secan-  
dæ, videlicet si ex suppressis mensibus, aut hæmorrhoidibus *Sectio venæ*  
genita fuerit phrenitis. Præter primam sanguinis missionem *na.*  
sepe necessaria est secunda, & tertia, vbi fuerit plenitudo, &  
morbus post primam & secundam sanguinis missionem au-  
getur. Perpetuò tamen robur virium sit præsens, quo deficien-  
tes vel si ætas fuerit ante decimum quartum annum, vel post  
septuagesimum, sanguis extrahatur per cucurbitulas cum *Cucurbiti-*  
scarificatione inter scapulas appositas, quamuis præsentè ro *tulæ.*  
bore virium extra hanc ætatem possit secari vena. Auertunt *Frictiones*  
quoque cucurbitulæ sæpe ceruici, scapulis & partibus infer- *& vincu-*  
nis admotæ. Similiter frictiones, & vincula artuum & par- *la.*  
tium extremarum, & lotiones tibiarum decocto rerum par-  
tim attrahentium, partim inducentium somnum.

Vacuatio quoque per medicamenta cholagoga præcipuè *Purgatio*  
salubria, & benigna auertit: vt hoc. ℞. medullæ cassiæ fi-  
stularis recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. iij.  
rhabbarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia ꝑ. iij.  
syr. violati ʒ. j. decocti florum cordialium, quod s. misce, &  
fiat potus. Si fuerit magna copia bilis, medicamēta purgan-  
tia valentiora, vt (electuariū de succo rosarū, & diaprunis so-  
lutiui) erūt necessaria, vt quinto genere auxiliorū dicemus.



# DE CVRAND. MORB.

- Repellentia.* Tertio, repellentibus materiam fluentem, qualia sunt oxyrhodinum ex parte vna aceti, duabus olei rosarum, & quatuor aquæ rosarum, & alia: de quibus capite de sanguinea, aut biliosa cephalalgia dictum est. Hæc omnia sincipiti sunt admouenda, vel ab alto infligenda, aut collo pannus lineus madidus liquore repellente est circumponendus, vt impediatur motus, & ascensus humorū. Omnia tamē hæc ante mutanda sunt, quam incalescant. An verò intense frigida actu oporteat esse, an remisse, dictum est capite de cephalalgia sanguinea. Odera frigida naribus adiungatur sæpe, vt aqua rosarum, acetum, violæ, myrtus, nenuphar, santali, & similia.
- Admonitio.*
- Odores.*
- Corrigentia intemperiem.* Quarto, corrigentibus calidam intemperiem a bile, aut sanguine bilioso relictam, & laxitatem viarum per quas ascendit: quæ sunt frigida & astringentia omnia, vt syrupus rosarum, de agresta, granatorum acidorum, & cotoneorum cum duplo aquæ rosarum, aut portulacæ, aut plantaginis, vel solani. Hæc & similia fumantur mane, aut post cœnam, vt petant citius caput cum vaporibus a cibo elatis. Sincipiti quoque & fronti sunt admouenda dicta capite de cephalalgia sanguinea, aut biliosa.
- Digerentia.* Quinto, digerentibus & vacuantibus materiam, quæ in meningibus superest, per ea quæ bilem purgant, si non suffecerit prima & vnica purgatio (de qua in secundo genere diximus) secundo per similia, vel valentiora medicamenta cholagoga fiat vacuatio sumptis prius medicamentis concoquentibus bilem: qualia sunt iam dicta in superiori quarto genere remediorum. Capiti quoque ad materiam euacuandam, resoluendo admoveantur tertia quaque hora pulmo arietis calens naturali calore (si fieri possit) aut pullus gallinaceus, capro, canis paruus, catulus, aut columbus per spinā sectus, & exenteratus, habens tamen calorem aliquem vitalem: etsi supra hæc animalia sic parata apponatur parū pulueris sequentis, erit efficacius remedium, somnūque inducet. ℥. florū camomillæ, & meliloti an. p. ij. rosarum, violarum, & coriandri præparati an. p. s. corticum papaueris albi 3. iij. contundantur omnia. Hæc resoluentia non conferunt, nisi in vigore & declinatione: ante tamē vigorem in ipso incremento est optimum auxilium ex alto in caput instillare lac humanum, aut caprinum actu calidum.
- Topica.*
- Puluis.*
- Admonitio.*
- De curatione symptomatum huius morbi.* Et si vigilie fuerint immodicæ, vt sæpe sunt, præsertim in biliosa phrenitide, ex alto infunde capiti hoc decoctum. ℥. hordei sine cortice 3. j. coriandri præparati, & corticum papaueris albi an. 3. s. florū camomillæ, rosarū, & violarum an. p. j.



p.j. radicis iuschiami 3.ij. fiat decoctum cum libris tribus aquæ ad dimidium. Quia per vigilias febris & inflammatio *Vigilia.* augentur, facultasque omnis soluitur, summa cura oportet *Decoctio.* somnum conciliare: præter iam dicta primò temporibus, & futuræ coronali admoendum est vnguentum populeonis: secundò in cœna vtetur iure pulli gallinacei, si opus fuerit, cum lacte drachmæ vnius seminis papaueris albi. Tertio naribus sæpe instilla oleum violaceum, aut papauerinum cum granis tribus, aut quinque opij. Quarto admoueatur ano suppositorium mellis cum paucio opio.

Quintò, & vltimò: cum alia iam dicta non suffecerint, & morbus fuerit acutissimus, bibat drachmam semis vsque ad drachmam vnā philonij Romani, dummodo non sit defectus caloris innati: quia ab his & similibus medicamentis narcoticis interiùs sumptis extinguitur paucus calor. Hæc ta- *Narcotimen* & similia ante annum sunt pessima, & post annum, quo *ca quæ antiquiora*, tanto meliora: vt docet Galenus duodecimo *meliora.* methodi.

Ischuria, seu vrinæ suppressio est alterum symptoma huius morbi, cuius curatio capite proprio tradetur. Vnctio ta- *Suppressio vrinæ.* men radicis penis, & pectinis oleo scorpionum cum cuniculi pinguedine, & titillatio eiusdem penis promouet vrinam suppressam. Eandē suppressam mouent parietaria, & apium, & alia diuretica vino cocta pectini admota.

Paraphrenitis est delirium non continuum, sed cum intermissione, symptomâque febris ardentis, & non inflamma *Paraphrenitis curatio.* facta, sed hiens. Hæc febrem nostri medici proprietariam, *ratio.* seu habentem prauam & veneficam qualitatem appellant: cuius symptomatis curatio similis est fermè curationi phrenitidis, cum quæcunque curant morbum factum, curent & fientem mitioribus tamen auxiliis hic affectus indiget. Maior & prior cura est adhibenda febrī tanquam causæ, quam *Febris affectui*: nisi symptoma ad se curam omnē traheret propter *prius curæ* sui magnitudinem. Animaduertendum tamen est, ne victus *randa, si* sit tenuis, vt in phrenitide absoluta, quia hæc febris propter *nil obstat.* malignitatem suam venenatam facultatem, & spiritum vitalem resoluat. *Observa.*

Quare maiori copia alimentorum eget, qui enim viriliter comedunt, liberantur melius a peste: nutriatur ergo laborans hoc symptomate iure gallinæ cum aqua carnis & succo agrestæ, aut acetosæ, aut malorum cotoneorum, aut limonum, aut citri. Si fuerit magna imbecillitas, vtilis & necessarius erit hic, aut similis huic clyster nutriens, & refrigerans,



## DE CVRAND. MORB.

- Clyster o-* & purgans. ℥. iuris pulli gallinacei decocti cum hordeo si-  
*primus.* ne cortice lib. i. cassiæ fistularis præparatæ (si sit alius dura)  
 ʒ. j. olei violarum ʒ. iij. sacchari rubri ʒ. j. mucaginis psyllij  
 aqua rosarum extractæ ʒ. ss. vitellorum ouorum numero 2.  
 misce. Præter repellentia & reuellentia, siue per sanguinis  
*Os & lin-* missionem, siue per purgationem, & alia iam dicta superius:  
*gua qui-* oportet humectare, refrigerare, & mundificare os & linguā  
*bus abluē* primò lacte amygdalarū dulcium, siue saccharo, & coctione:  
*da.* deinde mucagine semini psyllij, & cotoneorū aqua rosarum  
 extracta, his sæpe & similibus os obluatur. Ad totius refri-  
*Electua-* generationem, & humectationem vtile est electuarium dia-  
*rium.* trium fantalorum, aut diarhodonis abbatis, aut diamarga-  
 ritonis frigidi, si mane cum aqua endiuia aut buglossæ, aut  
 iure pulli gallinacei refrigerato, hordeo sine cortice, aut la-  
 ctuca, aut alia simili herba frigida sumatur aliquot diebus.  
*Epithy-* Cor omni tempore, etiam ante vacationem (quia non po-  
*ma.* test obstructione laborare, vt aliæ partes) hoc epithymate  
 refrigeretur sæpe, atque adeò in horas: ℥. aquæ rosarum ʒ.  
 iij. aquarum acetosæ & buglossæ an. ʒ. ij. aceti albi ʒ. ss. pul-  
*Cardiaca* ueris diamargaritonis frigidi & fantalorum omnium an. ʒ.  
*confectio* j. misce. Ad calorem febris remittendum, & corroboradum,  
*diniibus.* & resistendum præuæ qualitati & venenosæ est optima hæc  
 confectio cordialis: ℥. theriacæ de citro ʒ. j. ss. confectio-  
 nis de hyacintho, & requiei magnæ an. ʒ. iij. conseruæ cecetosæ  
 buglossæ an. ʒ. ss. pulueris diamargaritonis frigidi, & coralli  
 rubri præparati an. ʒ. j. margaritarum electarum ʒ. ss. foliorū  
 auri numero. 2. syrup. acetositis citri. quod s. misce, & fiat  
 confectio. Cuius dosis est cochlearium vnum omni hora cū  
*Pauperi-* aqua acetosæ, aut rosarum, aut buglossæ. Si fuerit pauper so-  
*bus.* la theriaca de citro erit bona. Similiter ad eundem affectū,  
 & ad sitim conferet sæpe, præcipuè ventriculo vacuo, bibe-  
 re aquam decocti hordei cum hac mixtura: ℥. iulep. rosarū  
*Mixtura.* ʒ. iij. syrupi acetositis citri ʒ. ij. misce. Aut cum hoc con-  
 dito, ℥. conseruæ rosarum ʒ. ij. conseruæ acetosæ, violarum,  
*Conditum.* & nenupharis an. ʒ. j. cōseruæ borraginis ʒ. ss. sacchari, quod  
 satis est, misce, & fiat conditum auro coopertum.

## De phrenitide. C A P. V.

### Scholium.

*Delirium.*

**P**hrenitis inflammatio est cerebri.) Delirium (quod ex  
 ex primo prorrhetico. com. i. insania dicitur) comprehendit sub  
 se delirium in melancholicis, & furentibus, phrenitim & pa-  
 raph



phrenitum, quæ ex consensu aliarum partium fit. Phrenitis, de qua modo disputamus, duobus sumitur modis. Primo largè, ita ut Typho- Phrenitis  
maniam etiam comprehendat, quæ est delirium cum inclinatione in som- duobus mo-  
num. De qua loquitur Hippocrates. 3. Epyd. par. 3. sent. 45. cum sic scri- dis sumi-  
bit. Nullus autem phreniticorum vehementer insanivit, ut in aliis: sed tur.  
alia quadam veternosa in somnum delatione, capite gravati moriebantur. Eodem etiam loco sent. 62. sic habet, Soriebantur in primis phre-  
nitici, cum enim haberent, ut Galen. ait in comm. caput affectum per se,  
facile illud suscepit humores crudos, qui tunc abundabant, à calore ad  
psum delatos. Hunc affectum nempe delirium cum inclinatione ad so- Phrenitis  
num vulgò appellamus modorrha, aut modorrilla. De hac phreniti- quid.  
de impropiè, quæ non est inflammatio, non disputamus modo: sed de  
altera quæ propriè phrenitis dicitur. Hæc nil aliud quàm delirium con-  
tinuum cum febre acuta. Delirium genus est, quo communicat cum a-  
liis deliriis, illa dictione continuum, differt phrenitis à paraphrenitide,  
hoc est à delirio, quod in accessionibus febrium, pleuritide, peripneu-  
monia, & ex vaporibus calidis ab ore ventriculi ad cerebrum ascen-  
dentibus contingit. Ultima definitionis parte phrenitis distinguitur à  
mania, & melancholia. Vallesius 3. epyd. par. 1. comm. ultimo existi- Vallesii  
mat de essentia phrenitidis non esse delirium continuum, quoniam hoc lapsus.  
interrumpitur aliquando, neque semper æquè sit, quoniam agrotus ad  
mentem redit. Hoc colligit ex Hippocrate, qui supradictò loco agens de  
agrote in Dealcis horio habitanti, quarta inquit die vigilavit, delira-  
vit aliquantulum, quinta non dormiuit, deliravit septima: similiter octa-  
ua dormiuit, intelligebat. Hic homo phreniticus erat, & ante solutionem  
morbis intelligebat, ergo non est necessum ut phreneticus semper deliret.  
Ad Galenum autem (qui phrenitum delirium continuum habere scri-  
bit) respondet, dici continuum, quia reditus ad mentem non habet certas  
intermissiones, & statos periodos, certè vir aliqui doctus non rectè con-  
sideravit phrenitidis essentiam. Si enim delirium ex inflammatione se-  
quitur, perseverante inflammatione quomodo intermitteret, non erit cō-  
tinuum? Tum si phrenitis non est delirium continuum, quomodo distin-  
guetur à paraphrenitide? Neque id rectè ex Hippocrate deprompsit, nū-  
quam enim Hippocrates intermittere delirium in phrenitide scripsit: &  
si in illa sententia id voluit, non erat vera phrenitis, sed paraphrenitis.  
Quod si sit phrenitis illa, de qua loquitur, ut reuera est, non etiam rectè  
colligit, quia Hippocrates illa dictione (intelligebat) significat agrotum  
parum delirasse, id colligo ex die. 11. in qua agrotus omnino, aut ut Val-  
lesius vertit, semper mente constituit: si omnino, ergo antea delirium remis-  
sum fuit, sed nō omnino. Phrenitis symptoma est in actione laesa princi- Phrenitis  
pe: Morbus, ad quem sequitur est inflammatio cerebri, aut membranarū an sit mor-  
eius: ubi per inflammationem tumorem præter naturam intellige, non bus, an  
quemlibet, sed eum, quem Erysipelas appellamus, in eo enim humor symptoma.



# DE CVRAND. MORB.

putrescens cerebrum calefacit, & delirium excitat continuum ob caloris perseverantiam: fit febris ob putridos vapores cordi communicatos.

**An cerebrum possit tumore affici.** Aliqui contendunt cerebrum non posse inflammationem pati, quia est pars rara, sicut & pulmo, carens venis & arteriis. secundo ex Gal. qui tertio de Præf. ex pul. capite 8. pulmonem non posse affici schirrhis sentit. Contrariam sententiam habemus ex Gal. 4. de Præf. ex pul. c. 8. ubi cerebrum intemperiem cum fluxione & cura fluxionem posse pati scribit. Inflammatio ergo potest esse in cerebro & membrana tenui. Quæ

**Vallesii lapsus.** duæ partes adherentes cum sint, affectiones sibi communicant. Quod non est dicendum de dura meninge, quæ cum separata sit, sola potest affici, neque cerebrum ei consentire. Quod si advertisset Vallesius, non scripsisset libro 5. epyd. posse esse inflammationem in cerebro sine delirio, ex eo quod in fracturis capitis viderit, inflammatione existente in dura meninge, hominem non delirare. Rationes supradictæ nil concludunt. Prima, quia pulmones ob raritatem raro Erysipelate afficiuntur: cerebrum vero, cum sit molle & non rarium, ea frequenter corripitur. Tum supponit rem falsam, cerebrum enim arterias & venas habet, sed paucas. Secun-

**De phreni da ratione,** etiam si ostendat Galenum existimare cerebrum, pulmones tude ex se schirrhis non affici, reuera tamen mos est Galeni, id quod raro fit, contempro trans- nere ac si nunquam contingeret: quia ratione quintanos circuitus non aduerso orta. mittit, sicut neque schirrum in cerebro & pulmone: Cum reuera in his partibus contingat, ut aliquando vidimus in pulmone arietis: & vna cum Ludouico Collado in hominibus anatome dissectis, raro tamen id euenit, quia schirrhus ex crasso sanguine generatur, & pulmo nutritur ex sanguine tenui, & cerebrum ex humido: ac proinde Gal. non scripsit simpliciter, non posse cerebrum & pulmonem schirrhis affici: sed fortasse non posse affici: dicit quis, Si phrenitis est propria cerebri passio, cur Gal. 4. lib. de cau. pul. cap. 14. phrenitim non solum ex tenui meninge, sed & ex septo transverso ortum habere scribit: idem enim ut ipsemet docet 5. de loc. affec. capite 3. veteres septum appellabant phrenas, quia hac parte inflammatione affecta phrenitis sequi solet.

**Vallesii lapsus.** Vallesius ad analogiam id refert, quæ est inter septum & cerebrum. Cuius sententiæ falsitas apparet ex varia & distincta natura cerebri & septi, cerebrum enim totum est spermaticum, at septum multa parte carnosum. Tum quæ similitudo substantiæ est inter cerebrum & membranam. Quod si similitudo id faceret, cur eandem non habet pulmo, & pleura, ex quorum inflammatione etiam sequitur delirium? obiectioni ergo hac ratione satisfacere oportet. Cum ea inflammatio quæ in septo est, respirationem impediat (est enim septum respirationis instrumentum) calor augetur in Thorace & corde, sanguisque attenuatur & bile scit, eoque nomine cerebrum ascendens herisypelas in eo generat: vel (quod idem est) phrenitim. Hoc s. de locis affec. considerans Galen. dicebat delirium factum à septo, pulmone, pleura, & orificio ventriculi differre, quod à septo factum, sit continuum, quod



Quod verò ab aliis partibus excitatur, intermittat. Differt tamen septi-  
phrenitis, ab alia quæ primò in cerebro fit, quod in hac statim apparet  
delirium: in illa verò, quæ ex septo pendet, primò febris ex inflamma-  
tione, & deinde delirium sequatur. Et ideo Gal. delirium ex septo ortum  
parum à continuo distare affirmat. ubi non negat esse continuum, cum  
bidem continuum faciat: sed parum ait à continuo distare, hoc est inter  
hoc exiguum hoc esse discrimen ut diximus: quod vnum vnà cum febre  
incipiat, & alterum parum post febrem. Quo tempore apparens conti-  
nuitatem, sicut & primum seruat. Vnde non est quod Vallesius admo-  
neat Galenum, ut sileat illam dictionem parum, quæ (ut ex dictis pa-  
lesius mo-  
ret) necessariò scribi debuit. Causa phrenitidis est fluxio sanguinis biliosi nitorem se-  
ad cerebrum. Differentiæ phrenitidis tres sunt, quas hac ratione colligo, facit Ga-  
Cùm phrenitis delirium sit, & delirium commune sit imaginationi, & leni.  
rationi, meritò vna differentia phrenitidis erit, cum delirium in imagi- Causa  
natione, & altera, cum in ratione reperitur, tertia verò, cum vtrique phreniti-  
actio læsa est. Inde colliges præsentī loco duos errores auctoris. Primum, dis & dif-  
cūm memoriā læsam differentiam phrenitidis appellat. Alterum col-ferentiæ.  
locans actiones principes in cerebri vetriculis, quæ in corpore eius sedem Duo læ-  
habent. Temperamentum enim cerebri tanquam animæ instrumentum psus au-  
illas actiones exercet. etoris.

Morbus igitur hic.) Cum febris acuta in phrenitide sit, & sitis, Potus.  
non est quod aqua hordei maceremus egrotantem, sed frigida simplici  
vtamur. Et cum consuetudo in morbis sit seruanda, vinum bibant, pau-  
cum tamen & bene dilutum. Vtemur etiam carnibus, pullo scilicet gal-  
linaceo solo, aut cum hordeo confracto (à nobis dicitur farto) lactuca,  
aut acetosa, quæ oxalis dicitur. In summa requirunt phrenitici victum  
frigidum, & humidum, aut frigidum etsi coniunctā habeat siccitatem,  
quia hæc debilitat agit.

Secundò auertentibus.) Cū phrenitis sit inflammatio habens Cuiatio  
aliquid factum, & aliquid fiens, id quod fit, debet prohiberi ne fiat, & phreniti-  
factum curari. Quæ omnia commodè in principio præstamus sanguinis dis-  
missione, quæ reuellit humorem aliò, & euacuat ex parte inflammata,  
inanitis enim eius venis iterum remigrat humor ad eas. Debet secari  
cephalica, etsi sit plethora, quia rectitudinem seruans cum parte affecta,  
ex ea citam & multam euacuationem facit: hanc autē venam secamus,  
etsi fiat phrenitis ex suppressione mensium: quia ex Galeno reuulsio non  
est faciendā ex loco, à quo fluit humor, sed ex eo, ad quem fluit. Iubet e-  
tiam auctor bis aut ter esse secandam venam, quando est plethora: qui  
ostendit se ignorare, sanguinis missionem in phrenitide tunc esse sisten-  
dam, quando non fluit iam multus sanguis ad locum affectum.

Vacuatio quoque per medicamenta.) In phrenitide medica-  
mento purgante non est vtendum, ut postea dicemus.

Tertiò repellentibus.) In principio phrenitidis debemus euacua-



ve humore in parte affecta inclusum. Quod præter sanguinis missione, præstat etiam medicamentum frigidum: hoc enim, ut auctor est Gal. 5, lib. simp. cap. 4. duplici ratione euacuat, primo, repellendo, secundo una cum calore multam ediscendo humiditatem. Repellemus ergo oxyrrhodi-  
no, (quod ex aqua rosarum, oleo rosarum, & paucis aceto constat) aqua sola cum aceto, succo lactucæ cum aceto, & aliis similibus, in quibus acetum miscemus, quia præter frigiditatem quam habet, sua partium tenuitate alia cum eo mixta medicamenta deducit, per bregmatis suturas, per quas non solum vis medicamenti, sed & eius substantia usque ad cerebrum penetrat.

**Humorem** Quinto digerentibus.) Materia, quæ in cerebro continetur, non ex cerebro purgatione totius corporis, quæ per aluum, aut vomitum fit, educenda est: non educi sed per proprios cerebri meatus. Quod in declinatione, in qua euacuatio-  
purgatio- nis solius indicatio urget fere ab omnibus observatur, capiti applicantes digerentia. Hoc nos non laudamus, quia ex Galeno humor faciens Eri-  
sypelas, tenuis cum sit, facile dissipatur. Aliqui hoc medicamento vtun-

**Examina-** tur. ℞. capium papaveris numero 2. seminis lactucæ p. i. corticis radi-  
**tur medi-** cis mandragoræ 3. j. florum cordialium 3. ii. chamemeli pug. s. gariophyl-  
**camerum.** lorum numero 6. contundantur, & fiat pulvis: quem immittunt in pul-  
monem arietis, aut intra columbum, & bregmati apponunt. Hoc medi-  
camentum inutile est in declinatione, optimum tamen in augmento &  
statu, cum repellat, somnum conciliet, & leniter digerat, quæ omnia in  
statu desiderantur.

**Vigiliæ** Et si vigiliæ fuerint immodicæ.) In augmento phrenitidis de-  
**prospicien-** bemus ob vigiliam sopire facultatem, quam in lethargo excitamus. Vi-  
**dum.** gilia symptoma est ad se aliquando trahens curatorem, cum ita est im-  
modica, ut deiciat vires: in ea enim ob perpetuum morum ad externa ce-  
lidum innatum dissipatur, & una cum ipso spiritus. Decoctio ab aucto-  
re proposita optima est, adde tamen ei calenculam, gariophyllos, aut  
aliud calidum, quod narcoticam vim medicamenti reprimat, & penetra-  
re ipsum faciat. Lotio etiam pedum cum decocto foliorum lactucæ, capi-  
tum papaveris crasse contusorum & chamemelo. Si hæc non prosint, v-  
tere unguentis cap. de capitis dolore scriptis. Hæc etiam potio, quæ fre-  
quenter vtor, utilis est. ℞. emulsionem 3. j. seminis papaveris in aqua  
nenupharis extractam, syrupi papaveris 3. j. s. confectiois de hyacintho.  
℞. cum aqua nenupharis q. s. misce, & fiat potio.

**Peraphrenitis.** Delirium in accessione febris ardentis à magna  
fit caliditate, neque ibi est venenum, ut auctor existimat, cum sympto-  
mata veneni absint. An verò caraiaca confectio hoc loco proposita ali-  
quid valeat, ex his quæ capite de Syncope & me explicantur, intelliges.

De



LIBER PRIMVS.  
De Lethargo. CAP. VI.

29

**L**ethargus, quem Latinorum nonnulli veterum *Descriptio.*  
nominant, affectio est phrenitidi contraria: ab obli-  
uione sic dicta, quod ea correptos rerum omnium  
obliuio inuadat: unde marcorem, & inexpugnabilem quan- *Diuisio.*  
dam dormiendi necessitatem cum obliuione & alienatione  
mentis eam dixeris, Lethargi (autore Aetio) duplex origo  
est: quandoque enim a præcordiis, & visceribus per sympa-  
tiam oritur: quandoque in cerebro primo incipit: ac qui-  
busdam statim ab initio euenit, quibusdam non nisi ex acu-  
torum morborum decidentia, præcipue ex phrenitide, vbi  
ob medicamentorum stupefacientium vim ea cerebri pars  
fuerit refrigerata. Sæpissime etiam a febre synocha in Le-  
thargum inciditur: & a pluribus aliis ægritudinibus, & ge-  
neratim ab omnibus, quas ingêtes inanitiones cōsequuntur.  
Sed nec obliuisci oportet, quod sæpe in singulis diuturnarū  
febrū circuitibus ægrotantes sopor inuadit, quæadmodū in  
quotidianis, hemitritæo, & quartanis etiā nōnunquā vsu ve-  
nit. Fit hoc malum a putrescente pituita posteriorem cere- *Causæ.*  
bri partem imbuente, & refrigerante, in somnos impellente.

Comitatur autem lethargicos lenta quædam febricula, *Signa.*  
nec adeo vehemens vt ea, quæ, laborantes caro, præcedere  
solet: quia in re lethargus & carus distinguuntur. Pulsus ho-  
rum rarus est, magnus, & vndosus, spiratio rara & imbecil-  
la. Somnolenti omnes huiusmodi sunt, desidiosi, ignaui in-  
terrogantibus ægre respondent: sunt etiam vsque adeo obli-  
uiosi, vt ad meiendum sæpe excitati, porrectam matulā ma-  
nutenentes obliuiscantur. Delirant porro, & expergefacti  
clamantes intuentur, sed illico ad somnum reuertuntur. O-  
scitant frequenter, & quasi claudēdi oris obliti hiantes per-  
sistunt. Supini iacentes ad pedes delabuntur, & increbrescē-  
te morbo velut cadauera segnes decumbunt. Quibusdam  
alius humidior est, aliis ita sicca, vt nihil reddat. Lotiū præ-  
terea quale iumentorum esse solet, emittitur. Ad extremum  
stertentes veluti sepulti arctissimo somno tenentur.

Curatur lethargus quinque remediorum generibus. Pri- *Curatio.*  
mò, victu tenui calfaciente, & exiccante, vt aere calido arte *Victus.*  
facto, si sit hyems, aut autumnus, suffitu rerū calfacientium,  
sereno & lucido. Parietes quoque ardeant picturis diuersis  
coloribus: nutriaur mulsæ, aut iure cicerū nigrorū, aut ptisa-  
na hordeacea, cum decocto fœniculi facta, aut granis pineis  
saccharo cōditis (est pygnonada Hispanis) aut cortice citri  
cond



*Quæ ali-  
menta no-  
cant.* condito. Si facultas sit imbecilla, iure columborum & cice-  
rum indigebit: semper tamen Aphorismum decimum octa-  
uum primi libri sequere, considerando tempus, regionem,  
ætatem, & consuetudinem infirmi. Omnia pituitosa alimē-  
ta maxime nocent, & vaporosa præter porrorū barbas, quæ  
si cum hordeo decoquantur, sunt optimæ. Inter cætera cæ-  
parum esus copiosus magis lethargum gignit, vix quoque  
recentes hunc morbum efficiunt. Potus sit decoctum cinna-  
momi, aut seminis fœniculi, aut aqua mellis potens, videli-  
cet constans quatuor partibus aquæ, & vna mellis, & hæc  
erit nutrimentū optimum. Vinum maxime nocet, nisi in de-  
clinatione, & in ægro imbecillo, & nisi sit debili stomacho.

*Auerten-  
tia.* Secundò, auertentibus, vt sectione humeralis, au mediæ,  
si sit plenitudo: extrahaturque sanguinis copia respondens  
plenitudini & viribus: & quia semper reformidanda est cru-  
ditas, ne sanguinis quantitas sit copiosa, diligenter obserua-  
bitur. Auertit etiam & clysteres acres, de quibus capite de a-  
poplexia, quamuis aliquantò mitioribus indigeat lethargus.  
Cucurbitule scapulis admoveantur sæpe, & aliquando cum  
sanguinis vacuatione, præsertim si æger fuerit iuuenis, &  
sanguineus. Vincula & frictiones dolorificæ partium extre-  
marum satis reuellunt. Vomitus sine violētia solius ventri-  
culi auertit a capite, siue fiat sola frictione & titillatione o-  
ris, & linguæ, siue oxymelle. S. cum decocto seminis rapha-  
ni, aut anethi, vel cum syrupo acetoso. S. & eodem, aut simili  
decocto. Vacuatio per Hieran. S. aut Agaricū trochiscatum  
auertit satis, aut per vnciam semis diaphæniconis.

*Repetlen-  
tia.* Tertio, repellentibus actu calidis, quæ sint minus frigida  
quàm in phrenitide, & primo & secundo die capiti, præci-  
pue posteriori parti rasæ admoveatur oxyrhodinum ex ace-  
to, oleo, & aqua rosarum: post secundum diem adde oxyrho-  
dino pulueris castorei drachmam vnam, & semper iuxta se-  
ptimum adde quantitatem eius, & loco olei rosati adhibe  
oleum ex lilio, & parum aceti squillitici.

*Vacuan-  
tia.* Quarto, vacuantibus materiam a capite per medicamē-  
ta purgantia, præcedente prius cōcoctione syrupis, & aquis,  
aut decoctis materiæ pituitosæ (de quibus caput primum  
vide) videlicet vsu rhodomellis, oxymellis compositi, aut sy-  
rupi ex hyssopo, aut ex stachade cum oxymelle squillitico.  
*Potio.* Hoc, aut simili potu fiet vacuatio: ℞. diacatholiconis ʒ. v. e-  
lectuarij indi maioris ʒ. iij. s. agarici trochiscati ʒ. j. rhodo-  
mellis ʒ. j. decocti communis quod s. misce, & fiat potus. Ale-  
xāder Trallianus solebat purgare lethargicos medicamēto:  
℞.



℞. castorei ℥. diagridij ℥. ij. cum aqua, aut syrupo, vel decocto fiat potus, & post illum omnes termē auctores laudant illud, quamuis nostris temporibus minuēda sit quantitas diagridij, & augenda castorei, vt. ℞. pulueris castorei ℥. j. diagridij g. vij. cū rhodomelle fiat pilulæ, aut potus. Ex hoc habemus medicamentū purgans bilem flauam, mixtū cum medicamento non purgante, fieri purgans pituitā, vt in superiori mixtura experientia docuit. Similiter purgatorium bilis mixtum cum purgatorio pituitæ purgat pituitam, vt in electuario indo scammonium mixtū cum turbit, & aliis purgat pituitam. Vacuatio quoque per loca proxima, videlicet *Deriuant* per nares & palatū est necessaria: quare sæpe naribus & palato admoueat parum huius decocti: ℞. pulegij, origani, stachados, rutæ an. m. j. sinapis, euphorbij an. ℥. ij. fiat decoctum cum librā vna aceti ad tertiam partem. Intrudatur puluis hic naribus: ℞. Pulueris hellebori & condisci an. ℥. ij. misce. Os & palatum sæpe fricentur mithrydato, & theriaca magna, & sale, hæc & similia in forma apophlegmatismi, & errhini vacuant materiam a capite per dicta loca, de his capite de apoplexia sermonem habebimus copiose: sed tamen *Apophlegmatismus* oportet scire, lethargum semper omnia remedia desiderare minora, tum quia minor est morbus, quam apoplexia, tum *mus* propter febrem.

Euacuat & resoluit materiam sal cum milio bene tostus, *Observa.* calidus, & admotus capiti raso. Idem fiet hoc cataplasmate: ℞. caricarum p. ij. sinapi p. j. cum aceto fiat cataplasma. Cucurbitulæ bene ignitæ occipiti affixæ idem faciunt. Optimè quoque euacuat castoreum mixtum cum humanis capillis adustis, & aceto admotum capiti raso, & excitat a somno.

Eandem aut saltem parem vim habet hoc medicamentū: *Topica.* ℞. pyrethri, sinapis, scillæ an. ℥. j. castorei, euphorbij an. ℥. v. cum succo aphroditillorum, aut sampsuchi fiat cataplasma: si ante appositionem horum pili euellantur cum dolore, erit melius. Si morbus hic diuturnus fiat, æger multis diebus in aurora bibat tria, aut quinque grana castorei cum rhodomelle, aut syrupo de stachade, aut aqua saluiæ, aut sampsuchi: vel accipiat drachmam vnam mithridati, aut theriacæ magnæ, aut diagalangæ, aut diatrium piperum: post hæc & in vigore maxime confert balneum decocti rerum calfacientium, vt pulegij, thymi, roris marini, saluiæ, rutæ, & similiū. *Historia.* Obserua historiam Tralliani, quam Fuchsius lib. i. cap. 13. de *Historia* morbis curandis refert.

Quintò, per ea, quibus symptomata huius morbi curantur, *Symptotur,*







io. Qua in parte duos practicum errores collige, primū auctoris, Ror- Duo pra-  
doletū & aliorum lethargum diuidentium in lethargum morbum, et le- Eticorum  
thargum symptoma. Si enim est actio laesa, quomodo erit morbus? secun- errores,  
dum auctoris, et aliorum etiam, qui ex phrenitide, cum in ea multum re-  
frigeramus cerebrum, lethargum fieri dicunt. Si enim somnus ille sit re-  
frigeratione cerebri, et non ab oedemate, quomodo erit lethargus? Obiciet  
nobis aliquis, in lethargo nonne pituita putrescens calorem concipit, quo-  
modo ergo inclinationem ad somnum generat? Respondeo, lethargus est  
intemperies cum affluxu humoris. Hic autem humor totus non putret, Morbus iū  
sed aliqua eius pars, reliqua suam seruat naturam. Pars quæ putret, lethargo.  
vapores mittit ad cor paucos, & nonnil calidos, indeque ortum habet in  
lethargo febris lenta. Reliqua verò pars, quæ non putruit, somnum in-  
ducit refrigerando, & humectando cerebrum: hac enim ratione densa-  
tur, & spiritus animales incrassantur, quo tempore liberè facultas non  
potest alterare, ut ex 13. method. cap. I. colliges.

Secundò auertentibus.) Cum lethargus sit tumor præter natu- Sanguinis  
ram, postulat in principio reuulsionem, & euacuationem: quod com- misio.  
mò præstat sanguinis misio ex cephalica, quia rectitudinem seruat cum  
loco affecto: et hac ratione citò & multum euacuamus. Neque est quòd  
timeamus cerebri refrigerationem, cum caleat à febre, & ab humore  
putri. Repellens  
medica-

Tertiò repellentibus.) Repellimus in principio eo modo, quo di- mentum  
ximus superiori cap. Aliqui diuidunt medicamentum repellens in illud  
quod rerè repellit, quale est oxyrhodinum, & in illud, quod improprie  
repellens ab ipsis nominatur, eo quòd una cum frigiditate habet ali- Refutatur  
quam caliditatem, quale est illud, quod cap. de phrenitide descripsimus, quidam.  
eo contextu qui habet. Quintò digerentibus, &c. Hæc tamen diuisio ad  
libitum est ficta, cum calidum non repellat, adde in principio inflamma-  
tionis calorem nullum habere vsum: dices posse nos miscere calida ob pe-  
netrationem: neque propter hanc causam licet, cum acetum frigidum e-  
xistens id præstet.

Quartò vacuantibus materiam.) Cum medicamentum purgans In lethar-  
non educat humorem in tumore inclusum, sed eum qui est in venis omit- go non pur-  
tendum est, in declinatione ergo lethargi euacuandus est humor à capite gandum.  
discutientibus, quæ aliquantulum vehementia debent esse ob humoris  
crassitiem: huiusmodi sunt oleum rutaceum, de spica, vnguentum Ara- Discutien-  
gon, et Marciat. Itemur medicamento purganti, quod per nares (errhi- tia.  
num dicitur) euacuet attrahendo, ut est euphorbium, helleborum album  
& alia mitiora, qualis est succus betæ, aut per os (apophlegmatismus  
appellatur) quod præstabitur vngentes palatum hier. i simplici: vel  
cum ea aliquid ex euphorbio miscentes, medicamentum etiam mastica-  
tum vtile erit. Capiti pileos applicabimus ex rebus calidis mastiche  
satureta, Garyophyllis, corticibus citri, ruta, thymo, his pulueratis, &  
cum




## DE CVRAND. MORB.

cum 3. ii. pliris arcoticon Nicolai permixtis. His enim cerebrum corroboratur, & humor discutitur. Aut sacculos discutientes bregma i appone.

**Somnus quid.** Quinto per ea. Somnus naturalis à cerebro fit: hoc enim, cum requiescere vult, aut spiritus reficere, somnum inducit animalibus primo de caus. symp. cap. vlt. Est ergo somnus naturalis quies facultatis animalis à cerebro inducitur. Quies est non omnimoda, sed per quietem intelligit Gal. remissionem facultatis, reuera enim tempore somni descendit ad instrumenta sensus, et motus, sed minor. Hæc autem remissio à cerebro efficitur: unde male Arist. humiditatem constituit causam somnum efficiientem, cum ipsa potius sit causa iuuans: hoc superiori loco significauit Gal. Sic enim habet cerebrum cum quiescere vult somnum inducit, præsertim cū alirix in eo facultas humiditate fuerit instaurata. Male etiam Argenterius somnum dixit fieri à reuocatione caloris natiui, eo quod hic est instrumentum commune, cum instrumentum facultatis animalis sit spiritus animalis, & somnus in cerebro fiat. Maiorem videtur habere difficultatem locus Gal. 3. de caus. pul. cap. 9. ubi scribit, somnum fieri cum natiuus calor ad alimentum se conuertit: huic tamen loco satisfacimus, dicentes Gal. in eo non tradere causam somni, quam cerebrum esse docuit: sed tradere id quod in somno contingit, in eo enim fit reuocatio caloris consentiente facultate vitali, facultati animali: ut colligo ex 3. de caus. pul. cap. 8. in somno hoc naturali facultates naturalis, & animalis roborantur: naturalis, quia calor reuocatur, animalis, quia quiescit ab opere. In eo verò somno, qui præter naturam est, cum calidum innatum longo tempore priuetur motus ad exteriora, & perseverantem seruet motum ad interna, suffocatur. Ac proinde huic symptomati occurrere oportet prætebit. Est autem somnus præter naturam longus, et qui difficilem habet res naturæ expurgationem. Fit autem à frigiditate, & humiditate. Humiditas. n. grauat cerebri facultatem. Frigiditas verò, ut diximus, stupidum reddit cerebrum, ipsum condensans: & incrassat spiritus animales, & hac ratione impedit alterationis descensum. Excitabimus ergo ex hac frigiditate & humiditate dormientes, calidis & siccis, & attenuantibus pituitam, & discutientibus eam: id præstabis decoquentes saturiam, rutam, thymum & alia cum aceto, & naribus inspirantes vaporem. Bregmati adhibebimus vnguentum, ex oleo rutaceo, castorei, succo scilla cum cera constructum. His tamen medicamenti vtire in augmento, non in principio, ne attrahas ad partem affectam.

### De Vertigine. CAP. VII.

**Descriptio.**  Vm in morbo obtenebrationes, hebetudinesque oculis obuersiones, & omnia rotari & circumferri videntur, malum illud est, quod latini vertiginem, Græci verò scothoma appellant. Valeant ergo barbari, qui nodum in scirpo quærent, scotomiam à vertigine differre volen



volentes. Nam si discrimen vllum ponendum sit in affectio-  
ne, non in omnibus erit constituendum. Vnde Gal. 4. de rat.  
vict. in morbis acutis, commentario 43. differre inter se di-  
non, & scodinon autumat: cum enim caput circumagi vide-  
tur, dinos id est, vertigo vocatur affectio. Cum autem & præ-  
ter id, tenebricosus fuerit aspectus, scotodinos, hoc est tene-  
bricosa vertigo dicitur. Fit autem ob inordinatam spiritus *Causa.*  
flatuosi motionem, qui vel in capite generatur, vel sursum  
ex infernis extollitur partibus. Qui præter ea, quæ dicta  
sunt, plura de vertigine volet cognoscere, adeat Gal. loco su-  
perius citato, & 3. de loc. affect. nobis enim breuitatem affe-  
ctantibus hæc satis sunt.

Curatio non potest esse eadem in omnibus, semper tamen, *Curatio in*  
quæ humores, & spiritus immobiles reddunt, conferunt: vt *accessione.*  
aër temperatus, aut frigidus, & obscurus, quies, cibus frigi-  
dus, & astringens, excepta vertigine, quæ a pituita fit, quæ  
calidis indiget cibus. Sit quoque tenuis victus, quia morbos *Victus.*  
ex repletionem (cuiusmodi est apoplexia) gignit, nisi ex coitu,  
& fame fiat, in quibus cibi boni, & multi sanguinis sunt ne-  
cessarij. In omni vertigine nocent alimenta difficilis conco- *Quæ sunt*  
ctionis, & vaporosa, & rerum aspectatio, quæ in orbem tor- *gienda.*  
quentur, ante quæ celeriter mouentur, despiciere ab alto, &  
ambulare per loca periculosa. Ira, tristitia, & timor maxime  
nocent. In initio mensæ, quæ aluum molliunt, vt pruna da-  
mascena, & passæ vix sine granis, sunt comedenda: in fine,  
quæ os ventriculi astringunt, & impediunt assensum vapo-  
rum: vt caro malorum cotoneorum cõdita, aut coriandrum  
præparatum. Potus sit aqua ex cinnamomo, & aqua mellis,  
aut aqua decoctionis coriandri, si fuerit à causa calida. Vinũ  
non bibat, nisi habeat vëtriculum imbecillum, aut sit totius  
corporis defectus. In accessione quies est necessaria, & frictio  
partium infernarum, & odor rosarum, mirthy, & similium,  
quæ spiritum animale quiescere faciunt. Si verò accessio *Remissio.*  
fuerit magna, aut longa, vacuatio per acrem clysterem, aut  
glandem fiat, de quibus capite de epilepsia, aut apoplexia di-  
cemus. Aliquando in ipsa accessione est necessaria sanguinis  
missio per venæ sectionem, vel per cucurbitulas cum scarifi-  
catione, ne transeat in epilepsiam, aut apoplexiam. Extra ac-  
cessionem, quando est ex sanguine præcedenti debita ratio- *curatio ex-*  
ne victus iam dicta, fiet sanguinis missio per sectionem venæ *tra accessio*  
humeralis aut mediæ, si sit magna plenitudo: deinde conco- *nem ex san-*  
quatur bilis per duos, aut tres dies syrupo rosarum cum de- *gmine.*  
cocto coriandri. Post hæc euacuetur bilis hoc, aut simili me-  
dicam



# DE CVRAND. MORB.

**Purgatio.** dicamento. ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ʒ. ʒ. rhabbari electi infusi per noctem in aqua endiuivæ ʒ. j. diaprunis solutiui ʒ. iij. ʒ. syrupi rosarum ʒ. j. aquæ buglossæ, quod s. misce, & fiat potus: vel fiat vacuatio per ʒ. j. pilularum de rhabbaro: ultimo fiat corporis refrigeratio, & partium corroboratio per electuarium diarhodon. Abbatis cum syrupo rosarum, aut aqua frigida, & astringente: & hepar vngatur ceroto santalato.

**Ex bile flava.** Quando fit à bile flava, eadem est curatio demptâ sanguinis missione, quæ aut non fit, aut si fiat, minor copia sanguinis in hac, quam in sanguinea extrahatur.

**Ab atra bile.** Ab atra bile rarò, aut nunquam fit: si autem fiat, inquire eius curationem capite de curatione melancholiæ. Quum **Per consensum.** est per consensum ventriculi, à quo sepe nasci solet, vomitus statim est utilis, quem concitat decoctum seminis raphani, aut anethi, aut atriplicis cum syrupo acetoso. S. aut maiori, **Vomit.** ubi opus est oxymelle. S. aut cum vncia vna oxymellis scillitici. Rarò in hoc morbo conuenit vomitorium potentius,

**Euacuatio** quia nocet commotio magna. Deinde euacuetur humor, qui est in ventriculo, per propria medicamenta purgantia præcedenti concoctione per rhodomel, aut syrupum de hyssopo, aut oxymel compositum cum decocto, aut aquis conferentibus. Hiera. S. aut pilulæ elephanginæ, aut agaricus trochiscatus, aut diaphænicum, aut pilulæ stomachicæ optime euacuant materiam detentam in ventriculo. Tandem quæ ventriculum corroborant, conferant, siue sint interna, siue externa: de quibus cap. de curatione imbecil. ventriculi satis copiosè dicemus. Mica panis cum succo malorum cotoneorum sæpe comesta vetriculo vacuo vertiginem tollit.

Si fiet per consensum vteri, aut aliarum partium, suis in locis patefiet curatio.

**A pituita.** Quando est à pituita (à qua fit sæpe) post victum tenuem **Victus.** & calidum, secundo, decoquatur pituita per medicamenta dicta cap. j. incipiendo à mitioribus: vt est rhodomel, vsque **Concoctio.** ad valentiora: vt sunt oxymel compositum, syrupus de quinque radicibus, & oxymel scilliticum cum aquis, aut decoctis conferentibus.

**Purgatio.** Tertiò, vacuantibus pituitam curatur, qualia sunt: agaricus, turbit, Hiera. S. & comp. diaphænicum, electuarium indam, & pilulæ de agarico, & alia multa dicta cap. j. Sed quia hic morbus diuturnus esse solet, multis purgationibus est **Observatio** vtendum, sumpto initio à leuioribus ad valentiora, præcedente semper concoctione apta, & debita. Hoc medicamen-

tum



um est medium: ℥. diacatholicon. ʒ. ʒ. Agarici trochiscati  
 ʒ. j. diaphænicon ʒ. iij. ʒ. rhodomellis ʒ. j. decocti saluæ, quod *Pilulæ no-*  
 misce, & fiat potus. Hæ pilulæ, sepe deuorentur, sunt effica- *bilissimæ.*  
 es, valentque plurimum ad affectum hunc tollendum, & ra-  
 ticus euellendū, caput & omnes sensus confirmant: ℥. nu-  
 is muscatæ, cubearum, garyophyllorum, xylo aloes, masti-  
 his an. ʒ. j. cardamomi, spicæ, seminis maioranæ, rutæ, pæo-  
 iæ, siseleos, zinziberis, asari, piperis an. ʒ. ʒ. agarici electi ʒ.  
 iij. colocynthidis ʒ. iij. myrobolanorum chebulorum ʒ. ij. sc-  
 apini, hellebori an. ʒ. j. salis gemæ, nitri an. ʒ. ʒ. aloes hepa-  
 cæ pondus duplum, fiant pilulæ cum benedicta. Harum  
 osis est drachmæ vnus, & in vsu frequenti scrupuli vnus.

Vacuatio per loca propinqua, videlicet per nares, & pa- *Derivatio.*  
 tum est necessaria in formis diuersis, de quibus dictum est  
 ap. de cephalalgia pituitosa, & cap. de lethargo: copiosius  
 amen dicemus de eis cap. de apoplexia, vbi nomina om-  
 ium harum formarum, & barbara, & Latina indicabimus.

Vltimò, euacuanda est, & resoluenda materia capitis per *Resolutio,*  
 interna, & externa medicamenta, & cerebrum corroboran- *corro-*  
 ia: vt ʒ. j. theriacæ magnæ, aut mithrydati, aut diatrion pi- *boratio.*  
 beron, aut diagalangæ multis diebus sumpta cum ʒ. j. aquæ  
 saluæ, aut stichados, aut roris marini, aut similis naturæ ca-  
 pitalis in forma aquæ, aut decocti, aut syrupi. Cervix & cap. *Topica.*  
 ungantur oleo rutæ, aut laurino, aut costino, aut ex casto-  
 leo. Emplastrum ex ruta, scilla, serpillio, saturæia, & cepa cum  
 nelle, & oleo camomillæ confectum capiti raso admotum  
 cum lana succida omnem vertiginem tollit. Quidam labo- *exemplum.*  
 rās vertiginē antiqua, post vacuationem per pilulas cochias  
 curatus fuit lotionē assidua capitis rasi decocto camomillæ,  
 & rosarum. In diuturna vertigine, & fermē incurabili est  
 summū auxilium venas nō pulsatiles post aures abscindere.

Quorūdam experientia probatum auxilium est cauterium *exemplum*  
 prædictarum partium. Passus est quidam vertiginem prope- *alterum.*  
 modum insanabilem, amisso sere sensu cap. & cum imenso  
 stupore ob frigus intensum, & post multa remedia, quæ ni-  
 hil profuerunt, cataplasmate ex sola vrtica toti capiti raso  
 per noctem admoto curatus est, factis postea multis ampul-  
 lis plenis aquosa pituita, a quibus multa emanauit pituita.

## De Vertigine. CAP. VIII.

### Scholium.



Vm in morbo ob tenebrationes. ) Cum visa indicamus Vertigo  
 circumuolui, symptoma hoc à Græcis dynos, à latinis vertigo quid.



## DE CVRAND. MORB.

*Vertigo duplex.* dicitur. 4. acut. com. 42. cum autem tenebrosa simul coram oculis apparent cum visus amissione, scotodinos dicitur affectio, à latinis vertigo tenebrosa. 4. aphor. com. 17. prædictæ duæ affectiones ratione maioris & minoris distinguuntur: tenebrosa enim vertigo maiorem causam arguit, nempe bilem adustam. Vertigo aliquando in febribus euenit. 4. acut. com. sent. 42. conante natura humores euacuare, de qua non agimus modo, sed tantum de ea, quæ cura febrem coniungit. Quæ vel fit ex proprio capitis affectu, vel per consensum. Per proprium affectum fit, cum humor, qui causa est vertiginis, est in cerebro. Id deprehendes ex eo, quod nullius partis affectæ signum apparet. Per consensum, cum à ventriculo, vterque, alia parte est prima mali origo, ut ex signis affectæ partis cognoscere poterimus. Vertigo est symptoma in actione læsa, deprauata scilicet imaginatio, quæ reu. quietam circumuolui indicat. Hoc symptoma ex alio sequitur, quod est vitium excrementi, cum inæqualiter mouetur, spiritus flatulentus in capite. Vnde intelliges non rectè colligere Lupeius reprehendi peccatum ex 4. acut. com. 42. ex sola ventriculi vellicatione fieri vertiginem: reuera enim illa vellicatio ex humore fit, ex quo excitati vapores vertiginis sunt causa. Neque existimandum est, ut fere omnes scribunt, vertiginem tunc fieri, cum spiritus flatulentus in cerebri ventriculis inæqualiter mouetur: sed opus est, ut ille spiritus descendat ad oculum, & ante humorem cristallinum motum illum exerceat: aliter enim non apparebunt res in gyrum moueri. Causa istius motus aut est externa, ut spiritus motus in gyrum, & vini potio: aut interna, quæ, ut diximus, vel est intus in verticillate, aut in alia parte. Morbus, ad quem sequitur vertigo, est intemperies frigida, in qua diminutus calor flatum excitat.

*Vertigo à causa frigida fit.* Extra accessionem quando est ex sanguine. Cum omnis vertigo fiat à causa frigida 4. acut. com. 42. quia à calore diminuto spiritus eleuari solent: difficile certe videtur qua ratione plethora vertiginis causa sit, nisi dicamus id fieri, eo quod à plethora fiant interceptiones venarum, hoc est repletiones, à quibus solet calor obrui, & spiritus non rectè diffusi. Cum in vertigine sanguinem mittimus, Aetius præcipit euacuationem acuatim non esse faciendam, quia vertiginosi facile concidunt: quod non erit seruandum, cum sanguinis missio iacete homine exerceatur.

### De epilepsia, seu morbo Comitiali. c. viii.

*Descriptio.* **M**Orbus comitialis (quem epilepsiam Græci vocant) concussio est omnium corporis partium non perpetua, ut in emprostotano, opisthotano, & terano conuulsionis speciebus, sed temporum interuallis accidens: neque hac solum re ab illis differens, sed mentis quoque, ac sensuum oblatione: ut auctor est Gal. lib. iij. de loc. affect. cap. v.

*Diuisio.* Cuius tres sunt differentię, quarum prima in cerebro per primariam affectionem fit: secunda per consensum ab ore ventris



ventriculi: tertia, quæ tamen & ipsa raro accidit, cum à par-  
te aliqua incipit affectus, post sentiente ægro ad cerebrum  
usque ascendit: ut in eo puero accidit, e cuius crure velut frigi-  
la quædã aura per coxam, & lumbos in caput tendens quo-  
tidie cerebrum afficiebat: visus quoque est (autore Paulo)  
morbus comitialis ab utero in quadam muliere, quo tempo-  
re vterum gerebat, qui post ædito fœtu quieuit. Omnibus ta-  
men his formis commune est, quod cerebrum afficitur. Fit *Causæ.*  
autem hic morbus à crasso humore pituitoso, aut melanco-  
lico, spiritus animalis meatum, qui in cerebri vetriculis est,  
obstruente. Cum verò per sympathiam quis laborauerit, si- *Causa hu-*  
mili quiddam cerebrum patitur, ventriculo à re aliqua in- *moris bilio*  
festato: nam ut singultire hunc cernimus, quoties aut cibo- *si per sym-*  
um mole grauatur, aut putres humores ipsum infestant, ita *pathiam.*  
tiam & neruorum principium concuti credibile est, ut a se  
expellat, quicquid sit, quod a parte primò affecta ad ipsum  
effertur. Præcedit hunc morbum mœstitia corporis, atque  
animi inconstantia cum motu minime voluntario, eorum, *Signa.*  
quæ perceperunt, obliuio, insomniorum visiones turbulen-  
tæ, dolor capitis, & faciei pallor: lingua præter hæc, inordi-  
nate mouetur, quam etiam nonnulli mordent. Inuadente ac-  
tione statim concidunt, conuellunturque, nonnunquam  
terunt, & circumaguntur. Præcipuum verò, ac maximum  
signum est oris spuma: nam cætera cõmunia sunt, & in aliis  
morbis. Obnoxij huic morbo ante omnes sunt pueri, & inter  
nos recens in lucem æditi, post hos adolescẽtes, ab his ætate  
constantes, omnium minime senes & decrepiti. Hæc affectio  
proxima est apoplexiæ, cum idem locus vtròque laboret,  
& idẽ humor in causâ sit: verum apoplexia ob omnimodam  
carentiam illius potentiæ, quæ ad neruos defluit: morbus  
autem comitialis, propter motum vitiosum generatur, ut ha-  
bet Gal. ij. aph. com. xlv.

Morbus comitialis, si hæreditarius fuerit non suscipit cu- *Curatio.*  
rationem: si non fuerit hæreditarius, & cerebrum primò affi-  
citur, difficilis est curatu: præsertim si æger sit natus xxv. an-  
num, affectusque fuerit ante illam ætatem simili, aut eodem  
morbo. Infans recens natus (cuius multi fratres in eadem, *Infantium*  
aut simili ætate perierunt epilepsia) præcedenti prius opti- *curatio*  
ma præuisione in victu materno, si ante primam lactationem *præseruās.*  
parum huius mixturæ acceperit, liberabitur à futura epilep-  
sia: ℞. sacchari optimi bene puluerizati ℥. ij. olei sisamini re *Victus.*  
centis, aut amygdalarum dulcium quod s. misce, & fiat con-  
fectio ad modum loch: quæ non solum ante primam lacta- *Confectio.*



# DE CVRAND. MORB.

tionem, sed multis diebus est sumenda, semper tamen ventriculo vacuo. Aliqui loco olei ponunt butyrum recens, purgat hoc medicamentum prauos humores ventriculi, & intestinorum, a quibus prauī vapores ascendunt, epilepsiamque efficiunt. Paulus Aegineta infanti nato ante lac exhibet mel. Nostræ fœminæ Valentinae consilio medicorum ante lac etiam primum exhibent cum melle parum decocto puluerem radice pœoniæ, & fel testitudinis, aut parum limoniatae smaragdorum.

*Duo medicamenta præstantissima.*

Ego sequutus multorum experientiam hæc duo medicamenta summopere laudo, primum bis, aut ter in die sumptum, alterum vero semel in hebdomada: hæc enim corroborant cerebrum, neruos, & ventriculum, & purgant ab eisdem partibus: ℞. limoniatae smaragdorum ℥.ij. pulueris radice pœoniæ maris, & seminis eiusdem an. ʒ.ij. coralli rubri præparati ʒ.ij. visci quercini, & cranei humani puluerizati an. ʒ.ij. pulueris vermium rubi, & succi rutæ an. ʒ.ij. corn. cerui vtri & vnicorni an. ʒ.ij. pulueris pullorum hirundinis adustorum ʒ.ʒ. rhodomellis, aut syrupi de hyssopo quod s. misce & fiat confectio: ex qua sæpe accipiat infans quantitatem vnius castaneæ. ℞. Hieræ picræ. S. ʒ.ij. agarici trochiscati ʒ.ij. rhodomellis ʒ.ij. misce, & fiat confectio. Dosis semel, aut

*Clyster in accessione.*

bis in hebdomada cochlearium vnum. Aliquando est necessarius hic aut similis clyster præsertim in accessione ipsa: ℞. decocti rutæ, saluæ, & roris marini an. ʒ.ij. s. olei rutæ ʒ.ʒ. s.

*Glandes.*

hieræ logodionis ʒ.ij. salis ʒ.ʒ. misce, & fiat clyster. Glandes, seu suppositoria hæc & similia sunt optima: pulueris hieræ picræ. S. ʒ.ij. salis gemæ ʒ.ʒ. mellis quod sufficit, misce, & fiant duo suppositoria, aut tria. In ipsa quoque accessione frictiones extremorum, vincula dolorifica & cucurbitulæ scapularum sine scarificatione ante primum annum, & post

*Avertentia, & reuellentia in accessione.*

cum scarificatione maximè conferunt. Curantur quoque infantes hoc laborantes morbo cauteriis paruis auribus, & superiori parti ceruicis, quam nonnulli nucam appellant, admotis. Radix pœoniæ maris secta ad modum coronæ collo appensa præseruat ab epilepsia.

*Diligentior cura in gratia Valentia.*

Eandem aut similem vim habet corallium, aut lapis smaragdus, aut hyaspis viridis. At quia infantes, & pueri in nostra vrbe Valentia sæpe laborant hoc morbo, & pereunt, præter dicta in curatione, & præseruatione eorum, his decreui alia non pauca addere. Da infanti summo mane postpositio lacte, saltem iij. horis, quantitatem vnius cicoris huius mixturæ, & liberabis eum ab epilepsia, Deo fauente: ℞. succi rutæ coch



cochlearium vnum, folia auri numero v. lapidis smaragdi  
 preparati ḡ.x. misce. Eandem, aut maiorem habet faculta-  
 tem notum Plinij auxilium, quod affert Antonius Cartha-  
 ginensis, vermiculorum lanuginosorum in rubo repertorū,  
 quorum tres aut quatuor lacte, vel aqua mellissæ simul de-  
 coquantur. Prodest mirum in modum infantibus hoc medi-  
 camentum, accipe cepe album perforatum, plenum theria-  
 ca magna, & croco, decoctum in furno, & ab eo exprimatur  
 succus: cochlearia tria bibat infans, reliquum in forma em-  
 plastri vētriculo impone. Confert quoque multum huic in-  
 fantili morbo 3.j. frequenter sumpta hieræ. S. cum decocto *Syrupus.*  
 ceroris marini, aut saluæ. Summe prodest huic morbo puero-  
 rum, ventriculo mundificato cochlearium vnū huius syru-  
 pi. ℥. florum buglossæ, horraginis, rosarum, radicum, & se-  
 minum pæoniæ, gentianæ, limaturæ eboris, vsnæ an. 3. ss.  
 cranei humani 3. ij. croci. ḡ.x. fiat decoctum in libris iiij. a-  
 quæ ad medietatem, de quo colatō accipe libram vnam, &  
 cum saccharo sufficienti fiat syrupus.

Si morbus comitialis fiat ex lacte in vētriculo infantium *Si ex lacte*  
 coagulato, à quo symptomata veneni generantur, hoc cata- *coagulato*  
 plasma ventriculo bis aut ter admotum deiicit ventriculi *in ventri-*  
 repletionem: ℥. foliorum vlmi p. iij. decoquantur in vrina *culo.*  
 puerorum, & cum vnciis duabus butyri fiat cataplasma: pa-  
 ris, aut maioris facultatis est hoc, ℥. foliorum maluarum,  
 absinthij, & vlmi an. p. j. decoquantur in vrina hominis, &  
 cum vnciis duabus butyri, & fermēti, & 3. j. olei nardini fiat  
 cataplasma: quod ter admoueatur ventriculo ante, & retro.  
 Sal cum melle deiicit ventriculi repletionem, siue sit ex la- *Sal cum*  
 cte coagulato, siue corrupto, vel ab alia causa, autore Gal. *melle.*  
 v. de sanit. tuenda, & iiij. de facultatibus alimētorum, cap. 14.  
 Si mel & sal lacti misceantur, ipsius in ventriculo coagula-  
 tionem impediunt: fallitur ergo Auicenna fen. 6. lib. 4. tr. 2. c. *Error A-*  
 21. de congelatione in stomacho, dicens sal ita lactis coagu- *uicennæ.*  
 lationem, vel (vt ita dicam) caseationem efficere.

Si superioribus non euacuatur lac concretum in ventri-  
 culo, neque eius symptomata finiuntur, præbe infanti 3. ss. *Potiones.*  
 coaguli hœdi, aut leporis, cum aqua pauca calamenti. Aut  
 da, præsertim grandioribus hanc potionem. ℥. Pulueris ca-  
 lamenti 3. j. theriacæ magnæ, & coaguli hœdi an. 3. ss. aquæ  
 rubeæ tinctorum 3. j. syrupi acetosi. S. 3. ss. misce. Hæc coagu-  
 la, quamuis lac coagulatum non sit, id coagulant, coagula-  
 tum verò dissolunt, & per inferiora, aut per vomitum de-  
 pellunt, quemadmodum theriaca magna veneno affectos



# DE CURAND. MORB.

curat, & sanos veneno afficit. Hæc tamen theriaca magna sola (teste Gal. in libello de theriaca ad Pisonem) nocet pueris, præsertim calidis: quia superat vires caloris naturalis, & spiritus infantium, & multum lætificat, & cordis spiritus dissoluit: mixta tamen cū aliis, & eius parua quantitas dari solet audacter, præsertim in hoc morbo mortē denuntiante.

*Fœminæ* Valentina fœminæ ad deliciendam ventriculi infantium plenitudinem, & cruditatem exhibent mixturam seminis sinapis, milij, & sesami cum rhodomelle, & oxyfaccara composita, has non damno. Aliæ eis dant puluerem contra indigestionem, qui vulgò dicitur, la Pellejana, quia eius inuentrix fuit fœmina Valentina dicta Pellejana: constat medicamentis calidis, & ferri fece, quare has minus laudo. Aliæ præbent eis succum bursæ pastoris, quæ a Valentinis nominatur paxeripeu, hoc medicamentum restringit, & non purgat, nisi per accidens, ideoque has damno. Aliæ homicidæ imprudentes infantibus exhibent cerusam, aut argentum viuum, aut minium, quod medicamentum Betici vulgato prouerbio derident. Aliqui pharmacopolæ eos interficiunt medicamentis valenter purgātibus, quos summè reprehendo, & pœna capitali dignos cenfeo. Aliquando infantes afficiuntur capitis vlcerebus manantibus, & tumoribus aurium, & mandibularum: & aliquando per nares, & palatum mucorem, & excrementa pituitosa depellunt: per has enim vias cerebrum, & nerui deponunt excrementa, quæ retenta parere solent morbum comitiale. Quare errant imperiti medici, & fœminæ, dum hæc curare nituntur. Possem ego in præsentia exempla aliquot adducere, sed breuitatis causa prætereo.

*Grandio-* Si fuerit æger gravior iam factus, in ipsa accessione summo studio oportet statim eū excitare, ne pereat subito, aut in apoplexiam incidat: semper tamen considerandum est, an fiat per cōsensum ventriculi, aut aliarum partium: ut medicus possit iis partibus prius medicinā facere, de quibus suis locis dicemus. Quæ vero solēt laborantē ex accessione excitare, & liberare, sunt vincula extremorū dolorifica, frictiones etiā illarū partium cū sale, & aceto, clysteres acres, & suppositoria valentiora, de quibus cap. de apoplexia loquemur: voces & strepitus magni excitāt, quāvis inaximi & repentini soni extra accessionem eam inducere possint, & aliquando mortē inferre, ut cōtigit filio Matthæi de Gradi. repentino tubarum clangore. Conferunt quoq; in ipsa accessione in conspectū ægri illata magna lumina subito capite,



& corpore egri erectis, & apertis palpebris. Si vinciantur do-  
 rifice testes ægroti fiet dubio procul, vt ab epilepsia exci-  
 retur. Hoc quoque medicamentum sæpe naribus admotum  
 dem efficere solet: ℞. succi Cyclamini, pulueris feminis ru-  
 æ, & coaguli leporis an. 3. ij. mouet enim sternutationem, &  
 excitat: sed prius scindenda est vtraque humeralis, vel inter  
 scapulas per cucurbitulas cum scarificatione sanguis est  
 mittendus. Quod si prædictis non liberatur ab accessione,  
 naribus impone sæpe parum huius pulueris: ℞. hellebori 3.  
 j. castorei euphorbij, condisi an. 3. s. misce, & fiat puluis.

Ioannes Agricola in lib. quem de Herbis inscripsit, cuius-  
 dam aquæ meminit ex cerasæis, quam etiam multi experti  
 sunt, ipsius verba subiiciã. Ex cerasæis distillata aqua certissi-  
 mum statim affert remedium, cum primùm in os epileptici  
 iam paroxismo correpti inditur. Vnde illicò reuiuiscit, & eo  
 dem temporis puncto surgit liberatus, neq; vllò spasmo am-  
 plius conuellitur, donec per cremētum noua materia aucta,  
 vt fieri solet, alius paroxysmus oriatur. Elicitur hac arte in  
 vas extillationi accommodū, imponuntur cerasa non multo  
 ante decerpta, adhuc succi plena, fiat humoris intra cerasa  
 contenti ex igne mediocri eliquatio, quem diligēter, vt rem-  
 pretiosam, atque ære multo redimendam, curabis asseruan-  
 dum, de quo in os epileptici paroxysmo laborantis coeffun-  
 das 3. iij. aut plures, & statim inhibebis impetum violenti  
 morbi. Considerabis tamen ex tribus crassorum generibus,  
 ea esse ad hanc distillationem eligenda, quæ Valentinis di-  
 cuntur reginals, dulcia quidem illa plus quàm alia duo ge-  
 nera, quorum alterū magis rubrum, alterum magis nigrum.

Extra accessionem si fiat a pituita, a qua fere semper de-  
 pendet, curatur quinque auxiliorum generibus. Primò vi-  
 ctu calfaciente, & exsiccante, vt aere, natura, aut arte para-  
 to, zinzibere, cinnamomo, gariophyllis, rore marino, itæca-  
 de, & similibus igni apposis, dum modò hæc non moueant,  
 & detegant epilepsiam, qualia sunt pellis caprina, odor he-  
 patis caprini, & suffitus cornū illius, lapis gagates ignitus  
 naribus subiectus conuulsionem concitat. Hoc quoque facit  
 suffitus sulphuris, apium, vt multorum est sententia, quibus  
 videtur Plinius assentire, epilepsiam detegit. Contrarium  
 scribit Gal. libello de puero patiente morbum comitalem,  
 si Galeni sit. Suffitus ex galbano, & odor myrrhæ epilepsiam  
 mouent, præsertim corpore non euacuato, quamuis non-  
 nullis displiceat, cum apud eos maxime huic morbo confe-  
 rant, præsertim in declinatione. Dioscorides tamen sentit

*deriuantia**Aqua ce-  
rasorum.**Victus.**Mouentia  
epilepsiam*



# DE CVRAND. MORB.

myrrham calfacere, astringere, glutinare, exsiccare, & sopire: nonnulli sunt, qui affirmant prædicta & similia medicamenta in accessione ipsa conferre, & intermissione nocere, & detegere, vt dictū est initio huius capituli de theriaca magna, & de coagulo in lactis coagulatione. Cibus sit, qui bonum, & paucum, & calidum sanguinē efficiat, vt est ius pullo-  
**Que no-** rum columborum agrestium cum ciceribus nigris, & pau-  
**ceant.** co pipere: & quia solet esse diuturnus hic morbus, & eget multis euacuationibus, maiori nutritione & liberaliore opus est. Utatur ergo turture, perdice, pullo gallinaceo, gallina tenera, lepore paruo, & cuniculo: semper tamē parum piperis, aut cinnamomi, aut zinziberis addatur: aut eruca, aut sinapi melle conditum. Carnes arietinæ sunt bonæ, præsertim in Hispania: capita tamen arietum & hircorum pessima sunt, reperitur in eis succus putridus malè olens, à quo forsā fiet epilepsia. Coturnix noxia est in hoc morbo, & forsā Arabes loco eius perdicem scripserunt, quāquam apud eos æquē perdix & coturnix nocent, quia solent laborare epilepsia. Similiter anguilla, pisces, legumina omnia præter cicera, herbæ frigida, lacticia, & omnia vaporosa, & cepe, allium, & quæ sunt difficilia cōcoctu maxime obsunt. Cōna sit minor prandio. Potus erit aqua mellis, aut cinnamomi. Si verò habuerit ventriculi imbecillitatem, bibat vinum optimum bene aqua dilutum per horā saltem ante potum. Immodica agitatio, & motus nocet præsertim à cibo, coitus quoque & animi perturbationes.

**Remissio.** Secundo, sanguinis missione ( præsertim si sint signa sanguinis cum pituita ) per sectionem duarum simul humeralium, & extrahatur sanguis respondens plenitudini. Si ætas & virium robur absint, extrahatur sanguis per cucurbitas cum scarificatione ex scapulis. Si ex suppressis mensibus, aut hemorroidibus genitus est hic morbus, venæ tibiarum, aut pedum sunt secandæ, in vere tamen magis conuenit sanguinis missio ad præseruationem.

**Præseruatio.** Tercio, concoquentibus pituitam, vt rhodomelle, oxymelle. S. & comp. syrupo de hyssopo, de stachade, de duabus radicibus, oxymelle scillitico, cum aquis, aut decocto capitali: videlicet, saluiæ, pæoniæ, stachados, & roris marini, & similia. Hæc materia per multos dies est apparāda, primò mitioribus, secūdò post primam purgationē mediis, terciò post secundam purgationē valentioribus, & si opus fuerit, quarto & quinto.

**Purgatio.** Quarto, phlegmagogis, de quibus primo capite diximus,

vt



vt drachma vna hierę. S. cū drachma vna agarici trochiscati  
facto potu cum decocto, aut aqua capitali, pilulæ elephan-  
ginæ, de agarico, Hiera composita, benedicta, pilulæ masti-  
chinæ, diaphænicon, electuarium vtrunque indum: pilulæ  
cochiæ optimē euacuant pituitam. His pilulis sine magna  
custodia vti poterit: ℥. pilularum cochiarum, agarici tro- *Pilulæ ad*  
chiscati, & pilularum assaiaret an. ℥. ij. optimi diagridij. ḡ. *vsu.*  
xv. cum aqua pæoniæ fiant pilulæ xv. & aurentur: ad vsu-  
tres pro dosi: aut si magis amat aliam formam: ℥. diacatho-  
licon. ℥. j. ḡ. diaphænicon ℥. j. agarici trochiscati ℥. ij. electua-  
rij indi maioris ℥. iij. pulueris rosatę nouellæ ℥. ij. rhodomel-  
lis, quod sufficit, misce, & fiat confectio. Dosis semel in heb- *Confectio.*  
domada cochlearium vnum.

Quintò, resoluentibus materiam reliquam, & cerebrum *Resolutio.*  
calfacientibus, & siccantibus, & roborantibus, ne postea si-  
milem materiam generet: qualia sunt theriaca magna, mi-  
thrydatum, & diamusculus dulcis, & pliris arcoticon, & con-  
serua acori veri: quorum drachma vna multis diebus sum-  
mo mane cum vinciis duabus aquæ, aut decocti, aut syrupi  
capitalis sumatur, post primam & alias purgationes maxi-  
mum in hoc genere auxilium erit.

Sequens quoque confectio est optima in hoc genere om- *Confectio*  
ni hora sumpta, præsertim mane: ℥. limoniata sinaragdo- *optima.*  
rum ℥. j. ḡ. diamusci vtriusque an. ℥. j. ḡ. theriacæ magnæ ℥. ij.  
pulueris galangæ, calami aromatici, & radicis pæoniæ an. *Electua-*  
℥. iij. cranei humani ℥. j. syrupi de stæchade quod satis est, mi- *rium mi-*  
sce, & fiat confectio. Hoc electuarium est mirabile: ℥. pulue- *rabile.*  
ris rosatæ nouellæ, & aromatici rosati an. ℥. j. ḡ. pulueris ca-  
lami aromatici, & galangæ an. ℥. ij. pulueris cranei humani,  
& coralli rubri præparati an. ℥. j. sacchari dissoluti in aqua  
pæoniæ quod s. misce, & fiat electuarium in tabulis. Cura-  
tur hic morbus radice eryngij cum melle condita, si multis  
diebus comedatur: aut sequenti conferua: carnis radicis pæo-  
niæ, & eryngij prius bene decoctæ lib. i. mellis quod s. misce,  
& fiat conferua: adde pulueris galangæ, & calami aromati- *Radix e-*  
ci, & cinnamomi an. ℥. iij. Nicolaus Florentinus vir magni *ringii.*  
nominis nostris temporibus curauit nobilem quandam xl. *Conserua.*  
annos natam, quæ ab infantia affecta fuit eodem morbo  
(quod Gordonius tanquam difficile non credit) hoc medi-  
camento: ℥. herbæ sancti Pauli, seu paralefis (hæc dicitur à  
Gattinaria costus, seu pipella. & à Dioscoride Phlomitis, &  
est verbasculum) m. iij. & cum iusta mellis parte fiat confer- *Observa.*  
ua, cuius cuilibet libræ adde pulueris gariophyllorum, py-  
reth



## D E C V R A N D. M O R B.

rethri, & radice pæoniæ an. 3. iiii. Dos est vnciæ s. cum aqua aut syrupo capitali. Vncia vna & semis aquę herbę prædictæ cum paucis saccharo, si triginta diebus bibatur, curat hunc morbum. Eandem habet vim oleum terebinthinæ, si in quantitate medij cochlearij sumatur. Drachma vna frequentis pulueris est eiusdem ferme facultatis. ʒ. cinnamomi electi, galangæ, spicæ nardi an. 3. s. pulueris cranei humani. 3. j. s. misce.

- Cauteria laudantur.* Laudatum & expertum remedium in hoc sunt cauteria actualia, & potentialia futuræ coronali admota, euacuant à parte affecta. Probatum est aliquos epilepticos vulneribus capitis affectos, curatis vulneribus nūquam in morbum comitiale recidisse.
- Scilla vis.* Medicamentum ex scilla est in hoc morbo summum remedium, præcedenti tamen prius euacuatione cōsentanea, autore Gal. in libello de puero morbo comitiali laborante, quod omnes post Galen. experti sunt. Accipe cæpe narcissi diuisum in partes minimas, ponaturque in vase vitreo, in quo prius mel conseruatum fuerit, luto, aut aut alia re bene obturato, & per quadraginta dies caniculares soli exponatur, & singulis quibusque diebus multum moueatur, & agitetur: quo tempore exacto, accipe liquorem ex scilla expressum, & cum sufficienti mellis quantitate fiat confectio. Cuius dos in iuuenibus, & senibus sit cochlearium vnum in singulos dies: Puerorum verò dos a quarto anno vsque ad decimum quartum erit dimidium cochlearij. Infantibus recens natis vsque ad quartum, & quintum annum minimè conuenit: illorum enim ætas non fert huius medicamenti valentem facultatem: neq; potest vacuationes necessarias prius tollerare. In periculosis remediis non laudo audaces medicos: hoc enim auxilio infantem, & canem recens natos subito mori vidimus.
- Confectio ex scilla.*
- Consilium.*

### De Epilepsia, seu morbo Comitiali.

#### C A P V T V I I I.

##### Scholium.

*Duos modis fit Epilepsia. Vallesij lapsus.* **M**Orbus comitalis. ) Cum Galenus Epilepsiam appellat conuulsionem, nomine conuulsionis motum conuulsuum intelligit. Epilepsia duobus modis fit: primo, proprio cerebri affectu, secundo per consensum: Vallesius lib. 3. de loc. affect. Omnem Epilepsiam ait fieri ab humore crasso obstruente cerebri ventriculos, ac proinde miratur qua ratione possit fieri per consensum. Non animaduertens solā eam Epilepsiam, quæ est propria cerebri passio, à dictis humoribus fieri,



fieri, eam vero quæ per cōsensum fit à vapore, aut alteratione ad cerebrum ascendente, ipsūque irritate ad eius expulsionē. Est tamen aduertendum epilepsia fieri ab humore crasso obstruente cerebri ventriculos, li qui ob non omnes, sed secundum aut tertium: nunquā enim fit, ab obstru- struuntur ne anteriorum ventriculorum: ratio est, quia in epilepsia debet impediri in epile- trāsitus spiritus animalis, quod in obstru- struuntur anteriorum ventriculo- psia. rum non cōingit. Ex his multorū errores effugies. Primò Rōdoletii, qui Rondole- epilepsia sentit fieri ex obstru- struuntur meatum, qui in anterioribus cere- tius labi- bri ventriculis pituitā ad glandulā huic rei dicatā expurgans. Quoniam tur in duo- etsi demus talem obstru- struuntur ctionem, et pituitam in anterioribus veni- riculis bus, detentā, cum non sit prohibitus transitus spiritus ad principium spinalis medullæ, non sequetur Epilepsia. Secundus error est eiusdem existiman- tis obstru- struuntur ctionem cerebri, quæ Epilepsia causa est, à tenui humore etiā fieri: reuera enim hoc repugnat naturæ humoris tenuis, qui penetrare potest, & nō obstruere. Tum hoc etiā repugnat curationi eius epilepsia, quæ est propria cerebri passio ab obstru- struuntur ctione pendens: hæc enim at- tenuantibus crassos humores, & incidentibus glutinosos perficitur, quorū nullum humori tenui conuenit. Tertius error adhuc maior est Ioannis Langii er- Langii, qui sentit Epilepsiam aliquando fieri ab obstru- struuntur ctione à vapore ror- crasso orta. Qua enim ratione vapor impedit transitum spirituum? E- pilepsia proximè accedit ad apoplexiam, eo quod obstru- struuntur ctio incepta faci- le poterit crasso humore addito perfici. Aduenit hæc frequenter pueris, Epilepsia cum septimestres sunt, & perseverat usque ad annos pubertatis. 2. aph. accedit ad sent. 45. lib. 5. sent. 7. pueris aduenit frequenter ob voracitatem, & ro- apoplexiā. bur facultatis expultricis. Cessat autem in pubertate ob magnam mu- In quibus tationem, quæ viris ab ætate et coitu contingit, mulieribus verò ex men- ætatibus strua purgatione. Post pueros frequenter hoc malum adolescentibus e- adueniat venit, omi- in n. minime senibus, quia cum languidam habeant expu- ltricem facultatem, non facile mouetur ad expellendum rei alicuius mo- lestiam, quod Lupeius non animaduertit.

Morbus comitialis si hæreditarius.) Cum sani homines sanos, Hæredita- & egri egros generent. Epilepsia hæreditaria erit, cū patre, aut matre ria epile- ea affectis, filius imbecillitatem capitis contrahit: hæc ( quamvis ab psia. autore incurabilis fiat) curari potest roborato capite, & optimo victu. Præseruantur ab ea pueri, quorum fratres simili malo perierunt, mal- Præserua- le cum pauci, fœniculo coctō & destumato, & postea permixto cum tio. oleo amygdalarum dulcium. Mel enim cum fœniculo attenuat crassos humores, & eos concoquit: oleum verò amygdalinum fluidā aluum ser- uat. Præterea ex medicamentis, quæ laudantur ab autore, primum ex- hibendum nō est: quia si pueri exiguum alimentum, & si familiare non possunt ferre in ventriculo, quæ ratione medicamentum ex tam variis & multis inuilibus rebus commixtum ferre poterunt? præsertim cum supradictum ex melle medicamentum id efficiat. Tum si in officinis nab



## DE CVRAND. MORB.

habemus paratos syrnpos pituitam incidentes, & melancholiam attenuantes, ad quid craneum humanū, smaragdus pulvis vermium rubi, & similia? Certè hic, & similes viri, cum ad manum habeant medicamenta, vt admirationi sint, ad ea quæ difficulter parantur, & cum minori vtilitate, ne dicam incommodo confugiunt. Secundum medicamentum auctoris, si in ventriculo non sit pituitosus humor collectus, optimū est. Tertium verò, quod incipit. *℞. succi rutæ, est omittendum*: in eo enim auri folia inutilia, & smaragdus maximè lædens obstruendo, & incrassando humorem ingrediuntur, omittere etiam oportet Plinii me-

**Epilepsia** dicamentum. Et in summa qui existimant aliqua esse medicamenta, quæ non habet epilepsiam curant occulta vi, decipiuntur maximè. Quia hic morbus manifestus est, nempe obstruēctio, aut res cerebro contraria: siue sit alterata toto tem pio, siue vapor, remedia ergo erunt etiam manifesta agētia, qualia sunt peramen- illa, quæ morbo contrariantur.

**to opesant-** Si morbus comitialis fiat ex lacte.) Epilepsiam ex lactis corruptione curabis, prius interdicens lac, deinde purgando ventriculum **Epilepsia** puluere hieræ picræ, & rhodomelle, si validus puer sit, ita vt sit ʒ. aut **ex lactis** ʒ. j. & s. pulueris, & rhodomellis ʒ. s. cum decocto feniculi: in gran- **corruptio-** dioribus puluere prædicto & terebentina ʒ. ii. cum decocto prædicto. **ne.** Suppositorio reuellere poteris à ventriculo, ex ʒ. j. pul. hieræ. ʒ. Gal. faciens duo suppositoria in sufficiens quantitate mellis, et addendo vnicuique, si opus fuerit, salis gemmæ. ʒ. ii. Neq; opus erit vii coagulatis, cum habeamus oximel, Rhodomel, & alia similia lac coagulatum dissoluentia.

**Plenitudo** Valentinae foeminæ.) Hanc plenitudinem commodè deponemus **ventriculi.** hoc medicamento. *℞. hieræ. ʒ. Gal. ʒ. j. oxizacari ʒ. ʒ. j. decocti hordei,* quod s. misce, & fiat potio.

Extra accessionem si fiat.) *Omnia calida & euaporantia, quia calefaciunt cerebrum, & vapore illud replent, fugienda sunt.* Sanguis mittendus est ex cephalica, vt reuellamus à capite, & euacuemus ex cerebri ventriculis, venæ enim cerebri inanitate humorem attrahent ex eius ventriculis.

**Euaporan-** Quintò, resoluentibus materiam.) Nullum præstantius remedium curat Epilepsiam, quā sit optima victus ratio, et locus etiam siccus. **tia fugien-** Quod si aliquis habeat Epilepsiam, cuius curationis nulla sit spes, huic **da.** opus erit tēpore veris sanguinē mittere ex parte longinquiori, ex pede scilicet vt reuellamus: tunc enim nullus est adhuc in capite affectus postuta **In despera-** licet vt reuellamus: tunc enim nullus est adhuc in capite affectus postuta **ta epil-** lans euacuationem. purgatione etiā et optimo victu vtentes, accessio epilepsia ali- **psia ali-** lepsia, non ita frequenter, vt solebat, neq; cū tāta molestia apprehender. **quid agē-** dum.

### De melancholia. CAP. IX.

Descriptio.

**M**elancholia quædam est mentis alienatio citra febrem ab humore melacholico proueniens, qui mētis sedem, quæ cerebrum est, occupat, & eius temper



periem immutat. Trifariam ea fit, vt autor est Gal. Interdū *Cause et diuifio.* enim vniuerfo, qui in venis continetur, sanguine melācho-  
lico affecto, cerebrum ipſum communem etiam totius cor-  
poris noxam ſentiens ob generale vitium afficitur: nonnun-  
quam verò reliquo ſanguine naturam ſeruante, & innocuo  
exiſtente, ſolus iſ qui in cerebro inuenitur, dignus eſt, qui  
notetur, cū in melancholicam naturā ſit alteratus. Quod  
bifariam contingit: aut enim aliunde in ipſum deriuatur,  
aut in ipſomet genitus eſt, cū videlicet internus calor, aut  
bilem, aut craſſum, atrūque ſanguinē ſuperaffauerit. Quæ  
ſanè diſtinctio non parum ad curationem conducit. Si qui-  
dem vbi vniuerſus corporis ſanguis melancholicus extite-  
rit, auſpicari curationem à ſanguinis miſſione conuenit: vbi  
verò ſolum iſ, qui in cerebro continetur: infirmus (quātum  
ad hanc attinet diſpoſitionem) ſecta vena non indiget, quā-  
uis ob aliam cauſam ſecari poſſit, quod aut propter pletho-  
riam erit faciendum, aut præſeruationis gratia, vt Aetius  
opinatur.

Eſt præterea tertium melancholiæ genus, quod à ventri-  
culo oritur, medicis pleriſq; hypochondriacum flatuoſūm-  
que nominatum, propter aſcendentem in cerebrum melan-  
cholicam quandam exhalationem ſimilem ei, quæ oculorū  
ſuffuſiones inducit.

Opere prætium autem erit, communes primū notas re- *Signa com-  
muna.* cenſere, poſt ad peculiare deuenire. Sunt verò communes  
notæ, metus, triſtitia, hominū odium & auerſio. Variæ præ-  
terea ſunt melancholicorū imaginationes, alij ſe fictilia va-  
ſa arbitrantur eſſe, alij animalia bruta, alij mortem experūt,  
quam ſibi non rarò conſeſcunt: ſimul etiam & perhorre-  
ſcunt eandem, atque abominantur, quod admiratione ma-  
gis dignum eſt. Nonnulli ſemper rident, Democritum imi-  
tati, alij Heraclitum referentes, in perpetuo ſunt luctu. Sunt  
qui ſe Deo plenos, & cœleſti numine afflatoſ opinentur, fu-  
turāque prædicere poſſe. Sed longum eſſet omnes horum i-  
maginationes recensere, & longius multo omnium cauſas  
reddere, cū hæc vna res ex earum genere ſit, quæ fieri non  
poſſunt. Verū ſi quis exercere ſe in hac contēplatione vo-  
let, licebit ſanè illi per me, verū ea lege, vt philoſophiæ con-  
uenientia dicat, verbi gratia ſiccitatem, in eo qui ſe teſtam  
eſſe credebat, cauſam explicabit: in eo verò, qui ſe caput nō  
habere arbitrabatur, & leuitatem, quam ſpiritus eleuatus  
præſtabat. In cuius curationem, præter alia dicitur excogi-  
taſſe Philoſtimus pileum plumbeum, cuius pondere oppreſ-  
ſus



*Signa par*  
*ricularia.* fus caput se habere intelligeret: Iam ad peculiare notas accedamus. Eos qui per consensum, totius corporis melancholici fiunt, hæc sequuntur, graciles sunt, macilentique, venas habent latas, hirti sunt, squalent, duri, nigri, aliquando rufi, nonnunquam flauī, denique vndiquaque & ex toto melancholici apparēt, idque aut propria natura, aut propter vigilias, sollicitudines, iras, mœrorem, ciborum vsum & antea-ctam victus rationem, quæ ad torrendum sanguinem, & in melancholicum conuertendum aptissima est. Quæ postquam optime consideraueris, cubiti insuper venam secato, certissimam enim hinc coniecturam facies: secabis autem mediam, quod si emanans sanguis melancholicus sit, pro laborantis viribus educatur, sin purus & syncerus, nequaquam: sumpto hinc argumēto, quod solum is, qui cerebrum occupat, sit melancholicus: qui aliter est, educendus. Hypochondriaca melācholia sic dignoscitur. Primo enim stomachi accidentia emergunt, flatus inquā, gurgulationes, cruditates, eructationes acide, & alui deliccatio, & ab egestionibus, vomitu, & eructatione percepta leuitas, & quod æger omnes molestias circa hypochondria versantes percipiat.

*Pictus ra-*  
*rio.* Initio quinque auxiliorum generibus sanatur, nam confirmata ægre, aut omnino nunquam curari potest. Primo, victu humectante, & in actiuis temperato, vt est ius arietis, & gallinæ cum borragine, aut buglossa alteratum. Bibat vinū buglossatum, id est, habens radicem buglossæ, rubrum, medium in ætate, & substantia, bene dilutum aqua. Quæ atrabilem gignunt, maxime nocēt, vt falsa omnia, caro ceruina, hircina, bubula & leporina, nisi hæc tria animalia essent propinqua ortui: tunc ratione humoris optimi sunt alimēti. Legumina quoq; nocent, & multum calida, qualia sunt eruca, sinapi, piper, zingiber, & similia. Animi perturbationes, & coitus immodicus satis nocent, aliquando tamē prodest, si moderatus sit, præsertim si ex semine detēto, & corrupto profectus fuerit hic morbus. Blandē iis inseruiendū est, aliquando tamen acerbius sunt increpandi & tractandi, sed perpetuò cautē. Nam aliqui sunt obiurgandi, verberandi & vinciendi, ne manus violentas medico, aut aliis inferant. Sæpe oportet obseruare melancholici phantasiam: & imaginationem. Si quis enim eorum mente sua informet & fingat, in ventre se habere ranas, aut serpentes (vt quidam melancholici iam figurarunt) promittat medicus se animalia illa facile expulsurum, & post purgantis medicamenti effectum ea animalia deiectionibus immixta viua ægroto ostē-



stendat. Si æger cibum, potumque fastidiat, ei omnia ferme genera alimentorum, vt licebit, sunt offerenda, vt possit gratum sibi accipere. Si verò nihil, aut parum comederit, hoc nutriatur clystere: ℞. iuris gallinæ, decoctionis florum cordialium lib. j. oleorum violarum & amigdalorum dulcium an. 3. ij. butyri recentis, & cassiæ fistularis præparatæ an. 3. j. vitellorum ouorum nu. 2. misce, & fiat clyster. Nutriatur quoque bonis odoribus, præcipue hac mixtura sæpe naribus admota: ℞. succi pomorum redolentium lib. j. aquæ rosarum 3. iij. vini albi optimi, & bene olentis 3. j. ℞. misce. Somnus conciliandus est iis, quia longa est eorum vigilia, & maxime eis nocet. Quod si lactuca, & lac seminis papaueris non possint somnum inducere, tibiæ, & pedes sæpe lauentur decocto lactucæ, violarum, foliorum salicis, & arundinum, corticum papaueris albi, & iuschiami. Naribus quoque & fronti, aut temporibus ad mouenda sunt olea violarum, aut papaueris, aut vnguentum populeon. *Clyster nutriens. Somnum inducens. Topica somnifera.*

Secundo, apparantibus atram bilem syrupo de pomis, de buglossa, de borragine, de fumaria. S. & comp. de epithymo cum duplo aquarum, aut decocti buglossæ, borraginis, fumaris, lupulorum, scolopædriæ. Hæc tamen multis diebus sunt bibenda, quia terrestris est, & admodum resistit atrabilis. *Præparatio.*

Tertiò, vacuantibus melancholiam, quæ si sit sanguinea, aut cum præsentia sanguinis: & si fiat per consensum totius, statim a legitima & iusta victus ratione est vena media seu communis secanda, autore Gal. iij. de loc. affect. cap. vj. sanguinisque tantum extrahendum est, quantum respondeat plenitudini, cum ex repressis mensibus, aut hæmorrhoidibus inhibitis nascitur, venæ tibiæ, aut pedum sunt incidendæ, & in confirmata iam & veteri frontis, vena aperienda erit. Vacuanda quoque erit lenibus & clementibus, quæ sunt epithymus, & aqua casei, & myrobalani indi: vt pulueris epithymi 3. ij. aquæ casei 3. iij. misce: vel epithymi 3. ℞. corticum myrobalanorum indorum 3. j. ℞. fiat decoctum in vnciis sex feri caprini, donec vnciæ duæ consumantur. *Vacuatio. Sectio veng. Quæ vena secanda. Purgatio lenis.*

Deinde valentioribus, vt folliculis sene, diasene, confectio- ne medicaminis quod scripsit Hamec, pilulis indis, & de fumo terræ. Multi quoque lapidem armenum, & lapidem stellatum, seu lazuli laudant in purgando hoc humore, sed ego his non auderem vti simplicibus, neque in compositione, quia primus incognitus est, secundus verò est malignus, nisi fuerit bene electus, & præparatus lapis stellatus, in die tamen purgationis per pilulas ab opere bibat æger decoctum fruct



# DE CVRAND. MORB.

*die purga-* fructuum, & florū humectantium: vt sunt vuæ passæ sine gra-  
*tionis su-* nis pruna damascena, violæ, borrago, & similia: ne intempe-  
*mendum.* ries sicca à medicamento sicco multum intendatur. Quia  
morbus hic est diuturnus, necessaria est vacuatio frequens,

*Confectio.* quæ fiet optimè hac confectione: ℞. cassiæ fistulæ præpara-  
tæ. ʒ. ij. confectionis medicaminis Hamac, & diasenæ an. ʒ. j.  
conseruæ borraginis ʒ. ss. pulueris diarhodon abbatis ʒ. ij.  
syr. buglossæ, q. s. m. & fiat confectio. dosis est cochlearia duo

*Puluis sa-* semel in hebdomada. Puluis hic optimus & ferme diuinus  
*luberrimus.* est, expertusq; à multis grauissimis medicis, & eo multi me-  
lancholici curati sunt: ℞. epithymi ʒ. iij. lapidis lazuli opti-  
*Laudes hu-* mi, agarici trochiscati an. ʒ. ij. scammoni. ʒ. j. gariophyllorū  
*ins pulue-* numero 20. misce, & da ʒ. ij. cum fero ouino, aut caprino, aut  
*ris.* aqua borraginis, aut buglossæ: hoc medicamentum dilige,  
& eo vtere, si vis salutem ægris restituere, & honores asse-  
qui. Dicitur à quibusdam puluis benedictus.

*Auersio.* Quartò auertētibus à cerebro & corde ad ignobiles par-  
tes: vt partium extremarum frictionibus, vinculis, foru ex  
decocto rerum parum calidarum, cucurbitulis, balneis, &  
*Clyster.* clysteribus: vt hoc: ℞. maluarum, fumariæ, borraginis, lupu-  
lorum an. m. j. epithymi, senæ an. ʒ. iij. fiat decoctum, de quo  
accipe lib. j. cassiæ fistularis præparatæ ʒ. j. olei violarum &  
sesaminis an. ʒ. ij. salis ʒ. ij. misce, & fiat clyster.

*Discutien-* Quintò, reliquias resoluentibus, & corroborantibus ca-  
*tia, corro-* put & cor, & tandem humectantibus, & intemperiem capi-  
*borantia,* tis & totius siccam sanantibus primum fit per diamuscum  
*& altera-* dulce, & amarum, per electuarium de gemmis, per electua-  
*ria.* rium lætificās Rhasis in quantitate drachmarum duarum,  
cum aqua buglossæ. Fit etiam resolutio, & illarum partium

*Confectio.* principum corroboratio per hanc confectionem. ℞. margari-  
tarum ʒ. ss. hyacinthorum, zaphirom, sinaragdorū, v-  
triusque corallij an. ʒ. ss. cinnamomi, macis, galangæ, nucis  
muscatae an. ʒ. j. gariophyllorum, piperis longi, cubearum,  
ligni aloes, storacis, calamithæ, seminis basiliconis an. ʒ. ss.  
croci. ʒ. j. musci, ambræ an. ʒ. iij. sacchari candi, carniū v-  
uarum passerū an. ʒ. j. conseruæ borraginis, & buglossæ an. ʒ.  
j. aquæ rosarū, muscatae ʒ. j. sacchari optimi, quod sat est, mi-  
sce, & fiat confectio: dosis quolibet mane drachmarū trium

*Simplicia* cum vncis tribus aquæ buglossæ. Corroborant etiam caput  
*roborantia* auellanæ & amygdalæ tostæ à cibo, & coriandrum præpara-  
*caput.* tum, & sequēs pileum, ℞. coriandri præparati ʒ. ij. rosarum,  
*Pileū cor-* florum borraginis, buglossæ, & violarum an. ʒ. ss. cubearū,  
*roborans.* nucis muscatae, stechados, maioranæ, anthos an. ʒ. j. corticū

pap



papaueris albi 3.iiij.in puluerē redigatur omnia, & fiat pileū.

Intemperies sicca curatur balneo totius capitis ex mal-  
is, violis, althea, lactucis, borragine & buglossa, capitibus *Alteratio.*  
intestinis veruecum. Capiti raso admoueatut butyrū re-  
ens, & farina hordei, vel hoc vnguētum, quod spinæ etiam  
admouendum est ad totius humectationem. ℞. olei amygdæ *Vnguentū*  
dulcium 3.ij. olei violarum, & papaueris an. 3. j. s. bu- *humectās.*  
yri recentis 3. j. mucilaginis altheæ & fœnugræci an. 3. ij. a-  
ungia gallinæ 3. iiij. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum.

Si sit per consensum partium circa hypochondria, ha- *Hypochon-*  
bita ratione victus iam dicta superius, cui addes in hac & *driacæ cu-*  
on omni carnem accipitris, cum succo maioranæ, quæ ha- *ratio.*  
et miram facultatem in curanda melancholia, & pulli no-  
tuæ. Est etiam experta in curatione eius aqua per distil- *Accipitris*  
ationem ex muribus boni pastus cum gallina & aquis cor- *& muriū*  
alibus facta: forsan est in muribus vis, & natura curandi *vis.*

hunc morbum, quemadmodum in accipitre, qui accipiter  
utritur muribus. In præcedenti quoque euacuatione, & a-  
is multis remediis præter sanguinis missionem, quia raro  
in hac contert, summopere est resoluendus flatuosus spiri-  
us, quod primò & præcipue fiet per clysterem hunc, & si- *Clyster fla-*  
mitem, tertio quoque die iniectum: ℞. blitis, matricariæ, cu- *sus discen-*  
cuthæ, melisæ maioranæ an. m. s. polypodij, senæ carthami *tiens.*  
n. 3. j. epithymi, thimi an. 3. s. ameos, seminis anethi, seminis

feniculi & carui an. 3. iiij. fiat decoctū, de quo accipe lib. i. cui  
dde diasenæ, hieræ logodionis, & cōfectionis medicaminis  
amec. an. 3. s. olei camomillæ, & de lilio an. 3. ij. salis. 3. ij. *Topica.*  
misce. Spiritus flatuosus dissipatur foru ex camomilla, meli-  
oto, calêdula, rore marino, radicibus quinq; diureticis, semi-  
nibus anethi, fœniculi, cymini, ameos, carui, & baccis lauri  
ventriculo semper vacuo, saltem bis in die, & post forū quo- *Forus.*

idie, ad dissipandum flatum venter vngatur hoc vnguento:  
℞. olei anethi, de lilio, laurini & rutæ an. 3. j. pulueris rosatæ  
nouellæ & diacymini an. 3. ij. ceræ quod sufficit, misce & fiat  
vnguentum. Si ante cibum comedat cochlearium vnum hu *Vnguen-*  
us pulueris, flatu valèter dissipatur: ℞. coriandri præpara- *tum.*

3. j. pulueris radicis buglossæ 3. s. cinnamomi electi, cortici *Puluis.*  
itri, seminis fœniculi, anisi, & carui, an. 3. iiij. origani 3. ij. li-  
gni aloes 3. j. sacchari 3. iiij. misce, & fiat puluis. Syrupus se- *Syrupus*  
quens est ad flatum dissipandum accommodatissimus, & ca- *dissipans*  
out cum corde corroborandum: ℞. serici crudi 3. ij. seminis *flatus,*  
basiliconis, gariophyllorum, foliorū citri an. 3. j. corticū mali *firmandi*  
cidonei & corticum citri an. 3. iiij. radicum buglossæ, num. 7. caput.

f

fol



# DE CVRAND. MORB.

foliorum buglossæ m. iiii. fiat decoctu in quantitate debita aquæ, de qua accipe quantitatem conuenientem ad lib. iiii optimi sacchari, & fiat syrupus, aromatizetur hoc puluere mastichis, zinziberis, galangæ zedoariæ, spicæ an. 3. ij. ligni aloes, gariophyllorum, nucis muscatæ an. 3. j. musci, ambra an. 3. j. Dosis. 3. ij. Pauperes tamen loco eius, & diuites si velint vtantur electuario rosatæ nouellæ, aromatico rosato diacymino, & similibus. Si melancholia fiat per consensum hepatis, aut splenis, aut vteri, aut aliarum partium curatis illis facilis erit curatio huius morbi, de quibus suis in locis agemus.

## De melancholia. CAP. IX.

### Scholium.

**Q**uid melancholia. **M**elancholia quædam est. Melancholia hoc in loco, non h umorem, sed affectum ex causa nomen assumentem significat. Est enim delirium sine febre cū metu & tristitia, in hac definitione delirium est genus, quo communicat cum phrenitide & mania. Reliquis vero partibus melancholia ab eis distinguitur, quia phrenitis est cum febre, mania sine metu & mœstitia. Pars affecta est cerebrum, ut constat ex actione eius læsa. In ea. n. imaginatio est deprauata, multipliciter tamen 2. de caus. symp. cap. ultimo, ita ut stultorum infinitus sit numerus. Morbus ad quem sequitur (loquentes de ea quæ proprius affectus) est intemperies frigida, & sicca cerebri ex melancholico humore orta. Humor melancholicus, cum non solum habeat generationē ex hepate frigido, sed ex caliditate sanguinis tenuem partem consumēte: proinde non est mirandū, si per febriles morbos multi melancholici fiant. Melancholia hæc aut sit per proprium affectum, aut per cōsensum. Per proprium affectum euenit quando humor melancholicus in ipso cerebro continetur. Quod bisariam contingit, primò cum melancholia ibi generatur, secundo cum aliunde fluit. In cerebro generatur à caliditate sanguinem excitante, eūque melancholicū efficiente, vnde corriges locum Corrigitur lib. 3. de loc. affec. c. 6. qui sic habet, In cerebro (hoc enim subaudiendum Gal. locus. est) melancholicus humor genitus est, cum videlicet internus calor, aut flauam bilem, aut crassum atrūque sanguinem assauit. Delendum enim est totum hoc (aut flauam bilem, aut) quia flaua bilis assata fit atrabilis, non autem melancholia. Aliunde fluit melancholicus humor, cū lien (a quo expurgatur) minus recte ipsum attrahit. Aut, iecur multam generat melancholiam, aut, cum ab alia causa in venis coaceruatur, tunc enim in cerebro, languidum si sit, colligitur. Per consensum excitatur melancholia, quando ex hypochondriis ortum habet, quam solēt medici hypochondriacam nominare. Hanc melancholiæ morbi diuisionē consue-



sideramus propter curationē: quia si in toto corpore contineatur sanguis melancholicus, secabimus venam, ut reuellemus à cerebro. Si verò in hoc affectu solus sanguinis, qui est in cerebro melancholicus sit, abstinendū erit à venæ sectione, euacuemus optimū sanguinem, & qui necessarius est ad coctionē melancholici humoris: nisi ipsum eduxeris ratione plethoræ.

Est præterea tertium melancholiæ genus.) Melancholia per Melancholiam consensum hæc est. Quæ fit à vaporibus melancholicis ex venis vetriculi lia per cō-  
ascen-  
sentibus ad caput, etiamsi non sint acres: vnde hac in parte errauit sensum.  
Iacorius. Hic autem melancholicus humor in venis vetriculi detentus, & obstructionem faciens aliquando putrescit, & aliquando non. Si putrescit, calorem in illis venis generat, quem intellexit nomine inflammationis Diocles non autem phlegmonem, ut multi malè voluerunt, erit que cum siti. Quod si hæc putredo effatu digna sit, Melancholia habebit febrem adiunctam. Si humor in venis prædictis non putrescat, ichores melancholici ad ventriculum descendentes facient acidum ructum, ledentque eius coctionem: cumque error primæ coctionis non possit emendari in secunda, corpus male nutritum gracilescet.


Melancholiæ signa communia sunt metus, & mæstitia, si multum Melancholia persuerent. 6. aph. sent. 23. adde tamen sine causa manifesta: signa communia hæc dicuntur, quia conueniunt melancholiæ, quæ est proprius affectus, & illi quæ per consensum accidunt. Causa tristitiæ & timoris est cerebri, & spiritus animalis (qui ex sua natura debet esse lucidus) obtenebratio. Hæc autem, in ea quæ fit per proprium affectum, ab humore, at in illa, quæ lege consortii accidunt, à vapore nigro pendet. Quod autem hæc sit optima causa Gal. 2. de caus. symp. cap. ultimo, exemplo ostendit: si enim tenebræ externæ timorem & mæstitiam inducunt, nonne melius id efficiunt illæ, quæ internæ sunt? dices non ne metus, & mæstitia sunt cordis passionēs? cur ergo causam earum in cerebro collocamus? Respondeo ex opinione mali ortum habere prædictas passionēs, spiritum autem denigratum deprauare imaginationem, ita ut excitet opinionem mali presentis & futuri, & hac ratione incutere timorem & tristitiam.

Quintò, reliquias resoluentibus.) Si in melancholia, quæ proprius est cerebri affectus, intemperiem frigidam & siccam habemus in cerebro, debemus ergo cerebrum humectare, & ex eo humorem euacuare, quod commodè præstat balneum, caput etiam unctum lauabimus decocto ex capite arietino, chamemello, violis, sœnugreco, & floribus buglosi. Male autem Hinc videbis errorē auctoris, & aliorum practitorum caput roborantem & tium in hoc affectu confectione per os assumpta, longa quidem, & ex re- alios prabus siccis constituta. Si enim cerebrū humectandum est, quæ ratione hi id eticq; in exsiccant? tum si ex capite debemus euacuare humorem, topicis id præstandum erit, & non internis? Debet præterea medicus in melancholia lia explicā-  
lienem roborare, ut attrahat melancholicum succum, quod præstabit oleo tū propi-  
nare.



**Lapsus au** Si sit per consensum partium.) Ea quæ dicit auctor de carne  
**etoris.** accipitris, muribus, & pullis noctuæ, falsa cum sint omittantur: quia  
**Curatio me** hypochondriaca hæc affectio ratione cognoscitur, ac proinde remedia ra-  
**lancholiæ** tione inuenta, & non experientia admittet. Curabitur ergo victus ratio-  
**hypocon-** ne humectante, secundo humor obstructionem in venis ventriculi efficiens  
**driacæ.** præparabitur syrupis, in prima melancholia ab autore propositis: ita vt  
**Purgatio.** illa, in qua putredinem habet humor (quam ex siti colligemus) miscea-  
 mus syrupum endiuie compositum cum decocto endiuie, borraginis, &  
 aliorum, quæ aliquantulum refrigerant. Tertio, hoc medicamento pur-  
 gabimus. ℞. pul. hieræ picræ. ʒ. iii. aut iiii. confectiois hamec. ʒ. ii. dissol-  
 uantur in decoctione hordei q. s. & fiat potio. Hamech melancholiam e-  
 ducit, at hiera serosos & tenues humores in ventriculo contentos, & si-  
 mul ipsum roborat, ne eos recipiat, poteritque frequenter vii hoc medi-  
**Vnguenta** camento. ℞. pul. hieræ. ʒ. Gal. ʒ. iiii. rhodomellis. ʒ. j. cum aqua fæniculi  
**ad lienem.** q. s. duobus tamen aut tribus diebus præassumpta decoctione ex hordeo  
 cum cortice, & fæniculo parata. Liem vngatur hoc vnguento, quod cor-  
**Ad animi** roborat ipsum & attenuat humorem melancholicum. ℞. olei absinthii,  
**deliquium.** de capparibus, tamaricis & ireos. ana. ʒ. j. ʒ. ammoniaci dissoluti in a-  
 ceto ʒ. iii. pul. brionie ʒ. iii. massæ emplastri de meliloto loco ceræ q. s. fiat  
 vnguentum. Et cum aliquando ex flatu in hac affectione fiat animi de-  
 liquium vtenuur hoc medicamento. ℞. confectiois Gentilis contra me-  
 lancholiam ʒ. ii. confervæ borraginis ʒ. j. misce: hæc cum aqua melisse ac-  
 cipienda est. Cui, si vigiliis molestetur æger, adde syrupi papaveris ʒ. j.

De Incubone. C A P. X.

**Descriptio.**  Incubo, vel incubus, quem Græci ephialtem appel-  
 lant: sumpta quidem appellatione vel ab huius no-  
 minis viro, aut quod magis credibile est, à vocis si-  
 gnificatione, cum hoc morbo correpti inuadi se  
 ab alio opinentur: porro & à Themisone pnigamon, aut pni-  
 galion dicitur: quod præfocari ægrotantes videantur. Vt vt  
 tamen nominetur, malum est, vbi aliquis in somno opprimi  
 se, & incumbente quadam mole, teneri arbitratur. Ceterum  
 oritur is morbus à crapula potissimum, & iugi in ventriculo  
 cruditate, vaporibus nimirum inde in cerebrum ascendenti-  
 bus, qui & ipsum obruant, & iter spiribus animalibus aut  
**Signa.** facultati animali per neruos occludant. Qui sic affecti sunt,  
 tardè admodum difficilèque mouentur, torpent in somno,  
 cum in corpus cerebri facultas nō defluat, suppressam vocē  
 aut frustra conantur rumpere, aut incertam, inarticulatam-  
 que reddunt. Ad hæc suffocari se imaginantur, & ab ingruen-  
 te aliquo detineri, denique ea omnia, quæ vigilantes epilep-  
 tici perpetiuntur, hæc eadem per quietem perferunt, qui hæc



mac molestantur affectione. Cum summa tandem anxietate tenuiori facto spiritu, & in halitu digesto discusso, & reseratis cerebri meatibus subito expergefiunt. Succurrendum huic malo est incipienti, si enim semel inualuerit, graues saepe affectiones parit, epilepsiam scilicet, Maniam, & Apoplexiam, cum horum velut praeludium quoddam sit, autore Aetio. Hic tamen si inter somnum, & vigiliam superuenerit, malus est, deterior vero si cum sudore frigido.

Curatio eius similis est curationi morbi comitialis, quam quis mitior, semper tamen ager a somno excitetur violenter, & cum increpatione, saepe quoque fiat in eo vacuatio per Hieram. S. Galeni, & agaricum trochiscatum.

## De Incubone. CAP. X.

### Scholium.

**I**ncubo vel incubus.) In incubone cerebrum laesum esse confirmant medici ex actionibus eius laesis, quae sunt, imaginatio sensus & motus. Imaginationem laesam colligunt, quia aliquorum qui hoc malo detinentur, existimant quiddam sibi incumbere. Quamuis de incubo id Rondoletius & alii ad plenitudinem venarum thoracis referant. Sensus etiam laesus est, quia ut aiunt, is in somno torpidus est, sicut et motus voluntatis difficilis. Ex his aliqua falsa sunt: imprimis, quod ait Rondoletius stare non potest, quia si plenitudo est in thorace, sensum grauitatis inducit in vigilia, non autem in somno, in quo mens alio intentata est. Adde hanc plethoram non laedere imaginationem. Falsum etiam est, id quod ii dicunt, in incubone scilicet actiones sensus et motus laedi: dicere enim esse sensum in hoc malo affectis, cum dormiunt, torpidum, nonne ridiculum est? quasi in aliis dormientibus sit acutus? Quod autem motus laesus non sit, constat ex eo, quod brachia & crura mouent, respirant etiam. Vnde dicendum est, Incubonem esse symptoma, in actione laesa principe. Est enim imaginatio deprauata, quae contigit ex speciebus rei alicuius suffocantis, & opprimentis, in cerebro motis. Tunc enim existimant se esse oppressos, ita ut, si velint loqui, quasi detineantur. Dices cur in vigilia non contingit? Respondeo, non esse necessum, ut quae in somno, eadem in vigilia afficiant: somniamus enim dormientes, & non vigilantes. Videamus modo, quem morbum sequatur hoc symptoma. Aliqui existimant, Morbum morbum esse obstructionem ventriculorum cerebri: & hi differunt, quia ad quem multi existimant obstructionem hanc esse, in anterioribus ventriculis, sequitur, aut in principio spinalis medullae ab humore factam. Alii sequuti Posidonium a vaporibus frigidis et crassis spiritus animales per nervos ferri prohibentibus, eam fieri sentiunt. Qui omnes errant maxime: nam si tanta est obstructio, ut impediatur transitum spirituum, fiet ergo caros epilepsia, aut apoplexia. Tum si obstructio est incubus, cerebrum afficitur,



## DE CVRAND. MORB.

*non ut similis pars, sed ut instrumentaria, ut Altomarius ex Aetio probat: qua ergo ratione erit laesa imaginatio? Sententia Posidonii nulla ratione potest admitti, non enim potest ratio capere modum, quo vapor possit impedire transitum alicuius substantiae, cum sit tenuis, & sicut aer facile cedens. His omnis dicimus, in incubo, si cerebrum afficiatur proprio affectu, morbum esse intemperiem frigidam & siccam, si vero per consensum, morbum esse, aut in via: si vapor, ex obstructione ventriculi ascendat: aut tumorem praeter naturam, si scyrrum lenis sequatur.*

*Inde colliges errorem multorum medicorum sentientium hunc affectum fieri à Dæmone, ducti in hanc sententiam ex eo, quod quidam Dæmones appellantur à theologis incubi. Hi enim etiam si hoc nomine appellantur, non quia hunc affectum efficiant: sed à coitu, quia assumentes aerea corpora, sub virorum forma mulieribus incubent: sicut & succubi appellantur illi Dæmones, qui feminā mentientes, viris succumbunt. Et ex horum coitu natos fuisse gygantes, multi ex Theologis affirmarunt. Ex supradictis intelligis, quam male omnes causam istius morbi ad crapulam & cruditates referant, cum hæc nunquam imaginationem lædant.*

*Curabitur hic morbus ea ratione, qua melancholia.*

### De iis qui amore insaniunt. CAP. XI.

**E**X amore posse aliquos insanire argumento est Anthiocus Seleuci filius, qui Stratonicam nouercam misere deperit, atque alij quam plurimi, quorum frequens est in historiis mentio, & in poetarum monumentis non rara, quamvis sub fabularum inuolucro. Est vero (ut Ovidius cecinit, amor res plena solliciti timoris) sollicitudo autem, ut ait Paul. Aegineta, animi quædam affectio, cum videlicet ratiocinatio in vehementi, ac laborioso quodam motu constituitur. Occasionem huic morbo exhibet res ipsa amata. Deprehenditur malum, quia oculi concaui fiunt, lachrymas nullas effundunt, sed voluptate quasi perpetua perfusi apparent, agitantur & subsiliunt identidem palpebræ, & aliis omnibus corporis partibus illæsis ac consistentibus, solum hi amantibus concidunt. Pulsus peculiaris huic morbo nullus est, quod medicorum aliqui sunt opinati, sed quales solent esse illorum, qui multis sollicitudinibus sunt impliciti. Erasistrati denique arte oportet uti, ut morbus ex toto detegatur. Præcipua huius morbi curatio tradita est capite decuratione melancholiæ, præter illa, duo sunt maxima remedia eorum, qui amore insaniunt, primum & firmissimum dare ei, quam diligit. Cum hoc non suppetat, alterum est necessarium, & primo stude, ne fiat melancholicus, per ea quæ dixim

*Descriptio.*

*Descriptio sollicitudinis.*

*Nota.*

*Curatio.*

*Præservatio.*



proximus cap. 9. nam ij imaginationem læsam habent, & alio-  
 tioties rationem, quare statim fugiat: absentia enim & alia-  
 rum rerum occupatio est summum remedium, autore Oui- *Auerſio.*  
 o libello de remedio amoris.

*Ocia ſi tollas, periſcere Cupidinis arcus,*

*Da vacuæ menti, quo teneatur opus.*

Conſule igitur Poetam eo in libro. Neceſſariæ ergo ſunt  
 enationes, piſcationes, ludi, instrumenta muſicæ, ambula-  
 tio per loca viridia, & iucunda, vbi aues & philomelæ reſo-  
 nant, communicatio, & frequens cum amicis, & conſanguini-  
 ſeis cõfabulatio prodeſt: & tandem opitulatur multum pro-  
 ſectio ad longinquas regiones, præcipuè ad inſignes vrbes,  
 t Valentiam & Barchinonam apud Hiſpanos: Lutetiam  
 Pariſiorum apud Gallos, & Romam Chriſtianorum caput,  
 quod ſi hæc non ſatis ſint cum Ouidio.

*Hortor vt & pariter binas habeatis amicas,*

*Fortior eſt plures ſi quis habere poteſt.*

Et poſt hæc omnia ſic finit curationem Ouidius.

*Quid moror exemplis, quorum me turba fatigat?*

*Succeſſore nouo vincitur omnis amor.*

(modicis.

Aliquando curatur hæc inſania ebrietate, & coitu non im-

## De Apoplexia. CAP. XI.

### Scholium.

**A**ppoplexiam morbum Græci.) Malè video ferè omnes me- *Error mul-*  
 dicos apoplexiam definiētes, priuationem ſenſus & motus in *torū circa*  
 toto corpore, hac enim ratione, qui vulneratus uſque ad cere- *essentiam*  
 bri venires repente concidit ſine ſenſu, & motu, tum & phlegmonode ce- *apoplexiæ.*  
 rebri diſpoſitione affectus, apoplexiam habebit. Quod, quam falſum ſit,  
 optima eius definitio oſtendet. Eſt apoplexia ſenſus, & motus amiſſio in *Apoplexiæ*  
 toto corpore, ob impeditum tranſitum ſpiritus animalium facta. Pri- *definitio.*  
 ma parte definitionis, apoplexia cum paralyſi conuenit: Secunda verò ab  
 ea diſtinguitur, cum paralyſis non habeat ſenſus et motus defectū in to-  
 to corpore. Vltima verò parte ſeparamus apoplexiam ab ea ſenſus et mo-  
 tus priuatione, quæ eſt in toto corpore fiat, euenit tamen ex diſſipatione,  
 ſpiritus animalium: qualis eſt illa, de qua loquitur Gal. 7. de placitis,  
 quæ ſequitur cerebri vulnus uſq; ad ventriculos pene rans: ab ea etiam,  
 quæ ſit ex repletione venarum & arteriarum cerebri, quæ contingit ex  
 cõſumptione ſpiritus animalium cerebri, eueniente ex eo, quòd ſpiritus  
 vitales ex arteriis non poſſint ad cerebri ventriculos deſcendere. *Cauſa Cauſa*  
 apoplexiæ eſt, quicquid replet cerebri ventres, ita vt non poſſit animalis *apoplexiæ.*  
 ſpiritus permeare, hæc autē repletio, aut ſi maior obſtructio, ſit ab humo-  
 re craſſo pituita ſcilicet, aut melancholia, aut a phlegmone maxima tenuis



**Lapsus** meningis, ita ut eius magnitudo internum cerebri meatum repleat. Quæ  
**Vallesii.** vera cum sint, non est quod sequaris Vallesii sententiam lib. 7. epid. com.  
 83. scriptam: quæ sentit ab omni humore fieri apoplexiam, et quod peius  
 est, quædam apoplecticas passiones à crasso flatu admitti: quia bilis fla-

**Cur in apo** na tenuis cum sit, permeabit per meatum, nō autem obstruet. Quod au-  
 plexia dica tem non obstruat vapor, superiori scholio diximus. Obstructio (quæ mor-  
 tur corpus bus est in via) in apoplexia magna est, ac proinde Gal. lib. 3. de loc. affect.  
 cerebri læ- in apoplexia corpus cerebri magis lædi, quam ventriculos scribit, quæsi  
 sum. dicat, cerebrum, ut est instrumentum, lædi, quia totus ventriculus est re-  
 pleretur: cum enim totus non repletur, ut in epilepsia evenit, tunc laesos ven-  
 triculos appellat Gal. et non corpus cerebri læsum. Et quamvis Gal. ali-

**Lapsus** quando per corpus cerebri eius substantiam similem intelligat, malè  
**Vallesii.** Valles. 5. epid. com. 47. explicat, quid sit vergere humore ad corpus, aut  
 ad animam: non enim vergere ad corpus cerebri, est vergere ad eius su-  
 perficiem externam et vergere ad animam ad internam: cum pars externa  
 et interna cerebri, idem habeant temperamentum, in quo animam consti-

**differentie** tuit Gal. & nos animæ instrumentum. In apoplexia aliquando servatur  
 apoplexiæ respiratio, aliquando non, et inde oriæ sunt differentiæ apoplexiæ, à Gal.  
 unde orian traditæ 2. lib. aph. com. 42. ex quibus tres sunt apoplexiæ illius, quæ for-  
 tur. tis dicitur: quarta debilis est. Prima differentia ea est, in qua prohibita  
 est respiratio, quæ curationem non admittit, sed cito interficit, tamdiu in  
 ea viuentes egros, quandiu illi qui præfocati moriuntur. Secunda diffi-

**explicatur** lenta respiratio, in aqualis tamen & inordinata. Ultima (quam debilem  
 Gal. appellauimus) cum respiratio aliquem seruat ordinem. Et hæc, inquit  
 Gal. si debite fiant necessaria, citò curatur. Quod cum sit contra aphoris.  
 in quo Hippoc. debilem apoplexiam non facile curari scribit, proinde ubi  
 est citò: legendum est, forte, ex græco codice. Vel si seruemus lectionem per

**Apoplexia** citò curari, intelligemus, statim in paralyfim transire. Hic transitus eue-  
 transit in nit humore penetrante neruorum substantiam, et hoc nomine impediende  
 paralyfim facultatis alterationem. Quod in epilepsia non cōtingit, quia humor eam  
 non epile- generans ita crassus est, ut non possit peruadere neruos. Obiciet Galen.  
 psia. 4. lib. de ratione victus in acutis com. 27. Epilepsiam in paralyfim finiri  
 scripsisse. Respondeo verum hoc esse, sed raro euenire: id autem quod ra-  
 rum est, cum contemnat Galenus ac si non esset, ideo in lib. 4. de locis af-  
 fect. cap. 2. epilepsiam nunquam in paralyfim finiri existimauit.

**Sanguinea apoplexia.**) Sanguineæ apoplexiæ meminit, cuius ha-  
 tænus manifestè saltim non fecit mentionem. Nos verò ex his quæ dixi-  
 Apoplexiæ mus, vario modo curandam apoplexiam intelligemus. Si apoplexia fiat  
 curatio. ex phlegmone tenuis meningis, curabimus eam primò sanguinem mittentes,  
 & applicantes capiti repellentia: & ut summatim dicamus, ea præ-  
 stabimus, quæ cap. de phrenitide diximus, vtentes tamen digerentibus in  
 declinatione, quia humor non habet eam tenuitatem, ut possit sine his ex-  
 halare

*Contrarij. Vallesii  
 et huius pignum  
 ap Gal. p. 446.*



halare. Aduertendum tamen est, practicos in sanguinis missione in qua-  
libet apoplexia facta hunc seruare ordinem. primo secant venam saphē- Reprehē-  
nam aut poplitis, quia amplior est, deinde cephalicam, & tertio venam dūtur pra-  
frontis: vel ut Rondoletius, Hollerius, & alii facere iubent, venam iugu- Etici in san-  
larem, ita ut fiat exigua plaga ob hēorrhagię metum. Caterum miran guinis mis-  
sione. dum est de his hominibus, rationem curandi non aduertentibus: Si enim  
est affectus in cerebro, quā rectitudinem seruabit cum ipso vena pe-  
dis? Præterea quis ausus erit venam iugularem secare, si legat Gal. lib. Vera sen-  
s. methodi, magnarum venarum sectionem formidantem propter pericu- tentia de  
lum, quod imminet: quia in harum sectione sanguis aut non potest, aut sanguinis  
difficile saltem supprimitur: ita ut immineat periculum transuersę se- missione in  
ctionis in vena. Adde in sectione venę semper imperandam esse ma- apoplexia.  
gnam plagam, ne sanguis tenuis relicto crasso effluat. Vltimò id quod  
de sectione venę frontis & linguę imperant, in angina, dolore capitis  
diuturno, & similibus locum habet: non autem in apoplexia, in qua ob  
breuitatem hæc remedia carent occasione. Nos sequuti Galeni doctri-  
nam semper secamus cephalicam, & merito, quia hac ratione ex loco  
affecto cito, & multum euacuamus.

Pituitosa apoplexia.) Ut plurimum fit apoplexia ex pituita, quæ  
multa solet in cerebro frigido ex natura abundare. In cuius curatione  
auctor nullam fecit mentionem sanguinis missionis, sentiens cum multis  
barbaris, hanc inutilem esse, cum abundet pituita, & absit plethora:  
quasi solum in plethora sit sanguis mittendus. Solent autem communiter Reprehē-  
medici, apoplexiam hanc curare clysteribus acribus, medicamentis vo- diur cura  
ditum cientibus, & purgatione. Acribus vtuntur clysteribus, existi- tio apople-  
mantes eos a toto corpore purgari. Quod possunt probare ex 4. lib. acut. xij. pitui-  
com. 20. ubi ait Gal. autorem illius lib. in dicta sententia in Angina cly- tose.  
sterem purgatorium exhibere, non ut, solum alimenti excrementa, sed  
& ut passum locum euacuaret. Vomitu vtuntur, ut deponant plenitu-  
dinem ventriculi: purgatione verò, ut pituita, quæ morbi causa est, eua-  
cuetur: hæc est illorum sententia vndique peccans. Primò in acri-  
bus clysteribus, ex valide purgantibus constructis: Hi enim solum eua-  
cuant ex intestinis, et primis venis, non ex toto corpore: quod ratione con-  
firmamus, & autoritate. Ratio hæc est, medicamentum, purgans ut a-  
gat, debet in actum reduci: Sed per clysterem iniectum non potest redu- Clysteres  
ci in actum, ergo neque purgare. Maior manifesta est ex eo, quod medi- non eua-  
camentum purgans potestate tale est. Minorem confirmamus ex natu- cuat ex to-  
ra acris medicamenti, quod statim irritat intestina, & proinde expelli- to corpore.  
tur. Autoritas, qua hoc ipsum probamus, ex Gal. desumpta est. 4. lib.  
aph. com. 2. ubi propositis medicamentis errhina & apophlegmatisma  
appellatis, quæ ex parte nempe cerebro euacuunt: addit, clysterem quo-  
que ex hoc genere feceris. Si ergo clyster ex parte euacuatur, intestinis sci-  
licet & primis venis, qua ratione in apoplexia: Hoc primo vtuntur me-  
dic



dicamēto, quod neque affectum, neque eius causam respicit: Ad id quod ex 4. acut. adferunt satisfacimus, dicentes Galenū solum scribere id, quod instituit auctor illius lib. (qui non est Hippocrates) non autem hoc approbare, potissimum cum sit contra rationem. Errant secundo supradicti medici in medicamentis vomitoriis, quia cum hæc solum ventriculum euacuent, non curabunt apoplexiam, quæ est cerebri affectus. *Kli-*

*In princi-* pio apople- est in accessione apoplexiæ, non poterit purgans medicamentum deglutiri, non est re. Si post accessionem, iam non est apoplexia, cum terminata sit in parapurgandū. *lys.* Dices purgari tunc humorem pituitosum: si hoc affirmas, non etiam effugies: nam aut ille humor est in venis, aut in ventriculis cerebri. Si est solum in venis, iam non curas affectum urgentem, morbum scilicet, qui est obstructio cerebri. Si verò humor est in cerebri ventriculis, cum extra venas diffusus sit in parte contentus, per proprios meatus partis debet euacuari. Adde humorem esse firmatum in parte, ac proinde post coctionem esse euacuandum. Quæ cum ita sint, inde videbitis quantum erret ille, qui non curans à bono præceptore methodum curandi perdisce-re, ad eos libros, quos practicos vocant, confugit: hic enim præterquam quod decipietur passim, multos interficiet. Curabitur ergo apoplexia ex humore crasso facta hoc modo, methodo rationali. Apoplexia est sympto-

ma, actio scilicet abolita sensus & motus. Morbus, ad quem sequitur, est ex humore obstructio ventriculorum cerebri, tertii vel quarti. Causa istius morbi crasso fa- est humor pituitosus, ex venis ad ventres cerebri descendens. Sunt ergo *Elg* vera tres affectus complicati in hac apoplexia, symptoma, morbus, & causa curatio. morbi: ex his affectibus actio læsa cum habet suam essentiam in fieri, &

ab alio dependentem, non poterit curari contrariis. Oportebit ergo urgentiori succurrere, nempe obstructioni, & si possumus, non negligentes causam. Hæc commodè præstabit sanguinis missio ex cephalica vena, quæ (præterquam quod potest exerceri in accessione et post accessionem) reuellit & euacuat ex loco affecto: reuellit enim humorem fluentem ad cerebrum, euacuat autem ex cerebri ventriculis: venæ enim tenuis me-

*Dubium.* ningis & cerebri inanitiæ attrahent ex ventriculis humorem: dubitabis, si ventriculus est plenus, nonne à sanguinis missione abstinerebis, cum eam impediatur, ne crudus humor feratur ad venas? Respondeo, nos sanguinem mittere propter urgentem affectum, noxa enim illa, quæ ex cruditate sequitur, deinde poterit emendari: quod quamvis ex Galeni methodo curandi colligamus, habemus tamen *Galenariam* auctorem ex *Arabum* familia subscriptorem, qui cap. de phrenitide in principio (inquit) secan-

Finita apo da vena est etiam ventriculo pleno. Finita accessione apoplexiæ, quando plexia in iam terminata est in paralyfim, considerabimus, an æger habeat incli-paralyfim nationem ad somnum, quam si habeat, etiam sanguinem mitemus, non quid fa- ratione paralyfis, quæ morbus longus est, sed ratione apoplexiæ, non ciendum. præsentis, sed omis, quæ futura timeatur: oportet enim magis inanire re-



tas cerebri, ne ex ipsis fluat pituita, quod simul cucurbitulis & frictio-  
libus præstabimus. Quo tempore clysterem parabimus acrem, ut eua-  
uentur pituitosa excrementa a b intestinis & primis venis. ℥. centau-  
æ minoris. m. j. furfuris, fœniculi, anethi, seminis lini ana pug. j. deco-  
quantur in sufficienti quantitate aquæ, de colatura sume lib. 2. in quam  
dissolue, hieræ logodionis ʒ. j. benedictæ ʒ. ss. olei rutacei ʒ. iii.

## De Apoplexia.

## CAPVT XII.

**A**tonitum morbum Græci apoplexiam nominant, *Descriptio.*  
est autem apoplexia animalium functionum in v-  
niuerso corpore subita cessatio, cum videlicet om-  
nes pariter nerui, tum sentiendi, tum mouendi vim amise-  
runt propter noxam communi neruorum origini cerebro  
inquam illatam. Hæc eadem cum alterutrâ tantum partem  
infestauerit, dextram nempe, aut sinistram, Hemiplexia &  
paralysis Græcè resolutio Latine dicitur, de qua sequenti ca-  
pite sumus dicturi. Initium huic morbo dare procatactica *Causæ.*  
causæ sæpenumero consueuere, cum videlicet caput alicui-  
us, aut casu, aut vehementi aliquo ictu vulneratum est, aut  
aliqua alia re percussum. Tunc enim ad eam partem humo-  
res confluunt, ut quæ propter ingentem cerebri concussio-  
nem eos ad se venire permittat. Aeris quoque admodum fri-  
gidi occurfus eandem solet noxam cerebro inferre. Nam &  
caput, spongiæ instar velut manibus apprehensum cōstrin-  
git: & illius humores, atque excrementa in internos cerebri  
meatus cumulatum retrudit. Magna tamen ex parte a causis  
internis provenit, nempe a copiosa pituita, quæ nihil aliud  
est, quam frigidus quidam, crassus atq; viscidus humor, qui  
cerebri ventriculos cōfertim & semel impletos ita obturat,  
ut animalibus spiritibus nequaquam peruios esse patiatur.  
Quod si, unde generatus sit hic humor, quæsieris, meminif-  
se æbes, quæ superius cum de cephalalgia agebamus, dicta  
sunt, & quod nimix cruditates, crebræque potissimum e-  
brietates huiusmodi succos peperere.

Porro tam grauis hæc affectio est, ut probè de ea scripse-  
rit veræ medicinæ vetustissimus autor Hippocr. Apoplexiā  
fortem soluere est impossibile, debilem verò non facile, cum  
illa statim interficiat, hæc verò in paralysem transiens nō ni-  
si longo tempore curetur. Interficit autē propter respiratio-  
nis læsionem, a qua etiam hoc habet, ut vel fortis, vel debilis  
dicatur. Nā si prohibita sit penitus transpiratio, maxima est

&amp;

2. aph. 42.



## D E C V R A N D. M O R B.

& acutissima apoplexia, sicut omnium maximè debilis, quæ parum habet in anhelitu impediementi, quæ inter has duas interiacent, pro vt magis ad alterutram accedunt, fortiores aut debiliores dicentur. Læditur verò maximè anhelitus, cū priuatur: quando verò respiramus, sed magna cum vi læsus sane est, & tunc anhelitus, sed minus, minus etiam cum neque intentus, neque violētus est: inæqualis tamen atque inordinatus. Præter hæc etiam intermissus æditur, omnium tamen minime cū aliquem seruat ordinem. Et mirari quidem subit, quomodo musculis omnibus feriat, & motus carētibus in apoplexiis illi, qui respirationi inseruiunt, quāuis difficulter moueantur, tamē plerunque. Videtur autem hoc fieri propter respirandi necessitatem, quæ neruorū vim excitat ad operationem. Præcedit hunc morbū (autore Paulo) capitis confectus, & acutus dolor, venarum, quæ in iugulo sunt elatio, vertigo oculorum incerti & discurretes lucis splēdores, extremarum partium sine causa refrigerationes, dentium stridores, in somno lotium emittitur atrum, pau-

*Notæ præ-* cum, & farinaceum habens sedimentū. Qui iam in hoc ma-  
*sentis mor-* lo sunt sensu omnino carētes (vt Aetius ait) mortui viuunt,  
*bi.* quapropter clausis oculis dormientium more decumbunt

*Signa.* stertentes. Opprimi hoc mali genus senes, atq; eos maximè qui temperatione sunt magis pituitosa: quod si iuuenem, & æstiuo tempore corripuerit, maxima est apoplexia, & quæ magnam arguat causam, vt ex aphorismo. 34. sectionis secundæ didicimus.

*Curatio* Sanguinea apoplexia tribus remediorum generibus cu-  
*sanguineæ.* ratur. Primò reuellentibus, vt secta vena basilica primum, si  
*Remulsiō.* magna est plenitudo, aut vtraque cephalica simul: quia seruata rectitudine in morbo breuissimo, & fortissimo cephalicæ sectio est vtilior. Frictionibus totius corporis, præcipuè partium infernarum, & earundem ligaturis dolorificis, lotionibus calidis, cucurbitulis, sine scarificatione primò, deinde cum scarificatione, clysteribus, & glandibus acribus, minus tamen potentibus quam in pituitosa.

*Derinatio.* Secundo, vacuantibus materiam cerebri, & ventriculorū eius iterum secta vna, aut duabus cephalicis, post vena frōtis. Deinceps fiat vacuatio per hoc, vel simile medicamentū: ℞. hieræ picræ. S. ʒ. j. pilularū de rhabarbaro ʒ. j. rhodomellis ʒ. j. aquæ cichoræ. q. s. misce, & fiat potus.

*Alteratio.* Tertiò, alterantibus intemperiem calidam à sanguine relictam: vt oleo & aceto rosatis, & similibus: quæ initio non conducunt (quamuis repellant) propter obstructionem. Ele-

ctuar



stuarium diarhodon.abbatis est in hoc genere optimum.

Pituitosa apoplexia, quæ ferè semper fit, curatur quatuor *Pituitosa.*  
auxiliorum generibus, primo, victu tenuissimo, præsertim *Victus.*  
primis tribus diebus, deinde solo iure pullorum columbi cū  
piceribus nigris, & pipere nutriatur, & aqua mellis, & nu-  
cleis pineis saccharo conditis.

Secundò auertentibus, vt acribus clysteribus caput & pi- *Auersiones*  
tuitam vacuantibus, qualis est hic: ℞. vtriusque cyclamini,  
mentaureæ minoris, hellebori albi, colocynthidis in ligatu-  
ra positæ an. m. j. fiat decoctum in libr. tribus aquæ ad con-  
sumptionem duarum, cuius ℥. vj. in anum mittantur, & si ci-  
tò ab ano elabuntur, rursus reperantur, & infundantur, do-  
nec humorū copia vna cum clystere deiiciatur, sequens cly-  
ster est optimus, & potens: ℞. saluæ, roris marini, stecha-  
dos, rutæ, hyssopi, & pulegij an. p. j. fiat decoctum, de quo ac-  
cipe libram vnam, cui adde hieræ logodionis ℥. j. pilularum  
cochiarum 3. j. olei rutæ & de lilio an. ℥. ij. salis gemmæ 3. j.  
misce, & fiat clyster. Glandes acres quoque auertunt, & e-  
vacuant, & maxime sunt necessariae, præcipue cū clyster  
accipi, aut retineri non potest, quales sunt hæ: ℞. pulueris  
hieræ logodionis 3. v. salis gemmæ, colocynthidis, & helle-  
bori an. 3. j. mellis quod sufficit, misce, & fiant tria supposi-  
toria filo appensa.

Tertio, vacuantibus pituitam crudam (quia hic morbus *Purgatio*  
est acutissimus, dependens à materia fixa in membro princi- *sine præpa-*  
pe, & ideo quodammodo turgida, quare moram, & tempus *ratione hu-*  
apparandi nō concedit) etiam valentibus, & largioribus me *moris.*  
dicamentis purgantibus: virtus enim expultrix in iis est so-  
pita, & meatus angusti, vt sanguis & spiritus per ipsos per-  
uenire non possint. Huiusmodi sunt pilulæ cochiae, pilulæ  
ætidæ, pilulæ de sarcocolla & euphorbio, dissolutæ 3. j. s.  
earum cum ℥. ij. aquæ stechados, & ℥. j. syrupi de hyssopo: aut *Potus.*  
fiat vacuatio per hunc aut similem potum: ℞. electuarij in-  
di maioris 3. iiij. agarici trochiscati 3. j. rhodomellis 3. j. a-  
quæ saluæ quod sufficit, misce, & fiat potus. Deinde fiat va- *Derivatio.*  
cuatio per loca propinqua gargarizatu, vulgò gargarisma  
dicitur, & errhinis (quæ dicuntur à medicis & pharmacopo-  
is barbaris nasalia, aut caputpurgia) & sternutamentis &  
apophlegmatismis, quæ à nostris dicuntur masticatoria. Hęc, *Aduerte.*  
quia magnam agitationem propè affectam partem efficiunt,  
nocent ante vacuationem vniuersalem, aut totius corporis,  
nisi in maxima necessitate, vbi timeretur subito mors.

Errhina, seu caputpurgia medicamēta, quæ sternutamē- *Errhina.*



ta efficiunt, aut sunt.

Mitiora, vt { Aquæ capitales destillatæ, anagallidis v-  
triusque succus, ceparū succus, cyclamini  
succus, brassicæ succus, succus ficlæ, succus  
foliorum enulæ campanæ. Aut,

Valentiora, vt { Ireos succus, marrubij succus, radicis ni-  
gellæ succus, hellebori succus, radicis agre-  
stis, cucumeris succus, castoreum, piper, hel-  
leborum album, euphorbium.

*Apophle-* Apophlegmatismi (vocat nostri masticatoria) aut sunt.

*gmatisimi.* Mitiores, vt { Hyssopus, origanum, thymus, pulegium,  
cappares:

Valētiores, vt { Synapi, mastix, radix acori, zinziber, pi-  
per, pyrethrum.

Hoc schemate continetur cognitio medicamentorum à capite purgantium per proxima loca, tam habētium facultatem mitem, & clementem, quam eorum, quæ sunt valenti facultate prædita: quorum formas tyronibus in hunc modū describemus. Gargarizatus clemētis formula: ℞. maioranæ, origani, saluiæ, roris marini, stachados an. p. j. fiat decoctum in lib. ij. aquæ, donec tertia pars absumatur, cuius collaturæ adde rhodomellis, oxymellis cōpositi an. ʒ. iij. misce, & fiat gargarizatus. Valentioris formula est: ℞. aquarum saluiæ, stachados, betonicæ, roris marini an. ʒ. iiij. aquæ vitæ ʒ. j. hieræ. S. ʒ. j. mithrydati, & theriacæ magnæ an. ʒ. ij. oxymellis scillitici ʒ. ij. syrupi acetosi S. & rhodomellis an. ʒ. iij. misce, & fiat gargarizatus, quo sæpe os & palatum abluatur. Formula errhini solidi mitioris est hæc: ℞. pulueris maioranæ, saluiæ, piperis, gariophyllorum & nucis muscatæ an. ʒ. j. terebinthinæ & ceræ, quod s. misce, & fiant errhinā, seu nasalia effigiem pyramidis referentia. Valentioris errhini formula hæc est: ℞. pulueris pyrethri, piperis longi, hellebori, castorei an. ʒ. j. terebinthinæ & ceræ an. q. s. misce, & fiant errhina, seu nasalia forma pyramidis, quæ naribus impo-  
nantur.

*Formula  
omnium.*

Forma errhini liquidi, seu caputpurgij mitioris: ℞. succi betæ, brassicæ, & ciclamyni an. ʒ. iiij. misce. Valentioris formula hæc est: ℞. succi ireos, marrubij & cucumeris syluestris an. ʒ. ij. pulueris nigellæ, & piperis an. ʒ. j. pulueris hellebori & euphorbij an. ʒ. s. misce, & huius parum naribus instilletur. Forma pulueris hæc medicamenta naribus inamissa sternutamenta efficiunt, & caput purgant.

Forma apophlegmatismi, seu masticatorij mitioris hæc est:



est: ℥. pulueris piperis, mastichis, zinziberis & galangæ an. 3. s. origani, thymi, pulegij an. 3. j. cum oxymelle. S. & pauca cera, fiant formulæ ad magnitudinem lupinorum. Valentioris formula hæc est: ℥. pulueris sinapis, stasisagriæ, piperis, & pyrethri an. 3. j. s. hellebori 3. j. cum oxymelle scillitico & cera, fiant formulæ ad magnitudinem lupinorum, quorum vnus in ore detineatur semper & manducetur.

Post hæc capiti raso admoueat<sup>Topica.</sup>ur hoc vnguentum, seu finapismum: ℥. olei costini, castorei, & de euphorbio an. 3. j. pulueris sinapis, euphorbij, & serapini an. 3. j. aceti cochlearium vnum, ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguētum. Demum frixorium ferreum, seu candentē sartaginē tantopere oportet capiti admo<sup>Observa-</sup>ueri, vt capilli ægri cōburi videātur.

Et quia ab hac apoplexia, quæ debilis vocatur multi euadunt, non omnes (Galeno teste) quibus signa lethalia sunt, <sup>Mortis,</sup> moriuntur: multi etiam citra expectationem vllam sanātur, quia accidunt monstra in rerum natura: ad cognoscendum <sup>aut vitæ</sup> viuatur ne, an mortuus sit æger, cum sit simillimus mortuis, <sup>explora-</sup> obseruanda erunt hæc signa, quæ a respiratione colliguntur, <sup>tio.</sup> priusquam operi manum admoueamus, ne vsu veniat nobis, quod aliquibus medicis, qui in mortui aluum clysterem infuderunt, & venam cadaueris iusserunt secari. Si lana carpta, aut gossipium carptum naribus, aut ori admota, vel candela accensa, aut cyathus aquæ plenus pectori etiam appositus moueantur, vitæ certissimum est indicium. Speculum quoque tersissimum ori & naribus admotum, si maculetur, respirationē & vitam testatur: & quamuis nulla indicia vitæ appareant, si fuerit æger imbecillus, aut suapte natura frigidus, non est sepeliendus nisi post tres dies. Illo enim spatio mouentur omnes corporis humores, & extra illud, aut mor- <sup>Tempus</sup> ris aut vitæ euident demonstrabit signū: & ideo Eangelium <sup>sepeliendi.</sup> secundum de Lazaro, inquit, foetet, quia quatrduanus est: primis tribus diebus aliqui corde frigidi visi sunt reuixisse.

## De paralyfi, quam Latini resolutionem dicunt. CAP. XIII.

**D**ictum superiori capite iam est, paralyfim tunc fieri, cum alterius lateris nerui dextri scilicet, aut sinistri motu pariter ac sensu priuantur, quibus si pauca quædam adiecerimus, nihil (vt reor) quod ad naturā morbi spectat, desiderabitur. Est ergo paralyfis alterius lateris mollificatio cum priuatione sensus & motus. Animad- <sup>Descriptio.</sup> uer



uertere tamen oportet, quod nō semper integrum latus res-  
soluitur: nam & tota manus, & totum crus interdum (vt in-  
quit Galenus) resoluitur, atq; solus in crure pes, & quæ sub  
genu sunt, & vt verbo rem complectar, sæpenumero vnus  
tantum membri sensus deperditur, ac motus, vt linguæ, o-  
ris, vesicæ, & aliarum corporis partium. Porro cū in para-  
lysi nunc motus, nūc sensus, sæpe vero vterque simul pereat,  
resolutio potissimum tunc dicitur (autore Gal.) cū motus  
amissus est. Nam cū sensus tantum eripitur, expertem sen-  
sus particulam magis dicimus, quam resolutam, quamuis id  
etiam in vsu sit, vt resolutam appellemus. Vnde tamē id ac-  
cidat, vt perduto sensu particulæ seruetur motus, & contra:  
& quare etiam ambo simul intereant, cōsulere quintum ca-  
put oportet quarti libri de morbo. & symptomate: nunc il-  
lud nouisse satis erit, propter horum amissionem paralyſim  
feri. Sequitur hic morbus frequenter apoplexiam, & (Gale-  
no autore quarto de victu acutorum, commētatio vigesimo  
octauo) paraplexia priuatim dicitur. Quare generalius no-  
men erit paralyſis, omnem resolutionem complectens, siue  
ea apoplexiam sequatur, siue aliunde proueniat. A quacun-  
verò fiat occasione, humorem frigidum, crassum, & lentum  
causam habet, qui neruos obstruens, spiritibus motum ac  
sensem deferentibus viam præcludit. Morbus cuius ex a-  
misso sensu, ac motu facile patet: monere tamen interim cō-  
uenit imperitiores huius artis in faciei resolutione, quādo  
alterius partis nerui resoluti sunt, vt in ea affectiōe (quam  
Græci caninam conuulsionem appellāt, vulgus medicorum  
oris torturam dicit) malum non in ea parte cōsistere, in quā  
altera inclinata est, sed in illa, quæ seipsam declinat, & in cō-  
trarium trahitur: cui etiam medicamenta sunt admouenda,

*Causæ.*

*Notæ.*

*Pars de-  
lapsa labo-  
rat.*

*In quo dis-  
ferant pa-  
ralyſis &  
stupor.*

quod ad curationem non paruum affert momentum. Sed  
quando oris tortura fit à conuulsione, ægra pars trahit ad se  
sanam, vt docet Gal. lib. 2. de causis morborum, cap. 7. & lib.  
3. & 4. de locis affectis. Errant ergo Auicenna, & Gentilis ca-  
lumniantes Galenum optimum veritatis indagatorem. Co-  
gnosces torturam fieri à conuulsione, dolore, tentione, & du-  
ritie quadam. Contraria sunt, quando fit à resolutione.

Differt verò hic morbus ab stupore, quamuis sub eodem  
genere vterque contineatur, magnitudine: cū enim inci-  
pit affectio, stupor fit: postquam verò consummata fuerit,  
resolutio: vnde Galenus libro 2. de locis affectis cap. 1. me-  
diam quandam dispositionem stuporem facit inter resolu-  
tionem, & integram valetudinem.

Cur



Curatio resolutionis quinque remediorum generibus con-  
 quirit: primò, victu calefaciente, siccante, & pituitę generatio- *Curatio.*  
 nem prohibente, vt aere arte parato, suffitu rerum calfacien-  
 tum, si opus fuerit, initio tamen, dum fluit materia, & ante *victus.*  
 vacuationē, calfactio fiat remissa, ne si maior fiat, humores  
 defiant, & augeatur fluxus. Panis sit bis coctus, & aniso in-  
 tersus, vel semine melanthij, vt est mos Agarenorum, ab il-  
 lo dicitur xenuz. Carnes sint auium montanarū, quales sunt  
 herdices, turtures, colūbi syluestres, & similes iis. Bibat aquā  
 annamomi, aut aquā mellis, quia vinum nocet neruis, tum  
 quod in acetum in iis conuertitur, tum etiam quod ad ipsos  
 remittit humores: quamuis in medicamētis cum melle, aut  
 ccharo non noceat acetum, vt in oximelle. S. & similibus.

Secundò concoquentibus pituitam incidendo, tenuando *Præpara-*  
 tergendo eam clementioribus, primò per v. aut vj. dies: vt *tio.*  
 L. rhodomellis 3. x. Item 2℥. aquarum saluix & fœniculi an.  
 vij. misce. Secundo, valentioribus, vt sunt syrapi de hyssō-  
 o, de stachade cum oxymelle. S. & comp. Tertiò, valentissi-  
 mis, vt sunt syrapi de v. radicibus, oxymel compos. & scilliti-  
 um, & syrupus de stachade. His omnibus simul, aut aliqui-  
 us cum dupla quantitate aquarum, aut decocti rerum ca-  
 pitalium paratur pituita, perpetuo tamen sit quantitas ma-  
 ior syraporū sine aceto, quia, vt dixi, maxime neruis nocet.

Tertiò, vacuantibus pituitam primò clementioribus, vt *Purgatio.*  
 sunt Hier. S. agaricus trochiscatus, pilulæ elephanginæ &  
 affuaret. Secundo & tertiò valentioribus, vt sunt pilulæ de  
 garico, pilulæ cochix, fœtidæ, de sarcocolla, de euphorbio,  
 & similes: electuarium indum vtrunque, post ergo primam  
 concoctionem clementem fiat vacuatio sic: 2℥. pilularum de  
 Hier. S. & agarici trochiscati an. 3. ij. fiant pilulæ vij. aut  
 2℥. diacatholicon. 3. 8. agarici trochiscati 3. j. electuarij indi-  
 maioris 3. iij. 8. rhodomellis 3. j. aquæ fœniculi. q. s. misce, &  
 fiat potus. Post secundam concoctionem fiat per hoc, aut si-  
 mile inedicamentum vacuatio: 2℥. pilularum de agarico, &  
 cochiarum an. 3. 8. cum aqua saluix fiant pilulæ vij. aut 2℥.  
 agarici trochiscati, & turbit electi an. 3. 8. electuarij indi-  
 maioris 3. iij. rhodomellis 3. j. aquæ saluix quod s. misce, & fiat  
 potus. Tertiò, & quartò, si opus fuerit, fiet vacuatio per pilu-  
 las fœtidas, aut de sarcocolla, quamuis inusitatae sint hæ de  
 sarcocolla, vel 3. 8. electuarij indi maioris, vel diachartami  
 facto potu cum aqua, aut decocto capitali addendo 3. j. rho-  
 domellis: quia pilulæ diutius in ventriculo detinentur in iis  
 & similibus morbis, qui a ventre longo intervallo distant.



# DE CVRAND. MORB.

*Auersio.* Laudantur magis, fitque per eas melior & maior euacuatio. Quarto, auertentibus materiam in partem contrariam, ne fluat ad spinalem medullam: quod fiet per medicamēta purgantia: de quibus tertio genere diximus, per clysteres & suppositoria dicta cap. precedenti. Auerti etiam potest materia errhinis, sternutatoriis, apophlegmatismis, & gargarismatis, de quibus in extremo cap. superiori abunde diximus. Huic tamen mitiora, & illi valentiora conueniunt, quia apoplexia maximus & acutissimus est morbus.

*Resolutio, & correctio.* Quinto, dissipantibus & resoluentibus materiam partium affectarum, & cerebrum, & ipsas roborantibus, perpetuo tamen est diligenter animaduertenda sententia Gale. aurea i. locorum affectorum illius, cui ex casu ē curru digiti resoluti erant, quem sanauerat admoto emplastro spinali medullæ:

*Observatio.* qua parte affecta nerui ab ea ad digitos progredientes obstructi erant: ab aliis imperitis medicis medicamēta tantum digitis imponebantur. 3. j. theriacæ magnæ, aut mithridati cum aqua, aut syrupo calido capitali multis diebus sumpta hæc omnia efficit. 3. ij. diamusci dulcis eandem habent vim, si multis diebus deuorentur, radix acori condita, aut eryngij est optima. Hæc cōfectio habet quoque eandem, aut similem facultatem: ℞. diamusci dulcis 3. ij. acori conditi 3. j. conseruæ anthos, & stechados, an. 3. iij. theriacæ magnæ, & mithridati an. 3. ij. pulueris galangæ, piperis, cassiæ lignæ, calami aromatici an. 3. j. syrupi de stechade, quod satis est, misce, & fiat cōfectio: Dosis 3. ij. cum 3. ij. aquæ, aut decocti, aut syrupi capitalis. Partem resolutam, & spinalem medullam, iuxta

*Confectio.* vertebrae, per quas oriuntur nerui, quibus sensus & motus illi parti datur, vnge bis in die hoc vngueto: ℞. olei euphorbij, castorei, rutæ, & de lilio an. 3. j. vnguenti aragon & dialtheæ compositæ an. 3. s. ceræ quod satis est, misce, & fiat vnguentum. Aliquando præsertim præcedenti hac vnctione, & existente humore in profundo cucurbitulæ admotæ parti resolutæ materiam dissoluunt. Balnea potentia calida & sicca naturalia, & artificiosa, sunt optima, vt sunt sulphurea, & quæ fiunt ex decocto roris marini, camomillæ, saluiæ, rutæ,

*Topica.* origani, & similium. Quidam affectus diuturna resolutione post cōsentaneas vacuationes curatus fuit hoc medicamento: Accipe lapidem molarem ignitū, quem sparge vino maluatico, cuius suffitu & euaporatione pars resoluta calefiat bis in die, post vaporē vngatur hoc vnguento: ℞. olei de euphorbio 3. iij. olei rutæ 3. j. castorei, pyrethri, trionpiperon an. 3. j. pulueris rosarum 3. j. s. ceræ q. s. misce, & fiat vnguent.

*Historia.* Hæ



Hæ pilulæ sunt maximè efficaces in hoc genere: ℞. castorei, assæ fœtidæ an. ℥. j. ligni aloes electi ℥. ij. cum mithridatico pilulæ xij. fiant: quarum dosis sunt tres tertio quoque die mandæ ante solis ortum per horam. Si multis diebus bibat ℥. iij. aquæ roris marini cum granis tribus pyrethri, erit ad hæc optimum remedium.

In resolutione, quæ fit cerebro primo affecto, cauterium *Aqua roris marini.* stuale in initio colli iuxta nucam, vulgò ita dictam, est efficacax remedium, & alterum post ultimam vertebra, sed eo- *In paralyse* rum penetratio debet esse non magna. Si verò sit particula- *per prima-* ris, cauterium fiat in parte affecta, sed providendum est, ne *riam affe-* is, aliisque remediis calidis pars resoluta inflammetur, ut *tionem ob-* sepe fieri solet ab imperitis medicis. *servatio.*

Si resolutione laboret aliquis, propterea quòd ex alto ce- *In paraly-* siderit, aut propter inflictum vulnus, desperatus est ille æ- *se ex casu,* ter, præsertim si tumor induruerit, a quo obstruantur nervi, si *aut ictu,* tandem resoluantur. Si verò ab aliquarum vertebrarum *exc.* luxatione resolutio genita sit, per reductionem vertebrarum *exc.* in suum locum curabitur. Post reductionem ad dissoluen- *exc.* dum humorem, si sit in nervis, hoc medicamentum affectæ *exc.* parti semel in die admoueat: ℞. farinæ fænugreci, bdellij, *exc.* armoniaci an. ℥. j. piperis albi, seminis been an. ℥. ℥. axungia *exc.* natis ℥. iij. olei de lilio ℥. j. semis, misce, & fiat ex his secun- *exc.* dum artem cataplasma, seu emplastrum, quòd parti resolu- *exc.* æ, & origini nervorum admoueat.

## De Paralyfi, quam Latini resolutionem dicunt.

CAP. XIII.

### Scholium.

**I**ctum superiori capite. ) *Paralyfis aut est exquisita, in Diuiditur* qua sensus & motus deficiunt, aut non exquisita, quando al- *paralyfis.* terum eorum seruatur: quæcunque sit, aut est in medio corpo- *exc.* re, aut in vna tantum parte. Si medium occupat corpus, morbus erit in *exc.* cerebro, aut in principio spinalis medullæ: quod distingues ex dimidia *exc.* apitis parte affecta, aut non affecta. Si paralyfis vnius tantum parris *exc.* it, tunc in peruo illius partis quærendus est morbus, ac proinde exortus quid sit. *exc.* nervorum sunt intelligendi, lege lib. 2. de caus. symp. cap. 5. Paralyfis est *exc.* Morbus in *exc.* symptoma, actio scilicet abolita. Morbus, ad quem sequitur, est obstru- *exc.* tio ab humore crasso, aut tumore facta. Dices, si nervi non sunt caui, quo *exc.* modo obstruuntur? Respondeo Gal. *obstructionem* appellare. 2. libro de *exc.* Obiectio. *exc.* caus. symp. *exc.* Omne illud, quod impedit transitum humoris, aut alterationis.



## DE CVRAND. MORB.

**Practici taxantur.** Quamvis tamen hæc sententia probabilis appareat, existimo tamen in paralyfi morbum esse in numero addito, est enim additus humor impediens actionem; neque poterit dici humor ille obstructio, si proprie loquamur: quia nervus caret cavitate, & hac ratione suffusio etiam diceretur obstructio. In curatione paralyfis reuollunt practici humorem ab spinali medulla purgatione, omittentes sanguinis missionem, male tamen, cum hæc sola reuollat humorem a parte affecta, quod non poterit recte præstare purgatio carens in principio occasione, humore existente crudo, & non sequace. Si obiciat humorem esse frigidum in paralyfi, & ideo non esse mittendum sanguinem: Respondebo, aut humorem frigidum esse multum et secretum a sanguine, aut habere satis insignem quantitatem sanguinis admixtam. Si multius est, & secretus a sanguine, tunc non mittimus sanguinem, quia non constant vires: si vero multum sanguinem habeat permixtum, sanguinis missio exercenda erit. 6. epy. par. 4. com. 43. non ratione morbi, quia cum fiat ex pituita, purgationem postulat: sed Sanguinis ratione affectus venarum, hoc est sanguinis vitiosi. Sanguine, ut decet, missio in misso & humore purgato, discutiemus in parte inclusum topicis medicamentis, ita ut in principio sint leuia, ut totum euacuent humorem, aliter enim euacuata parte tenui reliquum indurabunt, & incurabilem efficiant affectum. Deinde hoc vteris unguento. ℞. olei laurini et vulpini an. ʒ. ii. ℞. axungie vici ʒ. i. ℞. sagapeni, opoponacis ana. ʒ. ii. unguenti marciaton ʒ. i. ℞. cereæ parum, & fiat unguentum, quo caput, aut principium spinalis medullæ, aut principium nervi, si sit paralyfis particularis unges.

## De conuulsione. C A P. X I I I.

**Descriptio.** Conuulsio, quam Græci spasmon appellant (auctore Gal. vj. aph. com. 39.) affectio est inuoluntaria ad similem venientibus neruosis partibus dispositionem quam etiam in motibus voluntariis assumunt. Vnde & ab eodem recte dictum est lib. 5. de morbo & symptomate, conuulsionem esse, quæ neruos musculosque ad eundem cogit affectum, in quem ipsi ab animali facultate, cum habitum naturalem seruarent, ducebantur. Quæ si ita sunt, constabit sanè conuulsionem in conuulsis partibus factam hac sola ratione a motu naturali differre, quod præter voluntatem nostram conuulsio fiat, cum in ea non ab arbitrio, sed a morbi imperio nervi in suam originem conuellantur: quæ sola in parte dissimiles sunt naturalis motus, quem voluntarium dicimus, & iis qui in conuulsionibus reperitur, cætera similes sunt fere. Quod rem ipsam consideranti, & Galeni insuper librum tertium de locis affectis, & quintum de morbo, & symptomate legenti, facile constabit.

Eod



eodem enim modo fiunt: nam & volūtarius motus interim  
 intentis versus principium musculis, interim ab irruente spi-  
 ritu impletis perficitur, ita conuulsio eodem modo accidere  
 solet. Nam & spiritus intra ipsos generantur, qui eos inflare  
 possint, & cōplures etiam affectus, qui illos intēdere queant:  
 cuiusmodi est phlegmone: quos omnes Galenus ex Hippo- *Diuisio.*  
 cratis in duo capita reuocauit, plenitudinem, & inanitionem.  
 Phlegmone plenitudinem parit, ardentissimæ & aridissimæ  
 febres inanitionem. Porro quod neruosa corpora omnia tē-  
 li possunt, siue oppleta ea sint, siue inanita, argumento sunt  
 mulica instrumenta: etenim rumpuntur eorum chordæ, siue  
 in humido, vaporosōque, siue in arido & squallēti cubiculo  
 intentis etiamnum chordis collocentur. Quod cū intelli- *species.*  
 gant huius rei haud ignari artifices, eas antequam reponūt,  
 laxare solent. Conuulsionis in vniuersum tres species tradū-  
 tur Græcis appellatæ nominibus, quarū prima emprostho-  
 tonus dicitur, id est, tensio ad anteriora, & fit quoties caput,  
 ceruix reliquūque corpus in pectus contrahitur. Secunda  
 opisthotonus, id est, tensio ad posteriora, acciditque cū ca-  
 put in dorsum conuellitur, scapulisq; velut annectitur. Ter-  
 tia ex vtrāque composita, tetanus appellatur, Latinis tensio,  
 Celso rigo: qua affectione qui laborant, recta ceruice velut  
 frigore concreti rigent ita, vt neque in hanc neque in illam  
 partem flecti possint: sed quasi ab vtraque impediuntur, in  
 neutram inclinant. Quæ sanè species aut differētia conuul-  
 sionis reliquis periculosior est, autore Hippocr. Quicunque *5. lib. apho-  
ris. 6.*  
 tetano corripuntur, in quatuor diebus pereunt, si verò hos  
 effugerint, salui fiunt: peracutus enim morbus est: vnde & iu-  
 dicationem fieri oportet in primo circuitu dierum critico-  
 rum, non tolleranti natura longiori tempore tentationis labo-  
 rem. Et contingit sanè per has differentias interdum vniuer-  
 sum corpus conuulsione tentari, interdum vnam partem,  
 proinde ac in paralyfi quoque fieri diximus. Conuulsio verò *Simile.*  
 vniuerso corpore (vt omnes quidem autumant) talē quam-  
 piam partem effici necesse est: quæ vt in arbore caudex ra-  
 morum, sic ipsa sit omnium neruorum communis origo: aut  
 quoties vel crus, vel altera tantum manus cōuellitur, illius  
 membri conuulsio neruorum, qui ad ipsum perueniunt, ori-  
 ginem affectam fuisse declarat rami cuiuspiam exemplo in  
 arbore. Atque huius quidem conuulsionis, quæ scilicet par-  
 ticulare aliquod membrum afficit, multæ sunt differentię:  
 quippe si quis violenti aliquo dentium stridore vexetur, ma-  
 xillares musculi conuulsione laborant, per inuersiones verò



*Causæ.*

*Adverte.*

*Notæ.*

& strabisinos conuellantur oculorum muscoli. Iam & gonorrhæa conuulsionis species censetur, verum distinctione adhibita: si enim rigido pene semen effluat, veluti conuulsio quædam est: si non rigeat penis, ad retentricis facultatis imbecillitatem referri debet. Sed longum esset omnes differentias recensere. Causas huius morbi, tametsi superius obiter eas attigimus, clarioris tamen & vberioris institutionis causa accuratius repetemus. Duæ ab Hippocrate in vniuersum ponuntur plenitudo, & inanitio: oppletis siquidem, aut vehementer exinanitis nervosis partibus conuulsiones accidunt, quemadmodum euenire in lyricis fidibus antea dictum est: & in tergoribus, quoque ac loris accidere Gal. ait: verum tertium eis adiicere conuenit, nempe consensum aliarum partium, à quibus conuulsio non raro excitatur, quam conuulsionis differetiam, qui Arabum sequuntur placita, spasmus non proportionatum ad materiam appellant, quod scilicet non contingat propter materiæ multitudinem nervos implentis, neque propter eiusdem inopiam eos inanientis, atque exsiccantis: fit autem quoties aliquid à parte primò affecta ad cerebrum ascendit, quod vt excutiat, vehementer & inquiete concutitur. Solet autem per consensum infestare nervorum originem, ita vt ad ipsam aliquid ascendat, quod hanc conuulsionem inuehat, vel impactus nervosis partibus prodens aliquis humor, vt in eo qui propter æruginem in ventriculo contentam conuulsionem patiebatur, vt videre est v. aph. com. j. aut venefica aliqua qualitas, aut spiritualis substantia in cerebrum elata, vt de puero refert Gal. qui quotidie in epilepsiam incidebat, propter nescio quid, quod à crure in cerebrum ascēdebat simile illi, quod ab scorpione, & ab aliis venenatis feris iniecta parte relinquitur, quod cum mole minimum sit, facultate maximū est. Iam & nervorum punctura hoc ipsum efficere potest (quod Galen. confirmavit tertia parte artis medicinalis) quoniam ea pars cerebro continuatur, promptaque est ad conuulsionem excitandam: & vniuersim, id omne quod propter illatum parti nocumentum cerebrum ita afficit, vt ipsum ad expulsionem rei noxiæ per huiusmodi motus excitet, hoc genus conuulsionis efficere potest.

Notis, quibus morbus dignoscatur, non est opus: satis enim per se patet, à qua tamen fiat causa, sic deprehenditur. Conuulsio, quæ à plenitudine fit, sanum corripit subito eueniens, aut saltem nō multò post morbi initia: quæ verò propter inanitionem accidit, nō similiter euenit, sed post ardentes febres, plurimāsque euacuationes, siue persudores, vomitum,

dciec



Deiectiones infernas, sanguinis profusionem, siue aliquo alio modo factæ fuerint. Hæc enim omnia, atque alia his similia cum corpus exhauriant, conuulsionem inaniendo inducunt. Tertiam illam differentiam quæ per consensum est, ab egro-  
antis, aut assidentium sermonibus oportet exquirere.

Conuulsio ex repletione pituitosa (a qua frequentius fit) curatur sex remediorum generibus. Primò calfaciente, & occante victu simili resolutorum victui, de quo præced. cap.

Secundò, pituitam concoquentibus, primò clementibus, *Curatio pi-  
tuitosæ.*  
Secundò valentioribus, tertio, valentissimis: de quibus cap. *Victus.*  
superiori abundè diximus, nisi doloris vehementia, & ma-  
gnitudo ordinem peruerteret, tunc oportet vacuare mate-  
riam, etiam si non sit turgida, ne pereat æger. Ante conco-  
ctionem etiam per medicamenta valenter purgantia, quo-  
rum formas capite superiori docuimus, & sequenti etiam  
genere trademus. *Purgatio  
sine præpa-  
ratione.*

Tertiò, purgantibus materiam paratam, si intermissionem præce-  
derit dolor, aut crudâ, si vehemens & magnus fuerit. Qua-  
les sunt pilulæ de agarico, de hiera composita, cochia, fœti-  
dæ de sarcocolla, & de serapino, & opopanace; quamuis tres  
ultimæ non sint deuorandæ, nisi ægri vires validæ sint, &  
morbus magnus, & alia minus valenter purgantia medica-  
menta non satis idonea sint. Electuarium etiam indum pur-  
gat pituitam, & alia de quibus i. cap. & capitibus de cepha-  
lalgia pituitosa, de apoplexia, & de resolutione satis copiosè  
diximus. Primum ergo propter tyrones post primam mitio-  
rem concoctionem, sequentibus pilulis fiat vacuatio: *¶. pi-  
lularum cochiarum, & agarici trochiscati an. 3. s. cum aqua  
saluæ fiant pilulæ vij. aut hoc: ¶. diacatholicon. 3. s. electua-  
rij indi maioris 3. iij. s. agarici trochiscati 3. j. rhodomellis  
3. j. aquæ præoniæ q. s. misce, & fiat potus. Secundò, post se-  
cundam valentem concoctionem his pilulis euacua. ¶. pi-  
lularum cochiarum, de agarico fœtidarum an. 3. j. diagridij  
3. iij. cum aqua saluæ fiant vij. pilulæ: aut ¶. electuarij indi  
maioris 3. iij. s. agarici trochiscati, & turbit electi an. 3. s. sa-  
lis 3. s. Rhodomellis 3. j. s. aquæ stachadis q. s. misce, & fiat  
potus. Tertiò, post tertiam valentiorum concoctionem fiat  
his pilulis vacuatio: ¶. pilularum fœtidarum 3. iij. pilularum  
cochiarum 3. j. diagridij. 3. iij. cum aqua roris marini fiant  
pilulæ vij. Aut ¶. agarici trochiscati, & turbit electi an. 3. s.  
diachartami, & electuarij indi maioris an. 3. iij. rhodomellis  
3. j. s. aquæ roris marini, quod satis est, misce, & fiat potus.*

Quartò, auertentibus ad inferiora materiam, vt clysteribus *Auersio.*



# DE CVRAND. MORB.

acribus, & glandibus, frictionibus, & vinculis dolorificis in parte contraria, errhinis, apophlegmatismis, gargarisatu, & similibus, quorum copiosam tractationem vide cap. xij. de euacuatione apoplexiæ.

*Discutio.* Quinto, digerentibus, seu resoluentibus materiam nervis amixam internis, & externis, ut vfu longo diamusci vtriusque, mithridati, aut theriacæ magnæ, confectionis anacardinæ, & similibus. Acorus conditus est etiam in hoc utilis

*Confectio.* cum aqua, aut decocto, aut syrupo capitali. Hæc mixtura confert multum in hoc genere: ℞. diamusci dulcis ℥. j. diagalangæ ℥. ss. pulueris diacymini, & aromatici rosati an. ʒ. ij. pulueris calami aromatici, galangæ, & radices pæoniæ an. ʒ. j. ss. radices acori conditæ ʒ. iij. syrupi de stæchade. q. s.

*Topica.* misce, & fiat confectio: Dosis est cochlearium vnum cum aqua roris marini, aut alia simili. Vnctio ex oleo de lilio, vulpino, de semine lini, rutaceo, de castoreo, & de euphorbio, & similibus est optima: Admouere etiam parti conuulsæ pulmones arietum, aut animalia parua bruta recēs per dorsum incisa est quoque optimum remedium ad resoluendum, ut sunt pulli gallinacei, columborū, parui canes, & catuli. Cōfert quoque manum, aut partem conuulsam in bouem, aut aliud animal recens cæsum immittere, & ibi, dum cale scat, tenere. In vinum nouum feruens immittere manum est utile. Probatissima sunt in hoc morbo balnea, præsertim naturalia, ut sulphurea, aluminosa, & salsa, aut a nobis parentur ex sulphure, sale, alumine, & herbis, & floribus capitalibus incoctis. Suffitus, & vapor prædicti decocti per lapides ignitos in cacabum iniectiones, si toto corpore, aut parte resoluta (si totum non fuerit) sub conopæo, ne expiret vapor exceptus maximè conducit: post quem aut balnea vnctio melior erit, & validior oleis iam dictis, & hoc vnguento: ℞. olei rutæ, & de lilio an. ʒ. j. ss. olei de euphorbio & laurini an. ʒ. j. dialtheæ compos. & vnguenti aragon. an. ʒ. ss. pulueris castorei, & diacymini an. ʒ. j. ss. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum.

*Balnea.* Præstantissimū quoque est remedium partes conuulsæ oblinere adipe anseris pitiguis, exenterati, & cati parui minutatim concisi, & lardo veteri, myrrha, thymo, terebinthina abietis, farti, & consuri, & tosti. Accipiaturs adeps non primus, sed secundus decidens, & distillans in vas fere plenum aceto. Post perfectam tosturam anser in paruas partes diuisus eodem aceto percoquatur, à quo fuit adeps extractus, & alio, si non sufficiat primum vsque ad separationem ossium, & iterū colligatur adeps supernatās, qui mixtus cum priori

*Vnguentum.* val

*Limimentum.*



# LIBER PRIMVS.

58

salentiori referuetur ad idem hoc, quod supra diximus, efficiendum. Sequens quoque vnguentum est optimum: ℥. olei autæ, lumbricorum, & de lilio an. ʒ. j. s. olei castorei, & costi-  
 an. ʒ. j. agrippæ, dialtheæ, & marciaton an. vnciam s. ceræ *Vnguentum.*  
 quod satis est, misce, & fiat vnguentum: quo pars conuulsa  
 ngatur, & vertebræ, per quas nerui oriuntur illi parti sen-  
 um & motum tribuentes, aut ceruix, & tota spina, si fuerit  
 niuersalis conuulsio.

Sexto, corrigentibus symptomata, præcipue dolorem, qui *Symptoma.*  
 aliquando solet esse tam intensus, & intolerabilis, vt vix æ-  
 ter possit illum ferre. Balneum olei communis est bonū me-  
 diocriter calidum: melius si sit cum decocto seminis lini, *receptio per*  
 ugræci, lumbricorum, foliorum maluæ, violarum, & camo-  
 millæ: optimum erit balneum ex oleo vulpino, sed hoc ma-  
 iori prætio emitur. Dolorem hunc lenit oleum rosaceum cū  
 uorum vitellis aliquot. Eiusdem, aut maioris etiam facul-  
 tatis panis calidus est, cum e furno educitur, cum lacte ca-  
 rino. Oleorum camomillæ, lumbricorum, & terebinthinæ  
 mixtura pari facultate pollet, aut maiori sæpe. Aliquando  
 præcipue in maximo dolore, & aliis iam expertis est neces-  
 sarium hoc, aut simile medicamentum narcoticum. ℥. olei  
 rosati ʒ. iij. thebaici ʒ. s. iusquiami, papaueris albi ana. ʒ. ij.  
 corticum mandragoræ ʒ. j. aceti ʒ. ij. misce, & fiat inster vn-  
 guenti. Aut ℥. medullæ panis tritici. p. ij. lactis q. s. vitella o-  
 uorum numero iij. opij. ʒ. s. misce, & fiat cataplasma, adde  
 croci in puluerem reducti ʒ. s.

Si ex sanguine sit conuulsio, a quo raro dependet, vena se-  
 canda est contraria, vt si brachium dextrum conuellatur ba-  
 silica sinistra, & vicissim: si verò tibia, basilica eiusdē partis: si *Sectio ve-*  
 cotum, basilica dextra, aut vtraque simul, si sit magna pleni-  
 tudo. In omni parçe sanguis extrahatur, ne vires dissoluan-  
 tur, quod docet Aetius ferm. vj. c. 18. agens de sanguinis mis-  
 sione in resolutione, quæ parem exposcit curationem. Opor-  
 tet autem moderate detrahare sanguinem, ne refrigeretur.

Si sit conuulsio a bile flaua, aut ab atra bile, vacuetur sta-  
 tim, præcedenti tamen iusta concoctione, præcipue quæ gi-  
 gnitur ab atra bile, per propria medicamēta, de quibus c. ix. *Biliose & atrabilia.*

Si est ab inanitione & siccitate, curatur humectantibus a-  
 nimantis, & medicamentis, vt cap. de hectica, lib. 2. longius est a siccitate.  
 demonstrabitur, videlicet iure gallinarum pinguium, capote.  
 num, perdicū, vituli, arietis, suis teneri, & similibus animan-  
 tium cum herbis, aut rebus humectantibus, vt est cremor *Victus hu-*  
 ordei. Pus etiam aut aqua testudinum, limacū, & ranarum *mectans.*

in



## DE CVRAND. MORB.

*Vnguentum.* in salubribus aquis degentium confert, lac humanum primo, secundo asininum, tertio caprinum alimentum salutare est in hac conuulsione. Vinum generosum, dilutum potenter humectat. Balneum ex foliis maluarum, violarum, radicum althææ, caricarum, passularum enucleatarum, caprum & pedum arietinorum est optimum ad humectandum. Partes conuulsæ, & tota spina vngatur hoc vnguento: ℞. oleorum sesamini, amygdalarum dulcium, & violarum an. ʒ. ij. mulcilaginis seminis lini, & fœnugræci an. ʒ. j. ʒ. axungia gallinæ ʒ. ij. ceræ, quod satis est, misce, & fiat vnguentum.


*Eius quæ est ab ictu venenatorum.* Si conuulsio est ab ictu animalium venenatorum, extrahe venenum admoto parti affectæ ano galli gallinacei, aut gallinæ glabro, scabiosa pertrita, & cum vitello oui instar cataplasmatidis apposita venenum educit, ideoque carbunculis pestiferis imponitur. Cæpe crudum, vel coctum, admotum parti læsæ, eiusdemque succus venenum expellit. Idem efficit eductentia. theriaca magna applicita (quanquam utilior est interius assumpta) cucurbitula cum scarificatione parti punctæ affixa est adiumento.

*Eius quæ est a casu & percussione.* Si a casu, aut percussione aliqua conuulsio sequatur, post victum tenuem, & sanguinis missionem, & euacuationem per clysteres, parti affectæ, quæ parum emolliant, dolorē sedent, & moderatè resoluant, sunt admouenda, ut est hoc: ℞. hordei decorticati, camomillæ, farinæ fœnugræci, foliorum maluarum an. p. ij. omnia decoquantur, & cum oleo camomillæ, rosarum, & terebinthine fiat cataplasma.

*Eius quæ fit ex punctura neruorum.* Si ex punctura non penetrante nerui est, scindatur neruus, aut perforetur: melius enim est viuere parte vna priuata sensu, & motu, quam mori. Deinde apponantur quæ resoluant, & exsiccent humorem in neruis inculcatū, & aperiatur vulneris os, ut possit optimè & liberè pus effundi, & ideo oleum pypericum, sulphur, euphorbium cum oleis lumbricorum & rosarum, & pauca terebinthina erit optima mixtura in hac conuulsione.

## De conuulsione. CAP. XIII.

### Scholium.

*Conuulsio quid.*  Onuulsio quam Græci. ) Conuulsio est motus deprauatus partium nervosarum, quo versus suum principium retrahuntur. Prima parte huius definitionis communicat conuulsio cum *Pars nervosa.* palpitatione, tremore, & aliis motibus deprauatis: reliqua parte ab illis distinguitur. Per partes nervosas cum Gal. 5. lib. aphor. com. 1. intelligi-



gimus nervos, ligamenta, fibras musculorum, & tendones. Principium Partium  
 arum partium varium est, nam principium nervi est cerebrum, aut nervosarū  
 binalis medulla, ligamenti, os: tendonis, finis musculi: fibrarum muscu- principii.  
 eius caput. Harū partū omniū, aut vnius retractione conuulsio appel-  
 atur. Quod si Gal. aliquādo Conuulsionem appellat retractionem muscu-  
 orum versus suum principium, id facit, quia musculus est instrumen-  
 tum motus voluntarii. Aduerte tamen hanc definitionem esse conuulsio- Explica-  
 nis, cum sit, nam conuulsio facta motus est abolitus. Causæ conuulsionis tur Gal.  
 ſunt, omnia quæ prædictorum corporum longitudinem abbreviare pos-  
 ſunt, quæ ad duo capita reuocat Hippocr. lib. 6. aphor. sent. 29. repletio- Causa cō-  
 nem videlicet, et inanitionem exemplo cordarum vsus. Quod si aliquan- uulsionis.  
 lo frigiditatem causam conuulsionis scribat, de causa externa loquitur.  
 Auctor tertiam causam conuulsionis addit consensum aliarum par- Auctoris  
 tium, decipitur tamen, quia per aliarum partium consensum non fit cō- lapsus.  
 uulsio, sed motus conuulsiuus, qui cerebri est affectus, aut principii  
 spinalis medullæ, & non nervorum. Neque etiam sequendus est, cum  
 licet nervos in conuulsione ab spiritu posse contrahi, nam hæc contra-  
 ctio non perdurat, ut ostendit ea affectio, quam vulgò rampa appella-  
 mus: tum Galenus 2. de caus. symp. ex sententia pneumaticorum loqui- Obiectio.  
 tur. Differentias conuulsionis lege apud auctorem: Difficile tamen a-  
 licui videbitur, conuulsionem ex repletione nervi fieri sine sensus & mo-  
 tus læsione, quia si nervus repletur, non poterit alteratio facultatis per-  
 meare. Respondeo in conuulsione repleti nervi inæqualiter, ita ut quæ-  
 dam nervi partes libere sint, & per ipsas alterationem descendere.

Conuulsio ex repletione.) In curatione conuulsionis eius causas  
 aduerte quia ea pro varia causa variatur. Si fiat ab humore pituitoso  
 (ex eo enim ut implurimū euenire solet) auctor purgat, auertit, & topi-  
 ca adhibet medicamenta, recte quidem: Omittit tamen vnum remedium Sanguinis  
 maximè necessarium, quod reuellit & euacuat humorem, quod est san- nissio.  
 guinis missio. Hæc in principio imperanda est, ita tamen exerceatur, ut  
 non euacuet quantum postulat morbus, quia aliquid omittendum est pro-  
 pter symptoma, nempe dolorem qui ob rigilias & sudorem vires deii-  
 cit: aduerte etiam sanguinem solum esse mittendum in hoc affectu cum  
 pituita satis insignem quantitatem sanguinis habuerit admixtam. Si  
 à sanguine fiat conuulsio, etiam venam secabis. Conuulsio nunquam Lapsus  
 à bile ortum habet, quia, ut diximus, tenuis est, & proinde non po- auctoris.  
 test replere corpora nervosa, ac ideo ne sequaris auctorem. Cum conuul-  
 sio fiat ab humoribus frigidis, & crassis, aliqui inter quos est Vega,  
 sequuntur Cornelium Celsum contendunt, ad eius curationem nobis licere An in cō-  
 excitare febrem, ut humores attenuati euacuentur, & eorum frigiditas uulsionis li-  
 corrigatur. Quam sententiam possumus auctoritatibus corroborare: pri- ceat nobis  
 ma est Hip. qui 4. aph. sen. 57. sic scribit. Qui à conuulsione, id est opisto- excitare fe-  
 tono, & emprostotono, aut distentione nervorum, hoc est tetano tenentur, brem.  
 febr



## DE CURAND. MORB.

febre superueniente liberantur. ubi Gal. in commentario, duas (inquit) habet medicamentum intentiones in conuulsione, superfluum soluere humiditatem, & calefacere frigiditatem, quas duas febris complet. Præterea 2. aphor. sent. 26. Febrem (ait) conuulsioni superuenire melius est, quam contra. Tertiò Hippocrates 6. epid. par. 6. sen. 7. Si prius (inquit) epilepsia capiantur aliqui, & quartana superueniat liberantur. & quauis hæc loca videantur ostendere licere nobis in hoc affectu febrem excitare: multò clariùs idem Hippocr. 2. epy. sec. 5. statim post principium, id visus fuit docere, si puerperis (inquit) conuulsio fiat, igne excitato: ex quo loco multi colligunt non solum posse nos excitare febrem, sed & putridam, cum Hipp. semper per ignem intelligat magnam febrem. Ceterum existimo non licere ad curandam conuulsionem febre excitare, quia in ea non possumus deliberare, de quantitate, occasione, & modo utendi quæ sunt remedii conditores. Rationes propositæ ex auctoritate desumptæ nihil persuadent: nam omnes, quæ in aphorismis & lib. 6. epy. habentur, tantum docent, febrem, quæ conuulsionem & epilepsiam sequitur, eas sanare, aut melius esse febrem sequi conuulsionem quam contra: quia si febris sequitur conuulsionem ex repletionem ortam, calore iuuabit. Maiorem vim videtur habere locus qui habetur lib. 2. epy. ex quo aliqui ex nomine ignis persuasi, colligunt debere nos magnam febrem, hoc est putredinem excitare, nam diaria non est magna febris. Hi maxime decipiuntur, non enim est in nostra manu febrem mouere putredinem, imò si Hippocratis animus fuit, excitandam esse, febrem, nomine ignis diariam intelligit, si aduertamus dictionem, excitato, quia nos calefacientibus medicamentis & alimentis, solam hanc generare possumus. Et quamuis hoc ita sit, censeo, Hippocratem non voluisse excitare febrem, sed nobis præcepisse, ut medicamentis calidis, ex quibus illa oriri potest, utamur, quibus curare solemus conuulsionem: vel dicere possumus Hippocratem in epydimiis particularia exempla scribere, non tamen artem vniuersalem constituere: quam cum in aphorismis proposuerit, proinde in ipsis aliter, ac in epydimiis de febre in conuulsione loqui.

## De Tremore. CAP. XV.

Descriptio.



Remor (vt auctor est Gal. v. de morbo & sympto-  
mate) contrarius quidam motus est ex contrari-  
orum in se motuum successione proueniens. Cum  
enim facultas imbecillior reddita membrum in su-  
blime tollit, ipsa verò grauitas deorsum trahit, pugna quæ-  
dam fit inter facultatem, & membri grauitatem non permit-  
tente facultate deorsum ferri membrum, vt in resolutione  
membrorum solet, neque grauitate concedente, vt facultas  
ipsum sublime seruet, vt consueuerat, dum valebat. Itaque  
vicissim facultas nunc vincitur, nunc vincit, atque hinc na-  
scitur



## LIBER PRIMVS.

Fit tremor ex duobus scilicet motibus cōtrariis compo-  
 situs motus, altero, dum membrum sursum à facultate fer-  
 ritur, altero, dum ob grauitatem, & morbum deorsum premi-  
 tur. Fit autem in vniuersum tremor ex imbecillitate neruo-  
 rum, quod palam senectus ipsa (vt Paulus ait) testatur, in qua  
 est incurabilis tremor, specialiter verò id omne, quod motri-  
 cem facultatem imbecilliolem reddit, huiusmodi solet sym-  
 ptomata inducere: cuiusmodi est frigidus naturæ tempera-  
 mentum, frigida aquæ potus non in tempore sumptus, pi-  
 tuitosi humoris abundantia, vini multi, præsertim meracio-  
 ris immoderatio vsus, senectus, & animi affectiones, vt ti-  
 mor. Vnde his, qui per prærupta ingrediuntur, crura tremunt,  
 & qui incurrentem in se feram videntes fugiunt, tremuli e-  
 suadunt, neque nō toto corpore tremunt, quibus coram ter-  
 ribili aliquo magistratu negotium est, quippe loqui iussi ne  
 vocem quidem citra tremorem reddere poterunt. Signa ex  
 ægri temperamento, & sermonibus patebunt: si iis enim a-  
 nimus aduertat, proculdubio non solum notas, sed & cau-  
 sas quoque intelliges.

*Causa.*

*Nota.*

Tremor curatur abscissa causa eius: sed quia fermè sem-  
 per fit à pituita, vt resolutio, & conuulsio ex plenitudine, su-  
 peruacaneum esset in præsentia eandem rem iterum tracta-  
 re, postquam satis abundè cap. duobus præcedentibus de ea  
 dictum est, mitioribus tamen remediis indiget hic affectus,  
 quam resolutio, & conuulsio ex repletione pituitosa, quia à  
 minori fit causa.

*Curatio*

*per reme-  
dia mitio-  
ra.*

## De Ophthalmia. CAP. XVI.

**O**phthalmiam medici aliqui duplicem faciunt, veram  
 & non veram: non veram cōturbationem oculi, seu  
 vacillationem appellant, & ab externa aliqua occa-  
 sione fit, verbi gratia: sole, igne, fumo, puluere, ictu aliisque  
 id genus, & a Græcis taraxis dicitur, hoc est, lucis perturba-  
 tio, vt apud Paulum videre est, qui sic eam nominat, & velut  
 genus quoddā facit eius (quæ vera dicitur) ophthalmiæ. Por-  
 ro tam facilis curatu hæc est, vt vel cognita tantum causa,  
 ac separata discutiatur, modò id in principio fiat, alioqui  
 neglecta in veram sæpe ophthalmiam transit. Est autem vera  
 appellata ophthalmia, quam Latini lippitudinem nominant,  
 adnatæ membranæ, seu (vt barbari dicunt) coniunctiæ in-  
 flammatio. Fit hoc genus morbi (de vltima, quæ dicitur ve-  
 ra loquor) aut ob plenitudinem vniuersi corporis, ob quam  
 adnata quoque humoribus plena distenditur, vel propter  
 acrim

*Divisio.*

*Definitio.*

*Causa.*



# DE CVRAND. MORB.

acrimoniam humoris in oculum influentis, vel propter cras-  
 forum humorum, aut flatulenti spiritus tensionem.

*Nota.*

Notæ sunt adnatæ, rubor, ex oculis lachrymæ manantes,  
 & in maioribus oculi angulis, qui ad nasum sunt, sordes quæ-  
 dam acervatæ, & vniuersim omnia, quæ in inflammationi-  
 bus reperiuntur externis: quia perpetuò internas sequitur fe-  
 bris, symptoma necessarium: ab hac tamen febris non pro-  
 creatur, nisi sit dolor ingēs, & corpus paratissimum ad eam.

*Curatio.*

Curatur vera ophtalmia sex remediorum generibus, pri-  
 mò, victu refrigerante, vt aëre natura frigido, vel industria  
*Victus.* nostra sparsa aqua, floribus & foliis refrigerantibus: &  
 aere obscuro, quia lumen resoluit spiritus, humoresque com-  
 mouet: & victu tenui, quo partes inanitæ retineant tenacius  
 humores ne ad oculum confluant. Carnes, oua, vinum, quæ  
 sanguinem augent interdicta sunt: somnus, & quies laudan-  
 tur: his enim oculus quiescit, & humores.

*Remissio.*

Secundò, auertentibus sanguinem fluentem, vt sectione  
 cephalicæ eiusdem partis, si nò fuerit magna plenitudo: tunc  
 enim media, aut iecoraria est secanda. Si vero in vtroque o-  
 culo fuerit ophtalmia, vtraque cephalica est secanda, aut v-  
*Sectio ve-* traque media. Sanguinis copia, & numerus sectionis venarum  
*na.* respondeat plenitudini, magnitudini morbi, & viribus

*Aduerte.*

ægri. Sed si hæc, aut alia quæuis inflammatio à mēsis, aut  
*Auersio.* hemorrhoidibus detentis proficiscatur, vena tibiarum, aut  
 pedum est secanda. Fit quoque auersio in hoc morbo per cly-  
 iteres parum acres ex cassia præparata, diacatholicon, & si-  
 milibus: per frictiones partium extremarum, per ligaturas  
 dolorificas, per cucurbitulas sine scarificatione, & cū scarifi-  
 catione in scapulis, & per fotū ex aqua calida partium ex-  
 tremarum, & per purgationem hanc, aut simile factam medi-  
 camentis benignis, & salubribus: vt ℞. medullæ cassiæ fistu-  
 læ, recēs extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. j. β. rhabar-  
 bari electi infusi per noctem in aqua endiuivæ. ʒ. j. β. syr. rosa-  
 rum ʒ. j. aquæ buglossæ quod sufficit, misce, & fiat potus.

*Repellentia  
 topica.*

Tertiò, repellentibus materiam fluentem fronti admo-  
 tis, si fluxio sit per venas, & arterias extra cranium, vt sæpe  
 accidit: quia hæc tunica à pericranio producitur: qualia sunt  
 aquæ rosarum, plantaginis, portulacæ, solani, albumen oui,  
 acetum, cortices granatorum, balaustia, & bolus Armenus  
 præparatus aqua frigida maceratus. Si vero per venas & ar-  
 terias intra craniū materia fluat, nocent hæc repellentia ca-  
 pit, & fronti admotæ, cū materiam versus neruos opticos  
*Topica o-* impingant: tunc enim naribus & oculis sunt repellentia ad-  
*culis apta.* mou



remouenda. Ipsi oculo, aut oculis immittimus sepe aquam ro-  
 saeam albumini oui, permixtā, aut lac cum e mamma emul-  
 gemus, aut hanc mixturā: ℞. aquæ rosarū ʒ. iiii. collyrij albi  
 rhasis sine opio ʒ. ij. tuthiæ præparatæ ʒ. j. sarcocollæ nutritæ  
 ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. misce, & fiat collyriū, adde corallij rubri præparati ʒ. j.  
 mica panis lacte caprino cocta & oculis admota, est etiā o-  
 ptima ad repellendū, & dolorē sedandū. Sed si his dolor non  
 trincatur, adde emulsionē seminis papaueris, & mucaginē  
 psyllij, & in summo dolore sit collyrium albū rhasis cū opio: *Admoni-*  
 hoc tamen medicamentū, & simile narcoticum nō est oculis *tio.*

remouendum, nisi in vehementissimis doloribus, & quando  
 alia mitiora, & securiora nō sufficiunt, quia spiritus crassos  
 reddūt, & vidēdi facultatē infirmant, lege com. 31. 6. lib. aph.  
 in maximis tamē doloribus, & vigiliis, vbi etiam mors time-  
 tur, necessaria sunt hæc medicamenta narcotica. Vide histo-  
 riam de quadā nobili, cap. de ophthalmia doctoris Gatinarię.

Quando dolor est remissior, alia priora absque narcoticis  
 satis sunt, vt in non vera, quę sepe curatur sola absente cau-  
 sa externa, seu primitiua, & aliis leuioribus, quę superius di-  
 ximus: vel decocto seminis fœnugræci, & seminis psyllij, a-  
 qua rosarum, facto. Pomum quoq; putre coctum cum aqua  
 rosarum, & oculis calēs admotum, optimum remedium est.

Quarto apparantibus bilem non naturalē, & crassam sy- *Prepara-*  
 rupo acetoso. S. & rhodomelle, aut syrupo malorum grana- *tio.*  
 torum, & endiuia comp. cum syrupo rosarum, cum aquis fœ-  
 niculi rosarum, & plantaginis, & similibus.

Quinto, materiam concoctam euacuantibus, vt rhabar- *Purgatio.*  
 baro, myrobalanis citreis, agarico trochiscato, & pilulis de  
 rhabarbaro, aut aggregatiuis, & aliis pari facultate prædi-  
 tis, vt hoc est: ℞. diacatholicon. ʒ. v. rhabarbari electi infusi  
 per noctem in aqua endiuia ʒ. j. ʒ. electuarij de succo rosarū  
 ʒ. iij. diaphanicon. ʒ. j. ʒ. syrupi rosarum ʒ. j. decocti florū cor-  
 dialium. q. s. misce, & fiat potus. Sanguinis missio ex cephalic-  
 a eiusdem partis euacuat omnes humores, a parte affecta,  
 & ab aliis proximis.

Sexto, reliquias materiæ ex oculo vacuantibus, & resol- *Resolutio.*  
 uentibus: vt admoto decocto seminis fœnugræci, seminis fœ-  
 niculi, & camomillæ, spongia, aut molli lintheo. Balneum, &  
 vini potus cum Hippocr. 6. Aphor. potenter resoluunt. Idem *Topica.*  
 efficit ouum ita coctum, vt cōcretum & induratum sit, ocu-  
 lis impositum. Pari vi pollebit drachma. j. aloes cum vncia j. *Corroboratio.*  
 aquæ fœniculi, si oculo applicentur. Hoc medicamentum *tio, & ab-*  
 oculos roborat, reliquias siccant, & absorbunt. Idem præ- *teratio.*  
 stat



stat sarcocolla, aqua rosarum, vel potius lacte muliebri nutrita, & soluta.

- Ophthalmie antiquæ curatio.** Si antiqua fuerit ophtalmia, & intermittens præcedenti debita victus ratione, & humoris cōcoctione syrupo rosarū, & rhodomelle, cum aqua, aut decocto seminis fœniculi, purgabis 3. j. pilularum lucis ma. aut sine quibus esse nolo, aut de agarico semel in hebdomada. Iterum purgabis 3. j. prædictarum, aut similium pilularum: & oculis non sunt admo- uenda repellentia intense frigida, imò iis semper adde parū aquæ fœniculi, aut rutæ, ne fiat albugo, aut suffusio oculorū: hanc tamen & vlcera oculorum gigni prohibet filum collo traiectum per tres digitos sub nuca, prius tamen apprehen- de forcipi cutem, donec sensus tactus abeat, & post acui in- certo filo crasso facto ex pilis caudæ equinæ, vel (ne tantus dolor excitetur) seta, vel lino perforamus, vt in vulnere. Acu ablata filum maneat, quod vlcus diu apertum seruet, vt per id puris multitudo euacuetur. Diuitibus aureū annulū im- mittunt, loco fili acu ablata. Quotidie remouent dictum fi- lum, vel annulum, & mane, vesperique tergunt teriam. Hoc
- Cautio.**
- Cervix filo traiecitur.**
- Historia.**
- auxilio reuellente & vacuante multis oculi acies ferme a- missa fuit in pristinam sanitatem restituta, vt ego sæpe ex- pertus sum in plerisque, & in filio meo nato octo menses.

De Ophtalmia. CAP. XVI.

Scholium.

**Instrumenta animalia.** Phtalmiam medici.) Instrumenta animalia, i. de loc. af- fec. cap. vlt. aliunde, hoc est à principio (quod cerebrum est) ne- dio neruo, facultatem accipiunt: proinde evenit, in his ali- quādo lædi actionem morbo nō in ipsis, sed in principio, aut parte, quæ bent facul- deferi facultatem, existente. Præterea in his instrumentis vna pars si- milaris est, quæ operatur, reliquæ verò ei præbent vsum, & vico in a- Vna pars ctione eorum læsa, morbus aut erit in parte, quæ operatur, aut in aliis. similaris Quod in oculo verum esse deprehēdes, hic enim à cerebro per neruum o- agit in in- pticum facultatem accipit, pars autem quæ in ipso videt, est tunica ara- strumento. cnoides, vna cum humore cristallino, reliquæ oculi partes ei præbent v- Visionis sum. Dices nonne Gal. humorem cristallinum, visionis instrumentum ap- pellat? Respondeo, nomine humoris cristallini Galenum, etiam mem- branā intelligere, vt latè in libris de symptomate & morbo explicatum habeo. Oculi actio (quæ visio est) inter alios morbos solet lædi ab ophtal- mia quid. mia, quam Latini lippitudin. m appellant, hæc nihil aliud est quàm in- Causa oph- flammatio adnatæ membranæ: nomine inflammationis intelligentes tu- talinæ. morem præter naturam, qui in hac membrana, ob multas, quas habet venas, solet accidere. Causa ophtalmiæ aut est externa, aut interna: Ex-



na sol, fumus, & alia quæ dolorem, aut calorem in oculo excitando  
 fluxionem mouent. Interna causa est fluxio sanguinis, quæ fit à plenitu-  
 dine corporis, aut venarum capitis, aut ab humoris acris fluxione. Qua  
 parte nobis non placet sententia Montani & Iacotii, existimantium Montanum  
 ophthalmiam fieri etiam per essentiam sensim collecto excremento in mem et Iacotius  
 na adnata: nam ex Galeno, ex his excrementis sensim collectis fit a- errant.  
 tima & non tumor, qui ex eius sententia semper fluxionem sequitur.  
 ile etiam multi ophthalmiam à statu fieri sentiunt, hic enim bene pote-  
 ob tensionem dolorem generare, non autem ophthalmiam, quæ est in-  
 mmatio. Præterea sententia auctoris, quæ diuidit ophthalmiam in re- Auctoris  
 a, & non veram, sequenda non est: quia à quacumque causa fiat lapsus.  
 ophthalmia, est dictæ membranæ inflammatio. Altomarius ophthalmiam  
 orbis composuit ex intemperie, tumore, & soluta continuitate, ap- Altomari  
 clare solet. Decipitur tamen, quia tumor, si non lædit actionem, non erit decipitur.  
 orbis, sed symptoma, sicut & soluta unitas. Est ergo ophthalmia intem-  
 pes membranæ adnatæ, cum fluxione humoris, quæ si actionem vitiat  
 lectum generando in humore cristallino, erit causa morbi, aliter verò  
 orbis. Tumor & soluta unitas symptomata sunt, quæ ad intemperum  
 affluxu sequuntur, sicut & dolor, qui in hac parte membranosa, ac practicorū  
 inde multum sensili ita maximus aliquando esse solet, ut ad se cura- error circa  
 em attrahat, cum fiat causa argens affectum, nempe tumorem. missionem  
 Secundo auertentibus sanguinem fluentem.) Auctor et alii sanguinis.  
 effici in ophthalmia, si plethora sit in corpore, secant basilicam: si verò  
 pressio mēsum, secant venam pedis. Qui quantum errent intelligit,  
 ex Galen. dicit, reuulsionem faciendam esse ex parte, ad quam fluit An in prin  
 mor, & ex vena, quæ cum loco affecto se aperit. Secunda ergo erit ob cipio oph-  
 las causas in hoc affectu cephalica eiusdem partis, quæ citò & mul- talmia li-  
 na euacuat ex oculo affecto. Purgatione etiam auctor in principio re- ceat pur-  
 alit, sequutus fortasse Gale. qui 13. metho. cap. 11. phlegmonem oculi in- gare.  
 mentem sola purgatione vno die se curasse scribit. Hoc poterimus refel-  
 eo quod humor in ophthalmia non turgēt, tum quia in principio in-  
 mationis, non solum reuellere, sed ex parte affecta debemus euac-  
 are, quod non poterit præstare medicamentum purgans. Aliqui re-  
 ndent verum esse in ophthalmia solum in principio sanguinem esse mit-  
 dum, aliquando tamen, cū vires non sufficiunt ad eam euacuatio-  
 n, posse nos purgare, cū purgatio minores postulet vires, quàm san-  
 nis missio, atque hoc considerando Gal. 13. metho. faciendo id, quod po-  
 & purgasse. Alii satisfaciunt, contendentes etiam in principio ophthal-  
 e semper esse secandam venam, neque id violasse Gal. 13. method. nam  
 non purgauit in tumore præter naturam, sed in phlegmone oculi, hoc  
 ardore, id enim existimant intelligere Galenum per phlegmonem.  
 rum sententia nobis non placet, quia non semper in principio ophthal-  
 e debemus sanguinem mittere, licet enim aliquando purgare, ut si  
 h. fiat



fiat ophthalmia à bile, de qua loquitur Gal. 13 method. tunc enim purgatione utimur, quæ ex venis euacuantes bilem, reuellimus à loco affecto.

**Obiectio.** Dices est inflammatio, debemus ergo ex parte euacuare? Respondeo, hanc inflammationem esse exiguam, & ex humore tenui factam, qui citò exhalat, ac proinde nõ egere euacuatione, quæ fit per sanguinis missionem, verum est posse sanguinem mittere, si sanguis sit prauus. Obicies iterum, humor est firmatus, debet ergo prius concoqui, & postea euacuari: respondeo, hoc intelligendum esse in morbis venarum, & non in aliis.

**Repellentibus.** Tertio repellentibus. In principio ophthalmiæ cum humor extra-  
**in prin** venas fluxerit, opus est ipsum ex ea parte euacuare, non calidis, quia at-  
**capio oph-** trahent humorem, sed repellentibus, quæ adstringentia sunt. Delibera-  
**talmiæ.** re autem debemus de his inter alia naturam partis considerantes: hæc enim cum sit membrana, ac proinde multum sensibilis, non feret medicamenta multum frigida, & adstringentia: quia ipsam contrahent, et exasperabunt. Applicabimus ergo oculis, & non naribus, ut male vult auctor, ea quæ moderate reperiuntur, qualia sunt rosa, & albumen oui contractum. Supra frontem tamen bene possumus, valide repellentibus

**Extergen-** uti, albumine oui cum aceto, bolo armeno, aut sanguine draconis. Præ-  
**tiæ** semper terea cum inflammatio sit in parte, quæ non tegitur cute dura & cras-  
**in ophthal-** sa, semper ex ipsa aliqua humoris portio refudat, & ideo cum repellentibus  
**miæ** sunt tibus digerentia semper miscere oportebit: huiusmodi sunt, collyrium album,  
**utilia.** Rhasis sine opio cum aqua rosacea, aut plantaginis. Applica au-  
**Quomodo** tem medicamenta oculis instillando ipsa, aut pannum lineum, vel tenuem  
**applican-** stupam madefac, & sic utere, dummodò non permittas ea exsiccari, aut  
**dum medi-** calefieri: instillamus, aut lineo panno utimur, quia pars non potest ferre  
**camentum** graua & ponderosa medicamenta, in qua re auctor errat simul cum alius, micam panis, aut pomum applicans: non sinimus ea exsiccari, quia adhærebit, & deinde extrahetur cum dolore, à quo augebitur affectus.

**Dolor** in non sinimus calefieri, ne attrahant. Dolor in hoc affectu ob reuerentiam,  
**ophthalmia.** aliquando ad se attrahit curationem, quo tempore utere opiatum medicamentis, collyrio albo rhasis, cum opio, aut oui albumine agitato cum decocto papaueris albi. Rarissime tamen contingit, ut ad hæc veniamus me-

**In aug-** dicamenta, quæ visum hebetant, quia raro talis contingit dolor. In aug-  
**mento.** mento morbi repellentia cum digerentibus misce his, ita tamen ut repellentium facultas vincat, quia fluxio augetur. Coque ergo mirrhas, aut rosas cum semine lini: aut fenugrecum cum aqua plantaginis, aut (quod est elegantissimum remedium) albumen oui, & aquam rosaceam cum paucis vino miscebis. In statu equaliter miscenda sunt digerentia & repellentia.

**In statu.** Quarto, apparantibus bilem. Bilem præparat, et purgat, quasi ophthalmia à sola bile oriatur, & non à sanguine optimo, melancholico etiam, aut pituitoso. Dices, est ne purgandum in hoc affectu? Respondeo, purgandum esse sine aliqua præparatione in principio, si ophthalmia à bile



fiat: at si ab humore crasso eueniat, apparentibus signis concoctionis arguimus ipsum.

Sexto reliquias materiae.) In declinatione cum nil fluat ad oculum, digerentibus solis euacuanda est materia. In declinatione.

Si antiqua fuerit ophthalmia.) In antiqua ophthalmia filo per collum traiectione. Antiqua  
in traiectione sub nuca vitur, de quo remedio hoc modo deliberabis. In ophthalmia.  
antiqua ophthalmia fluxio perseverat, hac reuelli debet euacuatione ali- Delibera-  
na: & cum sanguinis missio, purgatio, inedia, cucurbitulae, & aliae si- tio remedi-  
iles non prosunt: deueniendum ergo erit ad duo remedia, quorum unum

cauterium, & alterum filum per collum traiectione: & cum caute-

um multum dolorem inferat, & vlcus ex ipso relictum non ita facile

sit apertum seruari, proinde ad filum deuenimus: atque hac est qua-

ntis deliberatio. Quantitatem colligimus ex vlcere, quod magnum

non debet fieri: occasionem ex euacuationibus totius corporis precedentibus: modum vrendi ex loco affecto, qui cum sit oculus, ut ab eo reuella-

us, & euacuemus, parti contrariae, et proximae remedium applicamus,

alis est cervicis superior pars. Remedia in ophthalmia supradicta no-

significare visus fuit Hip. 6. aph. sent. 31. ubi sic scribit: dolores oculo- explicatur  
m, meri potio, aut balneum, aut fomentum, ut venae sectio, aut medi- aph. Hipp.  
mentum epotum soluit. Si non sit plethora, & dolor fiat a sanguine 31. lib. 6.

isso venas adnatæ membranæ replere, à vini potione soluitur: quia

um fundit humorem, & suo motu ipsum educit. quod idem 7. aphor.

n. 48. habet Galen. Si dolor à bile acri oriatur, dummodò absit pletho-

, balneum vile est, quia ab eo bilis acrimonia temperatur. Si ophthal-

ia sit in declinatione, cum ad partem affectam nil influat, fomento ca-

lo, quod humorem dissipat, uti oportebit: sicut venae sectione in princi-

o, & purgatione in principio, aut postea, ut supra docuimus.

## De imbecillo aspectu. CAP. XIX.

**O**culorum visus, ut aliarum partium operatio, tri-

pliciter leditur (autore Gal. cap. 80. artis medica-

lis) aut quia vix, aut quia vitiose, aut quia nullo mo-

do cernimus: de ultimis duobus in presentia non agimus, cū

illis in sequentibus capitibus, & aliis locis verba facturi si-

mus. De prima igitur læsione hoc loco sermonem institui-

mus, quæ est affectio oculorum, qua minus æger videt. Cu-

us variae sunt causæ externæ, & internæ iuxta illud carmen:

*Allia, vina, venus, puluis, ventus, faba, fumus,*

*Ista nocent oculis, sed vigile magis.*

Ex his, aut aliis sit hic affectus, aut per consensum totius,

in hectica, aut aliarum partium, de quibus suis locis, vel

bulis primariò affectis. Quorum omnium causæ, & notæ Nota.

h 2

far



# DE CURAND. MORB.

satis ex ægri dictis, & per se patebunt.

*Curatio.*

Quando vitium proprium est in oculo ab humore largiori, curatur quinque generibus remediorum: primo, victu tenui exsiccante, dum modo sit cibus facilis concoctu, ob-

*Victus.*

ferueturque ordo traditus a Gal. in lib. de alimentorum facultatibus, & de sanitate tuenda, circa ordinē, horam, quantitatem, & qualitatem ciborum. A cibo comedenda sunt, quæ vapores prohibent ad caput ferri, vt panis tostus, coriander tostus: aut conditus, caro cydoniorum, vel ipsa cydonia tosta, aut pyra, addendo parum sacchari, & seminis fœniculi, hoc enim oculos roborat, vt in serpentibus, & buf-

*Vis vaporum.*

fonibus experientia demonstrat. Rapæ si bene concoquantur, sua proprietate visum roborant. Viperarum carnes bene apparatus similiter aciem oculorum confirmant. Eius præparatio cap. de elephantia si demonstratur. Auis pica, & hepar hirci tota substantia corroborant aspectum. Similiter & lentium frequens vsus, si ab humiditate nascatur imbeci-

*Noxia oculis.*

litas. Quæ vero huic affectui maxime nocent, sunt cruditas, coitus immodicus, & somnus diurnus.

*Præparatio.*

Secundo, apparantibus materiam, primò melle rosato colato, & oximelite. S. cum aquis aut decocto fœniculi, hyssopi, saluix, & similibus. Secundo syrupo de hyssopo, de stachade, oximelle compos. cum decocto, aut aquis superius dictis, & similibus.

*Purgatio.*

Tertio, materiam concoctam vacuantibus, primùm pilulis ex Hiera. S. elephanginis, mastichinis, agarico trochiscato, aut Hiera. S. Secundo pilulis de agarico, sine quibus esse nolo, & lucis. m. Vltimò si opus fuerit valentibus pilulis cochis, aut fœtidis. Dosis omnium horum medicamentorum ex dictis primo capite, & ex doctrina Mes. & Nicolai in eorum antidotariis est satis cognita.

*Auersio.*

Quartò auertentibus ad infernas partes, aut posteriores, vt clyteribus, glandibus, ligaturis brachiorum, & crurum frictionibus, fomento, & lotionē ex decocto rerum capitalium, multo pexu versus occipitium reuerſi, capitis, apophlegmatismis, errhinis, cauterio post aures aut in coronali commissura, vel filo collo affixo, de quo dictum est in fine 16. cap.

*Roboratio, & resolutio.*

Quintò, roborantibus partem affectam, & resoluentibus reliquias materiæ: vt nuce muscata quotidie sumpta visus recuperatur: myrobalani quoque cepuix, si duæ bis in hebdomada, aut ter sumantur, visum reficiunt. Item præstant acorus conditus, theriaca magna, mithridatum, diamuscus, &



pliris arcoticon, si multis diebus in quantitate 3. j. vsque *Acuentia*  
 3. ij. sumat eger. Hoc quoque auxilium valide visum cor- *visum.*  
 roborat: ℞. succi fœniculi depurati 3. vj. succi rutæ depurati  
 3. iij. mellis 3. j. sacchari 3. 8. foliorum auri num. iij. misce, &  
 per duos, aut tres dies æstatis insolentur omnia, facta sæpe  
 permutatione ab vno vase in aliud, vt omne excrementum  
 excrucietur. Eandem, & maiorem habet vim hæc aqua oculis  
 sæpe adnota: ℞. chelidonie fœniculi, rutæ, fileris montani,  
 euphragiæ, verbenæ, rosarum rubrarum an. lib. 8. pulueris  
 gariophyllorum, & piperis an. 3. ij. ex his fiat aqua per distil-  
 lationem instrumento vitreo & igne pauco. Puluis auis pi-  
 æ, si oculis admoueat, ipsos vehementer iuuat. Idem præ-  
 paratur succus, aut puluis hepatis hircini assi: cui si addas pa-  
 rum pulueris gariophyllorum, & piperis erit efficacior. Hoc  
 medicamentum visum maxime confirmat: ℞. tuthiæ Ale-  
 xandrinæ quinquies incensæ, & extinctæ vrina puerorum,  
 iterum toties incensæ & extinctæ aqua rosarum 3. 8. bal-  
 sami optimi 3. iij. vini albi odoriferi 3. j. misce. Serpentes ne-  
 morales abscissis capitibus, & caudis, si coquantur vino al-  
 bo, & fœniculo, donec caro ab ossibus separetur, visum mi-  
 nis modis tuentur. Hoc medicamentum est omnium in hac *Medicamē*  
 re nobilissimum: ℞. fileris montani, maioranæ, euphragiæ, *tū nobile.*  
 rutæ, chelidonie fœniculi, an. 3. iij. zinziberis, spicæ, piperis  
 longi, gariophyllorum, tuthiæ incensæ & post restinctæ, vt  
 diximus sarcocollæ nutritæ lacte asinæ, ligni aloes an. 3. i. fel-  
 is vnius anguillæ, & vnius accipitris, & vnius hirci monta-  
 ni, si possimus nancisci, balsami 3. 8. mellis rosati colati 3. iij.  
 Omnia simul mixta, & redacta in puluerem, quæ possunt  
 edigi, vase vitreo, bene obturato insolentur in æstate per  
 3. dies, & in hyeme sub stercore quolibet die bis, vel ter agi-  
 tetur illud vas, postea conseruetur liquor vase vitreo, qui o-  
 culis admotus sæpe visum corroborat, & auget etiam. In se-  
 culis tantam vim habet hoc medicamentum, vt aliquibus  
 visum sit nullum medicamentum huic simile, aut par hæcte-  
 nus extitisse, quorum summam veritatem ego felicissimo  
 successu sæpe expertus sum.

## De imbecillo aspectu. CAP. XVII.

## Scholium.



Culorum visus.) Confusè certè procedit auctor in hoc cap.  
 quod intelliges, si legas cap. 2. de cau. symp. vbi inquirat Galen.  
 causas læsæ visionis. Si ergo rectè voluerimus curare, hoc mo-




## DE CVRAND. MORB.

**Practico-  
rū error.** do procedendum erit. Imbecillus aspectus est symptoma, morbus ad quem sequitur, aut est intemperies, aut morbus in instrumentariis, aut communis, qui soluta veritas dicitur: morbo intellecto contrariis ipsum curabimus. Præterea quæ multi ex practiciis scribunt de medicamentis tota substantia corroborantibus aspectum, qualia sunt anis pica, hepar hirci, rapa, & similia, falsa sunt, & ficticia: quia morbi actionem videndi hebetantes manifesti sunt, ac proinde contrariis medicamentis, etiam auferendi. Neque obiciat fœniculum. Hoc enim caliditate sua digerendo humiditatem conferre: quæ eadem ratione opus erit curare aspectum, de quo loquitur auctor in hoc capite, & similibus omittere aurū, hirci hepar, tuthiam incensam & extinctam in urina pueri, & alias compositiones ab ipso propositas, cum aliqua inutilia, & multa simplicia vnus facultatis contineant, quod maximum vitium est.

## De curatione albuginis oculorum.

### CAPVT XVIII.

**Diuisio.**  lbuginum oculorum duæ sunt differentiæ, quædam enim in summa corneæ superficie consistunt, & Græcis nephelia, atque vlæ, Latinis verò nubeculæ, caliginelque & tenues albugines nominantur: quæ verò in interiori parte sunt, & vt Paulus ait, alterius radices egerunt, hæ leucomata Græcis, Latinis albugines crassæ dicuntur.

**Descriptio.** Vtraque autem, cicatrices sunt, ac maculæ in cornea post vulnere curationes relictæ: sic autem appellantur, quod oui albumen referant: omnes enim cicatrices (autore Aetio) in nigro oculo candidæ videntur: densata enim cornea tunica subiectus cæruleus color non amplius pellucet. Eminentes præcipuè albescunt, planæ minus canescunt, cauiore partem nigra oculorum quodammodo assimulantur. Hæc Aetius. Morbus intuenti patet non est igitur opus signis.

**Causæ.** Albugo in senibus est incurabilis, præsertim antiqua, in iuuenibus difficilis curatu, in pueris & infantibus facilior, semper tamen est similis curatio præcedenti, in victus ratione, vacatione auertentibus, præsertim per filum, de quo cap. 16. His omnibus iam factis, & admotis oculis medicamentis dictis in quinto genere auxiliorum præcedentis capituli, præter illa, frequens fœtus ex decocto seminis fœniculi, fœnugræci, camomillæ, rutæ & raparum est utilis, & necessarius: post quem potentius medicamenta poterunt albuginem dissipare, & omnino abstergere. Mel, & eius aqua bene eam tollit, similiter & aqua distillationis ex rhodomelle. Pulvis sacchari candi habet eandem vim, & maiorem, si addas parum



in pulueris ossis sepiæ. Sequens aqua optima est in hoc, & in meo filio probata, qui natus erat octo menses: ℞. fœculi m. ij. rutæ chelidonæ an. m. j. mellis optimi ℥. iij. fac-  
 mari candi, & rhodomellis an. ℥. j. ruthiæ Alexandrinæ, & *Aqua pro*  
 orcocollæ nutritæ an. ℥. ij. vini albi optimi cochlearia duo, *bata.*  
 Misce, & fiat ex his aqua per distillationem igne paucio.

## De suffusione. CAP. XIX.

**Q**Uod Latinis suffusio sonat, hoc Græcis hypochyma, *Definitio.*  
 & hypochysis, barbaris verò cataracta dicitur, & nihil aliud est, quàm frigidi, crassi, & lenti humoris, & glaciei instar cōgelati inter ceratoidē tunicam, id est, cor-  
 neam & crytalloidem, seu maius humorem tenuem effusio.  
 Causæ iam dictæ sunt, nempe humores crassi per nimias cru-  
 ditates iuxta pupillam inter corneam, & crytalloidem acer-  
 mati: præter hæc etiam violentus vomitus, & ictus, & ventri-  
 culi affectiones. Notæ ab Aetio hæc referuntur. Inchoantē *Signa.*  
 suffusione pusilli culices, & caliginosa quædam corpuscula  
 insidue oculis occurfare solēt quibusdam veluti lanarum fi-  
 amenta, & telæ araneorum, quibusdam circa lucernas cir-  
 culi offeruntur: quæ cum apparere incipiunt, pupilla minus  
 accurate spectantibus interdum pura videtur, interdum co-  
 lorem pelagi præ se ferre. Sed incrementum ægritudine acci-  
 dentia quoque increbescunt, quæ ubi ad summum peruene-  
 rint ægri excæcantur, & pupilla ad candidum colorem sine  
 ullo penitus splendore mutatur. Quamuis in variis suffusio-  
 nibus varij colores conspici soleant: quædam enim aeris co-  
 lorem, quædam vitri imitatur, quædam subalbescit, quædam  
 ad cæruleum vergit, quædam glaucescit, quædam insanabi-  
 lis est: hæc Aetius. Porro tunc cognoscitur, num sanabilis sit  
 suffusio, quoties altero oculo clauso pupilla eius oculi, in quo  
 est suffusio, & clarior apparet, & dilatatur, vt docet Galen. 4.  
 de morbo & symptomate, cap. 2. Si culpa neutrius oculi ac-  
 cidat suffusio, in utroq; oculo, & non in altero tantum, id fit,  
 & per interualla quoque, & prius aliquid in ventriculo præ- *Curatio.*  
 sentitur.

Suffusio curatur quinque remediorum generibus, quem-  
 admodum imbecilla visio, & albugo, sed valentioribus. Quæ  
 absoluta est, & confirmata, accuratur: eget tamē viro docto,  
 & probato: si verò absoluta nondum fuerit, curatur primò  
 victu calido, & sicco (quia materia est vaporosa, & aquosa)  
 de quo diximus cap. 16. Sed si aer conueniens desit, vt in hye- *Victus.*  
 me, arte oportet moliri, igne, scilicet, & suffitu. Abstinencia



# DE CVRAND. MORB.

quoque, & ieiunium huic morbo diuturno plurimum est salubre. Cœna sit lenis, si semel comedisse his non sufficit, vino, iusculis, & pituitosis alimentis minimè vtendum est: semper enim sunt eligenda calida & sicca.

*Preparatio, & vacuatio.* Secundo & tertio concòquentibus materiam aquosam, & vacuantibus per ea, quæ diximus cap. 10. & alia similia, sed toties est coquenda materia, & vacuanda, donec in totū sit affectus curatus, non solum semel, sed bis, ter, quater.

*Auersio.* Quarto, auertentibus, vt acris clysteribus, balanis, frictionibus, totibus partium extremarum, & aliis omnibus, de quibus dictum est satis, cap. 16.

*Resolutio.* Quinto, resoluentibus, & dissipantibus reliquias materie primo, interius sumptis, vt 3. j. theriacæ magnæ, aut mithridati, aut ij. 3. diamanulæ dulcis multis diebus cum syrupo, aut aqua capitali sumptis tempore capiendi somni, vt cum sibi vapore eorum vis rapiatur in cerebrum. Si sæpe accipiantur 3. ij. confectiois Hanc Mesp. cap. de imbecillitate visus valenter & optimè dissipabitur materia. Admouenda sunt oculis aliqua præter dicta duobus superioribus capitibus, quæ possint resoluerè, & tergere maculâ, albuginè & suffusionem non confirmatam: semper tamen optima præcedat corporis euacuatio, alias fieret attractio vaporis, & aquæ ad oculos.

*Tergentia.* Inter ea quæ potenter omnem albuginem, & suffusionem non confirmatam tergunt, est sagapenum mixtum aqua fœniculi, & aqua mellis, & saccharo concreto. Idem præstat pulvis capiti hirundinum, si cum aqua destillationis vrinæ puerorum, & fœniculi oculis sæpe admoneatur, post hæc valentiora conferunt, vt sunt genera feilis: sed prius oportet experiri ante dicta, & aqua destillationis corticum fabarum. Hæc

*Aqua efficacissima.* quoque aqua est optima, & efficacissima, ℥. vini albi 3. ij. succi fœniculi sine sedimento 3. ij. camphoræ 3. j. tuthiæ Alexandrinæ 3. j. ʒ. zinziberis 3. ʒ. mellis 3. iij, omnia simul in vase æneo ix. diebus in ymbra conferuentur, postea per filtrum fiat distillatio, cuius aquæ duę guttæ mane, & sero oculis instillantur: vltimò verò, & cum alia non sufficiant, sunt admouenda fella, prius mitiora, videlicet piscium, suum, agnorū, gallinarum, & perdicum: deinde acriora, vt accipieris, falconum, & aquilæ. Vltimò verò est admouendum fel viperæ: sed quia est venenosum, eo non esse vtendum censeo, sed in eius vsu oportet os plenum esse aqua, & theriaca magna, ne aliquid venenosum, in ventriculum, aut thoracem descendat: fel tamen tauri, & apri est viperæ tutius & satis potens.

De



LIBER PRIMVS. 61  
De suffusione. CAP. XIX.  
Scholium.

**Q**UOD Latinis suffusio.) Suffusio non est morbus in via, ut Quid suffusio? voluit Vega: quia nullam obstruit cavitatem. Sed ex Gale-  
no est morbus in numero addito: est enim in oculo additus hu-  
mor ad eius actionem non necessarius, imò eam impediens. Hic humor,  
concretus in humore aquæo continetur, prohibens quo minus species rerū  
clarum ad humorem crystallinum perveniant. Vel quod verius appa-  
ret, est ipsemet humor aquæus concretus ex alimento crasso, à quo nutri-  
tur. Causa istius morbi, est affluxus crassi humoris, qui vel à capite pro-  
venit, præsertim si imbecillitatem habuerit nativam à frigidityte sola, suffusionis.  
ut cum humiditate coniuncta, pendentem: vel à toto corpore, cum ob præ-  
dictam rationem humor crassus augetur. Solet curari suffusio, si in-  
veniat (quia inveterata solam aciem postulat) considerantes fluxionis cau-  
sam, si à capite fluat humor, eius intemperiem corrigemus, euacuato prius  
humore purganti medicamento: si à toto corpore fluat, sanguinem mitte-  
mus, ob sanguinem prauum, & deinde purgabimus, & ultimo ad To-  
pica deveniemus, quæ sensim digerant humorem in oculo coarctatum: qua-  
t sunt decoctum feniuli in vino albo, aqua etiam chelidonii, aut feni-  
culi, aut ruta, cum iusticia & similia. Hæc curatio communiter solet exer-  
eri. Si tamen voluerimus rem penitus considerare, intelligemus, hanc  
non esse optimam curationem, quia suffusio incipiens, ut experientia lon-  
ge docere tibi poterit, nunquam dictis medicamentis curatur, quia hu-  
mor sub membranis inclusus ea contemnit. Melius ergo erit omittere su-  
per dictam curationem: quæ impedit perfectam humoris concretionem,  
hoc nomine veram curationem: quæ exercebitur, si statim viamur, ex-  
temperatibus animalium, eorundem cerebris, & alio victu incrassante,  
humor concreascit, & durior fiat: & hac ratione possit acui, à pupillæ  
regione in oculi angulum mutari, atque hæc est curatio eius suffusionis,  
quæ proprius est affectus.

Causa suf-  
fusionis.

Refutatur  
prædicta  
curatio.

De dolore aurium. CAP. XX.

**A**URES perinde, ac aliæ quoque partes nostri corpo-  
ris dolore infestantur, & vehementi, plurimo enim sit ex lib.  
sensu pollent. Dolent autem nonnunquam propter de sympto.  
causas externas, cuiusmodi sunt refrigeratio in peregrina-  
tione à ventis frigidis proveniens: interdum propter intro-  
missum humorem in balneis aquarum frigidarum, aut infi-  
ni aliqua qualitate præditarum. Oritur etiam & ex cau-  
sa calida, à quacunque occasione accadat, ut sole, igne, ven-  
to, balneis, atque aliis id genus. Præterea & ex ictu, vulnere,  
contusione, acri aliquo medicamento, aut vermi in aurem in-  
gres

Dolor quid  
sit ex lib.  
de sympto.  
causis.

Causæ



# DE CVRAND. MORB.

*Nota.*

gresso. Internæ quoque causæ multæ sunt, vt intemperies aliqua, aut nuda, aut cum humoris affluxu, inflammatio, flatulentus spiritus, vlcus, ac vermes intra aures geniti. Signa causarum externarum ex ægri sermonibus colligi possunt.

Internarum verò notas sic exquires: si nuda fuerit intemperies, nulla adest grauitas, sed si calida fuerit, ardor, & maius acumen doloris: si frigida, obtusior quodammodo dolor est, & frigus sentitur. Idem de reliquis est iudicandum. Si verò præter qualitatem humor quoque infestat, præter iam dicta grauitas inest, ac pondus quoddam. Omni autem intemperiei, seu nuda fuerit, seu cum humore, hoc est commune, vt à similibus lædatur, iuuetur autē moderato contrariorum vsu. Si sit inflammatio, adest febris, grauitas, pulsatio, & dolor intolerabilis: si flatulentus spiritus, tentio, & tinnitus in aure sentiuntur: si vermes, interiorem motum quendam æger sentit, & in splēdido aliquo loco cerni possunt, vel ex iis aliquis foras prodit. Si vlcus, pus inde promanat.

*Curatio si ab intemperie calida.* Curatur quinque remediorum generibus, primò, victu tenui, & refrigerante: quare a carnibus & vino abstinendum est. Sit eorum cibus lac amygdalarum, cremor hordei, lentescichorea, lactuca, pyra, & mala cydonia assa, & potus aqua hordei.

*Reuulsio.* Secundo, auertentibus secta vena humerali eiusdem partis, si non fuerit plenitudo: vel media, existente plenitudine. Mittatur sanguis respondens dolori, & plenitudini semel, bis, & ter, si opus fuerit. Si atas, & vires non ferant sanguinis missionem per sectionem venæ, per cucurbitulas, & scarificationes inter scapulas sanguis extrahatur, fiatque debita reuulsio. Clysteres refrigerantes, & parum acres, cucurbitulæ, ligaturæ, & frictiones partium extremarum, & foci

*Purgatio.* quoque auerunt, & maxime conferunt. Vacuatio per medicamenta benigna similiter auertit, & est necessaria, vt per hoc, aut simile, ℞. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia 3. j. ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ 3. vj. syrupi violarum 3. j. aquæ buglossæ q. s. misce, & fiat potus. Si magis amat pilulas (quamuis vtilior sit potus) 3. j. pilularum de rhabarbaro fieri potest euacuatio, aut aliis pilulis, quæ bilem purgant.

*Topica repellentia.* Tertiò, repellētibus, vt in oxyrhodino, aut lacte humano, vel caprino, vel ouino. Hæc, & similia parum calida sunt auribus instillanda. Aut oleo de portulaca, aut violato, aut de nenuphare, aut de papauere. Oleum rosaceum & terebinthina simul mixta dolorem aurium tollunt, & repellunt, si  
ol



oleum rosaceum sit in magna quantitate, & terebinthina in parua. Sed si dolor fuerit vehemens (qui autore Galeno com. 8. primi præsagiorum facultates destruit) ad se trahit curationem, egétque narcoticis medicamentis, quæ non abscissa causa ipsum dolorem curant. De his Galenus 3. de compositione medicamentorum secundum locos satis abunde: inter alia tamen laudat mixturam ex lacte humano cum albumine oui, & pauco opio: laudat quoque Galenus castoreum cum opio æquo pondere vtrunque, aut si dupla portio castorei: vel vicissim, si maior & vehementior fuerit dolor. Hæc nixtura est etiam optima in hoc genere: ℞. micæ panis, aut farinæ hordei lib. ℞. sapa, quod sufficit, misce, & fiat cataplasma: adde castorei ℥. ℞. opij & croci an. ʒ. ij. Hæc tamen narcotica non sunt admouenda, nisi cum alia non possunt curare, aut in maximis doloribus aliis non conferentibus.

*Symptomatis curatio.*

*Curatio.*

Quartò, dissipantibus, & resoluentibus reliquias materiarum, ut oleo lumbricorum, camomillæ, amygdalarum dulcium, sesamino, terebinthina sola, & decocto camomillæ, fœnugræci, & seminis lini, althææ, & similibus.

*Resolutio.*

Quintò, frigidis sanantibus intemperiem calidam in auribus relictam, qualia sunt oxyrhodinum, & alia dicta tertio genere, & oleum rosaceum cum mucagine seminis psyllij.

*Alteratio.*

Si inflammatio in suppurationem terminetur (quod per doloris, & febris remissionem post augmentum cognoscitur) pus per incisionem instrumento ferreo factâ extrahendum est, aut vocibus, & sternutamentis, aut medicamentis parum acerbis, si non appareat pars suppurata: deinde abstergentibus, & mundantibus, & postremo glutinantibus, & exsiccantibus curabitur. In his tamen consule chirurgum doctum.

Dolor ab intemperie frigida, præcedenti debita vacuatione: si fuerit cum materia, curabitur oleo camomillæ, nardino, ex lilio, laurino, rutaceo, & costino, cape tostum etiam curat illum dolorem. Succus rutæ cum sanguine anguillæ statim mitigat omnem aurium dolorem. Succus roris marini cum oleo rosaceo, & sapone Gallico vetustissimos aurium dolores curat: adeps pulmonis vulpis auribus admotus, est optimum præsidium in dolore aurium. Idem præstat spolum serpentis decoctum oleo, aut succo conuenienti calido, aut frigido habita ratione causæ: pili Naqueræ facultate prædicti sunt à tota substantia curandi omnem aurium dolorem.

*Si à frigore sit.*

*Topica sedantia dolorem.*

*Pili Naqueræ.*

De



## Scholium.

Dolor au-  
ris.

Vres perinde.) Dolor auris symptoma est. Morbus ad quem sequitur, est soluta unitas, aut manifesta, quæ fit ab icthū, cōtusione, & aliis, aut occulta, quæ ab intemperie calida, vel frigida, aut à re distendente provenit.

Curatur quinque remediorum.) In hoc capite relictis aliis causis solum curat auctor dolorem à phlegmone ortum, vbi significare voluit phlegmonem sola caliditate dolorem generare, cum reuera tēsonem in ea considerare debuisset.

Quæ vena  
secunda.  
Purgatio.

Secundò, auertentibus.) Semper secunda est cephalica, ob causam multoties repetitā. Quòd si in venis sit cacochimia, purgabis etiam non cassia, & rhabbaro, quæ clementer id efficiunt, neque eorum vis multum se diffundit: sed aliis fortioribus, diapruni, electuario de succo rosarum, & similibus.

Topica.

Tertio, repellentibus.) Cum repellentibus misce acetum, vt penetrat, neque acetum lædet, si partem consideremus, quæ sicca cum sit, acris medicamenta sustinet. Oleo ergo rosaceo, & pauco aceto vteris: Omiste autem terebinthinam, quæ ab autore proponitur: quia præter caliditatem, impedit penetrationem medicamenti. Aduerte tamen hæcenus non curasse dolorem, sed eius causam, nempe phlegmonem. Tunc autem eum curabimus, cum neglecta phlegmone, solius symptomaticis habebimus rationem. Si ergo dolor vrget, stuporem inducenti medicamento vteris, quale hoc est: ℞. olei rosarum ℥. j. opii ḡ. iiii. aceti parum vt penetrat. Qua in parte omiste medicamentum ex mica panis, & sapa constructum, quoniam quæ ipsum componunt, opii vim infringent, neque etiam parti affectæ cataplasma applicatur, quæ in parte interiori recodita est.

Rondole-  
tius & au-  
tor de pilis  
Naquere,  
Et or labi-  
um.

Quæ Rondoletius scribit de cocteis, de medulla cruris porci saliti, & auctor de pilis Naquere, & aliis tota substantia sedantibus dolorem, omittantur, ac si non essent scripta: quia causam doloris cognoscimus, & ideo remediis manifesta qualitate operantibus curabitur.

Quintò frigidis.) Non est, quòd hæc frigida applicemus, quia si intemperies ex humore calido orta fuit, dissipato humore non remanebit.

## De sanguinis è naribus profluui.

## CAPVT XXI.

Cause.



Anguinis è naribus profluuij, quòd Græci hæmorrhagiam appellāt, multæ sunt causæ, partim internæ, partim etiam externæ, eas autem omnes breuitatis gratia iuxta Galeni placita s. method. medend. in tria capita reducimus: fluit enim sanguis à venis, arteriisve nasi, vel reseratis illarum orificiis, vel tunicis ruptis, diuisisque, vel



el sudoris instar transcolatus. Porro referatur arteriarum, renarumque ora, aut propter nimiam sanguinis multitudinem, quæ vel in toto sit corpore, vel capite, vel hepate, liene: vel vtero, præsertim si non probè fluant menses, vt ex Aph. 3. sectionis 5. deprehenditur: in caput enim tunc fertur, atque inde per nares vi erumpit: nonnunquam & citra plenitudinem propter vasorum imbecillitatē hoc ipsum accidit, aut ob acrem aliquam qualitatem in humoribus repertam. Diuiditur autem tunica ex vulneratione, cōtusione, ruptione, & erosione velut sudor transmittitur, aut tunica ipsa rarefacta, aut sanguine tenuiore facto, quod multis de causis contingit: aut quia plus æquo exercitationibus homo sit vsus, aut medicamentis calidis sanguinem tenuantibus, aut victus ratione, qui sanguinem biliosiores reddiderit. Notæ tum ex *Notæ* ægri sermonibus, tum ex eius intemperamento, aut antea facta vita colliguntur, quamobrem omnes eas recensere non erit opus, hoc tamen animaduertere oportet, cum à capite sanguis per nares profluit, in eo summā adesse grauitatem: cum ab hepate, in hypochondrio dextro: cum ab splene, in sinistro: cum a matrice, circa vmbilicum dolores, ac tensiones quasdam sentiri: cum per crism sanguinis profluuium fit, ea signa accidunt, quæ ab Hippocr. numerantur 3. Prognosticorum 33. prognostico, & a Galeno in libris de crifibus, atque alibi frequenter.

Sanguinis profluuium, à quacunque fuerit parte ortum si *Curatio* vires non deficient, non est sistendum, quia eo multis liberamur morbis, vt in libris de iudiciis Galenus testatur. Non criticum, verò quatuor remediorum generibus sistetur, primò, victu refrigerante, & astringente meatus, per quos sanguis fertur, vt aere arte parato per acetum, aquam rosarum, lactucæ, plantaginis, folia salicis, myrti lactucæ, nymphææ, & similia. Cibis ex succo acidulcium granatotū, limonū, *Victus*, aranciorum, acetosæ, & similia paratis, qui, si glutinosi fuerint, magis laudantur, quales sunt pedes, & capita vituli, arietis, hoedi, & aliorum animalium, amygdum, farina orizæ, caseus recēs pinguis, oua dura, quia paucum, & crassum sanguinem gignunt, præsertim albumina. Initio cum facultas nō est imbecilla, abstine a vino, carnibus, & ouis forbilibus, & tremulis, largiorem, & liquidiorē sanguinem generantibus. Potus sit aqua chalybeara, tandem animi & corporis quies est necessaria illis, & silentium.

Secundò, auertentibus, in quibus præcipua spes curationis versatur, vt crurum, & brachiorum dolorificis ligaturis, *Anerisid.* frict



# DE CVRAND. MORB.

frictionibus, fotibus ex aqua actu & potestate calente, cucurbitulis sine scarificatione hypochondrio appositis è regione naris, à qua sanguis effluit, & inter scapulas cum scarificatione, vbi vena scindi non possit ad virium defectum, aut æ-

*Sectio ve-* tatem puerilem, quamvis sanguinis missio per venæ sectio-  
*ne reuellit.* nem sit remedium efficacissimum ad reuocandum impetum floris in contrarium: secunda est vena media eiusdem partis, si sit totius plenitudo, vel humeralis, si non sit plenitudo: quod si ab vtraque nare fluat sanguis, vtraque media, aut humeralis simul scindatur. Post primam sanguinis missionem, si secunda fuerit necessaria, & tertia, semper secunda est humeralis eiusdem partis: aliquando tamen prius est facienda sanguinis missio, per sectionem venæ pedum, aut tibiæ, videlicet cum ex detentis mensibus, aut hæmorrhoidibus nascitur hoc profluuium, præsertim si natura tētauerit per infernas partes sanguinem vacuare, & hæc sit vniuersalis regula Hippocr. Gal. rationi & experientiæ accomodata. Duo quoque sunt, quæ maxime auertunt subito reuocando sanguinem, calorem, & spiritum, timor incussus, & aqua frigida iniecta in faciem ægri incogitantis: sed videndum ne sit æger maxime imbecillus, aut morbo comitiali obnoxius, quia hæc duo epilepsiam efficerēt, aut subito interficerent. Ligatura arcta testium, vel eorum ablutio aqua frigida, si subito fiat, potenter auertit.

*Admoni-*  
*tio.*

*Consilium.*

*Sumenda*  
*Et admo-*  
*uenda.*

*Repellen-*  
*tia.*

Tertio, sistentibus, & cohibentibus sanguinem, & glutinantibus sumptis, vel admotis, vt lactuca, portulaca, & aliis alimentis dictis initio huius cap. syrupo rosarum, cydoniorum, malorum granatorum, de acetositate limonum, & citri, præcipue vbi sanguis est biliosus, & nimis tenuis, & conserua rosarum, acetosæ & nenupharis ℞.ij. aut 3.j. trochiscorum de terra sigillata, aut de carabe cum 3.ij. aquæ plantaginis, aut portulacæ, aut similibus cohibent sanguinem. Naribus, collo, & fronti sunt admouenda quæ refrigerant, & impellunt inchoando à mitioribus ad valentiora. Prima mixtura bona est ex aqua rosarum, albumine oui, & aceto, cui si addas puluerem astringentem, vnientem, & obstruentem, erit efficacissima: qualis est ex rosis, balaustis, gallis, sumac, farina moletrinarum, mastiche, aloë, & myrrha, thure, & pilis leporis, & similibus.

Ex his omnibus, aut aliquibus accipe ij. 3. cum aqua, aut succo astringente, naribus impone, & collo, & fronti: sed si supra venas ruptas apponatur medicamentum, citius sistet sanguinem. Gypsum cum albumine oui, aut aqua, aut aceto

nar



naribus admotum videmus potenter sanguinem sistere.

Puluis limacum cum cruita tostorum sistit sanguinem, & *Sistentia*  
puluis ranarum combustarum. Aliqua sanguinem sistunt ita *sanguinem*  
tim a tota substantia, seu proprietate, vt stercus asininum, vr- *a tota sub-*  
tica, porrum, ocimum, seu basilicon. Hæc enim recentia, tri- *stantia.*  
ta, & in nares immissa, aut illorum succus possunt sangui-  
nem inhibere. Acetum potens cum gossypio, aut panno li-  
neo sæpe fronti, aut collo applicitum illico sanguinem sistit.

Quædam vetula Monspefulana sola menta naribus impo- *Vetula cu-*  
sita curauit sanguinis profluuium è naribus trium dierum. *ratrix.*

Cinis panni linei prius atramento tincti aceto mixtus, &  
cum gossypio naribus immissus cõsilio cuiusdam viri sapien-  
tis curauit hoc profluuium. Medicamentum ex puluere cor-  
ticum ouorum, & gypsi cum albumine oui, naribus & fronti  
adiunctum citò, reprimit sanguinem. Idem fit mixtura luti  
reperi in mola fabrorum, & bolo armeno cum albumine o-  
ui. Cauteria actu, & medicameta scarotica, quæ vrendo scha-  
ras, & crustam gignunt, potentissime sanguinem, & subito  
inhibent, sed si schara deciderit, maior & periculosior hæ-  
morrhagia fiet. Quare eis nõ est vtendum, nisi cum alia iam  
scripta, & similia non suffecerint. Quando salus deplorata *De narco-*  
est, & victa à morbo facultas omnium prædictorum, narco- *ticis.*  
ticis curatur, quæ sanguinem glaciant, & membra stupefa-  
ciunt, vt athanasia recenti, & requie magna a scrupulis duo-  
bus vsque ad scrupulos quatuor, & philonio antiquo Persi-  
co, aut Romano a drachma semis vsque ad 3. j. Hæc somnum  
conciliant, & hoc etiam modo fluorem sedant, sed hæc & si-  
milia narcotica partibus externis admota, tutiora sunt, vt  
cap. 5. de curatione phrenitidis docuimus.

Quartò, auferentibus causam hæmorrhagiæ, vt medica- *Purgatio.*  
mentis cholagogis, si biliosus fuerit sanguis, qualia sunt rha-  
barbarum, myrobalani citrinæ, & tamarindus, & hæc mixtu-  
ra vel similis. ℞. medullæ tamarindorum 3. vj. rhabarbari ele-  
cti & corticum myrobalanorum citrinarum an. 3. j. syrupi ro-  
farum 3. j. aquæ buglossæ, quod s. misce, & fiat potus. Si verò *Concoctio.*  
sanguis fuerit pituitosus, præcedenti coctione per rhodomel, *pituita.*  
& aquam basiliconis, plegmagogis curatur, vt ℞. diacatho- *Porio.*  
licon. 3. vj. corticum myrobalanorum Kebutorum & agarici  
trochiscati an. 3. j. syr. de mēta 3. j. aquæ buglossæ, quod s. mi-  
sce, & fiat potus.

## De sanguinis è naribus profluuium.

### CAPVT XXI.

Scol



## Scholium.

Quæ san-  
guinis ex-  
cretio sit  
toto genere  
præter na-  
turam.



Anguinis è naribus.) Sanguinis excretio ferè semper est toto genere præter naturam: Addit Galenus illam dictionem, ferè, propter eam sanguinis euacuationem, quæ singulis mensibus mulieribus per vterum contingit: hæc enim, cum non sequatur affectum morbosum, toto genere præter naturam non est. Aliarum partium sanguinis euacuationes toto genere præter naturam dicuntur, quia semper sequuntur aliquem morbum, unde male Fucius, & alii existimant, sanguinis euacuationem dici toto genere præter naturam, quia id quod euacuatur, est sanguis nobis familiaris, inde enim sequeretur euacuationem eam sanguinis, quæ per vterum singulis mensibus accidit, esse toto genere præter naturam, in ea enim optimus sanguis excerni solet. Sanguinis profluvium sit à causis externis, & internis: Externæ sunt duæ lib. 3. de caus. symp. cap. 2. vulnus, & ruptio: vulnus à re vulnerante, ruptio verò à tensione fit. Convulsio additur ab aliquibus, male tamen, cum hæc media ruptione, aut medio vulnere sanguinis profluvium efficiat. Causæ internæ sunt tres ex eodem Gal. Prima in facultate consistit, cum scilicet retentrix vasorum fuerit imbecilla, aut expultrix immodicè irritata: Secunda est sanguinis vitium, cum peccat quantitate, aut qualitate: Tertia causa est vasorum noxa: quæ tripliciter contingit, primò cum vas est tenue, secundò cum molle: & tertio cum durum, ab his enim tribus facile rumpuntur vasa. Obiicies Gal. lib. 5. methodi, alias Galenus à causas, nempe ruptionem, erosionem, & apertionem proposuisse: Respondet deo has causas sanguinis profluvii 5. lib. method. propositas, à superiori- bus non distinguere, quia ruptio à plethora fit, erosio à sanguine bilioso, apertio verò à vitio facultatis, aut à plethora. Quid de diapedesi? Respondet deo, non esse profluvium sanguinis, sed cruenti seri, ut 3. de caus. sympt. docet Galenus: vel si concedamus, diapedesim esse sanguinis euacuationem, ad anastomosim erit reducenda, quia ex lib. 5. method. cap. 2. diapedesis duobus modis fit, primò attenuato sanguine, & tunica vasorum rarefacta, secundò apertis orificiis exiguum vasorum. Ex dictis habemus causas profluvii sanguinis in genere, ac proinde eius, quod per nares fit, de quo præsentis capite.

Criticum Sanguinis profluvium.) Sanguinis per nares profluvium aut est profluvium criticum, aut symptomaticum. Criticum prævideri potest signis traditis ab Hippocr. 3. prog. sent. 33. Primum est dolor capitis, non quilibet, sed gravis, pulsans, & calidus, potissimum si perseveret circa frontem, & tempora com. 11. eiusdem lib. Secundum visio hebes à copia sanguinis impedito transitu spiritus animalis ad oculos: Tertium fulgoris motus circa oculos, ex splendore sanguinis proveniens: Quartum, tensio in hypochondrio sine dolore: Quintum colli dolor, & temporum gravitas: Sextum rubor oculorum, maxillarum, & narum: Septimum lachryma oculorum:

quor



torum signorum rationem lib. 3. criseon habemus explicatam. Symptoma  
 aticum profluvium cognoscitur ex eo, quod non soluit morbum, et præ-  
 dente cruditate eueniat. Criticum profluvium non est sistendum, quia  
 eo inutile expellitur, et fit proinde cum commodo animalis: symptoma-  
 um verò sistere oportet, quia fit à natura irritata, et cum incommodo.  
 Secundo, auertentibus.) Symptoma hoc, quod in excretis toto ge-  
 re præter naturam consistit, cum urgeat, ad se trahit curationem: quod curatur.  
 æstabis, à naribus auertentes sanguinem, primò sanguinis missio-  
 , quæ ex cephalica, basilica, aut si magis volumus reuellere, ex vena  
 dis fieri potest: cum enim nullus sit affectus particularis euacuationem  
 stulans, non seruamus rectitudinem, sed loci distantiam. Inde colliges, Lapsus at-  
 n recte auctorem in solo sanguinis profluvio, quod fit ex retentis men-  
 tis, aut hæmorrhoidibus, secare venam pedis. Neque hoc etiam in loco maduersio  
 imaduersio Hollerii, & Rondoletii locum habet, quæ præcipiunt in Rondoletii  
 ofluuiio sanguinis in vena exiguum sectionem faciendam esse, tunc e-  
 & Hollerii  
 tenuiori sanguinis portione euacuata exigua fieret reuulsio, quæ in non admit-  
 tione magna commodè præstabitur tota massa euacuata: nunquam tunc.  
 im fiet optima reuulsio sine sanguinis motu. Sanguine misso cucurbi-  
 lis utemur affixis hypochondrio, quod rectitudinem seruet cum nare, à læ supra  
 a fluit sanguis, ita ut si ex nare dextra fluat, supra iecur, si ex sini-  
 ra, supra lienem apponantur. Causam huius rei intelligemus ex dupli-  
 rectitudine: una enim est natura, seu loci, quam partes dextræ cum  
 xtris, & sinistræ cum sinistris admittunt, quæ natura dicitur, quia  
 m semper cum commodo animalis videmus naturam seruare, ita ut si  
 fecta sit pars dextra, per dextram, & si sinistra, per sinistram rem-  
 olestam euacuet. Altera rectitudo vasorum est, quæ non ex parte eo-  
 modo quo diximus, sed ex vena, quæ cum loco affecto se aperit, desumi-  
 r: qua ratione utranque basilicam cum iecore rectitudinem habere di-  
 mus. Ex his facile causam habebis, ob quam in profluvio sanguinis per  
 nres, hypochondrio supradicto cucurbitula applicanda sit, causa enim  
 duplex rectitudo, quæ tunc seruatur. Auertit etiam auctor sangui-  
 m frigida aqua inspersa in faciem ægri incogitantis, tu etiam ægroto  
 ente poteris uti hoc remedio, quia aqua sua frigidiitate operatur, &  
 n propter animi pathema.

Tertio, sistentibus.) Quæ de medicamentis toto temperamento Aduerte  
 nguinem sistentibus scribit, non laudo, quia morbus, ex quo profluit de medica-  
 nguis, ratione cognoscitur, et proinde curabitur remediis ratione etiam mentis to-  
 uestigatis. Si obicias Gal. qui lib. 9. simpl. cap. 8. scribit lapidem repe- to tempe-  
 ri contactu solo sanguinem cohibentem: respondeo illum lapidem siste- ramento  
 solum illud sanguinis profluvium, quod à causa nobis occulta excita- cientibus  
 m fuit, quale est illud, quod hæmorrhoids serpens inducit. sanguine.

Quarto, auferentibus.) Curato symptomate (nempe sanguinis Curatio  
 ofluuiio) quod urgebat, ad curandum morbum descendere oportet, con- morbi.



## D E C V R A N D. M O R B.

fiderantes an causa præsens sit, necne, quia si sit præsens, auferenda erit. Si ergo profluat sanguis ex anastomosi, emplastica, & adstringentia utilia erunt: si ex erosione magna, caustica, dummodo adstringentia sint, & possint applicari, conducent. Si magna non est, aqua plantaginis, & alia adstringentia sufficient, quæ simul humorem contemperabunt, & vlcus vniunt. Si vero à vulnere contingat prædicta sanguinis enacuatio, glutinantibus vlcus vtendum esse nemo dubitat.

### De rubedine faciei. C A P. X X I I.

*Causa.*

**R**ubedo faciei malum est nulli non manifestum, cum oculata fide cognoscatur. Quare superuacaneum erit in enarratione causarum, & signorum immorari, hoc tantum dixisse sat erit, prouenire eam affectionem sæpe à causis exterioribus, vt verbi gratia à sole, sæpissime verò propter calidam hepatis temperaturam immodicam, à qua sanguis biliosus fit, aptiorque est ad ascensum.

*Victus.*

Curatur primò faciei rubedo & macula, à sanguine bilioso nascens, victu refrigerante, de quo cap. v. de curatione phrenitidis.

*Remissio.*

Secundo, auertentibus, vt sanguinis missione per sectionem venæ mediæ, si fuerit plenitudo, aut humeralis dextræ, si desit ipsa plenitudo: euacuato sanguine secundum naturam, & plenitudinem ægri, frictionibus, ligaturis, & fotibus partium infernarum, & cucurbitulis cum scarificatione, & sine scarificatione, & filo collo traiecto, præcipue si antiqua, aut magna fuerit macula rubra.

*Preparatio.*

Tertio, parantibus humorem biliosum per medicamenta utilia, qualia sunt syrupus rosarum, oxysacchara. S. syrupus acetosus. S. syrupus de acetositate citri, & limonum, cum decocto, aut aqua endiuia, plantaginis, portulacæ, acetosæ, & similia.

*Purgatio.*

Quartò, vacuatione per medicamenta, qualia sunt rhabbarum, myrobalani citrinæ, cassia fistularis, & tamarindi, diaprunis solutium, & electuarium de succo rosarum, & similia: ʒ. medullæ tamarindorum, & medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ an. ʒ. iij. rhabbari electi infusi per noctem in aqua endiuia ʒ. j. diaprunis solutiui ʒ. iij. syrupi violarum ʒ. j. aquæ cichorei, quod. s. misce, & fiat potus.

*Alteratio.*

Quintò, refrigerantibus hepar, & prohibentibus bilis, & sanguinis calefactionem: vt electuario diatrion fantalorum, diarhodon. Abbatis, & diamargariton frigidi, cum aquis, aut syrupis refrigerantibus, de quibus tertio genere remediorum est dictum: aut cum infusione ʒ. j. rhabbari in lb. j. aquæ



aquæ endiuia, & ceroto santalato hepato admoto.

Sexto, vacuantibus clementer & resoluentibus materiam partis affectæ, & repellentibus, & inducentibus albedinem: vt lacte humano, caprino, aut ouino, vnguento citrino, lacte, seu emulsione quatuor seminum frigidorum mundatorum, & lacte seminis papaueris, & lacte virginali, quod fit ex *Lac virgineum*, duplici aqua satis tenui, & dissimili lacti, sed ambæ simul mixtæ substantiam lacti similem constituunt, modus faciendi hic est: ℥. aceti ex vino albissimo facti lb. ss. lithargyri dealbati 3. ss. misce, & postea per elychnium distilletur aqua ex vno vase in aliud. Item ℥. aquæ fontanæ lb. ss. salis armoniaci 3. iij. infunde per noctem, deinde distilletur per elychnium aqua ab vno vase in aliud: cōseruentur in vasis vitreis, & postea vtriusque aquæ guttis duabus mistis sæpe laua faciem: habet hoc lac magnam vim corrumpendi rubedinem, & albedinem inducendi faciei. Ego expertus sum sæpe, & hoc lacte curantur ij, qui facie leprosa videntur esse, & dicuntur à Gallis coporroscere. Aqua ex lacte caprino & albuminibus ouorum vitreo vase per distillationem facta, faciem terficiem candidam, & pulchram reddit. Eandem vim habet aqua limacum, seu cochlearum. Simili facultate valet aqua didiorem ex floribus typhæ. Aqua quæ fit ex vna gallina secta in exireddentes, guas partes, & 3. ij. sacchari, & 3. j. chrysocollæ (boracem vocant) faciei omnes maculas detergit. Idem fit mixtura pinguedinis renum hœdi, sacchari, & chrysocollæ noctu faciei admota, dummodò die sequenti facies lauatur aqua raphani, aut alia simili. Aqua aut succus qui ex raphano diuiso in partes, & melle, aut saccharo fit, potenter tergit, & tollit omnes faciei maculas. Hęc mixtura (quæ ab Hispanis muda dicitur & a rhase quinto ad Almanforem cap. 17. gumeta) faciem pulchriorem reddit, eiúsque labes detergit, si initio noctis apponatur, & mane aqua raphani aut alia lauatur. ℥. radicis lilij albi, raphani, amygdalarum amararum an. 3. j. mellis. q. s. misce, & fiat ad modum opiata, aut cōfectionis. Idem aut par efficere potest mixtura ex semine brasicæ, amygdalis amaris, & melle. Decoctum lupinorum aqua pluuiæ factum abstergit næuos faciei, interiora nucleorum persicorum, eorundemque oleum eandem habet facultatem. Aqua radicis lilij albi tergit faciei omnes maculas, & rugas illius tollit. Sanguis leporinus non dissimilis est superioribus facultate in delendis labeculis oris: similem vim affert in his aqua vitæ, qua vtuntur Germanæ in abluenda facie. Aqua per distillationem ex sanguine leporis & vino omnes faciei



# DE CVRAND. MORB.

*Historia.* maculas eruit, faciēque formosam efficit. Idem præstat aqua ex floribus fabarum, sterco columborum cum aceto, si in forma vnguenti factum fuerit, faciem emaculat, quo nobilis quædam fœmina septem diebus, curata fuit. Hæc aqua est optima, & ferme diuina ad maculas faciei; imò etiam ad vestigia exanthematū & papularum remouenda. ℥. florū fabarū p. iij. stercoꝝ columborū ℥. j. aceti ℥. iij. aque vitę ℥. iij. sanguinis leporis ad pondus omnium, misce, ex his fiat aqua instrumento vitreo, & igne paruo. Hæc aqua similiter omnes maculas faciei tergit, etiam illas, quæ dicuntur panis, & barro vulgo. ℥. florū fabarū ℔. s. terebinthinæ optimæ decies lothe ℥. j. aloes ℥. j. lactis caprarum ℔. j. misce, & fiat aqua igne paruo, & instrumēto vitreo: adde in fine extra ignē chrysocollæ ℥. ij. camphoræ ℥. j. sed postea sæpe moue vas.

*Aduerte.* Ad tergendos tumores paruos faciei, qui dicuntur Latinis vari, nobis barros, mane & vespere laua faciem mixtura ex albumine oui, & aqua rosarum benè mixtis, & post ad cutem defendēdam vnge eam adipe hœdi parato more Valentino.

Habet similem facultatem hæc aqua: ℥. centupedes, animalcula sunt, quæ dicuntur porcelletes a Valentinis nu. 12. sacchari candi ℥. ij. succi limonum ℔. j. ex his fiat aqua, quæ est optima in hoc. Hæc aqua similiter multam efficientiam habet, & experta est quemadmodū & aliæ: ℥. cucurbitulam vnā absq; cortice diuisam in partes minimas, xij. oua sine vitellis, & cum corticibus, boracis, sacchari cādi an. ℥. j. lactis capræ ℔. s. terebinthinæ abietis decies lotæ ℥. ij. ex his fiat aqua instrumento vitreo, & igne paruo. Inter alia maximè laudata medicamenta hanc aquam probabis in hac re. Oleum myrrhę est optimum & expertum ad omnes faciei maculas abstergendas, fit hoc modo: Accipe myrrham in puluerem redactam positam in vase terreo, & sæpe iuxta ignem moue illud vas, & à myrrha egredietur oleum cōpressa panno lineo, quemadmodum fit oleum amygdalarum, aut sesaminum. Hæc aqua faciem candidissimam, & pulcherrimam efficit sine detrimento vllō, & ea sæpe nobiles fœminæ Valentinae suas abluunt facies: ℥. sublimati pellucidi puluerizati ℥. s. aquæ fluuiatilis ℔. iij. in vase vitreo, & diu violento motu misce, & postea adde tria albumina ouorum benè prius agitata, ita vt ab eis spuma separetur, & deinde omnia sæpe moue, sicque post tres dies hac aqua vtere.

De dolore dentium, & de ipsis denigratis, & mobilibus. CAP. XXIII.

Den



**D**entium dolores partim à causis externis excitantur, partim ab internis. Externæ causæ sunt casus, percussio, & vsus rerū immoderate calidarum, vel frigidarum. Res etiam duras & contumaces vel mādissæ, vel dentibus diuissæ, & in vniuersum, id omne, quod eos, aut alterare potest, aut commouere. Internæ autem causæ erūt intemperies aliqua, vel nuda, vel cum humore, aut frigido, aut calido: abscessus porro existens vel in ipsismet dētibus, vel in neruo, qui illorum radici inseritur: vel in gingiuis, propter quas etiam contingit dentes dolere. Sæpè ab stomacho malū ascēdit propter sublato vapores: frequentissimè tamen prouenit propter humorū defluxum (quem rheuma appellant.) Imbibitus enim ille humor calidus nonnunquam, nonnunquā frigidus, sæpe etiam falsus, vel in gingiuis, vel in neruo, vel in ipsis dentibus dolores, & vehementes parit. Signa causarum externarum ex sermonibus ægri sunt petenda. Internarum verò hæc sunt, si intemperies fuerit nuda, quæ in capite fit, & per consensum dentes afficiat, non est dolor aggrauians, quemadmodum esse solet, vbi humor quoque infestat. Quod si fuerit calida intemperies, acutior est dolor, quam si frigida. Si abscessus fuerit, in dente ipso dolor sentitur, quo etiam auulso sedatur dolor. Si in neruo, in intimis partibus dolor dis cruciat. Si in gingiuis, circa ipsas erit, & præter id, tumor quoq; in ipsis cernitur. Si fuerit fluxus humoris à capite per frontē, & tempora sentiente egrotò, in mandibulas, & dentes humor descēdit, qui si sanguis fuerit pulsatio quædam adest, tumor, ac calor. Si bilis, acutus est dolor, ac pungens, ac vix tolerabilis. Si pituita, dolor est remissus, & candidant in orē partes omnes, & multa insuper est saliuæ copia. Si melancholia, liuent & gingiuæ, & dentes: nec dolor tantum infestat, & aliquando duræ apparent gingiuæ. Porro si à ventriculo dolor hic nascatur, quod fieri posse diximus, prius in ipso & dolor, & quædam conturbatio sentiuntur.

Dentium dolor, si sit à sola intemperie profectus, alterantibus contrariis absque euacuatione curatur, de quibus dicemus vbi de curatione doloris, qui fit à materia post illius euacuationem agendum erit. Cum est à sanguine, curatur primò victu refrigerante, & abstinencia vini, carniū, & ouorum, & omnium quæ nocent dentibus in omni fermè causa vt potus actu frigidus, præsertim à cibo, vel potu actu calido, lac, dactyli, & ventriculi cruditas.

Secundò, sanguinis missione per sectionem mediæ venæ eiusdem partis, si sit plenitudo in toto corpore, & dolor in

*Causæ.**Nota.**Curatio.**Victus.**Remissio.*



## DE CVRAND. MORB.

altera parte detinenda: si verò in omnibus, scindatur media dextra: cū verò non est plenitudo, humeralis est secanda ita, vt sanguinis copia respōdeat ex equo naturæ ægroti, & morbi.

*Preparatio.*

Tertiò, parantibus bilem, vt syrupo rosarum, endiuæ S. granatorum, & similibus cum aquis, aut decocto cichoreæ, endiuæ, lactucæ & portulacæ.

*Purgatio.*

Quartò, purgantibus bilem per medicamenta cholagoga, vt sunt rhabarbarum, myrobalani citreæ, cassiæ fistulæ, electuarium diaprunis solutiui, & de succo rosarum, pilulæ de rhabarbaro, & similia, quorum formulæ notæ sunt ex dictis præcipuè cap. j.

Quintò, refrigerantibus moderatè, quia frigidum omne inimicum est ossibus, ex Hippocr. v. aph. vt decocto hordei, lacte humano, aut ouino, aut caprino parum calidis, aut lacte amygdalarum dulcium, aut aqua rosarum, aut mirtyllorum, & similia.

*Alteratio.*

Si sit à bile dolor dentium, similis est fermè facienda medicina ei, quæ cephalalgia biliosæ adhibebatur. Si verò à pituita, curatio fermè talis erit, qualis pituitosæ cephalalgia, non secus fiet, si sit ab atra bile.

Si verò dolor dentium fuerit ab inflammatione gingivarum, curatur vt phrenitis, aut angina.

*A calore.*

Cū est dolor dentium à distillatione humoris à capite, obserua quæ dicenda sunt cap. xxv. quia hæc curatio similis est illi: in omni tamen quæ sit a causa calida per distillationem post vacuationem, & corroboracionem partis primo affectæ, a qua fluit humor, est optimū hoc auxilium: ℞. balaustiarum, rosarum, mirtyllorū, sanguinis draconis, mastichis, sandaracæ Arabū, hypocistidos, spodij an. ʒ. iij. fiat decoctum in lb. ij. aquæ ad dimidium, de quo percolato accipe ʒ. ix. cui adde syrupi rosarum ʒ. iij. rhodomellis & oxysaccharæ. S. an. ʒ. j. misce, & fiat mixtura, qua sæpe abluantur os, & dentes.

*A vermibus.*

Quando dolor est a vermibus, curatur rebus amaris, & acris quæ habēt facultatem interficiendi ipsos, qualia sunt absinthium, myrrha, aloë, lupini, colocynthis, & tithymalus. Ex his fiat decoctum, quo laua sæpe os. Suffitus ex semine porri, & iusquiami ipsos enecat, & etiam sensum omnem eripiendo dolorē curat: hoc tamen & alia narcotica (vt philonium) non sunt ad mouenda, nisi in maximis doloribus, & cū alia non iuuerint. Si dolor fiat a corruptione dentiū, ipsorum extractio est necessaria, & sufficiens cura, quæ ab experto viro fiet instrumentis ad hoc necessariis, & sine magno dolore. Aliqui eos medicamentis euellunt, sed cū maiori dolore,

quam



namuis tithymali lac cum farina mixtum dentes (vt quomundam est opinio) sine dolore extrahit. Quando dolor dentium est ab vlceribus prauis, & corrodentibus, consule chirurgum doctum, & interim vttere hoc liquore sepe: ℞. aquarum plantaginis, & foliorum oleastri an. ℥.iiij. syr. acetosi. S. ℥.j. ℞. rhodomellis ℥.j. aceti scillitici ℥.ss. pulueris aluminis vti 3.ij. misce. Vlcerata tamen oris parua, & superficiem carnis tantum occupantia ( quibus pueri & infantes laborant, dicuntur à Græcis apthæ, & ab Arabibus alcola ) curantur hoc auxilio: ℞. aquæ plantaginis ℥.iiij. aquarum lactucæ, & portulacæ an. ℥.j. ℞. rhodomellis, & syr. rosarum an. ℥.ij. syr. acetosi. S. 3. j. misce.

Vnum hoc est maximè animaduertendum, exuuias, seu fenectam serpentis omnem dentium dolorem curare à tota substantia, siue per suffitum, siue alio modo. Quare in dolore dentium infantium, cum oriuntur solent multi fieri tunc morbi, autore Hippocrat. 3. Aphorism. videlicet febris, ventris profluuium, & conuulsio: hæc enim curantur aut prohibentur fieri, si gingiua theriaca magna perfricetur, aut lacte canis, aut puluere cerebri leporis. Suffitus spoliij serpentis est in hoc optimus, & lotio facta illius decocto: hæc enim facilem efficiunt exitum dentium, & sine magno dolore. Si dentes liueant, aut nigricent, corpore euacuato sæpe perfricentur hoc puluere: ℞. salis ℥.j. pulueris ossis sepiæ & pumicis an. ℥.ss. misce, & fiat puluis: adde pulueris aluminis 3.ij. Aqua vitæ dentes cādidos reddit si sæpe ea os abluatur, excrementa pituitosa purgat, & gingiuas corroborat. Rhodomet etiam tergit dentes, & decoctum lupinorum, myrrhæ, & mastichis cum melle ad modum mulsæ est optimum. Puluis hic est optimum dentifricium ad mobiles dentes fulciendos, & gingiuarum carnem augendam: ℞. mastichis, sanguinis draconis, thuris, sandaracæ Arabum, ossium omnium myrobalanorum, nucum cupressi an. 3. iij. santalorum omnium, succi liquiritiæ an. 3. ij. seminis portulacæ, rosarū, corallij rubri præparati an. 3. j. ℞. foliorum myrthi, baccarum myrthi, psidiæ an. 3. j. spodij, cinnamomi, gariophyllorum, nucis muscatæ an. 3. ss. boli Armenici aqua rosarum abluti, amydi, gummi Arabici, dragaganti an. 3. j. grani tinctorum 3. v. lapidis hæmaticis 3. ss. misce, & fiat puluis, quo sæpe fricentur dentes. Vinum album decoctionis rerum astringentium, qualia sunt superius dicta, & similia, est præstantissimum dentifricium.



DE CVRAND. MORB.  
De dolore dentium, & de ipsis denigratis,  
& mobilibus. CAP. XXIII.

*Scholium.*

**D**entium dolores.) Dolor dentium symptoma est, quod sequitur solutam unitatem: hæc aut est occulta, aut manifesta: occulta ab intemperie calida, aut frigida, siue sit nuda, siue cum affluxu humoris, manifesta verò à rebus vlcus generantibus, ortum habet. Curabimus ergo hunc dolorem, si urgeat narcoticis medicamentis, si non urgeat, his, quæ causæ contraria sunt, omittentes ea medicamenta, quæ ab autore, & aliis toto temperamento hunc dolorem curantia describuntur, non enim extant.

De Angina. CAP. XXIIII.

*Descriptio.*

**S**ynanche, vel cynanche (quam Latini Anginā vocant) autore Gal. 4. de locis affectis, nil aliud est, quam spirandi difficultas, nullo existente vitio, neque in pectore, neque in pulmone: unde omnes affectus, qui gutturi accidunt, quos spirandi difficultas comitatur, Hippocrates, atque alij veteres anginæ nomine appellabāt, vt ex 3. Prognosticorum est colligere. Definitur etiam angina à Galeno 4. de ratione victus in morbis acutis, partium, quæ in gutture sunt, phlegmone. Cuius quatuor traduntur genera ab eodem 4. de locis affectis cap. 5. his verbis: Atque hæc sunt quatuor earum genera, primum vbi fauces inflammantur, fauces voco internum oris locum, ad quem simul conueniunt & gulæ, & gutturis partes extremæ: Alterum, cum neque reliquæ oris partes, neque etiam externarum partium vlla inflammata videtur: laborans tamen suffocationis periculum in gutture sentit: Tertium, vbi extrinsecus circa fauces inflammatio apparet: Quartum, vbi gutturis partes tum externæ, tum internæ similiter affectæ sunt: hæcenus Galenus. Quem locū si paulò inferius legas, quiutum etiam genus vidēbis positum ex vertebrarum cervicis luxatione. Recentiores medici inter quos Aetius & Paulus nominantur, sic de Anginæ differentiis disputant, vt multum interesse putent inter synanchen, & parasyanchen, & cynanchen, & paracynanchen: sic enim de illis sentit Paulus lib. 3. Inflammatis faucium interioribus musculis ea oris affectio fit, quæ Græcis synanche dicitur: exterioribus verò phlegmone infestatis, parasyanche. Pari quoque modo & in gutture, cuius inflammatis interioribus quidem musculis, cynanche: exterioribus verò, paracynanche nascitur. Quæ

tan



ne nominum curiosa distinctio, tametsi alias non videatur  
se improbanda, vt 4. aphor. commento 34. aperte: tamen à  
leno damnatur. 3. Prognost. comm. 18. & 4. de locis affect.  
p. 5. quippe (vt eo loco dicit Galenus) tunc primum homi-  
nes res ipsas neglexerunt, cum nimio studio nomina quære-  
re inciperent. Oritur hic morbus propter nimiam sanguinis *Causa.*  
aut copiam, aut efferuescentiam, qui in partes iam dictas im-  
petu ruit, & oborta inflammatione respirandi angustiam pa-  
t. Omnibus ferme, vt ait Paulus, eadem euenta sunt: verbi *Nota.*  
ratia non nisi recta ceruice, & difficulter spirant, dolor ad-  
t, & aliquando febris, ruborque semper tum vultus, tum col-  
atque tumor quoque. Quibusdam os perpetuo hiat, didu-  
mumque est, & deglutire omnino sic affecti non possunt, at-  
que dolore afficiuntur, idque præcipue, cum potus eis per  
ares effluit.

Angina, quia morbus acutissimus est statim initio ante *Curatio.*  
quam absoluta fiat, sex generibus remediorum curatur. Pri- *Victus.*  
mo, victu tenui & refrigerate prohibente phlegmonem auge-  
re: vt aere frigido, & inedia vnus vel duorum dierum, si vi-  
res poterunt ferre, vel saltem sola ptisana hordei, vel amylo  
sacte amygdalarum parato, aut lacte amygdalarum, aut iu-  
cep rosarum, aut succo malorum granatorum, aut cichorea  
botta, aut cucurbita saccharo codita, aut cydoneis tostis, aut  
myris: liquida tamè facilius deglutiuntur. Potus sit aqua hor-  
dei, vini enim, ouorum & carniū abstinētia est summe ne-  
cessaria: quia hæc sanguinem augent, & calefaciunt.

Secundo, auertētibz impetum sanguinis fluentis ad par- *Remissio.*  
tem affectam, & prohibentibus augmentum inflammatio-  
nis: vt sanguinis missione vsque ad animi deliquium, si vires  
meruerunt: eam tamen partiri est tutius. Secatur cephalica sta-  
tim propter necessitatem subitam euacuationis, & etiā ma-  
gister meus Falco doctor Monspeffulanus, vir magnę doctri-  
næ, & experientiæ id faciebat: & hæc aliquādo bis, & ter est  
recanda, dum fluit humor. Si vires, & ætas nō ferunt sangui-  
nis missionem per sectionem venæ, auersio fiet per cucurbi-  
culas cum scarificatione inter scapulas: cum verò sistit flu-  
o, vena sub lingua scinditur. Auertunt etiam purgationes *Cucurbi-*  
per clemētia medicamenta factæ, cum sanguis est depraua- *tula.*  
us qualitate aliqua, aut in alios humores est conuersus vt *Derivatio.*  
hoc medicamento, aut simili: ℞. medullæ cassiæ fistularis re- *Purgatio.*  
mens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. ss. rhabbari  
electi infusi per noctem in aqua endiuia ꝑ. iij. syr. violarum  
j. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus. Auer- *Auersio.*  
tim



## D E C V R A N D. M O R B.

timus quoque clysteribus clementioribus, cum est inflammatio à sanguine, aut bile: si verò fuerit à pituita, valentioribus. Reuellunt etiam cucurbitulæ scapulis affixæ. Frictiones & ligaturæ partium extremarum quoque auertunt, & fots carundem ex aqua calida.

*Repellen-  
tia sum-  
pta & ad-  
motæ.*

Tertiò, repellentibus materiam, & prohibentibus cynanchen augeri, qualia sunt frigida, & astringētia leuiter gargarizata, relictæ, donec incalescant in vltimis faucibus: hæc enim partem affectā roborādo, & vias, per quas materia fluit cōtrahendo optime inflāmationis huius incrementū prohibent. Quorum aliqua sunt simplicia, & alia composita, vt aqua, & succi rosarum, plantaginis, portulacæ, lactucæ, acetosæ, solani, granatorum, nucum viridium, mororum, & acetum. Ex his & similibus fieri possunt multa composita medicamenta: vt ℥. hordei decorticati, & lentium an. p. j. plantaginis, lactucæ, & solani an. m. j. fiat decoctum, de quo accipe lib. j. dianucū, & diamoron an. ʒ. ij. oxysaccharæ rosarum an. ʒ. j. s. misce, & fiat gargarisma hoc, & simile.

*Indicatio*

Absolutē repellētibus vti oportet initio: vbi verò habenda ratio etiam est materiæ, quæ fluxit simul, & fluentis, minus morbi scenda sunt medicamenta, dissipantia, & resoluētia, cum repellentibus, eorum tamen vis æqualis, aut inæqualis respondere debet proportioni materiæ delapsæ, & fluentis: vbi tamen intentio repellendi excedit dissipandi necessitatem. duplo, fiat hic, aut similis gargarismus: ℥. hordei decorticati p. j. lactucæ, & plantaginis an. m. ij. liquiritiæ rasæ ʒ. s. ficus numero x. camomillæ, p. s. fiat decoctum, de quo colo transfuso accipe ʒ. x. diamoron, & dianucum an. ʒ. ij. rhodomellis ʒ. ij. s. syrup. de liquiritia, & oxysacchara, S. an. ʒ. j. misce, & fiat gargarismus.

*Præparatio.*

Quartò, apparantibus pituitam, aut materiam mixtam, vt melle rosato colato, oxymelle. S. syr. de liquiritia, & de hyssopo cum decocto, aut aqua liquiritiæ, absinthij, & similibus.

*Purgatio.*

Quintò, vacuantibus materiam hanc per medicamenta mixta, vt est diaphænicon, pilulæ aggregatiuæ, & similia, aut hoc potu: ℥. diacatholicon. ʒ. s. agarici trochiscati ʒ. j. diaphænicon. ʒ. iij. rhodomellis ʒ. j. aque buglossæ, quod satis est, misce, & fiat potus.

*Resoluentia.*

Sextò, dissipantibus, & resoluentibus materiam externis, & internis: vt oleo camomillæ, amygdalarum dulcium, sesamino, de semine lini de lilio, laurino, rutæ, & similibus. Hoc medicamentum, seu cataplasma collo admotum potentissimè, & optime resoluit: ℥. farinæ scenogræci, seminis lini, &



ramomillę an. p. j. pulueris vnius nidi hirundinum: omnia  
 lul cum ſapa decoquantur, & in fine adde olei de lilio, &  
 thi an. 3. j. ſ. croci puluerizati 3. j. miſce, & fiat cataplaſ-  
 ſa. Filum laneum purpura tinctum, & quo poſtea vipera eſt  
 angulata, collo appenſum curat anginam. Cataplaſma ex  
 ſina hordei, & de ſucco apij potenter diſſipat, & reſoluit  
 materiam anginę: Expertum a multis, & à me eſt. Hic gar-  
 gariſmus diſſipat, & reſoluit materiam ſatis: ʒ. camomillę.  
 ſ. daſtylorum, vuarum paſſarũ ana. p. j. ſ. ſcœnugræci. p. ſ. ſi-  
 ſ. x. numero, fiat decoctum, de quo colo tranſuſo accipe 3.  
 j. diamorun ex maturis moris, & ſapę an. 3. j. rhodomellis,  
 roxymellis compoſ. an. 3. j. ſ. miſce, & fiat gargarifmus. *Ster Interna.*  
 ſ. canis album cribratum cum melle mixtum inſtar loch,  
 geglutiat, eſt præſtantiffimum remedium ad reſoluen-  
 dum. Eandem, aut ſimilem habet vim puluis hirundinum v-  
 ſum ſolum, aut cum melle. Hęc, & ſimilia in vigore, aut *A tempo-*  
 inclinatione tantum conferunt. Si verò angina nequeat re- *re.*  
 ſui, quę curandi ratio aptior eſt, ſed in ſuppuratione ten-  
 et, quod febris & doloris intenſio demonſtrant, ſuppuran- *Curatio*  
 bus curatur, vt gargarifmo, & emplaſtro ex rebus, quę pus *anginę*  
 gnunt: qualia ſunt ſcœnugræcum, ſemen lini, malua, radix *ſuppuran-*  
 theę, radix lilij, oleaginea & pinguis. Faſto pure abſcef- *de.*  
 ſ rumpatur inſtrumento ferreo, ſi videri poſſit, aut manſo  
 glutito pane duriori, vel digito altiùs immiſſo, aut cande-  
 caput tamen inclinetur, ne pus deſcēdat in thoracem. *De- Ruptio*  
 de vlcus eſt abſtergendum rhodomelle, & decocto hordei, *abſceſſus,*  
 ſimilibus: poſtremò verò eſt glutinandum maſtiche, thu-  
 , boloarmeno, ſanguine draconis, & ſimilibus.

## De Angina. CAP. XXIIII.

## Scholium.

**S**ynanche, vel Cynanche.) De nomine, differentiis, & cau Anginæ  
 ſis anginæ, lege auctorem: aduerte tamen Anginam eſſe mor- morbus eſt  
 bum acutum, ex quo imminet periculum, non ob partis, quę acutus.  
 ditur præſtantiam, ſed ob ſitum, quia huius partis tumor ſtatim re-  
 irationem lædit. Dices, cur in angina maiorem dolorem ſentimus de-  
 uientes res liquidas, & paucas, quàm ſolidas, & maiores? Reſpōdeo, Dubitatio.  
 prouenit ex maiori muſculorum contractione.

Secundò, auertentibus.) In Angina (quę eſt tumor præter na-  
 rā à quocunque humore procedens) duplex eſt morbus: vnus intempe- Morbi in  
 ſ, & alter tumoris magnitudo deglutitionem, & aeris ingreſſum im- Angina.  
 diens. Curabitur ea ratione, quā alij tumores in principio ſanguinis Curatio.

miß



## DE CVRAND. MORB.

missione, ut reuellamus, & ex cephalica, ut simul euacuemus ex par-  
affecta. Neque hoc in loco recte præcipit Vega, in Angina ex suppressi-  
mensibus secandam esse venam malleoli. cum enim Angina sit affectus  
urgens, ab ea incipienda est curatio, & deinde veniendum est ad mens-  
mouendos, adde remulsionem non esse faciendam ex loco, à quo fluit hu-  
mor, sed à loco, ad quem fluit. Quæ dicit auctor de purgatione, an ver-  
sint, inferius videbis.

**Repellen-  
tia.**

Tertio, repellentibus.) Humor extra venas effusus, faciens tu-  
morem præter naturam in faucibus, statim in principio, cum adhuc ser-  
uet suam naturam, euacuandus est, non calidis, quia hæc magis attra-  
hent, sed aliis remediis, quorum vnum fuit sanguinis missio, quæ eua-  
cuans venas partis causam dedit, ut humores iterum remigrarent ad ve-  
nas. Alterum verò est frigidum, & adstringens, interius gargarisatum.

**In Angi-  
na vsus  
extergen-  
tium.**

quod humores ad venas repellit. Aduerte tamen neque ad morbi decli-  
nationem semper esse miscendum extergens aliquod, sicut in omnibus in-  
flammationibus, quæ teguntur cute tenui, per quam semper aliquid re-  
sudat. In principio ergo vteris decocto hordei cum cortice, & aceto, & si-  
milibus. In augmenti principio, cum extergentibus, & adstringentibus  
pauca digerentia miscebis, decoquens cum hordeo paucum glycyrrizæ, ad-  
dito deinde aceto, aut diamorone. In incrementi secunda parte, quæ pri-  
mam partem flatus comprehendit, extergentia cum æquali quantitate  
digerentium, & adstringentium permiscenda sunt. Decoquemus ergo  
croci & myrrhæ an. ʒ. j. in lib. i. aquæ ad medietatis consumptionem, ei  
addentes diamoroni ʒ. vj. In declinatione verò solis vtere digerentibus,  
decocto glycyrrizæ, aut hyssopi, & similibus. Semper tamen aduerte, re-  
pellentia maiora, aut minora esse permiscenda pro affectu maiori aut  
minori.

**Purgatio.**

Quarto, apparantibus.) In Angina non est, quod vramur medi-  
camento purganti, eius enim nulla est occasio, nisi sit cacochimia, ex qua  
fluat humor ad partem affectam.

**Quæ ap-  
plicanda  
parti exter-  
næ.**

Sexto, dissipantibus & resoluentibus.) Parti externæ in collo  
non sunt applicanda repellentia sola, neque cum calidis mixta, ne humor  
ad interiora recurrens affectum augeat, & ideò medicamentum ex ni-  
do hirundinum compositum omittatur, quia etsi in eo sit stercus digerens,

**Medica-  
mentum  
ex nido hi-  
rundinum  
relicitur.**

est tamen terra repellens: neque tempus conteras in medicamenti collo  
appensis, quæ tota substantia operari creduntur, non enim reperiuntur  
ob causam multoties repetitam: vteris ergo externis calidis, quæ vim ha-  
bent leuiter digerendi, & attrahendi, oleo communi, aut camemellino,  
& lana succida. Atque hæc est curatio Anginæ, quæ resolutione ter-  
minatur: est enim altera illius, quæ coctione finitur suppurato humore,  
de qua lege auctorem.

### De coriza, catarrho, raucedine, & tussi.

CAP.



**O**rizæ, catarrhi, raucedinis, ac tussis eadem propè *Descriptio.*  
 est natura: omnes enim hæ affectiones fiunt ab hu-  
 more excrementoso a capite in subiectas partes de-  
 pendente: quiquidem humor, si in nares fuerit destillatus,  
 que eas aggrauet, coriza Græcis malum dicitur, Latinis  
 raucedo. Si verò humor fluat in os, palatum, & fauces catar- *Diuisio.*  
 rhus simpliciter appellatur: quæ sanè vox Latinis distillatio- *Grauedo*  
 nis sonat. Si verò idem humor descendens, in fauces, & gut *ad naves.*  
 & asperam arteriam cadat, & interiorẽ eius membra- *Catarrhus*  
 m asperiorẽ, atque inæqualem reddat, raucam tunc vo- *ad fauces.*  
 ni fieri necesse est, & morbus nascitur branchus Græcorũ *Raucedo*  
 nomine dictus, raucedo verò Latine. Ex his etiam collige- *ad asperã*  
 possumus, raucedinem esse catarrhum, non tamen graue- *arteriam.*  
 nem, quod Galenus 3. de symptomatum causis cap. II. & 2.  
 cognosticorum commentario 49. docet. Idem Paulus con-  
 stat 3. lib. cap. 28. & Aetius serm. 8. cap. 53. Quare decipi-  
 or doctissimus Brassauolus, credens catarrhum esse vocabu- *Brassauo-*  
 lum commune ad omnes defluxus humorum, quod barbari *lus.*  
 medici rheumati tribuunt, iuxta illud,

*Si fluit ad pectus, dicitur rheuma catarrhus.*

*Ad fauces branchus, ad naves dico corizam.*

Porro eius humoris, qui sic a capite descendit, causa est  
 rebrum, seu quod a frigore in frigidam intemperiem de-  
 ductum sit, seu quod ab æstu calefiat, atq; repleatur. Vinum *Causæ.*  
 quoque, si ultra modum haustum sit, caput replet, & balnea  
 lidiora, & largior perfusio capitis ex aqua calida, maximè  
 alias calidius caput existat, & cibus sanè, qui in ventre in-  
 ductus per inferiorem partem non excernitur in caput im-  
 metum facit: quod sic repletum in partes se inferiores eo mo-  
 do, quo dictum est, demittit excrementa. Atque hæ sunt ge-  
 nerales harum affectionum causæ, particulares verò multæ  
 sunt. Et coriza sanè nõ ob aliam causam videtur fieri, quàm  
 humoris descensum: Raucedo verò non ob hanc solam  
 causam, sed a vehementioris quãdoque atque altioris voci-  
 rationis conatu, & egelidi aeris, spiritusve ingressu. Tussis  
 autem multæ sunt causæ, quas Paulus Aegineta lib. 3. sic col-  
 ligit. Cæterum ex aliis quoque occasionibus tussis fit, sæpius  
 quidem ex distemperantia, quandoque calidiori, ceu in fe-  
 brilibus, nonnunquam frigidiori, quemadmodum in tempe-  
 ratibus Aquilonis, quæ aridior est plerunque. Quin & tuf-  
 s aliorum sæpenumero morborum symptoma est, morbi



# DE CVRAND. MORB.

scilicet lateralis, peripneumoniæ, inflammationis iocinoris phtisis, & aliorum similia.

*Notæ.*

Notæ hæ sunt, quicunque aliqua ex dictis affectionibus laborant, si à calore ea nascatur, hi circum partes affectas caloris nonnihil sentiunt, fluxio quædam acrium humorum ac tenuium cum per nares, tum maxime per os defluit. Rubor partes faciei nariumque inficit. Quibus contra ex frigore, partium circa caput, & frontem fit distentio, meatuumque, qui a percolandi adminiculo isthmoides vocantur, obduratio, ita, ut resonare vox deorsum per nares nequeat.

Longiore illis tempore permanent, & accidunt tusses, pituitæque excretiones, nunc quidem crudæ, nunc verò liquidæ, interdum virides. Nonnullis febris oboritur nihil eos iuvans, qui ab æstu inuaduntur: eos autem, qui ab algore, plurimum, cum ad concoctionem promoueat.

Quando tussis aliorum morborum symptoma est, ex aliis capitibus notæ sunt petendæ: omnis tamen distillatio siue ad nares, siue ad os & eius partes, est à materia calida, aut frigida, aut mixta ex iis, & utraq; cum causa effectrice simili, aut dissimili, ut cum materia est calida, à frigore comprimente distillans, aut frigida materia à calore liquante. Cum ambæ causæ sunt similes, eadem remedia requirunt, si verò causæ sint contrariæ, remedia postulant contraria, sed maior habenda est ratio urgentioris causæ, altera tamen non neglecta.

*Curatio distillationis à causa frigida.*

Distillatio à capite ad nares, aut os a materia frigida, à qua sæpius fit, & aere frigido facta sex remediorum generibus curatur: primò victu calfaciente moderatè, ea tamè, quæ caput offendunt, nocet, ut vinum, sinapis, allia, cæpe, coitus, & somnus diurnus, præsertim à cibo, & similia.

*Præparatio.*

Secundò, materiam frigidam apparantibus, ut rhodomelle, syr. de liquiritia, syr. capillorum veneris, de hyssopo, & oxymelle. S. cum aquis, aut decocto liquiritiæ, hyssopi, passularum, fœniculi, & similia: oportet tamen miscere quæ mo-

*Consilium.*

tum, & fluxum humoris impediunt, ut est syrupus rosarum, & decoctum coriandri: quamvis in materia calida frigidioribus uti oportet, ut est syrupus de papauere.

*Purgatio.*

Tertiò, purgantibus materiam pituitosam, ut agarico, turbit, pilulis de agarico, diaphænicon, electuario indo mai. pilulis cochiis, & similibus. Sed quia morbus hic aliquando est diuturnus, multis egens vacationibus, post primam his pilulis uti poterit: ℞. Agarici trochiscati ʒ. j. pilularum assaiaret & cochiarum an. ʒ. ss. optimi diagridij ḡ. xij. cum aqua stæchados, fiant pilulæ quindecim. Utatur his. Dosis erunt tres



res quaque hebdomada.

Quartò, auertentibus, vt ligaturis, frictionibus extremo- *Auerti-*  
rum, & fotibus, cucurbitulis in naribus, & scapulis, & clyste-  
ribus acribus, vacuatione per loca propinqua, videlicet per  
nares, si humor ad partes oris fluat, errhinis & sternutamē-  
tis clementioribus: de quibus capite de apoplexia. Si verò ad  
nares distillat humor per palatum, & os, facienda est vacua-  
tio reuulsoria, vt mastiche, aqua mellis cum puluere hyssopi,  
& aliis clementioribus apophlegmatismis. In diuturna & *Derivatio*  
assueta distillatione, præcipue à materia calida, filum cerui-  
ci traiectum est optimum remedium ad auertendum: de quo au-  
gustinus cap. 16. & 17. dictum est. Multi vtuntur, & bene ad reuel-  
endum, cauterio in futura coronali, aut post aures: per vlcus  
nim à cauterio factum materia diu, & salubriter euacuatur.

Quintò, sistentibus fluxum, vt mastiche deglutita, & thu- *Sistentia*  
re, spica, gummi iuniperi, succo liquiritiæ, & similibus: hoc *fluxum.*  
tamen genus auxiliorum magis confert distillationi, quæ fit  
materia calida mobili: hæc enim indiget incrassatione, vt *Admoni-*  
tione bolo armeno, saccharo rosato, syrupo rosarum, syr. de papa- *tio.*  
uere, & aliis etiam narcoticis, vt trochiscis de spodido, de ca-  
deabe, & de terra sigillata, ne fiat vlcus in naribus, aut in par-  
tibus oris, & aspera arteria, & tandem in thorace. Vltimò v-  
tendum est pilulis de cynoglossa Mes. cum alia non sufficiunt,  
& distillatio est maxima.

Sextò, corroborantibus caput, quæ est pars primò affecta, *Corroborã-*  
& à qua materia descendit, vt puluere ex coriandro, gario- *tia, & re-*  
phyllis, mastiche, & similibus, aut hoc sacculo: ℞. coriandri *soluentia.*  
præparati 3. iij. rosarum, mastichis, thuris, gariophyllorum *Externa,*  
anthos, stachados & macis, an. 3. j. fiat ex his sacculus ad ma- *& topica.*  
gnitudinē manus, qui capite rasō coronali commissuræ ad-  
moueat. Capitis lotio ex decocto rerum capitalium lau- *Interna.*  
datur in hoc genere. Diamusculus dulcis, theriaca magna, mi-  
thridatum, electuarium aromaticum rosatum, & similia cum  
aqua, decocto, aut syrupo capitali valenter corroborant ca-  
put, & dissipant materiam eius.

Distillatio, quæ fit à materia, & causa omni calida, sex e- *A causa*  
tiam remedium generibus curatur contrariis, vltimo ta- *calida.*  
men genere oportet aliquando curare vlcera narium, & oris,  
quæ solent succedere: in his tamen curandis consule doctum  
chirurgum.

Tussis, multas habet causas, vt diximus, aut fit à sola in- *Tussis*  
temperie, aut ab vlcere, vt in tabe: aut à tumore ventris, vt in *causa.*  
hydrope, aut à morbo laterali, aut inflammatione iecoris, aut  
à mat



# DE CURAND. MORB.

- Curatio* à materia frigida, quæ à capite distillat, à qua sæpe fieri so-  
*let.* Quare de curatione huius in præsentia agam. Huic sex  
*remediorum* generibus mederi possumus: primò, victu cal-  
*faciente,* & exsiccante, de quo dictum initio huius capituli: sal,  
*& acetum* maximè nocent huic, quia mouent tussim, quam-  
*uis cum melle,* aut saccharo sit vtile, & necessarium ad pur-  
*gandum* pectus, & attenuandam materiam crassam.
- Prepara-* Secundò, apparantibus materiam ad fluendum paratam,  
*tio.* crassam attenuantibus, & lentam incidentibus & tergenti-  
 bus, vt rhodomelle, oxymelite. S. syr. capillorū veneris, de li-  
 quiritia, de hyssopo, de prassio, & oxymelite cōpos. cum de-  
 cocto pectorali, simul & capitali.
- Purgatio.* Tertio, vacuantibus materiam hanc frigidam, pilulis de  
 agarico, cochiis, de benedicta, hiera cōposita, electuario in-  
 do maiori: sed quia hic affectus diuturnus aliquando est, &  
 eget post primam euacuationem aliis, vsus harū pilularum  
*Pilulæ.* est vtilis & necessarius: ℞. pilularum de hiera simplici, & co-  
 chiarum an. ʒ. ʒ. pilularum de Agarico ʒ. j. cum aqua hyssopi  
*Confectio.* fiāt pilulæ duodecim. Tres pro dosi qualibet hebdomada.  
 Si à pilulis alienus est, hoc medicamento vacuatio facienda  
 est: ℞. diacatholicon. ʒ. j. ʒ. diaphanicon, & electuarij indi-  
 maioris an. ʒ. ʒ. agarici trochiscati ʒ. ij. rhodomellis, quod sa-  
 tis est, misce, & fiat cōfectio. Dosis singulis hebdomadis à co-  
 chleario vno vsque ad duo.
- Auersio.* Quarto, auertentibus omnibus dictis superius hoc capi-  
 te, vbi de curatione distillationis ad nares, aut os agebamus  
 quarto genere remediorum.
- Eductio* Quintò, cōceptam pulmonibus materiam facilem ad ex-  
*materiae.* puendum reddentibus, in quo pars præcipua curationis cō-  
 sistit, vt eclegmate seu loch sano & experto, aut de pino, aut  
 de pulmone vulpis, aut electuario Diarisi, surupis pectora-  
*Loch.* libus, aut hoc loch: ℞. loch sani & experti, loch de cauli-  
 bus an. ʒ. j. pulueris Diarisi ʒ. ʒ. sacchari candi, & penidiarum  
 an. ʒ. j. succi liquiritiæ ʒ. ij. syr. de hyssopo quod satis est, mi-  
 sce, & fiat loch: adde ad corroborandum, pulmones, pulue-  
 ris pulmonis vulpis ʒ. ij. quo & aliis omnibus vtendum est  
 sæpe, & omni hora paulatim deglutiendo, vt ab vna via in  
*Topica.* aliam medicamentum possit per poros penetrare. In hoc ge-  
 nere confert multum foris admouere emplastrū filij Zacha-  
 riæ, & de meliloto an. æquales partes super alutā ad formam  
 & magnitudinem thoracis, vel bis in die hoc vnguento, il-  
 linere: ℞. olei sesamini, & amygdalarum dulcium, & de lilio  
 an. ʒ. j. mucilaginis scœnugræci ʒ. ʒ. croci puluerizati ʒ. j. cere, q. s.



misce, & fiat vnguentum.

Sexto, materiam reliquam resoluentibus, & digerentibus, *Resolutio.*  
suffitu sulphuris, & trochiscorum & aliorum, de quibus  
p. sequenti de asthma, & etiam omnibus auxiliis dictis  
octo genere remediorum distillationis, de quo superius.

## De coriza, catarrho, raucedine, & tussi.

### CAPVT XXIIII.

#### Scholium.

**C**orizæ catarrhi.) Catarrhos Græcis fluxio est Latinis, cum Catarrhos.  
a capite, ad subiecta membra excrementum descendit. Hæc flu

xio, ut auctor est Galen. 3. de caus. symp. cap. 4. aliquando habet  
proprium nomen, aliquando et caret. Proprium habet nomen ea, quæ ad Nomina  
res, os (quæ nomen generis seruat) fauces, gurgulionem, & ad oris eius.

indulas ferunt. Proprio caret nomine ea quæ sit ad ventriculum, &  
beram arteriam, quæ multorum malorum causa est: quia ex ventriculi  
actione, vitata eius concoctione, crudi humores generantur, ex quibus  
struções sine febre, & aliquando cum febre, apoplexiæ, & alia ce-

bri frigidi morbi oriri solent. Sicut ex ea distillatione, quæ asperam oc- Noxæ ex  
pat arteriam, aliquando asthma, cum excrementum crassum est, & distillatio-  
quando phthisis, si tenue & calidum sit. Distillatio symptoma est in ex- ne ad ven-

eius: Morbus, ad quem sequitur, aut est similis aut instrumenta- triculū, et  
us. Similis intemperies calida, aut frigida cerebri, diuerso tamen asperam  
modo hæ distillationem generant: nam calida intemperies attrahendo, arteriam.

ut fundendo humorem eam efficit. Frigida verò refrigerando cerebrum, Distillatio  
hac ratione multa coaceruando excrementa, aut ipsum comprimendo, quis affe-

modo, quo nos manibus spongiam. Morbus instrumentarius est reple- tus sit.  
venarum, & ventriculorum cerebri, quæ solet etiam fieri à toto cor-  
ore: hæc tamen repletio, exigua cum sit, neque carum, neque apople-

am, neque epilepsiam efficere potest. Signa pete ex auctore.  
Tussis etiam si in vniuersum fiat ab his, quæ intercipiunt respiratio-  
em, hæc tamen omnia ad quinque causas reducere possumus cum Ga-  
mo: Prima est humor distillans à capite. Secunda humor collectus in  
spera arteria, in pleuritide, & peripneumonia: Tertia compressio septi  
transuersi: Quarta magna asperitas faucium: Quinta intemperies fri-  
da inæqualis partium respiratori seruientium.

Secundo, materiam frigidam apparantibus.) Hinc discas quæ Tussis  
nale curant hi, qui tempora, hoc est doctrinam Auicennæ consequuti causæ.

unt: auctor enim iam secundo præparat humorem ad purgandum, non  
ollicitus de symptomate. Proinde eius curatione omissa, hac ratione cu- Curatio di-  
abis. Si distillatio, hoc est fluxio excrementi urgeat (quod continget, si stillationis  
ad ventriculum, asperam arteriam, aut partem principem firmetur)

k

tunc



# DE CVRAND. MORB.

tunc relicto morbo, ei prospiciendum est: primo sanguinem mittentes, cundo medicamentis per os assumptis, & capiti applicatis, fluxionem dantes, & ea sedata morbo prospicientes quæ omnia ea ratione, quæ cemus, præstabis.

**Sanguinis  
missio.**

Quarto, auertentibus) In distillatione facta ab intemperie frigida cerebri non audent practici venam secare, opus autem est, ut audent, potissimum in remedio adeo utili. Mittendus ergo sanguis est, reuellamus humorem ad partem fluentem, & simul ex cerebro aliquod excrementi euacuemus: quod commodè præstabis secta communia in brachio, quæ caput, & partes inferiores respicit. Auertes etiam modis ab auctore propositis: quod si diuturna sit distillatio, duo cauteria in singulo brachio vtiliter experieris.

**Sistentia  
fluxum.**

Quinto, sistentibus fluxum.) Siue humor à cerebro distillans causa calida proveniat, siue frigida, sistendus est statim, si urgeat. Quod præstabis ore tenentes medicamentum, quod incrasset humorem, eum ineptum ad fluxionem reddat, quale est hoc: ℞. mastichis ℥. ii. pinethri ℥. i. cum mucilagine dragagani, fiant trochisci ad magnitudinem lupini, quorum unum teneat in ore. Eo etiam tempore, quo æger dormi-

**Cerati ex  
thapsia  
duæ forme**

voluerit, assumat ℥. iii. electuarii de papauere cum paucis syrupo papaueris. Caput etiam, ut dolore attrahatur humor ad cutem, ceratum thapsia vtilissime apponetur, siue fiat in forma solida, siue in liquida. Solida forma paratur hoc modo: ℞. ceræ ℥. viii. cerebenthinæ q. s. misce ad ignem, donec ad emplastrum substantiam perueniant, in sine misce pulueris radices thapsiæ, si recens sit. ℥. iii. si inueterata ℥. iiii. cuius seris sufficientem accipe quantitatem, & super alutam extende ad formam mediæ cuculæ, quam bregmati rasò appone. Liquidum fiet ceratum forma unguenti, liquantes ℥. v. ceræ cum oleo, quoad formam unguenti accipiant, & deinde miscentes ℥. ii. pulueris ex thapsia. Quo unguente unges bregma, quo utendum est, quia melius, & citius vesiculas in cute excitat, quam ceratum solidum, quo multoties usus sum sine usu aliquo. Aduerte tamen, apparentibus vesiculis in cute, cessandum esse ab vngitione, ne ob dolorem fiat, attractio sanguinis, phlegmon. Quod si ceratum non potes efficere, sinapismum construes ea ratione, quæ docent Paulus & Aetius.

**Sacculus  
bregmati  
applican-  
dus.**

Sexto, corroborantibus caput.) In hac distillatione sedato symptomate, ad morbum deueniendum est, nempe ad intemperiem frigidam cerebri, quam auferre debemus, & simul excrementa cerebri frigida ducere, bregmati, ubi multæ sunt suturæ, hoc medicamentum applicantes: ℞. pul. rosarium & coriandri præparati ana. ℥. i. gummi iuniperi ℥. iii. salis tostii ℥. ii. gariophyllorum ℥. i. s. fiat omnium puluis, ex quo fiat sacculus, ad trianguli figuram. Et si in corpore sit pituitosa cacochymia, ea præparata purganda erit.

Distillatio, quæ fit à materia.) Si à causâ calida distillatio pro-



ueniat, sanguinem mittes, fluxionem inhibebis, assumptis per os: nō enim applicare oportet ceratum ex thapsia, ne augeamus intemperiem. Deinde curabis morbum, nempe intemperiem calidam, lauans caput aqua tepida, permiscens cum ea parum aceti, ut penetraret: & postea unge bregma oleo omphacino, rosaceo, aut alio quod frigidum sit.

Tussis multas habet causas. ) Tussis symptoma est in motu de- *Curatio*  
prauato facultatis expultricis: hæc à diuersis morbis ortum habet, ac tussis,  
proinde non vno modo, sed variis curanda erit. Si à distillatione oriatur,  
curabitur ea ratione, quæ docuimus. Si à secunda causa eueniat, medica-  
mentis attenuantibus, et incidentibus. Si à tertia, curare oportebit schir-  
rum, aut iecoris inflammationem, aut hydropem, si ex ea pendeat. Si tan-  
dem à quinta procedat causa, cohibita respiratione sedabitur.

## De Orthopnæa, Asthmate, Dyspnæa.

### CAPVT XXVI.



Ria sunt nomina apud Græcos, quæ eandem rem  
fermè significare videntur, videlicet dyspnæa,  
asthma, & orthopnæa, quæ omnia suspiriosos, &  
anhelosos significant, de quibus Celsus lib. 4. cap.  
4. abunde egit. Proprie a Græcis dicitur dyspnæa difficultas  
anhelitus modica, quamuis Paulus 3. lib. cap. 26. velit esse dif-  
ficultatem spiritus & animæ, & commune accidens alia plu-  
rima præter hæc comitās. Asthma Græcis est difficultas an-  
helitus vehementior, & cum eger non potest spirare sine an-  
helatione. Orthopnæa verò est, cum respirare non potest, nisi  
recta ceruice spiritus trahatur: sūt hæc affectiones (ut inquit  
Aerius) cum aut crassiorum & tenuium humorū multitudo *Causæ*  
pulmonis bronchia obstruxit, aut tumor quispiam abscessui  
similis in ipso consistit. Similiter autem difficiliter spirant,  
quibus aspera arteria multa distillatione madet, repletaque  
est. Ab aliis quoque fit causis, ut ab ulcere pulmonum: quæ om-  
nia sic docet distinguere Aet. Distillatio etiam sanis ex ma- *Notæ*  
nifesta causa repente accidit, in totum verò citra febrem co-  
mitantibus etiam propriis distillationis signis. Si verò tu-  
mor abscessui similis in pulmone fiat, necessariò febris sequi-  
tur, neque ita post inflammationem in pus conuersa, pus reiici-  
tur cum tussi. Qui autem proprie orthopnoici, & difficul-  
ter spirantes appellantur, in totum febrem non ferunt, gra-  
uitatis autem sensus eis contingit, neque quippiam purulen-  
tum per sputum reiectant. Cum igitur asthma fieri possit à *Curatio.*  
sanguine extra venas, eius curatio cap. 28. de sanguinis puto  
describetur, aut ab inflammatione pulmonum, de qua cap.  
27. de peripneumonia: aut ab ulcere pulmonū, de qua ca. 29.



de phitisi, aut à luxatis vertebrais spinæ, cuius curatio in reductione eius in proprium sitū consistit: aut fit à materia crassa pituitosa pulmones obstruente, & ab hac vltima causa fere semper pendet. Quare in præsentia de curatione eius agen-

*Curatio* à dum est: prius tamen oportet scire, an æger sit in ipsa accessione, an in quiete. Quia morbus hic, quemadmodum comitialis, & articularis, habet accessiones aliquando ordinatas, aliquando inordinatas. In ipsa accessione curatio fit per solas frictiones, ligaturas & cucurbitulas extremorum ad reuellendum, ne subito suffocetur æger, qui ceruice erecta vi-

*Sectio* re- gilet, & dormiat parum, & non in die, quies summe necessaria est. Quare tunc vacuatio per medicamenta purgantia, & gatio no- per sanguinis missionem maxime nocet, mouens humores, cent, nisi & augēs fluxum ad pulmones & tracheas arterias. Si tamen longa sit ipsa accessio fuerit magna, & longa, subitam suffocationem accessio. indicans, indiget vacuatione per clysteres acres, & per sanguinis missionem secta vena, aut per cucurbitulas inter scapulas. In tempore quietis curatur asthma pituitosum sex

*Curatio* remedium generibus: primò victu calido & sicco vt aere extra ac- estatis, aut arte parato, rore marino, saluia, stachade, & aliis cessionem. calidis medicamentis, vt cibo, pane scilicet furfuraceo, & salito, & bene fermentato: carnibus auium montanarum, & animalium concoctu faciliū, & non humidorum, assis, aut tostis, non neruosis, nec pinguibus: vt potu parco in pastu, & post pastum nullo, qui sit aqua cinnamomi, vel decoctionis anisi, vel seminis fœniculi: eorum tamen fitis vehemens est ob calorem cordis refrigeratum minus quam res exigit. Tunc enim laua os ægri lacte caprino, vel ex amygdalis dulcibus expresso sine saccharo, aut aqua frigida, aut mucagine seminis psyllij, vel cydoniorum. Sed quia potus comprimit septam transversum ventriculo distento & difficultatem respirandi auget, quoniam ventriculus concoquit cibum, donec ab eo egressus sit potus, maxime nocet.

*Prepara-* Secundo apparantibus materiam collectā in cerebro pul- tio. mone, vel aliis partibus, transmittentibus, qualia sunt calfacientia, incidentia, tenuantia, & tergentia: initio clementiora, ne resolutio tenui crassum ineptum expuitioni relinquantur.

*Syrupi cle-* tur. Cōueniunt primò syrupus de liquiritia, syr. capillorum mentes. Vene. oximel. S. cū decocto pectorali, aut aquis capillorum Syrupi ve Ve. & liquiritiæ. Secundo post primam vacuationem concedunt syrupus de hyslopo, de prassio, & oxymel compositum res. cum aquis, ut decocto hyslopi, prassij, fœniculi, dactylorū, & vuarum passerarum. Tertiò post secundam vacuationē prosunt ad



ad concoquendum syr. de quinque radicibus cum oxymelle *rehe-*  
 cōpos. & scillitico cum decocto aut aquis prafij, hyssopi, ra- *tissimi syr.*  
 dicis lilij sicca: quia succus eius valenter purgat in par-  
 quantitate: inter has tamen coctiones & purgationes inter-  
 iaceant dies aliquot, vt natura quiescat. Et quia hic affectus  
 chronicus est, necessaria medicamentorum omnium ferme  
 frequens permutatio, ne natura longa consuetudine iis simi-  
 lis fiat, ac proinde reluctetur, aut ab eis nihil patiatur. Præ- *Consilium.*  
 terea ob occultam quandam proprietatem, seu familiarem  
 quasi amicitiam quædam magis amat nostrum corpus, & a-  
 lia refugit propter inimicitiam, quod sola experientia de-  
 monstrare potest.

Tertiò, purgātibus materiam, si multa est in pulmonibus, *Purgatio.*  
 aut etiam non multa in toto. Nam si pauca fuerit in pulmo-  
 nibus vt per sputa expelli possit, nō opus est purgatione: pri- *Prima.*  
 ma ergo purgatio fiet per 3.j. pilularum de agarico, aut per  
 potum 3.j. diacatholiconis, & 3.j. agarici trochiscati cum de-  
 cocto pectorali, aut aqua capillorum Veneris. Secunda pur- *Secunda.*  
 gatio fiet per has pilulas: ℞. pilularum cochiarum, & de aga-  
 rico an. 3. s. diagridij. ̄. iij. cum aqua hyssopi fiant pilulæ viij.  
 & aurentur si opus fuerit: vel fiat per hunc potum. ℞. dia-  
 phaniconis 3. iij. electuarij indi maioris 3. ij. agarici trochi-  
 scati 3. j. diacatholiconis 3. v. rhodomellis. 3. j. decocti pecto-  
 ralis. q. s. misce, & fiat potus. Tertiò, si opus fuerit, fiat purga- *Tertia.*  
 tio per 3. j. pilularum cochiarum, aut foetidarum, aut de sar-  
 cocolla, vel per hūc potum: ℞. electuarij indi maioris 3. iij.  
 agarici trochiscati, & turbit electi an. 3. s. rhodomel. 3. j. a-  
 quæ hyssopi. q. s. misce, & fiat potus. Si opus fuerit, quia mor-  
 bus est chronicus, vtatur his pilulis semel vel bis in mense:  
 ℞. pilularum de hiera compos. & de agarico an. 3. j. s. agari- *Pilule*  
 ci optimi, & turbit electi an. 3. j. salis gemmæ 3. j. zingib. 3. s. *laudantur*  
 cum aqua hyssopi fiat massa, cuius dosi quinque pilulæ pon- *in hoc mor-*  
 deris 3. ij. Si vero non possit pilulas transglutire, quæ magis bo-  
 huic morbo conueniunt, quam purgātia liquida, quia prio-  
 ra diutius in ventriculo detinentur, ideoque magis & a par-  
 tibus longinquioribus, melius purgant: hac mixtura fiet pur-  
 gatio ad vsum: ℞. diacatholiconis 3. ij. electuarij indi maio-  
 ris 3. j. agarici trochiscati 3. ij. turbit gummosi 3. j. syrupi ca-  
 pillorum Ve. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis cochlearium  
 vnum.

Quartò auertentibus auxiliis, vt iis quæ per nares & pa- *Derivatio.*  
 latum purgant, errhinis scilicet apophlegmatismis, & aliis  
 multis, de quibus cap. 25. præcedenti, quales sunt clysteres,



# DE CVRAND. MORB.

& glandes acres, & cauteria in capite.

- Promouen** Quinto, promouentibus sputa, hoc est, incindentibus, di-  
**ria sputum** latantibus asperam arteriam, & roborantibus pulmones: ho-  
**et roboran** rum quædam sunt simplicia, vt capillus Ve. liquiritia, vuæ  
**ria pulmo-** passæ, crocus, ficus, iuiubæ, hyssopus, scabiosa, aristolochia,  
**nes.** folia & semen vrticæ, enula campana, pulmo omnis, præci-  
**Syrupi.** puè tamen vulpis, dulcia omnia, falsa, amara, & acria simul.  
**Loch.** Ex his fiunt decocta, syrapi, loch, & electuarium, vt syrapi  
**Electua-** capillorum Ve. de liquiritia, oximel. S. syrapius de hyssopo,  
**ria,** de prasio, oximel compos. oximel scilliticum, loch sanum &  
 expertum, loch caulium, loch de pulmone vulpis, loch de pi-  
 no, electuarium Diarisi, hæc & similia detineantur in ore, &  
 sensum transglutiantur, vt à gula in asperam arteriam per po-  
 ros penetrare possint, aut saltem eorum vis. Hæc mixtura,  
 seu confectio est optima in hoc genere quinto: ℞. succi li-  
 quiritiæ, hyssopi, cillæ, radicis lilij an. 3. viij. capillorum Ve.  
 siccorum 3. viij. seminis vrticæ, cordumeni, piperis, aristolo-  
 chie rotundæ, nasturtij, baurac, carui, amygdalarum amara-  
**Confectio.** rum an. 3. v. fiat ex his cum melle sufficienti confectio, cuius  
 cochlearium vnum dosis sit mane & vespere, cum vnciis, tri-  
 bus sequentis liquoris: ℞. caricarum, dactylorum an. num. x.  
**Liquor.** radicis liquiritiæ, hyssopi, calamenti, prasi, capillorum Ve.  
 an. 3. j. radicis apij, fœniculi, & seminis eorum, seminis vrti-  
 cæ, & fœnugræci an. 3. s. fiat decoctum in ℥. xij. aquæ, donec  
 tertia pars consumatur, percoletur, & cum ℥. duabus mel-  
 lis fiat instar mulsæ. Hæc aqua in hoc genere remediorum  
 est vtilissima: ℞. pulmonum hirci, castrati in paruas partes  
 diuisi num. iij. pulmonem vnum vulpis, si nancisci possumus,  
 capilli Ve. m. vj. hyssopi, m. ij. radicis iari, seu serpentariæ  
 contuse 3. ij. liquiritiæ recentis, si licet aliunde parare 3. iij.  
 fiat ex his aqua instrumento vitreo, & igne pauciori: eius dosis  
 3. iij. cum paucio saccharo cando, aut saccharo communi,  
**Aqua stil** Aqua ligni guaiaci, seu indi cum medicamentis pectorali-  
**latina.** bus facta, est etiam optima, & experta a me in hoc genere  
 remediorum. Ius galli gallinacei veteris medicamentis pe-  
 ctoralibus factum est ab omnibus laudatum, & expertum.  
**Ius galli** Thoraci sunt admouenda medicamenta, quæ in hoc genere  
**veteris.** conferant, vt facilius & citius medicamenta pectoralia spu-  
 tum promoueant, vt ℞. olei amygdalarum dulcium, & fesa-  
 mini an. 3. j. olei de lilio 3. s. croci puluerizati 3. j. axungie gal-  
 line 3. ij. cere, quod satis est, misce, & fiat vnguentum, vel: ℞.  
**Topica.** emplastri filij Zachariæ, & de meliloto an. æquas partes, ex-  
 tendantur super alutam ad formam & magnitudinem pectoris.

Sexto



Sextò, reliquias materiæ siccantibus, & dissipantibus, vt *Resolutio.*  
 lithridato, theriaca magna, diamusco dulci, & amaro, pli-  
 uris arcoticon, & suffitu cum thure, & sulphure: quamuis sul-  
 phur interiùs cum melle, aut ouo, aut syrupo pectorali con-  
 rat huic morbo. Ab aliquibus laudatur suffitus ex Arseni- *Aduerte.*  
 o, ego tamen non laudo, etsi sit aquis cardiacis castigatum.  
 nonnulli in vltimo genere præbent pilulas ex myrrha, co-  
 o, aristolochia, casia lignea, croco & arsenico: ego semper  
 nammo hæc medicamēta, & his similia, quanquā arsenici fit  
 parū. Cauteriū in furcula superiori thoracis in hoc genere *Cauteriū*  
 remedium a multis doctissimis medicis maximè laudatur. *laus.*

## De Orthopnæa, Asthmate, Dispnoæa.

### CAPVT XXVI.

#### Scholium.



Ria sunt nomina apud Græcos.) Dispnoæa nomen *Dispnoæa*  
 Græcum Latine sonat vitium in respiratione, aut læsio re- *nomen com*  
 spirationis: qua ratione sub se cōprehendit respirationē fre- *mune.*  
 quentē, celere, interceptā, anhelosā, & rectā. In hac com-  
 muni significatione loquitur Gal. 1. de diffi. respi. c. 2. Et cum varia sint  
 læsiones respirationis illæ, quæ exiguæ sunt, appellantur aliquando à  
 Galen. nomine generis, difficiles respirationes: & cum exigua læsio variè  
 possit comparari, varia etiam habebit nomina. Si enim cōparemus quā-  
 libet noxam respirationis cum abolita respiratione, omnes læsiones respi-  
 rationis erunt exiguæ, & ideo seruabunt nomē generis, qua ratione Gal.  
 4. de loc. affec. cap. 7. aphnæam, hoc est abolitā respirationem separauit  
 à dispnoæa: omnes alias respirationū læsiones illi, quæ maxima est, oppo-  
 nens. Si verò omittentes ablatam respirationē, vnā læsam, respirationis  
 læsionem cum alia cōparemus: illa, quæ exigua est, hoc est densa, di-  
 cetur difficilis respiratio, nomen generis huic tantum differētiæ accom-  
 modantes, & hac ratione loquitur Gal. 3. de diffi. resp. c. ult. & 6. epyd. Tres diffe-  
 par. 3. comm. 9. Ex quibus omnibus hanc vltimam respirationis læsionem rentig dif-  
 assumentes, tanquam vnā differentiam, tres statuemus in vnuer- *ficilis respi*  
 sum difficilis respirationis differentias. Prima erit illa paulò ante di- *rationis.*  
 cta, quæ seruat nomen generis, & nil aliud est, quàm densa respiratio.  
 Secunda dicitur asthma, & tertia orthopnæa. Asthma est densa respira- *Asthma*  
 tio sine febre, qualis apparet in his, qui diu accurrerunt: quæ vt colligi- *quid.*  
 tur ex septimo de compos. secundum locos capite sexto. duo habet sym-  
 ptomata coniuncta, vnum est arctatio thoracis sensibilis, secundum est  
 orthopnæa, id est recta spiratio. Vnde apparet error practico- *sepa-*  
 rantium ab asthma orthopnæam. Dices, nonne tu hanc tertiam dif- *Practico-*  
 ficilis respirationis differentiam ab aliis distinctam statuisti? Responde- *rum error.*




## DE CVRAND. MORB.

verum hoc esse, quia aliquando orthopnœa reperitur sine asthmate in suppuratis, peripneumonicis, et aliis, in quibus recta spiratio, cum non sit sine febre, neque fiat ab obstructione, sed compressione, non dicitur asthma. Difficilis respiratio causam habet humore frigidū, parum obstruente: asthma tuberculum, & eundem humorem, sed obstruentem magis arterias asperas, quæ in pulmone habentur. Inde intelliges, deceptum fuisse Iacotium existimantem Monachum collegii de Arras, asthma mortuum integris pulmonibus, solum abscessu in vena arteriali existente. Quæ enim ratione ex illo abscessu possit lædi respiratio, non video. Dicipiur etiam idem sentiens ex resecatione, ut in chymistis, aurificibus, fabris ferrariis, & aliis fieri asthma: nam cum asperæ arteriæ magnæ habeant meatum, nunquam in his siccitas poterit asthmatis esse causa. Verum est hos aliquantulum asthmaticos apparere ob vaporem crassum obstruentem prædictas arterias. Ex vntione autem morbi gallici, si asthma contingat, proveniet à crasso humore, ab argento vivo ad asperas arterias expulso. Orthopnœa fit ab obstructione in asthma, aut à compressione asperarum arteriarum pulmonis in suppuratis, peripneumonicis, & his, qui multo humore corpus pulmonis habent imbutum. In hoc capite adverte auctorem solum tradere curam nem prædictorum affectuum, qui sine febre sunt, & sequuntur morbum in via, rempe obstructionem asperarum arteriarum ab humore crasso factam. In curatione asthmatis adverte medicamenta inscindencia, quæ utilia sunt, assumenda esse nō simplicia, sed cum medicamento aliquo humido permixta, quod est Gal. præceptum 5. simpl. cap. 12. in affectibus thoracis, & pulmonis, ratio est, quia humor in pectore non debet sicari, at cum amara sicca sint, ideo cum re liquida & humida permiscenda sunt, ut penetrando inscindant humorem, & siccitate non lædant.

### De peripneumonia, & pleuritide.

#### CAPVT XXV.

**Definitio.**  Via Peripneumonia, quæ est pulmonum inflammatio: & pleuritis, seu lateralis morbus, quæ est inflammatio membranæ costas succingentis, vel musculorum ei propinquorum, (auctore Gal 5. de loc. affect.) iisdem ferme remediis curantur: hoc capite de his duobus affectibus non immerito agere statuimus. Fiunt ab iisdem prope causis, quamvis peripneumonia a sanguine magis pituitoso, & pleuritis a bilioso, ut docet Galenus commentario 35. lib. 6. Aphor. vtriusque tamen affectus causa externa calida per se, & frigida per accidens comprimendo esse potest. Peripneumonia quoque fit ab angina, à pleuritide & capitis distillatione: nonnunquam verò (ut ait Paulus) eius origo est sola inflammatio. Lateralis morbus aliquando est epidemialis, fitq

**Causa.**

**Pleuritis**  
**cōt. g. s. a.**



fitque per contagionem, quemadmodum pestis. Peripneumonia (vt vult Gal. 2. de locis affect. cap. 3.) deprehenditur ex tanta respirandi difficultate, & angustia, vt suffocari laborantes videantur, ac recti sedere cogantur, quem affectum orthopnæam nominant: Aetius tamen sexto ferm. cap. 66. omnes peripneumonię notas depingit longo satis sermo. nimirum febrem acutam, grauitatem thoracis absque dolore, inflammatis tamē pelliculis thoracis sentitur dolor, faciem rubicundam, præcipue malas, nasum in summo finum, appetentiam læsam, linguæ siccitatem, aquæ frigidæ maiusque etiam aeris desiderium, tussim siccam, vel, si expuant, spumum id est.

Accidentia inseparabilia pleuritidis (si Galeno & veritati credimus) sunt febris acuta, dolor perinde ac si locus vel intendatur, vel pungatur, respiratio frequens & exigua, pulsus paruus arteriam duram, & quodammodo tensam indicans, tussis magna ex parte cum sputis coloratis, nonnunquam verò sine his, has incoctas pleuritides appellat Galenus loco superius citato. scilicet de locis affect. cap. 1. quæ vel celeriter hominem rapiunt: vel longo temporis spatio finiuntur, quo in loco multas doloris lateris species proponit.

Curatur vera pleuritis sex generibus remediorum: primo, ratione victus tenui vsque ad quartum diem, cum vires ferre possunt, vt lacte amygdalarum dulcium sine pane, ptisana hordei colata, vel non colata: a quarto vsq; ad septimum pane loto & lacte amygdalarum cum saccharo, & radice buglossæ condita saccharo: post septimum iure pulli refrigerato, cremore hordei, semper tamen agri natura & consuetudo est consideranda. Bibat aquam hordei, aut saccharatam, aut ex decocto liquiritiæ remisse calidam, vinum nullo modo bibendum est, nisi vires sint admodum imbecillæ: tunc enim vinum dilutum, & ius gallinæ, aut aqua eiusdem per distillationem conuenirent, aut in declinatione. Dormiat supra affectam partem, talis enim incubatio minorem dolorem infert, augeturque calor partis affectæ, & magis resoluit materiam phlegmones.

Alius sit facilis, vt nimium semel in die. Animi perturbationes, quæ augere possunt inflammationem, tollantur, vt ira, timor, & similes.

Secundo, auertentibus materiam, quæ augere possit inflammationem, vt sectione venæ internæ cubiti, quam vocat hepaticam, eius est partis, seruata semper rectitudine, vt duplex scopus propositus sit, alter ad reuellendum, alter ad vacuandum.



cuandum: quod fieri non potest per sectionem venæ partis oppositæ. Si non apparet vena interna cubiti, communis secanda est, aut humeralis, si duæ aliæ non appareant: semper tamen sanguinis copia respondeat morbi magnitudini, naturæ ægri, viribus, regioni & consuetudini. Si morbus semper augeatur post primam sanguinis missionem fiat secunda & tertia, si opus fuerit, & vires patiantur: semper tamen ab eadē vena, postea quam ex diuersis fieri non potest: quemadmodum in inflammationibus & tumoribus aliarum partium, in quibus, cum fluit humor, facienda est sanguinis missio ex parte longinqua per reuulsionem, cum iam fluxit ex parte eadem, aut propinqua, vt in angina diximus. Si vires deficient, & ætas non sit florida, sanguis mittatur per cucurbitulas cum scarificatione inter scapulas, si non sit plenitudo, & in naribus, si fuerit plenitudo. In quacunque parte fuerit dolor, etiam si infestet partes, quæ sunt sub septo transuerso, vt docet Gal. comment. 11. secundi de ratione victus in morbis acutis, quamuis vacuationem per medicamenta purgantia Hippocrates tam eligat, sequens aphorismum 22. primi libri, quæ ducere oportet: sed ego cum Galeno semper ad reuellendum & euacuandum simul magis laudo eius sententiam, quia inflammationibus internis, & febribus ardētibus medicamenta purgantia, præcipue Græcorum sunt satis calida, & valenter mouent, ideoque timenda. Præterea alui profluuium in pleuritide, & peripneumonia, si adueniat malum, vt Hippocrates 6. lib. Aphor. 16. scribit. Quare in his duobus morbis benedictis medicamentis & salubribus purgabis suo tempore, quarto videlicet genere remedium. Auertunt quoque frictiones, ligaturæ partium extremarum, & clysteres.

*Auersio.*

*Preparatio.*

*Purgatio.*

Tertio, materiam apparantibus (quæ si fuerit turgida absque coctione vacuanda est) vt syrupo violarum, syr. endiuie. S. cum aquis endiuie, cichoreæ, & borraginis: aut cum decocto hordei sine cortice, violarum, & liquiritiæ: idque cum materia est biliosa, quæ si fuerit admodum tenuis, syrupo, nenupharis, & de papauere est incrassanda: crassa verò aut mixta cum crassa syrupo capillorum Vene. de liquiritia, de hyssopo, cum oxymelle. S. & decocto pectorali, est concoquenda.

Quarto, purgantibus non valentioribus, qualia sunt Græcorum, sed clementioribus, & salubribus, quæ Arabes & nostra ætas cognouerunt, exceptis stipticis, & astringentē substantiam habentibus, vt est rhabarbarū, & myrobalani, præcipue cum tota substantia: eorum tamen infusio est probata,

&



& laudata, & aliquando scammoniata correctâ, quando salubria non sufficiunt, vt in electuario de succo rosarum, & diaprunis solutiui, & in parua quâtitate, & mixta aliis salubribus: vt ℥. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ 3.vj. medullæ tamarindorum (quum est ardentissima febris) 3.ij. (nec timeas acetositatem tamarindorum) infusionis rhabarbari per noctem in aqua endiuia factæ ℥.iiij. syr. violarum 3. j. decocti florum cordialium. q. s. misce, & fiat potus. Si copabilis fuerit magna, adde 3.ij. diaprunis solutiui: & si crassa & mixta cum pituita, adde 3.℞. agarici trochiscati ℥.ij. aut si amat magis pilulas, quæ minus in hoc morbo conferunt, has accipiat hora idonea: ℥. pilularum de rhabarbaro, & agarici trochiscati an. 3.℞. fiant pilulæ septem cum aqua endiuia, & aurentur, si non est pauper.

Quintò, sputum materiæ pleuritidis, quæ in pulmonem *Sputum* & thoracem exudat, facile, & fluidum reddentibus in omni *inuania.* tempore phlegmones, & omni hora diei, aliis atque aliis medicamentis, vt syrupo violaceo, de iuiubis, capillorum vene. de liquiritia, syrupo acetoso. S. & oxymelle. S. pilulis bechichis, saccharo cando violato, electuario diadraganto frigidò, & similibus, & hoc eclegmate, seu loch: ℥. penidiarû, *Loch.* sacchari candi, violati an. 3. j. pulueris diadraganti frigidi 3. ℞. succi liquiritiæ, & pulmonis vulpis an. 3. ij. gummi crassi 3. j. syrupi violarum 3. ij. ℞. syrupi acetosi. S. 3. j. misce, & fiat loch. Hæc omnia quæ sputum promouent, retineantur ore, *Liquor.* & sensim deglutiantur. Hic liquor seu syrupus non perfecte decoctus sputum promouet: ℥. capillorum veneris, violarû an. m. ij. iuiubas num. x. vuarum passerû sine granis p. ij. liquiritiæ 3. ij. fiat decoctum, de quo percolato accipe libras duas, post parum serueant. Foris ad sputum excitandum confert *Topica.* hoc vnguentum: ℥. olei sesamini, & amygdalarum dulcium an. 3. j. ℞. emplastri filij Zachariæ loco ceræ. q. s. misce, & fiat *Observa-* vnguentum: vel ℥. emplastri filij Zachariæ. q. s. extendatur *tio.* super alutam ad formam mediij folij papyri. Quidam in hac inflammatione parti affectæ admovent repellentia medicamenta, & male, quia augent inflammationem.

Sextò, reliquam materiam resoluentibus, & dissipantibus, *Resolutio.* vt vnguentis, emplastris, cataplasmatibus, & fori per spogiam ex decocto camomillæ, meliloti, seminis lini, fœnugræci, furfuris, vel per vesicam plenâ simili decocto, Saccus ex milio, *Vesica.* sale, & fursure bene tostis est optimus in hoc genere reme- *Sacculus.* diorum. Hæc tamen omnia, & similia initio veræ pleuritidis maximè nocet, & in augmento: valèter enim augent inflam-

mat



## D E C V R A N D. M O R B.

**Error indo-** mationem. Quare errant multi indocti medici, qui inconfi-  
**Etorum.** deratè fomentis & calefactoriis vtuntur. Solet enim (Galenus  
no autore comment. 31. sexti lib. Aphor.) in his fomentum ad  
liquantum mollire dolorem, sed alteram fluxionem aducere  
care: experientia tamen gratia ad cognoscendum qualis sit

**Curatio tē-** affectio Hippocrates & Galen. medici sapientissimi, & prae-  
**ratina vul-** dentissimi iis vsi sunt. In non vera pleuritide ad flatum diffu-  
**gō dicta.** pandum optima sunt, & iis vbi dubitat medicus an sit vera  
an non vti oportet: semper tamen cautè, ne attrahatur hū-  
mor ad laborantem locum, & ne ex non vera fiat vera, vel  
vera fuerit, ne augeatur. Si autè pleuritis suppuretur, à qua  
pauci liberantur, natura non est impedienda, sed potius ean-  
ars imitari ferè semper conatur, vt hoc medicamento inter-

**Medica-** mentum  
**internum**  
**pus effi-**  
**ciens.** no: ℥. malua, bis malua an. m. j. ficuum. p. j. seminis lini, &  
fœnugræci an. p. s. fiat decoctum, de quo percolato accipe li-  
bras iij. cui adde butyri recentis ℥. j. olei amygdalarum dul-  
cium ℥. iij. misce, & saepe in die transglutiat paulatim parum  
huius medicamenti. Foris admoueatut hoc cataplasma, ℥.

**Cataplas-** foliorum maluarum. m. ij. radicis althæ. m. j. caricarum, se-  
**ma ad idē.** minis lini an. p. j. omnia decoquantur, & postea cum vnciis  
duabus farinae fœnugræci, & cum ℥. ij. & s. olei sisamini, & ℥.  
j. butyri, addendo ℥. s. axungia gallinae ℥. s. croci, & duos vi-  
tellos ouorum, misce, & fiat cataplasma: quod parti affectæ  
admoueatut.


**Quæ abf-** Confecto pure rumpatur abscessus frequenti tussi, & vo-  
**cessum rui-** ciferatione, vomitu, & sternutamētis, & corporis vehemētis  
**punt.** cōcussione. Deinde abstergetur vlcus aqua hordei cum cor-

**Absterfio.** tice saccharata, & si non suffecerit ipsa, cum hydromelle ex  
**Glutinan-** decocto furfuris, & cicerum, præsertim si non sit febris. Vlti-  
**tia.** mō verò vlcus glutinabūt terra sigillata, bolus Armenus, &  
alia quæ dicentur capite de Phtisi, sed in hoc, similibusque  
vulceribus consule doctum chirurgum.

## De Peripneumonia, & Pleuritide.

### C A P V T X X V I I.

#### Scholium.

**Peripneu-**  **monia** Via peripneumonia.) Peripneumonia est inflammatio  
**quid.** pulmonis, vbi inflammatio tumorem præter naturam signifi-  
**Causa.** cat, potest enim fieri peripneumonia à quocunque humore, vt  
**Signa.** plurimum tamen contingit ab humore pituitoso, & crasso, quia in sub-  
stantia laxa (qualem habet pulmo) melius moram facit. Signa eius sunt  
febris acuta, dolor grauis, difficilis respiratio, rubedo malarum, & pul-  
sus



sus mollis. Febris acuta (quæ acutior est, quàm in pleuritide, etsi fiat à causa calida, & peripneumonia à frigida) cōtingit à duabus causis, prima à vicinia cordis, secunda à vasorum cum corde communicatione. Dolor grauis fit, quia pulmo paucos & exiguos habet nervos, & ideo in eo dolor ratione membranæ usum ambientis sentiri debet. Difficilis respiratio cum orthopnea contingit, quia pulmo est instrumentum respirationis, ac proinde peripneumonia est affectus acutissimus, à quocūque humore fiat, perniciosissimus tamen, si fiat à sanguine bilioso, quia habet maiorem febrem, ob quā ita augetur usus, ut non possit ei respiratio sufficere. Rubedo malarum non apparet in hoc affectu statim in principio, sed postea vaporibus ascendentibus, & in malis detentis, exhalant enim ab humore crasso, quod non contingit in pleuritide, quæ ut plurimum fit à bile, cui citò dissipari proprium est. Pulsus mollis euenit in hoc affectu, ut ait Gal. lib. de pul. ad Tiro. propter raritatem pulmonis, & irrigationem arteriæ à pituita, quāuis enim ratione inflammationis debuerit esse durus, pituita tamen, & partis natura id impediunt, & occultant exiguam arteriæ tensionem. Pleuritis nomen est æquiuocum, nā Pleuritis, primo significat quemlibet lateris dolorem, etsi sit citra inflammationē: & hunc affectum nominare solemus lateris dolorem, aut pleuritidē spuriam. Secundo propriè significat inflammationem membranæ pleuræ, quæ multis donatur venis. Vnde errat Iacotius pleuritidem etiam in pericostio collocans: in eo enim pauca & exiles vena, inflammationi nō supeditabunt materiam. Pleuritis propria rursus diuiditur in exquisitam, Pleuritis & non exquisitam. Exquisita dicitur, cum membrana primū inflammatur. Non exquisita, cum membrana secundariò, hoc est ad inflammationem musculorum internorum intercostalium afficitur: cum enim pleura his musculis adhæreat, & sit veluti tegumentum eorum, proinde fieri non potest, ut illi muscoli inflammentur, quin pleura quoque inflammetur, & contra: sicut in tenni meninge: & cerebro euenire cap. de phrenitide diximus. Has duas pleuritides ex Gal. 5. de locis affectis cap. 2. distinguēs ex pulsu, qui in exquisita magis durus est. Signa Pathognomonica pleuritidis sunt febris continua, & acuta: dolor punctorius, pulsus serratilis, & durus, difficilis, & frequens respiratio, & tandem tussis. Febris hunc affectum comitatur, quia inflammatio propinqua est ipsi cordi & eius inuolucro. Dolor propter tensionem soluta cōtinuitate, punctorius verò, quia est tensio in membrana, quæ acutum habet sensum: dicitur autem punctorius, quia ægroti habent talem sensum, qualis solet sentiri in acus punctura. Et cum membranæ ex sua natura sint extensæ, & inflammatio tendat membranam, proinde etiam vicinæ partes inflammationis etiam tendi solent, & hac ratione dolor serè per totam membranam extēditur: unde prouenit, ut dolor aliquando ad iugulam ascendat, & aliquando in hypochondriis sentiatur. Pulsus est durus in pleuritide non propriè, sed apparentia, quia tensa est arteria, serratilis verò, quia



quia inæqualiter arteria mouetur, ob eius inæqualitatem in duritie. *F* autem respiratio frequens, quia magna respiratio, quam calor cordis artus requirit, exerceri non potest ob dolorem à dilatione thoracis excitatum, & ideo frequentia motus defectum distentionis supplet. *T*ussis natura excitatur, ut tumorem, qui ei molestus est, & humorem resudatorem ex eo expellat. Præter hæc signa, alia in pleuritide reperiri solent.

*Lupeii lapsus.*

quæ mox apparentia dicuntur. Hæc aliquando contingunt, & aliquando non: inter quæ est aponia, quam vocis priuationem ait *Lupeius* enunire per consensum affectis nervis vocalibus. Qui maxime decipitur, ne ui enim vocem efficientes in pleuritide non afficiuntur: sed sunt aliquando pleuritici aponia deficiente materia vocis quod in magna pleuritide experimur, in qua ob inflammationis magnitudinem, non potest attrahere ad vocem necessarius.

*Cotrouersia.*

*Vallesius* libro septimo epyd. comm. 13. ex Hippocr. sententia motus suscitatur quæstionem, olim à barbaris medicis agitari solitam: quæ quæritur, cuius lateris pleuritis sit periculosior. Aliqui pleuritidem sinistri lateris periculosiorem esse sentiunt: quia hæc pars nobilior est ob cordis situm. Alii contrariam defendunt sententiam adducunt etiam ex nobilitate dextri lateris, quam colligunt ex caliditate maiori proueniente ex maiori latitudine arteriarum, quæ per ipsam disseminantur: & ad argumentum de situ cordis respondent, cor in medio thoracis pendere, & non in sinistra parte.

*Vallesii sententia.*

*Vallesius* in hanc secundam declinans sententiam sic explicat cotrouersiam. Pleuritis tres exitus habet: primus est resolutio, in qua sensim euacuato humore breui intra morbi constitutionem liberantur ægri: secundus est corruptio, qua breui moriuntur, humore vincente naturam: tertius est suppuratio, in qua magna ex parte moriuntur etiam ægri sensim tabescentes, aliquando vero liberantur. Ex his optandus est exitus qui resolutione fit, timendus qui corruptione: ille verò, qui suppuratione contingit, timendus etiam, sed minus. Iam pleuritis lateris dextri maior erit, & acutior, si partis naturam consideremus, quæ calidior, & sanguinolentior est, & sic parata ad calidam & acutam inflammationem, unde pleuritis huius lateris, erit parata acutam salutem, aut mortem, per resolutionem, aut corruptionem (acutiori enim est hoc) sinistra sæpius in suppurationem abibit: vide utrum eligas. Facta verò suppuratione (quæ in utroque latere fieri potest) deterior est haud dubie dextri lateris, quia non poterit fieri, nisi ea parte multum debilitata, debilitata autem esse partem, ali. qui fortem, grauius est, quam debilem: accedit, quod sinistra pars, ut ignobilior oportunior est curatio.

Quæ sententia, quia cum minori periculo secatur, & vritur. Hæc *Vallesius*. Ex qua quæritur ad hæc omnia colligimus: primum est, pleuritidem tres habere exitus: Secundum, dextrum latius esse calidius sinistro, & plus sanguinis continere. et sententiam, quod arteriæ per ipsam disseminate sunt maiores, quam in sinistro: tertium, ex dextri lateris maiori calore sequi in eo maiores inflammationes.

Quartum, in parte sinistra sæpius fieri suppurationem, in dextra vero sæpius

resol.



resolutionem, & corruptionem. Quintum, suppurationem dextri lateris *Vallesius* esse peiorem, eo quod pars debilitata robustior erat, tum quia maiori cum reprehensione periculo vritur & secatur. Hæc si examinemus, inueniemus primum ve dicitur, rum esse, alia verò omnia esse falsa: innittitur enim falso supposito, quod est partem dextram esse calidiorem, quia habet arterias maiores, hæc enim nullus anatomicorum id animaduertit. Imò si dissecans corpus attente id aspicias, arterias dextre parvis æqualis magnitudinis cum arteriis sinistræ reperiens, hæc enim est naturæ iustitia, quam in duobus oculis et auribus experieris. Imò si arterias spectemus, sinistrum latus erit calidius, cum arteria magna versus ipsum declinare videatur, si hoc ita est, non ergo dextrum latus erit calidius sinistro, neque plus sanguinis continebit, & inde sequetur non esse robustius, neque in eo plures & maiores fieri inflammationes, neque plures resolutiones, & corruptiones, neque erit peior suppuratio in eo, quam in sinistro, neque sectio, & vstio sinistri lateris minori cum periculo fiet, sed cum æquali, cum æquales partes, & præstantes æquæ vulnerentur. Sedabitur ergo controuersia *Sedatio* cōbreuiter hoc modo. Si cætera sint paria solo discrimine existente in situ *trouersia*, æquæ periculosa est pleuritis dextri lateris, ac sinistri, cum æqualis dignitatis partes occupet. Fortasse tamen *Vallesius* & alios, ut existimarent dextrum latus esse calidius, ac proinde robustius, decepit brachium dextrum. Cum nō sit par ratio: nam brachium dextrum plus mouetur, quam sinistrum, & ideo & calidius & robustius est, quod lateri dextro non contingit.

Curatur vera pleuritis.) Ratio victus in pleuritide, & aliis internis inflammationibus, distincta est ab ea, quæ tradit *Gal. II. meth. in Etus.* febris, in quibus cum tota materia ad unam expulsionem seruetur, in principio crassiori (ut perdurent vires) in statu verò tenuiori victu (ne impediamus naturam) vtendum est. Contra in pleuritide & aliis internis inflammationibus, in principio tenuem adhibere oportet victum, ut fluxionem minuamus, at in statu fluxionis, quando coctio apparet, crassum, ut vires roborentur ad spiritum educendum: quod ex Hippocrate primo acut. sen. 23. colliges: si os, inquit, madescat, & quæ expiuntur ex pulmone talia sint, qualia esse oportet, sorbitionis quantitatem auge.

Aquam bibant cum liquiritia, aut capill. veneris, aut paucis cinamo- *Potus.* mo decoctam, & sit tepida, ut humor inscindatur, & attenuetur qui ab aqua frigida solet incrassari. Vinum paucum solemus concedere ob consuetudinem.

Secundò, auertentibus.) Cum pleuritis sit tumor præter naturam, in principio postulat reuulsionem, & euacuationem simul seruata rectitudine, non solius naturæ, ut voluit *Rondoleius*, sed naturæ simul & vasorum. Secabis ergo basilicam eiusdem partis, quæ ex parte affe- *Vena se-*cta magis & citius euacuat, quam alterius partis: & hoc propter il- *Flu.* lam venam, quæ ex axillari orta, & sub osse pectoris delat., commu-  
nicat



**obiection.** nicationem cum venæ arigos ramis habet. Dices non semper esse venam secandam in principio pleuritidis, quia ex Hippocr. 2. de ratione victus in acut. sent. 11. in pleuritide, quæ habet dolorem vergentem ad hypochondria, purgandum est. Respondeo pleuritidem omnem, etiamsi habeat dolorem vergentem ad hypochondria, in principio postulare sanguinis missionem, quoniam hoc solum remedium potest ex parte affecta reuellere, & euacuare: neque Hippocr. in supradicta sententia contrarium docuit: Quod si dixit, esse purgandam, id fecit, ut nos doceret, id quod habet proprium illa pleuritis, in qua dolor ad hypochondrium vergit, in qua, cum post sanguinis missionem & coctione apparente videamus inclinare humorem ad venas inferiores, per ipsas purgatione educemus ipsum: hoc autem communem rationem curandi pleuritidem non tollit, quæ cum sit inflammatio, sectionem venæ statim requirit. Quem locum (ignoscant mihi eius manes) Galenus non recte explicauit.

**Duo auctoris** Tertiò, materiam apparantibus.) Bis peccat autor: primò in ris lapsus. pleuritide turgentia statuens, cum in ea humor in una parte firmatus sit: Secundo purgans, si enim humor peccas in thorace continetur, per spiritum est educendus, & non purgatione, natura enim ut in plurimum per hanc partem eum expellit. Adde ut in plurimum, quia aliquando cum exigua est pleuritis, per alium eum expellere solet, 6. aphor. com. 16. aliquando etiam per urinam, quod raro etiam contingit, ac proinde in his eam non imitatur.

**Multorum** Quintò, sputu materiæ.) Facta reuulsione, & aliqua humoris euacuatione ex parte affecta, quod ex accidentibus remissis intelliges, opus erit humorem resudantem ex inflammatione euacuare. Quid aliqui ut præstare possint, sic distinguunt: si humor in thorace contentus sit crassus, debet incindi, si verò tenuis, incrassari, ne aeri cedens in thorace remaneat. Hi tamen decipiuntur, quia etsi illud verum sit in humore, qui

**In pleuritide.** distillans à capite in asperis pulmonis arteriis recipitur, in pleuritide tamen falsum est, in ea enim, cum humor ex cavitae pectoris debeat asperas pulmonis arterias ingredi per poros membranæ pulmonē ambientis, attenuantia medicamenta semper desiderantur: quod elegantissime exhibenda. docet Gal. 13. method. cap. 18. Vbi aduerte hæc medicamenta attenuantia, lambendo, & supino homine sensim esse deglutienda, ut asperam petendi mediant arteriam. Quæ autem medicamenta exterius applicanda sint, ex humoris natura, & loco colligemus: si enim humor sit tenuis, qualis ut in plurimum solet esse in pleuritide, leuiter digerendum est, potissimum si sit in musculis inflammatis, hoc commodè præstabit emplastrum filii Zachariæ. Si autem humor sit crassus, & in pleura membrana, augenda erunt digerentia, qualia sunt emplastrum de meliloto, puluis iridis, & ciclaminis. Repellentibus nunquam utaris, ne ex venis exiguis pullatus humor augeat affectum, tum ne partes vicinæ noxam suscipiant.

**Lapsus auctoris.** Sextò, reliquam materiam.) Pleuritis signis supra positis depreh



prehenditur, habet etiam pleura sua signa: unde id quod auctor dicit de curatione pleuritidis tentamina, non potest constare: reuera enim Hippo. fomenta calida applicat, non ut tentando discat, sed ob unam ex duabus causis: prima est, ut curet affectum, aliquando enim inflammatio exigua est, et exigua fluxio, quæ ex Gal. 6. epy. par. 3. com. ult. sine sanguinis missione curari possunt, digerentibus medicamentis dissipatis humoribus. Secunda verò causa, ob quam fomenta calida applicat, est, ut leuato aliquantulum dolore non fluat sanguis ad affectum locum. Atque hæc de pleuritide.

Peripneumonia, cum sit acutissimus morbus, & non possint ægri cum Curatio illa læsione respirationis multum perdurare, in principio sanguinis missio- peripneumonia nem postul. ut copiosam, non enim semel, sed bis, ter, & quater, eadem monia. die sanguinem mittimus, ex basilica cuiusvis brachii, quoad ex remissione acciderit, cognouerimus fluxionem sisti. Et cum propter acutiem hic morbus quarto die veniat ad statum, tenuissimo victu viedum erit, assumentes mulsam cum decocto liquiritiæ, capil. vene. aut hordei cum cortice, decocto etiam cicero, uti possumus, aut iure pulli gallinacei, in quo cicera, et perroselinum decocta sint. Educemus id, quod resudat in inflammatione, s. liquiritiæ, capil. ven. et oxymelice simplici, cum decocto rerum attenuantium. Aduertere tamen oportebit, in sputum sit coctum, necne. Si sit coctum,angebis victum, ius gallinæ exhibens: si sit crudum, thoraci digerentia, & concoquentia appones, vehementiora tamen, quam in pleuritide, cum profundiori loco contineatur affectus: sic emplastro diachilonis magni, et filii Zachariæ, addes puluerem iridis, ut aristolochiæ, aut ceroto ex thapsia uti poteris: hæc. n. inscindunt humores, & eos ad externa attrahunt. Si inflammatio suppuretur, periculum certò crescit.

### De sanguinis sputo. CAP. XXVIII.

**Q** Mnes sanguinis expulsionones (autore Gal. lib. 6. cap. Species, 2. de causis symptomatum) toto genere præter naturam censentur, excepto sanguinis profluvio, quod mulieribus ab utero defluit: sanguinis tamen deiectio per os, & cruentum sputum aliis est deterius, præsertim quando ex pulmonibus emanat, quia tabem efficere solet. Hoc accidit nonnunquam à causa externa, & aliquando ab interna, quas omnes cap. 21. de sanguinis è naribus fluxu scripsimus: eas tamen ex Gal. sensu longius eruditè collegit Aetius. Causæ. tuius ferm. 8. cap. 59. Causæ externæ ex sermonibus ægri, aut Notæ omnium assistentium cognoscuntur: internæ verò per hæc indicia, nū causa quæ omnia ferè Aetius loco superius adnotato demonstrat. rñ, et par- Si enim ob sanguinis plenitudinem accidat, ante reiectionem sentitur grauitas, & post melius, leuiusque habet. Si bus san- propter oris, venarumque apercionem, calidus victus, & quis fluit.



## D E C V R A N D. M O R B.

morbus calidus præcessit. Si ob venarum erosionem, cruentum apparet sputum, non subito, sed paulatim sanguis cum tussi expuitur, & semper peius habet. In magna tamen erosionem confertim sanguis cum tussi expuitur sine casu, & externa violenta causa. Quando est ex pulmone, sanguis educitur spumofus, subalbius, atque ex interuallo cum tussi sine dolore prodit: si verò cum leuiori tussi absque spuma pituitosus sit ex aspera arteria educitur: si niger, & in grumum concretus sanguis cum tussi, & dolore partis affectæ reicitur, ex thorace est, si verò ex locis, quæ sunt circa fauces, & palatum, ex ore, an e gingiuis sanguis feratur, ex sensu deprehendes. Nonnunquam propter hirundinem deuorata tam alicui parti inhaerentem per palatum sanguis tenuis & serofus educitur, si tamen a capite sanguis deferatur, titillatio palati adest, & frequens excretio: aliquando cum tussi, & præcedenti capitis colore, aut pondere. In colore, sanguis niger, aliquando pituitosus, & aliquando mixtus cum pure. Si ex ventriculo, parua copia sanguinis vomitu educitur. Si ex hepate, aut splene, colore & dolore partis affectæ percipitur.

- Sputum sanguinis curatur quinque auxiliiorum generibus:*
- Curatio.* primò, victu refrigerante, & astringente, vt aere, in æstate sparsis humi herbis, floribus, & aquis frigidis, & aceto rosato, vt cibo tenui saltem primis diebus, & glutinoso, vt hordei farina, succus agrestis, aut acetosæ, aut malorum granatorum acidulcium solus, aut cum aliis est optimum alimentum. Post primos dies, præsertim cum est necessaria instauratio maior, succus gallinæ, aut perdicis cum iure pedum arietinorum, aut vitulinorum cito & multum nutrit, & sanguinem crassorem reddit. Farina orizæ cum lacte bene cocta, aut cum iure pedum est optima. Denique omnia, quæ sanguinem in crassant, & venarum ora obturant, huic morbo utilia sunt, vt caseus recens, lentes, pyra, mala cydonia, portulaca, & similia. Potus sit aqua chalybeata, nisi ventriculi, aut totius imbecillitas vino egeat: sit tamen id rubrum, & bene aqua chalybeata dilutum, qua omnia alimenta sunt coquenda. *Quies* animi & corporis, silentium, & somnus fluxus omnes cohibet.
- Remissio.* Secundo, uertentibus à rupta vena, vel aperta, vt sectione venæ internæ cubiti frequenter, vt sexta quaque hora, si opus fuerit, paucò tamen missò sanguine, cum multus per sputum reiectus fuerit: si verò paucus & æger sit plethoricus, largiori. In mensibus, aut hæmorrhoidibus suppressis sanguis mittatur per sectionem venarum pedum, aut tiliarum. *Aueritiæ* tunc quoque cucurbitulæ coxis, natibus, & inguinibus affi-



xæ, & ligaturæ, & frictiones dolorificæ, & fots ex aqua calida partium infernarum. Calor enim, & dolor trahunt ad se, & hac ratione auertunt à parte affecta.

Tertiò, æquantibus sanguinem & ipsum reducentibus ad iustam proportionem quatuor humorum, quibus constitutus est sanguis ipse, vt tenui victu parum nutriente, si fuerit largior sanguis, si acer, biliosus ac mordax syrupo rosarum, myrtillorum, endiuixæ S. cydoniorum, & similibus cum duplo aquarum, aut decocti, aut succi acetosæ, endiuixæ, rosarum, portulacæ, & plantaginis: vt ℥. syrupi rosarum, & acetositis citri an. ʒ. iij. Item ℥. aquarum endiuixæ, portulacæ, & acetosæ, an. ʒ. iij. misce sumptis his, aut similibus tribus diebus, aut quatuor, vacuanda est bilis non scammoniatis, neq; aliis valentibus & acris medicamentis purgantibus, sed astringentibus: vt ℥. medullæ cassiæ fist. recens extracta ʒ. j. corticū myrobalanorū citrinarū, & rhabbari electi infusi per nocte in aqua endiuixæ an. ʒ. j. syrupi rosarū ʒ. j. aquæ portulacæ q. s. misce, & fiat potus. Si pituita fuerit sanguini mixta, rhodomelle, & aqua absinthij fiat concoctio eius, & euacuatio per myrobalanos cepulas, vel rhabbararū, vel turbit sine zinzibere: vt ℥. corticū myrobalanorū cepularū, & rhabbari electi an. ʒ. j. Turbit electi ʒ. ss. rhodomellis ʒ. j. aquæ absinthij ʒ. ij. misce, & fiat potus: quod si malit pilulas: ℥. corticū myrobalanorū cepularū, & agarici trochiscati an. ʒ. ss. cū aqua fœniculi fiant pilulæ vij. & aurētur, si nō est pauper. Quartò, glutinantibus vlcus, & contrahentibus oris hiatum, & tandem sistentibus sanguinem: hoc tamen genere auxiliorum semper est vtendum, & statim cum æger visitur, ne sanguis immodicè fluat: vt portulaca mansa, & ore re- tenta, lapide hæmatite, corallo albo vsto, bolo armeno, terra lemnia, balauistiis, semine myrtillorum, dragaganto, gummi Arabico, mastiche, & similibus simplicibus. Sunt quoque composita, quæ eadē, aut simili facultate valent, & valis hiatum opplent, vt trochisci ex terra sigillata, & trochisci de Karabe, & de spodio: horum singulorum, siue simplicium, siue compositorum ʒ. j. cum aquis, aut syrupis astringentibus ex dictis potente astringit, & glutinat: asininum stercus recens odoratum, vel potum, quodcunque sanguinis profluuium sistit: ℥. succi stercoris asinini ʒ. ij. syrupi myrtillorum ʒ. j. aquæ portulacæ ʒ. ij. misce, & fiat potus: quem bibat actu frigidum, & omnia alia medicamenta, & etiam alimenta omnia, si fieri possit. Narcotica medicamenta huic morbo sunt necessaria, etiam in initio, ne subito pereat æger,

*Retinatio sanguinis ad proportionem*

*Restrictio sanguinis, aut venæ obstratio*

*Admonitio*



# DE CVRAND. MORB.

aut ne fiat tabes, si breui tempore non consolidetur vena: i-  
deoque in hoc sanguinis profluuium Galenus audacter iis vti-  
tur, præter tamen trochiscos superius in hoc genere lauda-  
tos, qui sunt narcotici, quamuis parum opij suscipiant, præ-  
ter etiam requiem magnam, & athanasiam, quæ sunt narco-  
tica composita clementia, cum prædicta non sufficiunt, vten-  
dum est philonio Romano, aut Persico, aut Tharsensi ab ℞.j.  
vsque ad ℞.j. semper tamen his narcoticis, aut similibus non  
egent, qui calidum innatum imbecillum habent, ne ab iis  
admodum frigidis omnino extinguatur, vt multis contin-  
git, qui perpetuò dormierunt ex potu narcoticorum: sed tro-  
chisci, qui sequuntur, sunt optimi, & à multis experti in hoc  
morbo: ℞. acaciæ, balauitiarum, nucis cupressi, gallarum, hy-  
pocistidos, nucleorum vñ syluestris, caudæ equinæ, corrigio-  
læ, myrti, sumac an. ℞.ij. thuris, mastichis, myrrhæ, lapidis hæ-  
matitis, carabæ, santalorum, corali rubri, sanguinis draco-  
nis, terræ sigillatæ, boli armenici, aluminis fossi an. ℞.v. sterco-  
ris asinini sicci, capræ & leporis, spongiæ combustæ, centau-  
ræ minoris, cornu cerui viti, spodij, cupullorum rosarum  
rubrarum, bedeguar, rhabarbari tosti an. ℞.iiij. seminis pa-  
paueris albi, seminis iusquiami albi an. ℞.j. corticum man-  
dragoræ, opij castorei, casie lignæ an. ℞.ij. croci, camphoræ  
an. ℞.j. fiant trochisci cum succis, aut aqua plantaginis, &  
portulacæ: Dosis ℞.j. cum ℞.ij. aquæ, aut succi portulacæ, aut  
plantaginis, aut sanguinariæ: sed iis non est vtendum, nisi post  
tres menses, vt minimum. In vsu tamen horum, & aliorum  
medicamentorum, quæ sanguinem à pectore fluentem si-  
stunt, semper sunt permiscenda, quæ pulmones & thoracem  
iuant, vt electuarium diadragantum frigidum, syrupus de  
liquiritia, & succus eius, & similia. Quare hoc medicamen-  
tum est huic affectui summe vtile: ℞. conseruæ rosarum an-  
tiquæ ℞.ij. gummi dragaganti, gummi Arabici, & cerasi an. ℞.  
iiij. (dissoluantur in aquis portulacæ, & plantaginis) succi li-  
quiritiæ, boli armenici præparati, terræ sigillatæ, lapidis hæ-  
matitis, corali rubri præparati, sanguinis draconis, mastichis,  
thuris an. ℞.j. Karabæ ℞.iiij. s. syrupi papaueris, & myrtillorū  
an. equas partes, & quæ satis sint confectiōni faciendæ ad mo-  
dum loch, cuius cochlearium vnum frequenter teneat eger  
ore, & sensim transglutiat. Thoraci admoveantur medica-  
menta actu, & potestate frigida, & repellentia, atque astrin-  
gentia, eaque sæpe, quales sunt succi, aut aqua plantaginis,  
portulacæ, rosarum, solatri, & similes cū pauco aceto & bolo  
armeno. Vnguenta frigida, vt cerotū santalatum est bonum.


Quin



Quintò, corrigentibus symptomata, præcipue sanguinis *Gremis* concretionem: vt oxymelite. S. & compos. dosis sunt ʒ. ij. huic sanguinis symptomati cōfert coagulum hœdi, vel leporis ab ʒ. j. vsque dissoluētia, ad ʒ. j. cum vino albo. ʒ. j. theriacę magnę, aut diacurcumę et expurgā cum aqua hyssopi, aut scabiosę, est etiam optimum auxilia pectus. lium huic symptomati: hoc medicamentum est expertum: ʒ. amydi ʒ. ij. ʒ. farine fabarum, seminum melonum, & malue an. ʒ. iij. ʒ. boli armenici, seminum cydoniorum an. ʒ. ij. farine hordei sine furfure ʒ. v. gummi Arabici, dragaganti an. ʒ. j. ʒ. oxymellis. S. quod sufficit, misce, & fiat confectio ad modum loch, qua sæpe vtatur.


## De sanguinis spūto. CAP. XXVIII.

## Scholium.

 Mnes sanguinis expuitiones.) Ea quæ in hoc cap. habentur, intelliges ex his, quæ cap. de sanguinis è naribus profluvio diximus. In spūto sanguinis primum curabis symptoma, nempe Quid sit euacuationem sanguinis, eo quod vrget, & potissimum, si sit ex pectore, primò cū tunc enim statim debet sedari, antequam fiat inflammatio. Id præstabis rēndum. sanguinis missione, & victu incrassante, simili etiam medicamento, quale est hoc: ʒ. trochiscorum de karabe, et terra sigillata, an. ʒ. i. ʒ. lapidis hæmatitis ʒ. i. conferuæ rosarum ʒ. i. aquæ plantaginis, & capillorum veneris (vt faciat penetrare) q. s. misce, & fiat confectio, cuius assumat æger quantitatem vnius nucis cum aqua plantaginis, et capillorum ven. Vltimò, si hæc & similia non prosint, ad narcotica deuenies. Symptomate curato morbo prospicies, siue sit vlcus, siue ruptio, siue anostomosis.

Quintò, corrigentibus.) Sanguinem concretum inscindes posca, sanguinem hoc est aqua & aceto mixtis, & per os assumptis, mulsa etiam & oxyconcretum melite, vnde non est, quod vtaris coagulis ab auctore propositis. inscinderis

## De Empyemate, id est, suppuratione, &amp; tabe. CAP. XXIX.

 Mpiema Græcis, Latinis suppuratio, est affectio pectoris eorum, quibus in succingente costas interius membrana abscessus, aut in aliqua alia pectoris pellicula factus, acervatim ruptus est, & in vacuum pectoris locum effusus inter pulmonem & membranam costas succingentem. Vnde constat ex non curata pleuritide hæc affectio nē maiori ex parte nasci, quod aph. viij. sect. v. vetustissimus *Descriptio.* *Causa.*



# DE CVRAND. MORB.

Hippocrates docuit. Interdum tamen & ex sanguinis eruptione hoc malū oritur, disrupto scilicet vase aliquo in thorace, & ad cicatricem non perducto. Iam & propter confluxum a capite permutatam anginam in pulmone sæpe fit iuxta aphorismum decimum sectionis quintæ. Ex causis quoque procatasticis fieri potest, sed raro. Suppurati sicprehenduntur, si inflammatio præcesserit, deinde vehementes febres quieverint, & ex magna parte quoque dolor, gravitatis autem sensus remanserit intus in lateribus in profundo thoracis, simulq; transfluere aliquid appareat iuxta multiplices reclinationis permutationes, & maxime cum ab vno latere in alterum decumbunt, tunc sane multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus sæpe sensibilibiter in reclinationibus ipsorum auditur. Cognoscitur itaque suppuratio facta tum ex prædictis, tum quod nihil relatu dignū reiectarunt in eo, qui præcesserit vehemēti lateris dolore. Sed quoniā vicina admodū affectio huic morbo phthisis est (autore Hippocr. 5. sect. Aphor. 10.) nō iniuria de utraque affectione vno capite agetur. Dicamus ergo de phthisi aliquid, ut deinceps curationem aggrediamur. Phthisis pulmonis exulceratio ob omnibus censetur, ex empyemate (ut dictum est) nata, nōnunquam verò & ex defluxu humoris acris, atq; erodentis oritur. His autem notis cognoscitur, totius corporis summa adest extenuatio, nares acutæ sunt, tempora collapsa, oculi concaui, scapulæ alarū more prominentes, ad hæc tussunt qui sic affecti sunt, & quod expuitur foetidum est, & febri corripiuntur hectica, quam insequuntur ea omnia, quæ a Gal. numerantur primo de differentiis febrium cap. 11. quæ si probe cōsulas: & præter hæc etiam, quæ ab Hippocr. dicuntur Aphor. 11. 12. & 14. sect. 5. plenam habebis signorum cognitionem ad hanc affectionem dignoscendam. Suppuratio hæc diligenter est curanda, ne fiat vlcus in pulmonibus, & tandem insanabilis morbus ob motum perpetuum pulmonum, eorumque substantiam raram, & hecticam febrem coniunctam: quæ sola est incurabilis, si fuerit confirmata. Magis etiam insanabilis est, si sit coniuncta cum ulcere pulmonum, quod indiget mundificatione, & exsiccatione: hectica verò instauratione, & humectatione, quamuis quis tabe laborans agnoscat medicamentum, quo curatur.

*Nota.*

*Descriptio  
& causa  
phthisis.  
Nota.*

*Curatio  
suppurat  
ionis.*

Curatur suppuratio hæc medicamentis purgantibus pus iam dictis capite de pleuritide in fine, cum terminatur per suppurationem post ruptum abscessum aliquando tamē ubi mag



magna est copia puris, incisio est facienda secundum longitudinem costarum, inter quartam & quintam thoracis mēdosas, facta prius experientia fili actu humidi admoti supra locum, si exsiccatur. Sed aduerte, ne totum pus, vel illius magna quantitas extrahatur semel, sed multis purgationibus, quamuis citò & cautè in habitatione calida propter cōseruationem caloris innati & spiritus. Nostri enim temporibus fuit integræ sanitati restitutus hac curatione quidā nomine Lupus, qui ex vulnere magno partis superioris thoracis in suppurationem peruenerat magnam cum febre acuta & maxima difficultate respirationis, educto pure per nouā incisionem partis inferioris thoracis non vno die, sed multis, ne vires deficerent.

Phthisis, si curari possit, quinque generibus remediorum curatur: primò, victu refrigerante, & humectante habitatione hec tice: si verò spectes vlcus, febris causam (quod prius & magis curandum esse volunt auctores) calido & sicco victu curabis. Sit ergo in actiuis qualitatibus temperatus victus, sed siccior vlceris gratia, ob id Galen. quinto methodi phthificos ad Tabias mittebat, vbi erat aer siccior, & sanabatur. Sint cibi faciles concoctu, boni & multi sanguinis: quia calor est imbecillus, & corpus macrum: sint etiam tenues & liquidi ob eorum vias siccitas, & contractas, & causa febris refrigerent parum, & propter vlcus sint apti ad detergendum. Ab his etiam ad consolidandum & glutinandum, quæ omnia insunt lacti, & saccharo rosato. Lac enim facile concoquitur, ac maxime nutrit butyro & caseo, optimi est succi, liquidum quoque est, & sub frigidum, tergit acrimonia feri, & sapore dulci substantiæ butyrosæ alit, glutinat caseo: facultates tamen variæ lactis augentur, vel minuuntur diuersa ratione victus. Refrigerans facultas augetur lactuca, cichorea, endiuiā, portulaca, & similibus. Tergens verò vis augetur hordeo, adianto, fœniculo, & hyssopo. Natura glutinosa crescit rubo, lentisco, salice, & similibus. Humanum lac est omnium præstantissimum, omnium tamen tenuissimum est lac camelorum, deinde equarum, post asinarum. Caprarum lac est temperatum, sed vaccarum lac & ouium magis nutrit. Humano tamē lacte nobiliori omnibus, & magis familiari est nutriendus hoc morbo laborās, fugatque ipsum ab vberibus, dū modò, sit sana, & iuuenis lactans, nec candida admodum, aut nigra. Bonis quoque nutriatur cibus, fugiat venerem tanquam pestem. Si verò non possit, vt infans lac à māmīs fugere, summo studio ipsum bibat actu



# DE CVRAND. MORB.

calidum, calore naturali, quod fiet ingenio astantium in ae-  
*Modus sio* re temperate calido. Primo bibat vnciam vnam, deinde sen-  
*mendi la-* tim progrediatur ad ℥.vj. vel octo, parum sacchari addendo,  
*Etis.* ne coalescat in ventriculo, alij adeunt parum mellis, aut fa-  
*Lac diffusa* lis, sed ego magis laudo saccharum, dummodo nō aufit ven-  
*dentia,* tris profluuium, quod prohibet lactis vsum, quemadmodum  
& alia multa, vt distillatio a capite, dolor capitis, febris pu-  
trida, praesertim ardens, suspensa lypochondria & murmu-  
rantia, inimicitia & discordia inter ipsum & ægrum; vbi ta-  
men illius vi & ope maxime eget ægrotus, quibusdam dissen-  
tientibus oportet eum nutrirī, praecedenti tamen aliqua cor-  
rectione, vt in ventris profluuiio lac fiat acidum per sex ho-  
ras, aut per noctem eductis partibus butyrosis, facta eius cō-  
motione in vase vitreo, aut terreo quibusdā virgulis & spu-  
ma saepe extracta, erit illud lac astringēs & refrigerans: quē-  
*Lege Gale* admodum est lac, in quo extinguitur quinquies ferrū igni-  
*num lib,* tum, aut chalybs, quo nutriatur sine saccharo. Asininum lac  
*de facult.* post humanum eligatur tāquam tenuius, & facile concoctu,  
*alim. de la* deinde caprinum, praecipue ad refrigerādum & tergendum,  
*Ete.* quia est serosius. Ouinum & vaccae valentiū glutinat, & ma-  
*Lac asini-* gis (vt diximus) nutrit: quia butyrū & caseum imitatur. Hu-  
*num.* manum tamen ad omnia est praestantissimum, si esset eius co-  
*Sumpro la* pia. Non est dormiendum ægro hausto lacte, sed quiescen-  
*Ete non est* dum, ne lac crudum in corpus trahatur. Quare tunc frictio  
*dormien-* cutis maximē noceret: saccharum rosatum his omnibus fa-  
*dum,* cultatibus praeditum est, quamuis recens magis tergat, anti-  
quum verò cōglutinet, sed de eo in quarto genere remedio-  
rum loquemur. Nutrimentum gallinarum iuuenum, capo-  
num, perdicum, attaginis, hœdi, turturis, conturnicis est o-  
ptimum, & ius eorum cum hordeo, & ciceribus cum amy-  
do, & cum lacte amygdalarum dulcium, & quatuor seminū  
frigidorum maiorum, cancri fluuiatiles bene praeparati, si-  
militer limaces saltem eorū aqua, aut ius bene nutriunt, hu-  
midūmq; gignunt nutrimentum, glutinosum, & tardē disso-  
lubile. Testudines, & ranæ degentes in aquis salubribus ma-  
ximē laudātur ab omnibus, horum tamen mentio fiet capi-  
te de curatione heclicæ lib. secundo. Hæc aqua est optima &  
omnibus melior, & huic morbo utilior, omnibūque facul-  
tatibus necessariis praedita est: ℥. foliorum lactucæ. m. iij. ca-  
pillorum veneris m. j. hyssopi. m. j. liquiritiæ recentis si heri  
possit ℥. iij. pulmones duos hirci, aut vituli, pulmonē vnum  
vulpis, si reperiatur, carnis cancrorum secundum artem pa-  
ratæ (quam obseruabis cap. de curatione heclicæ secundo  
lib



libro) ℥.iiij. carnis testudinis nemoralis, carnis limacis bene paratæ ana. ℔.ss. carnis ranarum bonarū ℥.iiij. sacchari candi ℥.viij. pulueris diadragati frigidi ℥.iij. boli armenici præparati ℥.ij. fiat ex his omnibus aqua instrumento vitreo, & igne paucio: quolibet die summo mane bibat ℥.iiij. illius cum paucio saccharo. Potus sit aqua hordei, & vinum album tenuè bene dilutū autore Rhase, inter Arabes viro multæ experientia. Quidam laborantes tabe perfanati sunt solius lactis potu, & si ferrum, aut chalybs, aut lapilli candentes in eo fuerint extincti, erit præstantius, sed ego non laudo permutationem lactis cum aliis alimentis.

Secundò, abigentibus causas phthisis, quæ si fuerit distillatio curatur, ut diximus capite 25. Si verò vas ruptum, *Causæ re-  
motio.* retur ut diximus præcedenti capite: si humor in pulmonibus erodens, appareatur & vacuetur, ut diximus cap. de catharro.

Tertio, tergentibus vlcus pulmonis dulcibus & amaris ut *Detergen-  
tia vlcus.* rhodomelle, syr. de liquiritia, syr. capillorum veneris de hyssopo, de prasio, & decocto pectorali, & cicerum solo cum saccharo, aut aliquo ex prædictis syrupis. Dosis vnciæ tres, quâuis frequenter & omni hora sensim transglutiendo sit utile, & necessarium aliquod ex supradictis medicamentis.

Quartò, implentibus carne vlcus, & glutinantibus, hæc *Sarcotica,  
vel carne  
vlcus im-  
plentia.* tamen propria sunt opera naturæ præcipue præcedenti debita terfione, ut bolo Armeno, sanguine draconis, & similibus cum syrupo pectorali. Saccharum tamen rosatum: anti- quum potenter glutinat ratione substantiæ rosarum, quamuis recens tergat magis, utrunque tamen nutrit ratione sacchari. Quare recenti opus est, cum vlcus est sordidum, & vetusto, vbi fuerit tersum: hoc multis iam morti proximis fuit sanitas restituta, præcipue si semper etiam in prandio & cæna eo nutriantur ægroti. Aliqua sunt quæ totius substantiæ proprietate profunt huic morbo, ut pulmo vulpis, pulmo ericij siccatus: ex his & aliis fiat loch, ut ℥. pulueris pulmonis vulpis, & ericij an. ℥.iiij. pulueris diadraganti frigidi ℥.j. sacchari rosati ℥.vj. gummi cerasi, & Arabici an. ℥.ij. syr. de liquiritia. q.s. misce, & fiat confectio, ad modum loch. Est etiam herba quædam nobis incognita, qua ouis curatur, ipsamque naturali cognitione inquit, & amat, ut autoritate Democriti aliqui scribunt.

Quintò, corrigentibus symptomata, ut alui profluuium, *Correctio  
symptoma-  
tum.* de quo capitibus 36. 37. & 38. dicemus. Fit tamen hoc symptoma ab imbecillitate facultatis retentricis, & concoctri- cis ventriculi, & aliarum partium: puluis diarhodonis Ab- bat



# DE CVRAND. MORB.

batis est optimus, & in vsu frequenti, emaciationem laborantium phthisi corrigunt aqua carnis, iura optima, dicta primo genere remediorum, & alia, quæ dicemus capite de hectica, libro secundo. Si verò fuerit confirmata & antiqua phthisis, insanabilis est, blandè tamen tractāda, & callus excitandus per siccantia. Vixit enim quædam furnaria phthi-  
*Historia* fica viginti octo annis, inspirato sæpe aere sicco furni.  
*armosāda.*

## De Empyemate, id est, suppuratione, & tabe. CAP. XXIX.

### Scholium.

*Due em-  
pyematis  
significa-  
tiones.*

*Altoma-  
rius repre-  
henditur.*

**E**mpyema Græcis. ) Empyema à Latinis suppuratio dici-  
tur: hac duobus modis sumitur, ex 7. aphor. comm. 44. primo  
pro mutatione in pus, in qualibet contingat parte, qua ratio-  
ne Hippocr. lib. prædicto sent. 45. hepar suppuratum appellat, & primo  
prognost. sent. 36. suppurationes foras vergentes bonas, contrarias malas  
scribit. De his etiam suppuratis intelligenda sunt signa, quæ 2. progn.  
sent. 60. ab Hippocrate traduntur. Secundo modo sumitur suppuratio  
proprie, pro ea collectione puris, quæ fit in thoracis cavitate, & pul-  
monis asperis arteriis. Altomarius ex Gal. lib. 5. aphor. comment. 8. &  
2. progn. c. m. 60. tertiam significationem scribit suppurationis, qua sup-  
puratio dicitur mutatio in pus, earum tantum inflammationum, quæ in  
pectore continentur. Nos tamen rem considerantes, ex illis Galeni locis  
duas tantum suppurationis significationes scripsimus, & sic non est hac  
in parte sequendus Altomarius. Hac puris collectio solet fieri ex pleu-  
ritide, & peripneumonia, cum ad suppurationem veniunt, & rumpitur  
abcessus: tum ex distillatione pituitæ à cerebro, in qua reuera pituita nõ  
venit ad suppurationem, cum nec possit nutrire, nisi prius mutetur in san-  
guinem, mutatur tamen in similem puri substantiam, ut patet ex Ga-  
leno 7. aphor. com. 30.

*Phthisis  
unde dica-  
tur.*

*Secunda  
Tabis si-  
gnificatio.*

*Quid sit*

Phthisis (quæ a Græcis Atheniensibus dicitur πτοῖς) à verbo σῆω di-  
citur, quod est corrumpo, aut absumo, & proinde à Latinis dicitur Ta-  
bes, quæ consumptionem significat. Inde duplex phthisis significatio ex-  
orta est, quam scribit Gal. primo epyd. par. 2. com. 13. una & prima si-  
gnificat quamlibet corporis extenuationem, siue ex defectu alimentici (quæ  
atrophia dicitur) siue ex febre hectica, siue ex pure in thorace contento,  
aut ex quavis alia causa exsiccante contingat. Secunda proprie tabes si-  
gnificat eam corporis extenuationem, quæ sequitur ad insanabilia ulce-  
ra pulmonis. Unde mirandum est de Altomario, & aliis cachexiam Ta-  
bis speciem facientibus, cum homines cachectici non sint extenuati, nu-  
trantur etenim, quamvis male. Quod si Hippocrates in epydimis, ali-  
quos



uos natua tabe laborasse scribit, per tabem nullam ex dictis intelli- natua ta-  
it, sed tantum inclinationem ad ipsam, quæ reperitur in his, qui caput bes.  
habent languidam, ita ut facile impleatur, & ad pulmonem fluxiones  
mittat, primo epyd. par. I. com. 18. tum & in his, qui angusto constant pe-  
tore, non quia habent pulmones languidos, & qui facile corrumpun-  
tur, ut male voluit Fernelius: sed quia humores, in loco angusto inclusi  
non recte diffiantur, & sic facile putrent.

Curatur suppuratio hæc.) Empyema morbus est in numero ad- Empyema  
dito, est enim in thorace addita pars toto genere præter naturam, non quis mor-  
necessaria ad actionem, imò quæ causa est actionis lesa. Debet ergo au- bus sit.  
erri, hoc est pus debet euacuari tussi, ut locus, in quo continetur, nobis  
indicat: assumi tamen debent medicamenta, quæ ipsum attenuant. Et Attenuan-  
ideo summo mane assumere poterit æger mel destigmatum, aut pulue- tia pus.  
rem iridis cum mulsâ, aut sequentia duo medicamenta. Primum ℞.  
Syrupi de hyssopo ℥.iii. Syrupi violarum & oxymellis scillitici ℥.ss. misce.  
Secundum ℞. loch caulium, loch sanum & expertum ana. ℥.j. succi li-  
quiritiæ ℥.iii. pul. diaris & diapenidionis an. ℥.j. ss. conseruæ capillo-  
rum veneris ℥.iii. cum oxymelle scillitico, & syr. violarum, quod sat est,  
misce, & fiat loch. Quod si pus ex inflammatione rupta sit, quod cõtine- Cicatricem  
tur in thorace, post puris expurgationem cicatricem inducimus exiccant- inducen-  
tibus, qualia sunt ℥.j. sulphuris cum melle, aut miscebis cum ovo, aut tĩa,  
decocto scordei sulphur, aut eiusdem scordii puluerem. Aut bolum ar-  
menum cum melle, vel decocto fœtici mixtum exhibebis. Suffumigium  
etiam facere oportet ex sandaraca arabum, thure, & mastiche, aut ex  
rusilagine, quæ est ungula caballina officinarum. Si pus prædictis me-  
dicamentis non expurgatur, ad sectionem devenies: quamvis fere hi o-  
mnes moriantur phthisici.

Phthisis si curari possit.) Pulmonis vlcus tunc curari potest, cum Quando  
non habet inflammationem coniunctam, ea enim præsentem, impossibile vlcus pul-  
est ipsum curare, ubi causam à Gal. pr. positam §. method. cap. 8. in quo monis cu-  
etiam capite habes curationem vlcis pulmonis. Frequenter autem so- rari possit.  
let exire corporis extenuatio ex materia, & thorace in puris similitu- Tabis im-  
dinem mutata, & à capite distillante, quam tabem improprie appel- proprie cu-  
lamus. Cognosces autem hanc materiam non esse pus, quia in his homi- ratio.  
nibus neque inflammatio interna, neque profluuium sanguinis præ-  
cessit. Oportet autem hæc diligenter curare, quia febrem excitat putrem,  
in qua moriuntur ægri: hac tabe mortuus fuit Antiphonis filius 7. e-  
pyd. sent. 27. Curabitur prius distillationi proficiendo illis, quæ cap. de  
citharro diximus: extenuanti etiam victu, & medicamentis, quæ in-  
ferunt humorem crassum. Purgabimus etiam pituitosum excremen-  
tum pilulis de agarico, & aliis.

## De Palpitatione cordis, & syncope.

CAP.



DE CVRAND. MORB.  
CAPVT XXX.

**P**alpitationis cordis, seu tremor (quam recēiores medici malè cardiacam appellāt) motus cordis deprauatus est, nimirum dilatatio eius præter naturam.

*Descriptio.* Fit palpitationis propter inclusum vaporem crassum, ac multum. Hæc enim est generalis causa omnium palpitationum, cuiuscunque fuerint loci, vt docet Gal. 5. de symptomatum causis: quamuis quinto de locis affectis scribens causas affectuum præter naturam cordis, & ventriculi de huius affectus causis, porro inquit vtriusque partis, tum oris ventriculi, tum cordis dispositiones aut forti duntaxat intemperie, aut venenoso humore, nonnunquam ab erisipelate, aut inflammatione, aut aliquo præter naturam tumore fieri solēt.

*De syncope, eiusque descriptione, & causis.* Ab iisdem causis, sed maioribus fit syncope: quæ est (autore Galeno lib. 12. method.) præceps virium lapsus, qui sæpe à causis externis accidit, vt à dolore, timore, ira, & terrore, & vacuationib<sup>9</sup> maximis, vigiliis, & inedia, & aliis multis, quæ vires dissoluere valent. Deprehenduntur hæ affectiones, pal-

*Nota palpitatio cordis.* pitatio quidem, ex ægroto euidenter sentiente hoc malum, & ex pulsu, qui in causa calida velox est, & aliquando cum febris: in frigida, contrarium apparet. Si ab humore intra pericardion collecto palpitationis cordis fuerit, pulsus est mollis, & languidus.

*Notæ synopes.* Cognoscemus syncopem ex pulsu maximè languido, & deficienti: ex frigore extremorū, & colore faciei albo, & exāgui, ex sudore frigido, & priuatione sermonis & motus totius. Quando per consensum ventriculi fit syncope, sentitur prius dolor in ipso ventriculo, & grauitas, & sæpè nausea, ac vomitus cum angustia præcedit, de quo capitibus sequētib<sup>9</sup> agemus.

*Curatio palpitatio cordis.* Curatur palpitationis cordis quinque remediorum generibus, primò, victu, si causa calida est, refrigerante, vt aere refrigerato rosis, santalis, aceto, violis, nenuphare, myrto, addito vino, & ambra, vt frigida promptius penetrēt ad cor. A causa verò frigida, calfaciente, vt aere commutato, & alterato rore marino, maiorana, basilicone, saluia, moscho, ambra, melissa, & similibus. In his cordis morbis ratio aeris præcipua est habenda. Mox enim penetrat ad cor inspiratus aer. Cibi sint boni succi, & faciles concoctu, refrigerati in calida, acetosa, aceto, agresta, succo malorum medicorum (vulgò naranias vocant) limonum, & citrorum: & in frigida causa, maiorana calefacti, basilicone, rore marino, fœniculo, & simil



audili milibus. Vinum in hac est optimum, sed in calida vitetur, & recipiue generosum, & vaporosum: dilutū tamen aqua hor-  
lei, aut rosarum vel alia refrigerante cōfert, in omni tamen  
mausa, si ventriculus sit imbecillus, bibat vinum, aut aquam  
innamomi.

Secundò, sanguinis missione, præsertim si fuerit à sangui- *Remissio.*  
e, & æger carnosus, per sectionem iecorariæ dextræ, non v-  
nam tantum, sed plures, si non fuerit senex. Si verò fiat à fla-  
u implente ventriculum sinistrum cordis, secunda est basili-  
a sinistra, & parçe sanguis mittendus.

Tertiò, apparantibus materiam crassam tenuantibus, & *Prepara-*  
alidam frigidis, eius acrimoniam remittentibus: sed tam ca *tio.*

ididis, quam frigidis moderatis: ne offendatur cor, pars prin- *Consilium.*  
ceps, & fons vitæ. Quare in causa calida medicamentis fri-

gidis aliqua aromata calida sunt miscenda, vt eorum frigi-  
litas immodica reprimatur: & vis etiam frigida mista cali-  
do medicamento promptius (vt dixi) ducatur ad cor. Opti-  
nè igitur trochiscis de cāphora additur crocus, & alia que-  
dam calida secundum quosdam: quamuis calida sit officina-

rum cāphora. Calida ergo materia apparatur per duos aut *Camphora*  
tres dies syrupo violato, rosato, endiuia simplici comp. & in *nostra ca-*  
magna caliditate syrupo acetositis limonū, aut citri, cum *lida est.*

quis aut decocto rosarum, endiuia, portulacæ, lactucæ, plā-  
raginis, nenupharis, & similia. Frigidam verò, & pituito-  
am incidunt, & tenuant mel rosatum colatum, syrupus de  
nyssopo, oxymel S. & comp. syrupus de duabus & de quinque  
radicibus cum aquis fœniculi, melissæ, betonicæ, scabiosæ.

Hæc materia eget maiori concoctione, quæ non fiet tribus *Aduerte.*  
tantum diebus, nec forsan sex: quamuis ob loci nobilitatem  
vacuatio sit facienda aliquando non expectata concoctione.

Materiam melancholicam concoquere valent ea, quæ dixi-  
mus i. cap. vt sunt syrupus borraginis, buglossæ, fumariæ. S.  
de pomis, de epithymo, & syrupus fumariæ compos. cum a-  
quis buglossæ, borraginis, melissæ, & sero caprino. Sed hæc  
terrestris materia eget magna concoctione.

Quartò, vacuantibus materiam calidam medicamentis *Purgatio.*  
cholagogis, de quibus diximus cap. i. sed in hoc affectu sem-

per sunt miscenda cardiaca, & rarò cōueniunt scammonia-  
ta, quia nocent cordi, nisi benè correctæ: & quando clemen- *Obserua.*  
tia non sufficiunt: vt ℥. rhabbarbari electi infusi per noctem

in aqua endiuia ℥. iij. medullæ cassiæ fist. recens extractæ,  
aut mannæ electæ ℥. j. syr. borraginis ℥. j. decocti florum cor- *Calide cau-*  
dialium. q. s. misce, & fiat potus. Si sit materia pituitosa, hoc *se.*

aut



# DE CVRAND. MORB.

*Melancho-  
licæ mate-  
ria.* aut simili medicamento vacuabitur: ℞. agarici trochiscae  
℥.iiij. corticum myrobalanorum chebulorum 3.j. diacath-  
liconis 3.vj. rhodomellis 3.j.℥. aquæ fœniculi. q. s. misce  
fiat potus. Si vero sit materia melancholica, hoc aut simili me-  
dicamento vacuetur: ℞. corticum myrobalanorum indo-  
rum 3.j.℥. pulueris epithymi 3.j. feri caprini 3. iiij. misce, &  
fiat potus. Quandoque necessarium est, laborantem cardiaca  
biliosa, vacuare 3.iiij. diaprunis solutiui cum aliis iam dictis,  
& laborantem pituitosa 3.iiij. electuarij indi maioris: & me-  
lancholica cardiaca. 3.iiij. confectionis medicaminis hamet  
cum cassia aut manna, quando humores redundarint.

*Auersio.* Quinto, auertentibus materiam a corde ad partes igno-  
biles, præsertim vrgentibus symptomatis, & in ipsa accessio-  
ne, vt secta vena malleoli, præsertim in mensibus detentis,  
aut hæmorrhoidibus, & vinculis dolorificis, & fotibus par-  
tium extremarum, clysteribus, & cucurbitulis.

*Corroboratio, & alte-  
ratio.* Sexto, corroborantibus cor, & ipsius intemperiem corri-  
gentibus, sumptis, vel admotis. In calida sumantur ex sim-  
plicibus, spodium rosæ, violæ, nenuphar, acetū, corallus, suc-  
cus limonum, succus citri. Ex compositis electuarium dia-  
rhodonis Abbatis, diatrium santalorum, diamargaritonis  
*Sumenda  
S. & com-  
pos. refrige-  
rantia.* frigidi, confectio de hyacintho, confectio Gentilis cordia-  
lis contra melancholiam, conferua acetosæ, rosarum, & vio-  
larum. Sæpe enim his & similibus vti debet multis diebus  
summo mane: accipiat 3.iiij. electuarij diarhodonis Abbatis,  
aut diamargaritonis frigidi cū 3.iiij. aquæ acetosæ, aut syru-  
pi rosarum, aut alio ex prædictis liquoribus. Accipiat si di-  
ues sit omni hora in hac cardiaca cochlearium vnum huius  
confectionis cum pauca aqua rosarum aut acetosæ, aut alia  
simili, ℞. conferuæ rosarum, & acetosæ an. 3.j. cōfectionis de  
hyacintho, & Gentilis cordialis contra melancholiam an. 3.

*Dimitt.* ℥. pulueris diarhodonis Abbatis, & diamargaritonis frigidi  
an. 3.ij. margaritarū electarum, & ossium de corde cerui an.  
3.j. foliorum auri numero iij. syrupi acetositis citri. q. s. mi-  
sce, & fiat confectio: adde musci & ambre an. 3.iiij. Cordi ad-  
moueat sepe hoc epithyma, aut simile, in hyeme actu ca-  
lidum, & in æstate aut frigidum, aut remisse calidum: ℞. a-  
quæ rosarum 3.iiij. aquæ acetosæ 3.ij. aquæ melissæ, & vini  
albi odoriferi an. 3.j. pulueris diamargaritonis frigidi, & tro-  
chiscorum de camphora an. 3.j. croci puluerizati 3.℥. s. mi-  
sce, & fiat epithyma. Saccus hic cordi semper admotus, est  
optimus in hac calida cardiaca, ℞. florum nenupharis, rosa-  
rum violarum, & buglossæ an. 3.ij. pulueris dimargaritonis

*Admonē-  
da refrige-  
rantia.* *Epithyma.* *Saccus.* frig



frigidi 3.j.ß. santalorum omnium an. 3.j. musci, & ambre an. 3.j. fiat sacculus ad formā cordis, seu scuti cum sindone coccinea. Si tamē fuerit pauper, epithima ex sola aqua rosarum *Pauperi.* cum aceto, & croco, erit optimum ad corroborandum. Similiter in omni palpitacione cordis odor succi pomorum, aquæ *Odorifera* rosarum, & nymphææ cum paucō vino albo & musco simul *profunt.* cum ambra potenter corroborat cor. In frigida sumantur *Sumenda* calida simplicia cardiaca, & composita, vt buglossa, melissa, *calfacien-* zedoaria, doronicum, cortex citri, crocus, moscus, ambra, & *ria.* similia composita, vt diamoschus dulcis, & amarus, electuarium de gemmis, diamargaritonis calidi, confectio Alkermes, & similia: multis diebus ventriculo vacuo accipiat 3. iij. electuarij diamargaritonis calidi, aut electuarij de gemmis cum 3. ij. aque melissæ, aut basiliconis, aut alia simili. Omni hora accipiat cochlearium huius aut similis confectio-  
nis: ʒ. theriacæ de citro, & diamusci dulcis an. 3. j. confectio-  
nis Alkermes 3. iij. conferuæ buglossæ 3. ß. pulueris diamar- *Confectio.* garitonis calidi, & electuarij de gemmis an. 3. ij. margaritarum electarum 3. j. foliorum auri numero iij. syrupi buglossæ. q. s. misce, & fiat confectio. Hoc epithima in hac frigida *Admoneri* cardiaca est optimum: ʒ. aque melissæ, & buglossæ an. 3. iij. *da.* vini albi odoriferi 3. j. pulueris vtriusque diamargaritonis *Epithima.* an. 3. j. croci puluerizati, & coralli rubri præparati an. 3. ß. musci & ambre an. 3. iij. misce, & fiat epithima. Hic sacculus, aut similis est optimus in hac cardiaca: ʒ. florū buglossæ, citranguli, & coriandri præparati an. 3. iij. corticis citri, gariophyllorum, cinnamomi, zedoariæ, doronici, basiliconis an. 3. ß. rosarum 3. j. musci, & ambre 3. v. fiat ex his puluerizatis sacculus ad formam cordis cum sindone coccinea. Si *Sacculus.* fuerit hæc palpitatio à vermibus, eapite si dicemus de ea. Si autem à veneno, oportet scire per proprias notas veneni speciem, & naturam, vt propria medicamenta cardiaca exhibeantur. Sed hæc ab Italis & Romanis tractantur frequen-  
tius, cum apud eos multi veneno pereant. Lege tamē librum *veneno pal-* de venenis doctoris Santes & Ordenies. Lege etiam Alexi-  
pharmaca Nicædri, & eiusdem antiquissimi medici, & poetæ librum quoque de theriaca vtilissimum, quem noster ciuis & amicus doctor Petrus Iacobus Steue fidelissimè interpretatus est, doctissimisque expositionibus illustrauit.

Syncope curatur primò per asperionē faciei, & aliarum *Curatio* nudarum partium aquæ frigidæ, præsertim rosatæ. Prohibet *synco-* enim hoc remedium spiritus resolutionem, dummodò non  
pronemiat syncope à causa frigida, vel alui profluuiò: tunc *Admonē-* maximè noceret aquæ frigidæ inspersio, sed cum est ab æstu, *da.*



## DE CVRAND. MORB.

aut febris incendio spiritibus resolutis, saluberrima est aqua frigida, aut rosata sola, aut aceto faciem ægri aspergere, & nutrire spiritus bonis odoribus naribus admotis, nisi sit syncope ab vteri præfocatione: quia tunc odora naribus admota nocerent, vt dicemus capite de vteri præfocatione. Spiritus tamen intus in corde quasi conculcati, quod sæpe cõtingit in hoc morbo, reuocandi sunt ad partes externas frictionibus, & ligaturis partium extremarum, & cucurbitulis, & euellendo pilos, & naribus auribusque dolorem inferendo, ne fiat subita strangulatio. Si syncope fiat ob spiritus resolutionem post sanguinis vacuationem, aut alui fluorem, aut aliam euacuationem, nocent maxime, quæ dolorem inferunt, & quæ reuocant spiritum ad partes externas: odora tamen omnia, sunt optima & necessaria: auctore enim Gal.com.ii. secundi libri Aphor. quæ citò nutriunt, sunt liquida, vinum citius, & omnium maxime & celerrime sunt odores, vt hæc optima mixtura: ℞. aquæ rosatæ ℥.iiij. aquæ florum aranciorum ℥.ij. vini optimi albi, & succi pomorum redolentium an.℥.j. musci, & ambræ ana.ḡ.vij. misce, & sæpe naribus & faciei admoueat parum huius mixturæ. Nutriatur aqua carnis gallinæ iuuenis, aut capri, & perdicis, & arietis, quam nostri valentini destillat appellant. Hæc enim celeriter nutrit, ac subito ferme in sanguinem & spiritum transmutatur: id eoque à multis laudatur, tanquam vltimum & maximum alimentum ad cordis & totius corporis imbecillitatem. Quæ cor corroborant, spiritumque vitalem instaurant, vel saltem perfectiorem efficiunt, multa sunt, de quibus dictum est superius hoc capite. Curatio syncopes, quæ ab aliis fit causis tradita est à Gal.12. methodi, & i. de arte curatiua ad Glauconē, & nos in curatione aliorum morborum eam trademus.

*Victus.*

*Admonitio.*

### De Palpitatione cordis, & Syncope.

#### CAPVT XXX.

##### Scholium.

*Palpitatio cordis quid.*

**P**alpitatione cordis. Palpitatio cordis est dilatatio eius, & compressio præter naturam. Hic autem motus non fit à facultate, quia pulsus diceretur: Sed à flatu exitum quærente. Unde est symptoma, quod refertur ad actionem læsam, est enim motus deprauatus. Hinc apparet error Hollerii in suo lib. de curandis morbis cap. 27. & Iacobi scholio: existimantium palpitationem cordis fieri ab excretionibus triue facultate cordis, conante expellere id, quod molestum est: hæc enim ratione palpitatione non esset motus à solo morbo factus, quod falsum esse intel



intelliget, qui cap. 2. lib. 2. de symp. causis perlegerit. Quod motus in pal-  
 pitatione, qui violentus est, & partis causæ, simul et mollis, fiat ab spiri- Causa pal-  
 tu, celeritas dilatationis eius, & compressionis ostendit: cuius humor cau- pitationis.  
 pitationis esse non potest. Palpitatio cordis fit ab spiritu crasso, in eius sinu con-  
 tento, & exitum quærente. Hic aut ibi generatur, aut aliunde ascendit.  
 Si ibi generatur, palpitationem (quæ est affectus proprius) generat. Si  
 aliunde ascendit, ex utero, ventre, aut alia parte, fit palpitatio per con-  
 sensum. Dices nonne est tertia palpitatio, quæ fit ab humore in pericar-  
 dio contento, quam Gal. 5. de loc. affect. cap. 1. palpitationem cum signifi-  
 catione appellat. Respondeo, hanc esse palpitationem propriam, cum in  
 ea, ab spiritu genito in pericardio (quod à corde non distinguitur) cor di-  
 citur. Dicitur autem cum significatione fieri, quia fit cum Typo, hoc est  
 cum signo manifesto, ab humore enim in pericardio incluso cor compri-  
 mitur, ita ut in principio palpitationis sentiant ægri compressionem, quam  
 nos etiam ex pulsu deprehendere possumus. Quacunque ergo ratione  
 contingat palpitatio cordis, semper fit ab spiritu flatulento, in corde de-  
 contento: qui paucus non est, nam in viscere calido statim discuteretur, sed  
 multus, ita ut aliquando suffocationem fere inducat caloris, & sic animi  
 deliquium, & synopem, & aliquando omnino, suffocato calore, mortem.  
 Quod cum consideraret Gal. lib. 5. de loc. affect. Omnes hos ante quinquag- cap. 2.  
 gesimum annum more scribit. Cum palpitatio omnis ab spiritu fiat, Gal. Morbis in  
 2. de cau. symp. cap. 2. omnem partem palpitantem esse refrigeratam col- palpitatio-  
 ligit. Si enim multum calida est, vaporem excitabit, & discutiet, si mul- ne.  
 tum frigida, non eleuabit vaporem: debet ergo esse frigida, sed parum. Ex  
 his habebis palpitationem cordis sequi morbum similem, nempe intem-  
 periem frigidam. Hæc in palpitatione, quæ est proprius cordis affectus,  
 in ipsomet corde consistit, ac in ea, quæ est per consensum, in parte humo-  
 rem generante. Aduerte tamen, cor refrigerari, aut in propria essentia,  
 aut (quod ut in plurimum ei contingit) agraatione caloris, facta à mul-  
 to humore, tunc enim calor cordis, comparatione facta ad illum humo-  
 rem, dicitur diminutus, ita ut non possit vapores ex eo eleuatos discutere.  
 Flatus autem materia est humor potissimum crassus, qualis est melan-  
 cholicus. Ut synopes essentia intelligatur, aliqua oportebit supponere primū sap  
 maximè necessaria. Primum est, vires nostri corporis esse positas in natu- positū ad  
 ra partium solidarum, carnosarum, & spirituosarum, ita ut partes car- synopes  
 nosæ, & solidæ, sint actionum principia, at spiritus, instrumenta. Secun- essentiam.  
 dum est, prædictarum partium naturam postulare quantitatem, seu Secundum,  
 molem elementorum, & debitum qualitatum temperamentum, si vires  
 debent esse validæ, & actiones firmæ. Tertium suppositum est etsi vires Tertium.  
 in natura omnium corporis partium, posita sint, potissimum tamen in tri-  
 bus, quæ principes dicuntur (corde, cerebro, & iecore) consistunt: ab his  
 enim corpus gubernatur. Quod quamuis ita sit, præcipue vitam in cor-  
 de collocamus, quia in eo generatur materia (nempe spirituosus sanguis)  
 à qua



## DE CVRAND. MORB.

à qua calidum innatum, quod est vitæ instrumentum in toto corpore conseruatur: & ideo nemo potest mori quin cor cesset agere. Ex his, quod querimus, facile inuentum erit. Si enim vita in quantitate, & qualitate partium præcipuarum, & maxime cordis sedem habet, tunc labentur vires, cum aliqua ex dictis partibus (& potissimum cor) quantitate deficiet, aut qualitate alterabitur. Animi igitur deliquium, & syncope, nil aliud sunt quam virium lapsus. Quod si inter hæc est aliquod discrimen, leue tamen positum in ratione maioris & minoris: ita vt animi deliquium via sit ad syncope. In animi enim deliquio sentiunt ægrotantes

**Quid syn-** vires deficere (& hic est eius terminus) non autem in syncope: in ea enim  
**cope,** & a- cum sit maior affectus, nec sentiunt, nec mouentur: quamuis possit esse  
**nimi deli-** syncope sine animi deliquio precedente. Obiciet quis, si animi deliquium,  
**quium,** & & syncope, sunt passionis cordis, qua ratione affectus eos ex actionibus  
eorum di- facultatis animalis distinguimus, in animi deliquio sentientes defectum  
**scrimen.** sensus, & motus voluntarii, non autem in syncope? Respondeo aliorum  
**Obiectio.** sententias omittens reuera animi deliquium, et syncope, affectiones esse

cordis, consentire autem ad eas cerebrum, ex defectu enim spiritus vitalis generari non potest animalis, & hac ratione eam concidere, quæ cum habeat actiones nobis manifestas, proinde ex illis affectiones cordis colligimus. Quæ cum ita sint, eadem ergo erunt viriusque affectionis (animi deliquii, & synopes) causæ, consistentes in illis rebus, quæ dissipant animi de- substantiam partium, aut spirituum, aut earum evertunt temperamentum: toto temperamento operantia, vt venena, aut qualitate manifesta, vt quæ calore, frigidityte, humiditate, aut siccitate agunt. Hac ratione in cholera morbo, diarrhæa, dysenteria, henteria, muliebri profluvio, sudore, animi pathematis, in quibus sanguis ad externa mouetur magna medicamenti purgantis euacuatione, & similibus, ob substantiæ spiritus dissipationem fit animi deliquium, sicut in marasmo, ob dissipationem substantiæ solidæ. In cruditate ventriculi fit animi deliquium, ab intemperie calida cordis per consensum genita, sicut in bullimo à frigida: in apoplexia verò, in equam præhendat, in principis accessionum, in magnis inflammationibus viscerum, gangræna, et in illis animi pathematis, quæ habent motum ad interna, animi deliquium ab intemperie frigida ex suffocatione caloris orta provenit. In balneo & sole, animi deliquium ex intemperie & dissipatione spiritus ortum habet. Atque hæc sunt alterationes manifestæ prædictum generantes affectum. Præter quas est venenum, quod qualitate occulta, hoc est toto temperamento alterando ani-

**Error an-** mi defectum inducere solet.

**Etoris,** & Curatur palpitatio cordis.) Nescio quid in mentem venerit a-  
aliorum præ Etori, & aliis practicis, in curatione palpitatiois distinguentibus, an  
Etorum. fiat palpitatio à causa calida, an à frigida: quia siue loquantur de causa  
Victus in efficiendi, siue materiali, semper est frigida, vt diximus. Ac proinde ipsis  
hoc affectu omisis, perpetuò victus rationem attenuantem in hoc affectu admini-

strab



trabis, ex qua humores tenues generantur: & semper fugies alimenta melancholica.

Secundò, sanguinis missione.) Hoc in loco distinguere videtur Lābitur auctor palpitacionem à flatu, ab ea quæ à phlegmone fit: quasi sit palpitatio sine flatu. In palpitacione ergo omni sanguinem mittes. Si causa Sanguinis sit plethora grauians, vt euacuemus, si cacochimia ob vitium sanguinis missio.

is, cum quo multa cacochimie portio educi solet, & sic reuelli à loco affecto. Obiciēs eam palpitacionem, quæ ex humore in pericardio contento ortum habet, in qua nõ debemus sanguinem mittere, vt euacuemus, quia non fit à plethora: neque vt reuellamus, quia non fit à cacochimia venarum. Respondeo esse sanguinem mittendum in ea, vt euacuemus, nam cum illa aqua exciderit à venis, poterit iterum ad eas remigrare: vel possumus dicere, sanguinem mitti ob reuulsionem, quia vacuato humore ex venis, non descendet ad pericardion. Si fiat sanguinis missio, vt reuellamus, & euacuemus, ex brachio aut saphena. Quod si sint suppressi menses, non est tunc eorum habenda cura, quia palpitatio vrget.

Tertiò apparantibus.) Materia palpitacionis, cum vt in plurimum Syrupi crassa sit, melancholia scilicet, postulat attenuantia, qualia sunt syrapi de bizantiis, endiuie compositi, oximel, rhodomel, cum decocto melissæ, thimi, & similibus. Vnde distinctio auctoris de causa calida aut frigida omittenda est, nunquam enim fit à materia calida.

Quartò, vacuantibus materiam.) Malè auctor in palpitacione cordis viuitur medicamento purgante bilem, cum hæc non sit causa palpitacionis. Purganda ergo erit pituita, aut melancholia.

Sextò, corroborantibus cor.) Cum palpitatio cordis à flatu fiat, Auctoris vt diximus, exterius, & interius, ea quæ ipsum dissipare possunt, vilia lapsus. runt. Exterius, thoraci ex parte, quæ respicit cor, applicandi sunt sacculi parati ex rebus calidis, qualia sunt cinnamomum, camemelum, gariophylli, et similia, quæ extenuandi habent vim. Hoc medicamentum opiflatum, imum est, ℞. foliorum roris marini, thimi, & satwreie an. ʒ. i. melisse ʒ. i. s. cinamomi, & gariophyllorum an. ʒ. i. rosarum siccarum ʒ. iii. muci, ambre an. ʒ. iii. fiat ex omnibus pul. tenuissimus, ex quo fiat sacculus. Per os similiter confectio Gentilis contra melancholiam, et alia flatuum discutientia, assumenda sunt. Ex his presenti loco multos auctoris errores animaduertes, primum, cum exterius, & interius iubet assumi, Nota mul & applicari medicamenta quæ frigida sunt, sentiens cum multis aliis tot auctoris palpitacionem cordis fieri ab eius feruore. Secundum, construens illas errores. cardiacas confectioes ex margaritis, ossibus, gemmis, pulueribus frigidis & aliis, quæ augent materiam flatuum, et eiusdem dissolutionem impediunt. Tertium, palpitacionem quandam à vermibus factam nobis vendens, cum talis non extet, sicut nec palpitatio à veneno.

Syncope curatur primò.) Syncopem curamus aut in accessione, aut extra accessione. Cum in accessione eam curamus, tunc solius




## DE CVRAND. MORB.

*Aduerte* Symptomatis habemus rationem, quo tempore cum calor sit in partibus syncopis *ve* internis inculcatus, modis omnibus nitimur eum exterius euocare leuiter ram cura-*fricantes* cutem, & maxime eam, quæ est in ore ventriculi, quia hac in-*tionem.* cunda frictione calor natiuus excitatur. Nares etiam comprimimus, quia tunc ob usum respirationis excitatur facultas, & calor roboratur. Odorare etiam facimus vinum, vt spiritus resciantur, propter quam etiam causam inspergimus frigidam aquam supra faciem, hæc enim excitat facultates naturales sopitas in syncope. Cum extra accessionem syncopem curamus, tunc non symptomati prospicimus: sed morbo, à quo pendet, qua ratione præuenimus syncopem. Si ergo syncope eueniat spiritu dissipato, ipsum resciciemus vini potu, qui celerrime id præstat, si non sit interna inflammatio, delirium, capitis dolor, aut febris cum cruditate ventriculi. Vinum autem in regione, ætate, et tempore frigidis calidum, in contrariis frigidum exhibendum est, remedia etiam adhibenda sunt causæ, quæ dissipat spiritus. Si syncope euenit ex substantiæ solidæ eua-*cuatione*, alimentis boni succi, & facilis concoctionis impiedietur. Si in-*temperies* eius est causa, contraria intemperies, si venenum, alexipharmacum medicamentum proderit. Quod si intemperies syncopem gene-*rans* à multitudine fiat, sanguinem mittemus. Atque hæc sunt medica-

*Quæ medi* menta cardiaca verè, non illa quæ à barbaris medicis, & eorum sequa-*camenta* cibis cordialia appellantur, ex auro, argento, gemmis, terra lapidibus, et  
*cardiaca.* ossibus indiscriminatim in omni morbo constructa.

### De imbecillitate ventriculi, & de dolore, & inflammatione eiusdem.

#### CAPVT XXXI.

 Vanquam quælibet ventriculi læsio imbecillitatem gignit, ea tamen, quæ in coctione est, etiam si valida sit appetentia, dicitur ventriculi imbecillitas. Quo affectu laborantes stomachicos appellant medici, quemadmodum & hepaticos Gal. nominat 6. de symptomatum causis eos, qui imbecilla coctione iecinoris infestantur. Hæc coctio, vt quælibet alia actio, tripliciter læditur, vt diximus, Gal. autore 3. de symp. diffe. & cap. 80. artis medicinalis: quia vix, aut quia vitiose, aut quia nullo modo: vltimum symptoma dicitur à Græcis, Apepsia, & Latinis cruditas: duo priora dicuntur homonymos, mala scilicet concoctio ventriculi: quæ si tarda sit, cruditas quoque dicitur, ita vt cibi vix propriam suscipiant transmutationem, & hæc à Græcis dicitur bradypepsia, de qua in præsentia agimus. Si verò omnino cor-  
rumpantur cibi, vt nullam bonam coctionem admittere possint



possint, sub mala & vitiosa coctione comprehenditur, quam  
 uis nullum proprium habeat nomen. Tarda concoctio fit, *Causæ.*  
 quia cibi difficulter concoquuntur, vel quod potentia illos  
 non superat, vel quod somnus breuior fuit, quam ut eos vin-  
 cere possit, vel quia immodica copia sumpta sit, vel quod  
 coctioni repugnent, vel quod inordinate sumatur. Quod  
 si præter hæc acrem aliquam, aut alienam habeant qualita-  
 tem, non tam imbecillam concoctionem, quam corruptam  
 pariunt. Potentia illos non superat, aut quia per essentiam  
 læsa sit, aut propter aliquem morbum instrumentorum, ut-  
 cunque tamen fiat, imbecilla reddita est. Per essentiam verò  
 læditur ventriculus, cum intemperie aliqua primarum qua-  
 litatum laborat vel simplici, vel coniugata: nuda, vel cum  
 humore. Per instrumentorum verò morbos, ut sunt erysipe-  
 lata, ædemata, phlegmones, scirrhi, abscessus, atque alij hu-  
 iusmodi morbi. Deprehenditur hoc malum: Si culpa quidem *Notæ.*  
 ciborum fuerit, & potus, ab ægro, & aliis scies: liberalioris  
 tamen potus indicium est fluctuatio, cibi verò, grauitas in  
 ventriculo percepta. Deinde num ingesti cibi fuerint con-  
 coctu difficiles, ut panis in clibano non bene coctus, vel fer-  
 menti expers (quem azymum appellant) aut carnes bubulæ,  
 suillæ, hircinæ, asininæ, atque camelinæ, nam his vltimis A-  
 lexandriæ homines vescuntur. Deinde imbecillitas ventri-  
 culi, quæ cibos superare non potest, cognoscitur: si ab intem-  
 perie nuda proueniat per ructus. Nidorem enim referentes  
 calidam arguunt intemperiem, acidi verò frigidam. Præ-  
 terea ubi calor infestat, sitis adest, secus ubi frigus: si humor  
 quoque cum intemperie affuerit,prehenditur & ex graui-  
 tate, & ex ructibus, & ex iis, quæ foris emittuntur, aut deor-  
 sum per secessum, aut sursum per vomitum. Tumores verò  
 præter naturam, ut erysipelata, ædemata, & reliqui, propriis  
 signis cognoscuntur, & qui his tumoribus laborant, contra-  
 riis non in totum iuuantur. Ab iisdem his causis, quæ supra *Causæ do-*  
 numeratæ sunt, duæ quoque affectiones fiunt, dolor scilicet *loris, et in-*  
 ventriculi & inflammatio: dolor ab intemperie sola fit, aut *flammati-*  
 ab humoribus calidis & frigidis sine putredine. Inflamma- *nis.*  
 tio verò ab influxu humoris calidi, & sanguinei putridi, do- *Notæ.*  
 lor per se manifestus est. Inflammatioprehenditur, quia in  
 ventriculo dolor adest immensus, assiduus, & qui nullis me-  
 dicamentis admotis mitigari potest: præterea tumor, æstus,  
 qui tactu diiudicari queat, febris grauitas, & nausea.

Hæc ventriculi imbecillitas nullam propriam habet cura-  
 tionem, cum a multis causis (ut diximus) fieri possit: sed ces-



# DE CVRAND. MORB.

fat morbus eius causa profligata.

*Curatio im-* Sæpe tamen reualescentibus a diuturno, aut magno mor-  
*becillitatis* bo adest imbecillitas ventriculi, quæ curatur roborantibus  
*reualescen-* qualitate tum manifesta, tum occulta: de quibus in vltimo ge-  
*tium per* nere remediorum dicemus: neque verò in ventriculo imbe-  
*roboraria.* cillo sunt vtilia calida, sicca, & astringentia: præsertim cum  
est ab intemperie calida, vt docet Gal. 7. method. contra suos  
præceptores: imò in frigida causa calida medicamenta pru-  
denter sunt admouenda, & exhibenda, ne ex accidenti resol-  
uatur naturalis calor. Sed quia frequentius fit hoc sympto-  
ma a morbo frigido, cum materia, illius curationem in præ-  
sentia ponimus, & describimus.

*Curatio in* Curatur ergo hæc quinque generibus remediorum: primò  
*temperiei* victu calfaciente, & exiccante, & cibis facilibus concoctu, vt  
*frigida cū* sunt perdices, conturnices, turtures, & similes. Ius arietis  
*humore.* cum menta aut fœniculo, aut salvia, aut petroselino est vtile.  
*Victus.* Exercitatio moderata ante cibum confert. Coitus maximè  
nocet, & animi perturbationes. Bibat vinum rubrum Sagun-  
tinum, aut simile bene dilutum, aut aquam cinnamomi, aut  
decoctum seminis fœn. vel anisi. Omnia pituitosa alimenta  
nocent, vt pisces, legumina, & herbæ frigida.

Secundò, curatur apparantibus pituitam, vt rhodomelle,  
*Prepara-* syrupo de absinthio, syrupo de menta, oxymelle. S. & compos.  
*rio.* cum decocto, aut aquis fœniculi, seminis anisi, mentæ, absin-  
thij, maioranæ, & similium. Concocta pituita per sex, aut oc-  
cto dies.

Tertiò, vacuantibus ipsam pituitam myrobalanis chebulis  
*Tempus co* qui simul purgant & corroborant ventriculum, eorum enim  
*tionis.* vsus continuus est optimus, & expertus, aloe, agarico, turbit,  
*Purgatio.* pilulis de Hiera. S. quæ magis purgat, quam sicca, autore Gal.  
*Error A-* 7. methodi. Errant ergo Arabes dicentes ipsam cum melle  
*rabum.* minori vi præditam esse. Pilulis elephanginis, pilulis stoma-  
chicis, electuario diaphænicon, & similibus, quæ non attra-  
*Hiera com* hunt ab aliis partibus longinquis ad ventriculum. Hiera ta-  
*mendatio.* men S. obtinet principatum in morbis ventriculi curandis.  
Quare ʒ. j. eius cum rhodomelle, & decocto fœniculi purgat  
clementer ventriculum, si semel in hebdomada capiatur, vel  
ʒ. iiij. pilularum hieræ. S. aut elephanginarum erit foelix in  
huius morbi curatione successus.

*Flatus di-* Quarto, dissipantibus flatum, & intemperiem frigidam  
*scutientia* corrigentibus, vt puluere diarhodon Abbatis, & rosatæ no-  
*te- & alte-* uellæ simul, aut aromatico rosato, si maiori calore indige-  
*ramia.* mus, aut diacymino, aut diagalanga, aut diatrionpiperon ʒ. j.  
aut



aut duæ. Ex his cum aqua absinthij, aut mentæ, aut fœniculi pondere vnciarum duarum quolibet die ventriculo vacuo validè dissipant flatum, & curat intemperiem frigidam, aut grana sex, septem, vel octo piperis integri deuorata hora ante cibum, aut drachma vna theriacæ magnæ, aut mithridati mane sumpta in septimana. Vinum ex absinthio est optimum in hoc genere. Hoc medicamentum est optimum, si æger fuerit senex, & morbus antiquus: ℞. pulueris diagalangæ, pulueris diatrion piperon an. 3. iij. pulueris aromatici rosati, & rosatæ nouellæ an. 3. iij. pulueris diacymini 3. j. con-  
*Topica.*  
 seruæ anthos 3. s. diamusci dulcis 3. j. mellis, myrobalanorum chebulorum, aut communis. q. s. misce, & fiat confectio: *Lege cons-*  
*lium vnde*  
 dosis cochlearium vnum, aut duo cum vino optimo, at aqua *cimum Ioã*  
 fœni. aut melissæ. Supra ventriculum pellis vulturis est opti-  
 ma in hoc genere: similiter vnguentum hoc: ℞. olei absin-  
 thij, anethi & de lilio an. 3. j. pulueris mentæ, gariophyllo-  
 rum, & cinamomi an. 3. j. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum,  
*stæ Mon-*  
*tani Vero-*  
*nensis.*  
 quod bis in die actu calidum ventriculo admoueatur tam parti posteriori, quam anteriori: quia posterior pars est propinquior ventriculo: vel ℞. emplastri stomatici. q. s. extendatur super alutam ad formam scuti, seu ventriculi: fiat duplicatum vt tam pars anterior, quam posterior defendantur ab externis, & melius dissipetur flatus, & intemperies frigida corrigatur: vel fiant duo sacculi ex absinthio sicco, menta, camomilla, aniso, semine fœniculi, carui, cymino, cinnamomo, gariophyllo, cortice citri, & similibus.

Quintò, corroborantibus ventriculum internis, & exter-  
 nis, qualitate tam manifesta, quàm à proprietate, seu rota-  
 substantia: quales sunt ventriculorum gallinarum pellicu-  
 læ interiores: Syluius tamen cum Gal. has pelliculas, & mer-  
 gi & struthiocameli damnat Gal. 3. de aliment. facultatibus  
 cap. de differētia, quæ est in partibus animalium volatiliū,  
 ventriculum mergi, & struthiocameli tantum damnat: at II.  
 de facultatibus simplicium medicamentorum improbat gal-  
 linæ & mergi pelliculam internam ventriculi, contra quos-  
 dam antiquos. Dioscorides tamē lib. 2. cap. 41. ventriculi in-  
 quit, galli pelliculam internam siccata, & trita cum vino  
 in potu cōferre stomachicis. Puluis hic ante cibum sumptus  
 quantitate vnus cochlearij cum vino, aut iure corroborat  
 ventriculum: ℞. coriandri præparati 3. ij. seminis anisi, fœ-  
 niculi, cinnamomi electi an. 3. iij. pellicularū internarū ven-  
 triculorum gallinarum secundum artem præparatorum 3. ij.  
 corticis citri, & ligni aloes an. 3. j. s. coralli rubri præparati



# DE CVRAND. MORB.

3.j. sacchari optimi 3.vj. misce, & fiat pulvis. In longis morbis præsertim calidis pulvis solus diarhodon Abbatis summo mane & ante pastum cum paucis iure ventericulum vehementer corroborat. Corallus si tangat regionem ventriculi diu, corroborat ipsum: eandem habet vim lapis smaragdus.

*Admonenda.* Pulegium montanum, & betonica quoque corroborant ventericulum. Manus sana, & iuuenis alicuius sæpe deteta supra ventericulum suo naturali calore eum confirmat: eodem modo si aliquod animal viuum, vt canis admoveatur ventericulo.

*Doloris ab intemperie nuda curatio.* Dolor ventericuli, si sit a sola intemperie, curatur contrariis ei, vt si a flatu, & frigida intemperie fiat, mederi illi debemus per ea, quæ diximus quarto genere remediorum hoc capite, & etiam per frequentem fotum, saltè quolibet die bis vacuo ventericulo hoc decocto spongiis madidis, vel philtro:

*Ab intemperie cum affluxu humoris.* ℞. absinthij, mentæ, camomillæ, calendulæ, anthos an. m. j. galangæ, corticis citri, spicæ, gariophyllorum, nucis muscatæ, cinnamomi, zingiberis an. 3. ij. seminis fœniculi, anisi, carui, & cimini an. 3. ij. rosarum, coriandri præparati an. 3. j. vini optimi rubri lb. ij. aquæ calybeatæ lb. ij. fiat ex his decoctum ad consumptionem tertiæ partis. Si a calida intemperie, per frigida curatur: si cum materia, per illius euacuationem, per sanguinis missionem, si ætas, & facultas adsint, & æger sit carnosus: quamuis in omni vehementi dolore habita ratione ipsius sit necessaria sanguinis missio ex sententia

*Sectio venæ.* omnium. Si verò alij humores abundauerint, illorū euacuatō per medicamenta purgantia est necessaria. Aliquādo tamen hoc symptoma eget curatione coacta per narcotica, & non per causæ ablationem, si fuerit vehemens, & non expectans propriam curationem, de quibus cap. de colico dolore: quamuis propter ventericuli maximum sensum solet hic

*De usu narcoticorum.* sæpe esse fortis. In usu horum semper sunt consideranda, & mente tenenda, quæ diximus capite de phrenitide, de facultate ægri, & de fermentatione medicamenti narcotici, quia ante sex menses non possumus eo vti. In vehemēti igitur ventericuli dolore accipiat hunc potum: ℞. philonij Romani 3.

*Quæ tutiora sint.* ss. syrupi de absinthio, & aquæ melissæ an. 3. j. misce. Tutior est athanasia, & requies magna: tutiora etiam sunt externa, in primis temperate calida, deinde narcotica regioni ventericuli admota, & mica panis cum cortice papaueris, lacte & croco: vel absinthium cum foliis mandragoræ coctum oleo rosarum, vel menta: & absinthium & folia mandragoræ decocta cum oleo papaueris, addendo parum croci.

*Inflammati.* Inflammatio ventericuli curatur, vt hepatis phlegmone, &




& phrenitis, videlicet primò, victu tenui, & refrigerante: *se-* *tionis cu-*  
 cūdò, sanguinis missione ex basilica ad reuellendū, hāc quo- *ratio.*  
 que reuulsionē faciunt clysteres, frictiones, ligaturæ, & fots *Victus.*  
 extremorum. Tertiò, repellētibus externis, de quibus capite *Remulsiō.*  
 de cura phrenitidis, & internis, vt syrupo rosarū, myrtillorū *Repellen-*  
 & cydoniorum cum aquis plantaginis, portulacę, lactucę, & *tia exter-*  
 similiū sępē sumptis, & omni hora, in æstate, & iuvene, actu *na & in-*  
 frigidis, in hyeme, & senibus, tepidis. Quartò in augmēto re- *terna.*  
 pellentibus, & digerentibus, seu resoluentibus, vt syrupo ro- *Indicatio*  
 sarū, & de absinthio simul, aut rhodomelle cum decocto hor- *à tempori-*  
 dei, & camomillæ: in statu resoluentibus solis, vt syrupo de *bus morbi.*  
 absinthio, rhodomelle, & decocto camomillæ. Quintò, in- *Alteratio,*  
 temperiem calidam relictam alterātibus, & corroborātibus *& corro-*  
 partem affectam, vt syrupo rosarum, & decocto seminis psyl- *boratio.*  
 lij, & cidoniorū & similibus. Si verò in suppurationem ter-  
 minetur, curatur per ea, quæ diximus in fine cap. 27. de cu-  
 ratione pleuritidis.


## De imbecillitate ventriculi, & de dolore, & inflammatione eiusdem.

### CAPVT XXXI.

#### Scholium.

 Vanquam quælibet.) Ea quæ auctor docet in hoc capite, *Auctoris*  
 vera sunt: solum aduertere oportet eum, & alios errare, cum & aliorū  
 scribunt esse medicamenta totò temperamento roborantia vē- *error.*  
 triculum. Solum enim corroboratur cum languidus est medicamentis in-  
 temperiem eius oppugnantibus, adstringentibus etiam, quæ densantia i-  
 psum virtutem vniunt, & substantiæ dissipationem impediunt.

### De singultu. CAP. XXXII.

 Singultus velut quædam ventriculi cōuulsio est, non *Descriptio.*  
 tamen vera censetur, cum in musculis nō fiat, quod  
 ad conuulsionis essentiam requiritur. Ventriculus  
 vero musculus non est, neque eius hostiolum, vt aperte Ga-  
 lenus demonstrat lib. 6. de morbo & symptomate, cap. 2. Vt-  
 cunque tamen res habeat, motus est ventriculi, quo ad ex-  
 pulsionem rerum molestarum, aut quantitate, aut qualitate  
 mouetur. In hoc differt à vomitione, quod (vt ait Galenus)  
 per vomitiones ea, quę in spatio continentur, eiiciantur: per  
 singultum verò ea, quæ ventriculi corpus impleuerunt. Fit *Causæ.*  
 generaliter (vt autor est Hippocrates 6. sect. Aphor. 39.) aut  
 a plenitudine, aut inanitione: & præter has causas etiam ab  
 hum



# DE CVRAND. MORB.

humoribus vellicantibus, & rebus acri facultate præditis: item quoties quispiam affatim deuorauerit calidū aliquod medicamentum, deinde calidam potionem biberit, & ex cruditate etiam præsertim in pueris. Morbus per se patet, causæ partim ex ægri dictis, partim ex his quæ supra cap. de cōuulsione dicta sunt, perspicui poterunt.

*Nota.*

*Curatio.*

*Si ab intem-*

*perie nu-*

*da, per al-*

*terantia*

*contraria.*

*Si ab afflu-*

*tu humo-*

*ris pituito-*

*si, per ea*

*quæ dicta*

*sunt.*

*Laus*

*Rhasæ.*

*Si ab acri-*

*monia, &*

*mordacita-*

*te.*

*Vacuatio.*

*Antece-*

*dat præpa-*

*ratio.*

*Vomitus*

*utilitas*

*Alteratio.*

*Sedantia*

*singultum.*

Singultus, qui ab inanitione fit, rarò curationem suscipit, similis tamē est curationi conuulsionis ex inanitione, de qua cap. 14. dictum est, & hēcticæ, de qua capite octauo, secundi libri dicemus. Si à sola intemperie fit, per alterantia contraria curatur, plerunque tamen fit à plenitudine humoris pituitosi, cuius curatio similis omnino est curationi imbecillitatis ventriculi, quæ fit ab humore frigido pituitoso, de qua capite præcedenti abundē diximus. Si vis tamen hunc & alios affectus præter naturam ventriculi rectē curare, lege octauum lib. Galeni de compos. medicamentorum secundum locos, & quintum continentis Rhasis, qui inter Arabes primas tenet: fuit enim vir magnæ experientiæ, & in omnibus Galenum magis, quam alij omnes Arabes amplectitur. Si fiat à rebus acris, & mordacibus, vt à piperibus, præsertim sumpto vino, & aqua calida, super id, vt Gal. docet octauo de compositione secundum locos, & comment. 40. sexti Aphorismorum: tunc necessaria est vacuatio per rhabarbarum & myrobalanos citrinos, cum manna electa, aut cassia fistulari: & si opus fuerit, vbi materia est fixa nimis, & multa, adde drachmas tres, aut quatuor electuarij diaphenicon, præcedenti leui præparatione per syrupum rosatum & acetosum. S. cum decocto hordei. In omni tamen materiali singultu est utilis vomitus, præsertim si materia non fuerit fixa, & non penetrarit tunicas ventriculi. In hac, quæ fit à causa calida, post vacationem electuarium diarhodon Abbatris est optimum, & potus solius aquæ frigidæ: quæ omnem ferè singultū curat, aliquem per se, & aliquem per accidens, quemadmodum & animi perturbationes, vt ira, tristitia, timor, & gaudium, si subito acciderint, sternutatio, cohibitus anhelitus, frictions, & vincula extremorū, cucurbitula magna, & similia singultum curant. Si verò fiat ab inflammatione, ipsa curata curabitur & singultus. In antiquo tamen singultu, qui fit a materia frigida, præter ea, quæ dicta sunt capite præcedenti, hoc medicamentum est optimum & expertum: ʒ. squinantij, calami aromatici, anisi, marathri, foliorum mentæ, & absinthij, costi an. ʒ. j. croci, ligni aloes, ambre, gariophyllorum, aloes Alexandrinæ an. ʒ. ij. apij, coriandri



dri præparati, seminis papaueris albi, cassiæ lignæ an. ℥.j. conferuæ aranciorū 3.ij. sacchari. q. s. misce, & fiat confectio, vel in hyeme cum melle, cuius vncia semis cum decocto fœniculi, aut alio simili huic summo mane per aliquot dies curat singultum indubitato. Similiter post vacuationem curatur singultus, si ventriculo admoueatur castoreum cum oleo rosato, aut si accipiat æger 3.ij. seminis rutæ cum paucio vino, aut decocto fœniculi in singultu magno: & vbi alia non contulerint, præsertim cum sit à maximo ventriculi sensu, *Ultimum* 3.℥. vsque ad 3.℥. philonij Romani cum syrupo papaueris, & *remedium.* aqua absinthij, aut mentæ, est vltimum, & probatum remedium.

## De appetentia immodica, quam caninam appellant.

### CAPVT XXXIII.

**A**ppetentia immodica, quam caninā appellant, tunc *Descriptio* fit, cum ventriculus ea comedendi rabie vexatur, vt satiari, qui sic affecti sunt, non possint, nec post ingestos ad nauseam vsque cibos: quos cum citra noxam ferre nequeant, eorum plenitudine velut intollerabili quadam sarcina grauati ad vomitum, quod vltimum est remedium, confugiant, vt per eum a tam graui pondere liberentur. Verum cum inexplibilis sit eorum appetitus, denuò ad cibos famelici conuertuntur, & in similem priori necessitatem detrusi, iterum vomere coguntur: quod eo vsque perseverat, donec velut canes (vnde etiam morbo nomen inditum est) in edendo, atque euomendo toti sunt: quo fit, vt quæ dum inchoabat, vomendi erat necessitas, consuetudo inualescente morbo efficiatur. Causæ à Galeno sic breuiter explican- *Causa.* tur quarto de morbo & symptomate, cap. 7. Caninæ igitur appetentiæ causa vna est acidorum humorum vitium, altera verò (vt dictum est) plurima totius corporis inanitio, siue ipsa caloris vim, siue retentricis facultatis imbecillitatem sequatur. Porro acidorū humorum vitium erosionem, *Nota.* quæ suctioni proportionem respondet, inducit, appetentiāque (vt inquit Gal.) haud aliter quàm naturale pathemā excitat. Cognoscitur eorum, quæ ingesta fuerunt, deiectione, si multa simul & liquida fuerit, & ructu insuper acorem referente, corporis verò inanitio, quæ (vt inquit Aetius) ob plurimi caloris vehementiam fit, qui instar igni cibos consumit, cutem rarefacit, & exhalationem mouet, sic deprehenditur, ven



# DE CVRAND. MORB.

ventris egestionem lōgè pauciores prodūt, quam pro eorum, quæ ingeruntur, modo, & proportionē: & stercus insuper quod egeritur, siccius est. Quod si propter retentricis facultatis imbecillitatem, quæ cibis dominari nō potest, corporis facta sit dissipatio: tunc multus est deiectionum proventus.

*Curatio.*

Si fiat hæc immodica appetentia ab inanitione, vt in conualescētibus, curatur cibo boni succi, facili concoctu, & sepe sumpto, non tamen multo. Alimenta pingua semper laxant ventriculum, excitāt nauseam, & appetitum deiiciunt, quā-

*Ab imbecillitate.*

uis sint difficilia concoctu. Si fiat à vētriculi imbecillitate, illa semota cessabit affectus. Si à iecoris calore, similiter sublata causa tolletur & effectus. Si à vermibus, ipsis eductis sanabitur, vt cuidam puellæ contigit, quæ fame canina laborans à verme duodecim cubitorum sanitati restituta fuit,

*A calore hepatis.*

verme illo magno purgato. Si ob succum melancholicum à liene ad ventriculi os largius transmissum fiat, vt Arabibus

*A vermibus.*

placet, quod non repugnat Galeno volēti retentricem facultatem, corroborari melancholia, cum per accidens ipsa con-

*Historiæ.*

trahendo, & comprimēdo inanitionem faciat, & appetitum

*A succo melancholico.*

augeat: ideoque melancholica alimenta augent appetitum præcipuè sale condita, horum tamen omnium curatio suis locis referēda est. Si à pituita immodica, frigida, acida, os vē-

*A pituita acida.*

triculi infestāte, à qua sæpius fit, curatur quinque remediorum generibus, primò, victu calido, & sicco communi omni-

*Victus.*

bus pituitosis affectibus, demptis acribus, vt sunt cæpe, allia, porra, sinapi, & acida, quæ excitant appetentiam, & ob id nocent huic affectui: quanquam aliis pituitosis affectibus sint salubria, quia incidunt, tenuant, & tergunt pituitam: menta tamen, & saluia, petroselinum, fœniculus, cicera, & similia sunt salutaria cocta cum carne arietina, aut hœdina. Potus sit vinum vetus mediocriter dilutum, vel aqua decoctionis fœniculi.

*Præparatio.*

Secundò, apparantibus materiam hanc medicamētis iam sæpe dictis, præsertim primo capite, & 31. de curatione imbecillitatis ventriculi. vnum tamē iterum scire oportet, syrup.

*Observatio.*

acidus non conuenire huic affectui, vt est oxymel. S. & compositum, & similia: ne excitent appetentiam, nisi pauca quantitas ipsorum sumatur, & sint aliis mixta.

*Purgatio Diaphenicon quale fit.*

Tertiò, vacuantibus materiam pituitosam, medicamētis frequēter dictis præsertim 1. cap. & 31. huius libri. Inter composita tamen diaphenicon est vtile, & quātitate 3. iiii. vsque ad 3. vj. quia eius vis non transit hepar, & purgat materiam mixtam ventriculi.

Quart



Quartò, resoluentibus reliquias materiei medicamentis *Resoluta*  
 sæpe descriptis, maxime cap. 31. quarto genere remediorum:  
 vt theriaca magna, mithridato, diagalanga, electuario rosa- *Sumenda.*  
 tæ nouellæ, & aromatico rosato, cum aqua aut decocto fœ-  
 niculi, aut anisi, aut petroselini, & similium. Vinum quoque *Vini gene-*  
 generosum post cibos pingues, & oleaginosos statim famem *rosi facul-*  
 caninam sedat, autore Gal. comment. 21. secundi aphor. non *tas.*  
 tamē eam, quæ fit ex longa inedia, vel alui profluuiio, aut flu-  
 xu sanguinis, aut aliqua alia vacuatione. Nam qui huiusmo-  
 di aliqua causa esuriunt, plurimum offenduntur vini potu,  
 in eo comment. Galenus distinguit bulimon à fame canina.

Quintò, prosternentibus appetitum, & laxantibus ven- *Appetitus*  
 triculum, qualia sunt cibaria & iura omnia pingua, vt ori- *ablatio.*  
 za cocta cum pinguibus rebus, & hoc medicamentum, aut  
 huic simile: ℞. decocti maluarum, & seminis lini. an. ʒ. iij. o- *Ab intem-*  
 lei sesamini, & butyri recentis an. ʒ. j. misce, & fiat potus. Si *perie cali-*  
 ab intemperie calida ventriculi fames canina oriatur, (quæ *da.*  
 autore Galeno 4. de symptomatum causis appetentiam pro-  
 sternit per accidens, meo quidem iudicio quemadmodum *Victus.*  
 & fames augetur à frigore per accidens) curatur alimentis  
 coctu difficilibus, vt sunt castaneæ, caro bubula, suilla, panis  
 azimus, & similia.

## De appetentia immodica, quam caninam appellant. CAP. XXXIII.

### Scholium.

**A**ppetentia immodica.) Calidum innatum perpetuè dissi- *Nutritio-*  
 pat substantiam triplicem corporis, solidam, humidam, & spi- *nis neces-*  
 rituosam, insensibiliter tamen per occulta cutis spiramenta: *tas.*  
 inleque orta est nutritionis necessitas, nisi enim loco substantiæ dissipa-  
 tæ, altera substitueretur similis, breui animalia perirent: propterea na-  
 tura indidit animalibus, appetitum alimentum, aut suæ conseruationis, quod  
 idē est, qui appetitus fames dicitur, hæc duplex est, vna naturalis, omni- *Fames dis-*  
 bus corporis partibus cōmunis, qua alimentum appetunt nullo præcedente *plex.*  
 sensu rei deficientis, eo enim non eguerunt, quia alimēto coniunctæ sunt,  
 sicut & plantæ cum quibus hoc appetitum communicant. Est fames alte- *Fames a-*  
 ra, quæ dicitur animalis, eo quod fiat cum sensu, est enim appetentia a- *imalis.*  
 limenti, quæ suctionis sensum sequitur, hanc solum in orificio ventriculi  
 sentimus, ob multos & magnos nervos ibi disseminatos. Quæ sit eo mo- *Vallesii,*  
 do, quo docet Gal. lib. 2. de causis simp. partibus circa cutem attrahenti- *ualleriolæ,*  
 bus ex vicinis, & his ex aliis, quod ad vsque suctio perueniat ad orifi- *& aliorū*  
 cium ventriculi & in eo molestiam inducat. Inde colliges errorem *Val-*  
*error.*

les




## DE CVRAND. MORB.

*lesi, Valleriola, et aliorum sentientium melancholiam ex liene ad ventrem expurgari, ut excitaret famem. Hæc enim non erit secundum naturam, cum a partium suctione non fiat, imò erit canina, cum melancholia non est perpetuò in illis venis contenta sensum suctionis faceret. Appetentia animalis nimialis necessaria est animalibus, ut excitet ipsa ad querendum alimentum, quoniam ipsis non est coniunctum. Neque hæc appetentia est facultas, ut male aliqui existimarunt, sed finis naturalium facultatum mouens eas ad agendum, & potissimum attractricem, & proinde ad ipsam refertur, quia ita ei adhæret, ut pro modo appetentiæ attrahat ventriculus. In hac appetentia tria sunt symptomata, cum nō fit, cum imbecilliter fit, & cum male fit. Rursus appetentiæ, quæ male fit, quæ depravatam appellamus, duplex est: una ratione motus, quæ canina dicitur, in qua immodicè appetimus alimenta. Altera in qua alimenta prauæ qualitatis appetuntur, per prauam qualitatem aliena alimenta, & ea, quæ non sunt alimenta (qualia sunt testæ, & carbones) intelligentes.*

*Caninæ ap* Hoc capite auctor solum agit de canina appetentiæ. Hæc à duabus causis ortum habet, prima est frigiditas orificiū ventriculi, quæ vel est nuda, cuius meminit Gal. 2. aph. com. 21. vel cū humore acido, de qua loquitur Duo aduer eodē loco, & 2. de causis symp. Secunda causa est immodica corporis distensio. Curationem lege apud auctorem. Solum aduerte duo, primum est, famem caninam ab intemperie frigida nuda factam, curari calidis, ut potu vini, dummodo non sit austerum. Secundum, famem caninam curari pinguibus, quoniam hæc dissoluendo ventriculum auferunt sensum suctionis similem.

### De cibi fastidio. CAP. XXXIII.

*Cur appetentia est necessaria.* ppetentiam nobis omnibus prouida natura indidit ne eius, sine quo constare animantium vita non potest, per negligentiam obliuisceremur, ea in hūc modū fit. Cum quodlibet animal in ambientem aerem per cutem dissipetur, principio partes cuti subditæ inanes redduntur, hæc verò, quia talis est natiua earum facultas, à vicinis partibus ad se alliciunt alimentum, ut id quod fuit exinanitum, repleatur: mox illæ rursus ex sibi vicinis, atque eodem modo aliæ ex aliis sibi proximis, donec ad ventriculum deuentum sit: & ab ipso suction fiat, reliquis omnibus partibus ante ipsum per eam suctionē iam euacuatis. Quam quidem suctionem cum venter ferre non possit, sed inde veluti diuellatur, huiusmodi molestiæ remedium cibum exquirat: atque inde tum fames, tum appetentia nascuntur. Est enim fames suctionis sensus, appetentia verò implēdi desiderium, ut copiosius Galenus docet lib. 4. de causis sympt. cap. 7. Porro cum trifariam appetentia lædatur, perinde ac omnes corpor

*Quid famer.*



poris functiones: vnus læsionis eius modus est, cum animal nihil appetit: cōtraria sanè canino appetitui affectio, anorexia Græcis, Latinis appetentię amissio, aut abolita appetentia, nobis verò cibi fastidium appellata. Hæc fit (vt loco citato ait Galenus) vel quia suctionis sensus perit, vel quia suction non fit, vel quia corpus non inanitur. Præter has causas etiam alias recēset Aetius lib. 9. cap. 21. in hunc modum. Cōtingit autem sæpe ob immoderatam vētris, & intestinorum fluxionem, & ob biliosum humorem in ventrem delatum, tenacis & acris, ac porri speciem referentem, & ob pharmaci potionem, & sanguinis immoderatam detractionem, & in continuis ac vehementibus febribus, stomachi, ac ventris inflammationē, item hepatis, vesicæ, ac vuluæ. Contingit etiam in cholica & voluulosa affectione. Maxima autē, quod quis non esuriat, causa, caliditas existit: quæ solida corpora laxando dissoluit, & ad attractionem imbecilliora reddit: humida autem diffundit, atque amplius extendit. A pluribus etiā aliis causis appetitus perit, quas facile quiuus inueniet. Notæ, cum a fluxu ventris hæc passio fit, manifestæ sunt. Si a biliosis humoribus, ventriculi morsus adest, nausæaque, & sitis vehemens: si ab humoribus putridis, etiam interdum febris adest: at quibus crassi, lentique humores fastidium cibi pariunt, ij nec rofionem ventriculi, nec sitim patiuntur. Cōmuniter autem omnibus superuenit nausæa. Indicia verò, quibus calida intēperies dignoscatur, quæ huic morbo occasionem præbuit, sæpè in aliis capitibus dicta sunt.

In omni tamen cibi fastidio nocēt pingua, & oleaginea, & crocus, cum ipsis augent appetitum, odorifera omnia alimenta, præsertim si habuerint naturam contrariam causæ, acria etiam, vt cepe, allia, porrum, piper, sinapi, cinnamomū, gariophyllus, nux muscata, & similia: pari modo stiptica omnia vt menta, absinthium, pyra, cydonia. Acida quoque omnia, vt acetosa, agresta, acetum, succi granatorum, citri, limonum, & aranciorum. Salita omnia quoque mouent appetitum, vt caseus, oliuæ, capparis, caro suilla, & similia. Seruetur tamen modus præscriptus 9. cap. huius lib. obseruata semper natura infirmi. Nam sunt inimicitia quædam inter nonnulla alimēta, & singularem hominem: quemadmodum & esse potest amicitia magna, & familiaritas, quæ solo experimento cognoscenda est. Deinde materia est præparanda, si calida fuerit & biliosa per syrupum acetosum S. & rosarum, cum decocto hordei: si frigida per rhodomel, & oxymel. S. r. calida per syr. de absinthio, de menta, cum decocto fœniculi, & si frigida.

mil



# DE CVRAND. MORB.

- Purgatio calida.* milibus, de quibus 1. cap. Deinde vacuanda est materia calida, rhabarbaro, myrobalanis citrinis, hiera. S. & non medicamentis, quæ attrahunt ab aliis partibus ad ventriculum: vt ℞. rhabarbari optimi infusi per noctem in aqua endiuiae cum paucio vino albo, & corticum myrobalanorum citrinorum an. 3. j. pulueris hiera. S. 3. ij. syr. violarum 3. j. aquæ buglossæ. q. s. misce, & fiat potus: aut ℞. pilularum de hiera. S. & rhabarbari electi an. 3. ss. cum syr. rosarum Alexandrinarum
- Purgatio frigida.* fiant pilulæ vij. & aurentur, si non est pauper. Si materia fuerit pituitosa, vacuanda est agarico trochiscato cū hiera simplici, & myrobalanis chebulis: vt ℞. agarici trochiscati, & corticum myrobalanorum chebulorum an. 3. j. pulueris hiera. S. 3. j. ss. rhodomellis 3. j. aquæ fœniculi 3. ij. misce, & fiat potus. Si materia mixtam habuerit pituitam, & bilem 3. iiij.
- Materia mista.* diaphænicon vacuanda est, aut 3. j. pilularum aggregatiuarum.
- Resolutio, & corroboratio.* Postremo, curatur resoluentibus, & corroborantibus ventriculum, vt in causa calida puluere diarhodon Abbatis quolibet die sumpto quantitate 3. ss. vsque ad 3. j. cum 3. j. syr. rosarum. In frigida, syrupo de absinthio cū aqua hordei cum cortice, mastiche, interius & exterius, & similibus, vt carne cydoniorū in calida cum saccharo condita, & in frigida cum melle, in qua electuarium rosatæ nouellæ, & magis puluis cōducit, & aromaticum rosatum cum aqua aut decocto absinthij, mentę, alia simili. Theriaca magna, mithridatum, aut diamusculus dulcis, aut diambra resoluunt, & corroborāt ventriculum, si sæpe magnitudine drachmæ vnus capiantur cum liquore aliquo calido, vt est decoctum cinamomi, corticis citri, coriandri, fœniculi, anisi, & similibus. Hoc ventriculo admotum tam posteriori parte, quam anteriori resoluit, & corroborat: ℞. emplastri stomatichonis partes duas, mastichis partem vnā, extēdatur super alutam ad formam scuti: aut ℞. olei nardini, absinthij, & de lilio ana 3. j. pulueris rosatæ nouellæ, cinamomi, gariophyllorum, mentæ, & corticis citri an. 3. ss. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum, quod mane, & vespere ante cœnam actu calidum ventriculo admoueatur.

## De cibi fastidio. CAP. XXXIIII.

### Scholium.

*Auctoris lapsus.*

*¶* Ppetentiam nobis.) In hoc capite solum aduerte, non recte auctorem inappetentiam a causa frigida fieri scripsisse, hæc enim potius appetitum inducit, comprimendo orificium ventriculi, & hac ratione sensum suctioni similem efficiendo.

De



**Q**uam barbari cholicam, & cholicam passionem appellant, hanc tum Græci, tum etiam Latini choleram dicunt, quæ (autore Paulo lib. 3. cap. 39.) immoderata est ventris perturbatio, quæ multo bilis fluxu, & *Descriptio.* supernè per vomitum, & infernè per alui deiectiones fit. Contingit ob multam cruditatem, quæ nonnunquam prauorum admodum alimentorum (vt docet Gal. 2. de alimentorum facultatibus, capite de peponibus, & libello de cibis boni & *Causæ.* mali succi, vbi ex boletis, inquit, non benè coctis cholera excitatur) interdum verò vitiosorum succorum culpa oritur. Malum sic deprehenditur, per superiora, & inferiora excretio fit. Vtroque enim ostiolo ad expulsionem ventriculus *Note.* vititur, & eò, quòd ad gulam superius, & eò, quòd ad pylorum, id est, ianitorem, vt testatur Gal. 6. de morbo & sympto mate, cap. 2. Sitiunt præterea qui hoc morbo laborant, & copioso sudore madent, pulsùmque habent concisum, & in musculis manuum ac pedum, maximèque surarum contractionem, ac tensionem quandam sentiunt. Quæ per vomitum redduntur, aut acescunt, aut amara planè sunt. Deiectiones vel pituitosæ, vel melancholicæ, vel biliosæ, nonnunquam etiam carniū recenter cæsarum lotioni simillimæ excernuntur. Facies sæpenumero, qualem Hippo. describit 1. Prognostic. Conspicitur & color non dissimilis ei, qui in iam iam morituris cernitur, nec in numero. Frequenter enim hanc affectionem mors insequitur, nisi celeriter medicus opem tulerit: denique & in ventriculo, & intestinis summus adest dolor, angustia, & vellicatio.

Primò, victus debita ratio instituenda est, parum frigida. *Curatio.* Calor enim humores mouet, & frigus si immodicū sit (quā- *Victus.* uis immobiles ipsos efficiat, spiritum & calorem natium resolui prohibeat) nocet, humores ipsos subito ad intestina reuocans. Alimenta sint boni succi, & facilia concoctu, parū & sæpè sumpta, præsertim deficientibus viribus. Nam sæpius utilis est abstinencia, vt reddantur cæteræ partes quasi auaræ. Ius ergo ex gallina tenera, & perdicibus, ex animalium quæ bonum succum gignunt, extremitatibus est bonum, melior succus eorum, & optima aqua per distillationem expressa, præsertim si parum aquæ rosarum, aut florum myrtillorum, aut malorum cydoniorum misceatur cū cinamomo, antequam fiat aqua. Si fuerit ciborum magnum *In causâ* fastidium, vna pensilis erit utilis, oua sorbilia, testiculi gal- *frigida* lor



# DE CVRAND. MORB.

lorum, & hepata gallinarum sunt salutaria, & alia dicta cap. superiori. Potus in causa frigida sit vinum generosum aqua dilutum, seruata consuetudine ægri, aut aqua cinnamomi, *In calida.* aut seminis fœniculi. In calida verò aqua hordei, aut aqua decoctionis coriandri præparati, aut vinum granatorum. Animi perturbationes maxime nocent, præsertim quæ ad *Vomit.* interiora reuocant, vt timor & tristitia.

Secundo, si materia & causa fuerit in ventriculo, vomitu curatur aqua tepida cum paucis aceto & saccharo, aut decocto seminis raphani cū syrupo acetoso. S. Si verò fuerit multa materia, & aliunde venerit ad ventriculum & intestina, apparatus syr. rosarum, syrupo de agresta, oxysacchara. S. syrupo de endiuia. S. & similibus, cum aquis rosarum, plantaginis, portulacæ, & aliis eiusdem naturæ.

*Purgatio* Tercio, vacuantibus cum corroboratione, vt rhabarbaro, *mat. r. pi* myrobalanis citrinis, & chebulis, si fuerit materia pituitosa: *tuiof. g.* vt ℞. rhabarbari electi parū tosti ʒ. j. corticū myrobalanorū citrinorum parum tostorū ꝑ. iij. syr. rosarū ʒ. j. aquæ portulacæ ʒ. ij. misce, & fiat potus. In repletionem tamen ex cruditate sola hiera. S. bene purgat, aut ʒ. j. pilularum stomachicarum, aut ʒ. j. agarici trochiscati, aut ʒ. iij. diaphænicon.

*Error in* Amatus Lusitanus centuria 2. curatione 44. & alij iuniorum *me* res ante ipsum malè rhabarbarum assatum, & myrobalanos *dicorū su-* in hoc, & in aliis ventris profluuiis damnant, cum hæc dup- *per affatio* plicem habeant substantiam, vnā tenuem, igneam, & æ- *ne rhabar-* ream, alteram verò terrestrem, crassam, & adstringentē. Pri- *bari.* ma purgans, mundificans, & abstergens per modicam assationem, & torrefactionem amittitur, crassa verò, & astringens sola summè necessaria est, quando materiam & causam profluuij cum corroboratione & astrictione, & absque acrimonia clementissimè educere volumus. Credunt iuniores

*Remissio* medici idem esse assationem, adustionem, incinerationem, *& resolu-* & calcinationem, quod falsum est. *tio.*

*Corroboratio.* Quarto, reuellentibus, & trahentibus ad cutem: vt balneo, quo raro est vtendum propter facultatis imbecillitatem, frictionibus, & ligaturis extremorum, & cucurbitulis. *Sumenda.*

*Potus a-* Quinto, roborantibus ventriculum, & intestina, & prohibentibus motum humorum, & symptomata quædam, vt *quæ tepide* potu solius aquæ rosatæ tepidæ, quantitate vnciarum quatuor, maxime cum sit a sola bile: est a me expertū remedium, & laudatum a grauissimis medicis ℞. ʒ. j. pulueris diarrhodon Abbatis, cū ʒ. j. syr. de agresta, aut alio simili, est in hoc genere optimum remedium. Similiter rob de agresta, de cydon



doniis, miua cydoniorum non aromatizata, nisi causa cholerae esset cruditas, tunc enim aromatizata esse debet: & syrupus de menta, de absinthio, puluis rosatae nouellae, & electuarium eiusdem, puluis seu electuariū aromaticum rosatum Gabrielis, & similia calida medicamenta stomachica interna, & externa, de quibus cap. 31. de imbecillitate ventriculi abunde dictum est. Hæc quoque mixtura est optima in hoc genere, in calida causa & venenosa: ℞. conseruæ rosarū antiquæ ʒ. iij. conseruæ acetosæ ʒ. j. coralli rubri præparati, & boli Armenici præparati an. ʒ. j. margaritarum electarum, pulueris crysalli præparati an. ʒ. j. sacchari optimi. q. s. misce, & fiat conditum auro coopertum. *Condimentum.* Dosis est cochlearium vnum mane, & quacunque hora cum aqua acetosæ, aut portulacæ, aut calibeata aqua. Ventriculo, & toti etiam ventri, *Admouenda* admouenda sunt astringentia, & corroborantia, vt oleum damastichinum, rosatum, myrtillorum, cydoniorū, nardinum, de absinthio cum pulueribus astringentibus: vnguenta ex *Vnguentum* iis fieri possunt: vt ℞. olei de absinthio, myrtillorum, & cydoniorum an. ʒ. j. pulueris mastichis, thuris, trochiscorum de spodio an. ʒ. j. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentū: aut ℞. farinae hordei lib. j. pulueris spodij ʒ. iij. albuminum ouorū numero iij. succi plantaginis, aut bursæ pastoris, aut caudæ equinae quod. s. misce, & fiat cataplasma: adde parum aceti calibeati, & semel in die ventri admoueatur actu frigidum, vel parum calidum: aut ℞. micæ panis tost. p. j. carnis cydoniorum melle coditæ ʒ. ij. mēte, absinthij an. m. j. vini rubri, aut aceti calibeati, si est causa vehementer calida, quod. s. misce, & fiat cataplasma: adde pulueris gariophyllorum, cinnamomi, ligni aloes, mastichis, spicæ an. ʒ. ij. Magna cucurbitula *Cucurbitula* vetriculo & vmbilico admota detinet vomitum, & deiectionem. Multi in hoc genere remediorum laudant aquæ frigida subitam irrorationem supra crura, & pedes, & testes: sed *iectionem* hoc faciendum in ægro robusto. Aliquando necessaria sunt *cohibet.* narcotica, vt requies magna, micleta, athanasia, & alia valentiora, vbi alia non prosunt, seruatis iis, quæ diximus superius capite de phrenitide, & capite de sanguinis profluvio è naribus, & quæ dicuntur capite de ventris profluvio sequenti. Si adsit initium vlcerationum intestinorum, curabitur per ea, quæ dicemus cap. 38. de curatione dysenteriae.

## De cholera. CAP. XXXV.

## Scholium.



# DE CVRAND. MORB.

Cholera  
morbus.



Vam barbari cholericam.) Cholera est v̄tris perturba-  
tio, quæ rem molestantē superne per os, & inferne per aluum  
expellit. Vnde pars affecta erit ventriculus, vt ex 3. de caus.

Vallesius  
taxatur.

symp. cap. 2. colligimus: ita vt in eo facultas expultrix irritata immodicē  
moneatur. Neque video qua ratione adductus Valles. 5. lib. epy. com. 10.  
hoc symptoma etiam ad retentricem ventriculi referat, cum fiat ab irri-  
tatione, & veteres in eius definitione solius excreticis facultatis memi-

An duplex

euacuatio

fit de essen

tia cholera

nerim: Præterea ex definitione prædicta colliges, de essentia cholerae esse  
viramque euacuationem, sic Eurychides lib. 5. epy. sent. 75. in principio  
morbi vomitu affectus, & non deiectione, cholera non laborabat: nisi in  
quarto die, in quo non solum vomuit, sed & per aluum deiecit. Quod si  
ante deiectionem cholera vocatum morbum habuisse scriptum sit, in il-  
la sententia, dicendum est, librum non esse Hippocr. Et quamuis vtraque  
euacuatio proprie cholerae conueniat, aliquando tamen post dictas eu-  
acuationes soles vomitus cessare ob imbecillitatem facultatis expultrix,  
quo tempore hunc affectum cholera esse nō possumus negare, sicut ne-

Causa cho

lerge ex a-

liis.

Propria

sententia.

que quando declinante affectu, vomitus cessat. Causa cholerae in genere  
est quicquid totum ventriculum molestat: hoc autem ex omnium medi-  
corum sententia vel est alimentum corruptum, vel bilis acris à venis ex-  
pulsa ad ventriculum. ¶ Ego tamen existimo cholera morbum semper  
fieri ab vna causa, nempe a fluxione humoris bilioli, & acris à toto cor-  
pore ad ventrem: quod confirmo, primum ex nomine, nam idē hic affe-  
ctus cholera dicitur, quia in eo cholera, id est bilis euacuatur: secundo ex  
Gal. 3. de nat. fac. cap. 13. vbi in choleris per venas, quæ ad intestinum &  
ventrem pertinent, totum corpus euacuari scribit: Tertiō ex imbecillita-  
te, quæ in choleris in toto corpore sentitur, quæ non sequetur ad solam hu-  
moris corrupti in ventriculo euacuationem. Dices, nonne Gal. lib. 2. de a-  
lim. fac. cap. de peponibus, ex vitioso succo ex peponibus genito cholera  
morbum fieri dicit? Respondeo, eo loco Gal. vitiosum succum non in ven-  
triculo, sed in venis coacervatum cholera efficiere nos docuisse: quod si  
aliquando corruptum cibum cholera causam statuatur, intelligendum est,  
illum irritando id efficere, quod manifestē colliges ex lib. 4. de rat. vic. in  
morbis acutis com. 103. vbi sic habet. Nempe ea choleraceorum edulio-  
rum communis est malitia, cum & humida & acris fuerint. Talia si-  
quidem similiter corrumpūt, suæque acrimonia rasorum eorum, quæ ad  
ventrem decumbunt, ora remordent, atque fluxionum earum, quæ ex to-

Reprehen-

ditur Val-

lesius.

to corpore in eum fiunt, causæ efficiuntur: Hæc Gal. Ex quibus videat  
Valles. qua ratione possit fieri cholera ex redundantia immodica, vt ipse  
scribit: hoc in loco aduerte, ea quæ superius diximus de cholera simplici-  
ter dicta, intelligi, nam est altera, cuius meminit Hip. 4. de ratio. vict. in  
acut. sent. 104. quæ cholera sicca appellatur, quā Valles. 7. epyd. com. 81.  
siccam appellari sentit, quia in ea non excernitur humor, sed quia habet  
solam irritationem ad euacuationes, quæ per os, & aluum fiunt: exi-

sim



stimat enim choleram siccam & humidam nasci ab eisdem causis e. r. ratione, qua nausea & vomitus. Cuius viri sententia, quam falsa sit intelliges ex com. supradictæ sententiæ, in quo Galenus choleram siccam appellat eam, in qua non humor, sed flatus acrimoniam habens per os, & alium emittitur, qua ratione Hippocrat. hydropem tympanitem, hydropem siccam appellare solet, quia ab spiritu fit. Ex supradictis intelliges etiam, quam male auctor inter signa cholerae simpliciter dictæ deiectiones pituitosas, aut melancholicas, enumeret.

Primò, victus debita ratio.) Qui in choleris statim in principio victum adstringentem imperant, detento humore acris, mortis sunt auctores. Oportet ergo in principio istius affectus victu refrigerante uti, quia, ut diximus, cholera à causa calida ortum habet, & ita multoties curavi choleram potu solo aquæ niue refrigeratæ. Quòd si alimentis vitemur temperatis, erunt alteranda rebus frigidis. Cessante autem vomitu, & remissa molestia, aut quando iam alimentum incipit deineri, tunc adstringentibus, quæ roborare possunt ventriculum, utemur: aut, si his nolumus uti (quod melius erit) sufficiet sola victus ratio cõueniens. Ea alimenta quæ in causa frigida ab auctore conceduntur, omittenda sunt, quia cholera à frigida causa non fit.

Tertiò, vacuantibus.) Si natura recte humorem ex ventre euacuet, nil oportet nos mouere. Si euacuet, sed aliquantulum diminuit (quod in cholera, ex molestia colliges) tunc vomitoriis ab auctore paulò superius descriptis utere: poteris tamen uti eo, quod paratur ex aqua tepida decoctionis hordei cum cortice, aceto, & pauco saccharo, hoc enim vomitum mouet, & simul extergit, & retundit acrimoniam humoris. Quòd si natura ita diminuit irritantem humorem expellat, ut ex eius copia anxietas, & extremorum frigiditas sequantur, tunc cum hoc medicamento educemus: ℞. cassia præparatæ ʒ. vj. pulueris hieræ picræ ʒ. iiii. decocti hordei cum cortice. q. s. misce, & fiat potio: quam qualibet hora diei assumere poterit. Qua in parte errat auctor, & cum eo Vallesius, purgantes humorem, & simul corroborantes ventrem: cum solum intendamus illum tam molestum educere humorem, post cuius purgationem, si euacuatio remittat, oportune roborantibus utemur.

Quintò, roborantibus ventrem.) Hoc in loco remedia tantum Quæ roborant ea, quæ frigida cum sint, constringendo roborant ventrem. Id, quod vent auctor dicit de medicamentis calidis choleram ex cruditate curantibus, trem. falsum est, cum ex humore semicocto non fiat cholera. Conditum etiam Authoris auro coopertum omittatur, quia præter expensam, non est gratum. Prælapsus, terea ea omnia, quæ dicit facienda, ut vomitum compescamus, inutilia sunt: quia si vomitus multus est, & nos humorem ita prauum violenter detineamus, certam inducimus mortem.

## De Diarrhæa. CAP. XXXVI.

n 3.

Diar



# DE CVRAND. MORB.

*Descriptio.* **D**iarrhæam Barbari corrupto vocabulo diarriam appellant. Est autem ac si diceret simpliciter alui profluuium, cum sine exulceratione & inflammatione sit. Cuius variae sunt species ac differentiae, quas sigillatim recensēbimus causas simul ac notas cuiusque breui perstringentes. Alui ergo profluuium seu à toto corpore, seu ab aliqua eius parte oriatur, aliquādo quidem fit natura per indicationes (quas crises appellant) humores inutiles expellente: aliquando vero vi symptomatum. Magnopere tamen diiudicari oportet, an hoc vel illo modo alui fluor cōtingat. Si enim crisi naturę fiat, curatione non indiget iuxta Hippocratis præceptum aphorismo vigesimo sectionis primę, quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè, neque nouare aliquid siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere oportet. Porro num per naturæ crises sequutus sit alui fluor, consulere oportet ea, quæ ab Hippocr. dicta sunt lib. 2. prognosticorum prognostico 14. & a Gal. ibidem in commentario, & lib. 3. de crisibus: maximum tamen signum est, si confert, & ægri tolerant. Quod si symptomaticum fuerit, & non à natura vincente factum, curationem requirit, & de huiusmodi alui profluuiis hoc loco agitur: cuius vna differētia est, quoties ab hepate nascitur ob multitudinem bilis ad aluum defluentis, quæ irritat ad excretionem, vnde ventriculus & intestina, non expectata in totum concoctione, chylosam substantiam expellunt, & huius alui profluuij meminit Galen. aphorif. 29. sectionis secundæ. Deprehenditur, quia in deiectionibus cōmixtus bilioso humori chylus apparet, & quia iuuenibus temperamento biliosis accidit, & æstiuo tempore, & noctu magis, & citissimè in dysenteriam degenerat. Prouenit etiam nonnunquam obturatis mesenterij venis, quibus hepar velut manibus vtitur, dum alimentum ad se trahit. Notæ sunt, quod in deiectionibus nihil præter chylū cernitur, & in dextro hypochondrio grauitas quædam sentitur, & anteaacta vita, quæ humores crassos generaret, extitit: verum animaduerrere oportet, sæpè prædictas venas obturari propter abscessum aliquem in ipsis existentem: quod Ex vitiatō ventriculo. cognoscitur, quia febris adest, calor, ac dolor dextri hypochondrij: lienis quoque vitio accidit, quod sic dignoscitur, egestionēs nigræ sunt, sinistrum hypochondrium dolet, adest in eo grauitas & cætera melancholiæ signa cernuntur, iam & ventriculus huius mali origo est, vel quia eius expultrix facultas fortior est, vel quia retentrix imbecillior, vel quia intemperie aliqua laborat, & concoquere cibos non potest.

Consid



Consideranda verò sunt ad id deprehendendum, quæ supra de ventriculi affectionibus sunt dicta, & quod cibus semicotus protruditur, & in ventriculo dolor, & grauitas sentiuntur. Multis à capite alui profluuium prouenit: cognoscitur *Ex capite.* verò, quia distillatione aliqua laborant, & dolor, & grauitas capitis præcesserunt: & quod ea quæ deliciuntur, spumosa sunt iuxta Hippocr. septima sectione, aphor. 29. sunt & aliæ differentia, quæ a nobis prætermittuntur, quod illorum in aliis capitibus mentio fiat.

Diarrhæa curatur primò, victu refrigerante, & astringente, vt aere arte parato, aceto, aqua rosarū, & similibus: quem, *Curatio.* si epidemialis fuerit (vt anno 1450. Ferrariæ omnibus ferme *Victus.* hominibus accidit) omnino oportet relinquere, & saluber-  
rimum quærere, si fieri tamen non possit, considera quæ dicentur cap. 9. secundi libri, semper tamen necessaria sunt, quæ simul restringunt, & veneno resistunt.

Cibus, sit paucus, & parum nutriendus, præsertim initio, & *Cibus.* facilis concoctu, vt reliquæ corporis partes quasi auarę reddantur, propriūque retineant alimentum. Tunc enim pyra; & cydonea tosta satis nutriendæ, aut ius pulli gallinacei aqua calybeata factum, & eius caro tosta. Vbi diuturna fuerit diarrhæa, aut facultas imbecilla, nutriatur hepate galli- *In diuturna.* næ, ouis sorbilibus, testibus pullorum gallinaceorum, succo *na.* carnis gallinæ aut perdicis, aut arietis, iure pedum arietinorum, suillorum, & similibus, amido, aut oriza assata, aut pane bis cocto, & cum iure optimi nutrimenti & aqua calybeata facto: perdix tã assata, quam elixa restringit. Si facultas fue- *perdix sem*  
rit admodū imbecilla, nutriatur aqua carniū gallinæ, per- *per restrin*  
dicis, & arietis, quæ sit per distillationem, vase vitreo apposi- *git.*  
to supra aliud vas semiplenum aqua efferuescente, miscendo ante illius distillationem aquam malorum cydoneorū, aut *Noxia &*  
myrtillorum, semper tamen ante cibum comedat ossam pa- *utilia.*  
rum assatam immersam in aqua cydoneorum, aut rob cydo- *Admoni-*  
neorum, aut de agresta. Acris omnia nocent, quemadmo- *tio.*  
dum glutinosa, & astringentia iuuant. Toties & tantum cibi sumendum, quoties, & quantum consueuerat capere licet parum & sepe sint alendi, qui facultatē habent imbecillam. Potus sit aqua chalybeata, aut pluuiialis, si tamen fuerit ven- *Potus.*  
triculo imbecillo, aut si solitus vinum bibere, sit rubrū & astringens, quale est Saguntinū, bene aqua chalybeata dilutū. Tandem quiete animi & corporis vtatur, & somno magis, *Si sit ab*  
quam vigilia. Quando ventris profluuiū sit à medicamento hyperca-  
immodicè purgante, acrimonia obtunditur quatuor, aut *tharsi.*



# DE CVRAND. MORB.

sex vnciis aquæ calidæ, aut decocti hordei cum ʒ. j. sacchari, vel hoc potu: ʒ. mucaginis feminis psyllij, & cydoneorum an. ʒ. ij. decocti hordei ʒ. iij. misce. Hæc tamen immodica purgatio multis curatur modis, causis eius abscissis, primò per ea, quæ vim medicamenti purgantis frangunt, incrassant, & à corpore expellunt compingendo, vt sunt mucagines supradictæ, aut per ea quæ canales, & partes seruientes expulsionis roborant, & constringunt, vt est mastix, & similia: aut per ea, quæ ad contrarium vacuant, & trahunt, qualia sunt vomitus, balneum, frictiones & cucurbitulæ: aut per ea, quæ laboriosum motum sedant, per quietem scilicet, & somnum: & per ea, quæ cor corroborant, & animum oblectant. Si quis tamen hanc rē perfectè cognoscere cupit, legat caput Mesuæ

*Si ab hæ-* de medicamento immodice vacuante theoremate tertio, *morrhoidi-* none primo. Sanguinea diarrhæa, si sit ab hæmorrhoidibus, curabitur cap. 52. huius libri. Si à mensibus suppressis nascatur, cap. 56. Si critica, vt in synocha, nulla eget curatione, nisi si modum excedat: tunc curatur sanguinis missione, per sessionem venæ cubiti internæ, extracto pauco sanguine: maior tamen copia sanguinis est educenda, cum diarrhæa sanguinea est à mutilatione membri. In vtraque tamen præcedenti sanguinis missione vtile, & necessarium est hoc, aut simile medicamentum: ʒ. conseruæ rosarum antiquæ ʒ. ij. micleæ ʒ. j. lapidis hæmatitis, coralli rubri præparati, Karabæ, mastichis, boli Armenici præparati an. ʒ. ij. syrupi myrtillorum, quod satis est misce, & fiat confectio. Dosis, mane, & omni hora cochlearium vnum cum aqua caudæ equinæ, aut

*Curatio critica.* sanguinariæ. Diarrhæa biliosa, præcedenti victu prædicto initio huius capitis, curatur vacuatione bilis per medicamentum stiptica: vt ʒ. rhabarbari parū assati, & corticum myrobalanorum parum assatorum an. ʒ. j. syrupi rosarum ex infusione siccarum ʒ. j. aquæ portulacæ ʒ. ij. misce, & fiat potus. Aliquando initio, vbi materia fuerit multa, ante purgationem necessarius est vsus syruporū de agresta, cydoneorum, rosarum ex infusione siccarum, & similium, cum dupla quantitate aquarum, aut decocti portulacæ, plantaginis, & similium: & tunc fiet vacuatio per rhabarbarum non tostum, &

*Confectio.* per myrobalanos non tostos. Diarrhæa pituitosa curatur, si materia fuerit multa, per vacuationem factam myrobalanis chebulis eodem modo paratis, & aliquando addendo scrupulum vnum agarici trochiscati, præcedenti concoctione facta per rhodomel, per decoctum, & syrupum de absinthio.

*Curatio biliosa.* Diarrhæa biliosa, præcedenti victu prædicto initio huius capitis, curatur vacuatione bilis per medicamentum stiptica: vt ʒ. rhabarbari parū assati, & corticum myrobalanorum parum assatorum an. ʒ. j. syrupi rosarum ex infusione siccarum ʒ. j. aquæ portulacæ ʒ. ij. misce, & fiat potus. Aliquando initio, vbi materia fuerit multa, ante purgationem necessarius est vsus syruporū de agresta, cydoneorum, rosarum ex infusione siccarum, & similium, cum dupla quantitate aquarum, aut decocti portulacæ, plantaginis, & similium: & tunc fiet vacuatio per rhabarbarum non tostum, &

*Observa.* nem necessarius est vsus syruporū de agresta, cydoneorum, rosarum ex infusione siccarum, & similium, cum dupla quantitate aquarum, aut decocti portulacæ, plantaginis, & similium: & tunc fiet vacuatio per rhabarbarum non tostum, &

*Curatio pituitosa.* per myrobalanos non tostos. Diarrhæa pituitosa curatur, si materia fuerit multa, per vacuationem factam myrobalanis chebulis eodem modo paratis, & aliquando addendo scrupulum vnum agarici trochiscati, præcedenti concoctione facta per rhodomel, per decoctum, & syrupum de absinthio.

*Melancholica.* Diarrhæa melancholica curatur per vacuationem factam

myr



myrobalanis indis, & epithymo, præcedenti concoctione *licæ cura-*  
per syropos, & medicamenta dicta capite primo: quamuis *tio.*  
aliquando si fuerit ob obstructionem lienis, hæc diarrhæa e- *Præpara-*  
geat propria curatione, de qua capite 45. huius libri loque- *tio & eua-*  
mur copiosè. Deinde auertentibus curatur, vt vomitu, auto- *cuatio.*  
re Hipp. lib. de locis in homine, quo libro docet vomitum cu *Reuulso.*  
rari vomitu, & ventris profluuium ventris profluuiio. San- *Sectio ve-*  
guinis missione, si sint signa sanguinis & robur virium. Mo- *nae.*  
uentibus sudorem & vrinam cientibus, præsertim si simul *Sudoris,*  
ventrem restringant, & vrinam prouocent, vt cydonea. Fri- *& vrinæ*  
ctione externa totius corporis, demptis infernis partibus. *prouoca-*  
Postea curatur per ea, quæ intestina lauant, & simul corro- *tio.*  
borant, dolorémq; sedant, ac defendunt illa ab vlcere, vt cly *Clyster la-*  
stere hoc pauca quantitatit: ℥. decocti hordei ʒ. vj. sacchari *uans.*  
ʒ. ij. misce, adde lutea duo ouorum. Ex solis vnciis octo lactis  
(in quo lapides marini extincti fuerint, aut chalybs ignitus)  
clyster est optimus, & vtilissimus huic profluuiio ventris: in  
dysenteria tamē sunt maioris momēti clysteres, & magis ad  
multa necessarij. Deinde curatur incrassantibus, meatus cō- *Constipa-*  
stipātibus & corroborātibus retētricem facultatem, vt thu- *tio, & cor-*  
re, cymino assato, & aceto infuso, aniso tosto, semine nastur- *roboratio.*  
tij assato: hæc tamen calida magis profunt, si sit profectus  
morbus à causa frigida, quamuis in calida sint vtilia, præci-  
puè si misceantur his syrapi aut aquæ astringentes frigida, *Aduerte.*  
vt syrupus myrtillorum, rosarum ex infusione siccarum, sy-  
rupus de agresta, cydoneorum & similium. Simplicia tamen *Mastiches*  
& composita medicamenta huic profluuiio necessaria sunt, *commēda-*  
omnia fermè frigida, quamuis mastix calida obtineat prin- *tio.*  
cipatum in omni profluuiio, quare ea perpetuò vtendum est  
etiam loco salis in cibis. Oriza etiam assita est optima, a- *Adeps ca-*  
deps quoque caprinus, quo multi diarrhæa laborātes etiam *pinus. i.*  
inueterata sanati sunt, mixta cum pane facto in modum di- *capræ, aut*  
ctum ab Hispanis migas. Drachma vna casei antiqui in a- *capri ca-*  
qua chalybeata per diem infusi, deinde decies, eadem aut si- *strati.*  
mili aqua loti, si sæpè cum cibis, aut syrupo, aut liquore ali- *Virga cer-*  
quo astringente comedatur, curat omne vētris profluuium. *ui, coagu-*  
Similiter ʒ. j. virgæ cerui in puluerem redactæ. Coagulū hœ- *lum hædi.*  
di ab scrupulo vno vsque ad ʒ. j. cum ʒ. ij. aut iij. aquæ plan-  
taginis, aut portulacæ, aut alia simili astringente, potentissi-  
me curat hoc profluuium, incrassantur eo humores, ac coa-  
lescunt. Sed hoc auxilio & antiquo caseo non est vtendum, *Tempus*  
nisi post alia remedia clementiora, vt sunt omnia simplicia *vtendi.*  
astringentia, vt balaustræ, spodium, hypocystis, sanguis dra- *Simplicia.*  
conis,



*Composita* conis, thus, sandaraca Arabum, nux cupressi, myrtillorum  
*astringen-* bacca, & similia. Composita etiam vtilia sunt multa huic  
*via.* profluuiio, vt syrupus rosarum ex infusione siccarum, syru-  
 pus cydoneorum, syrupus myrtillorum, syrupus de Ribes,  
 syrupus de agresta, miua cydoneorum, rob de agresta, aut cy-  
 doneorum, conferua rosarum vetus, conferua cydoneorum,  
 caro cydoneorum saccharo condita. Hæc composita summo  
 mane sumpta sola, vel cum aqua calybeata conferunt, & e-  
*Ante ci-* tiam tempore sitis. In prandio tamen, & coena semper in fi-  
*bos sumen* ne nocent, quia impellunt cibum, ideoque initio mensæ of-  
*da esse.* fa tosta & madefacta aliquo ex supradictis syrupis, aut rob  
*Micleta.* sumenda est. Micleta omne ventris profluuium curat, siue  
 per os, siue per clysterem iniecta, est ab omnibus, & à me  
 probata diligenter. Sunt multa alia medicamenta compo-  
 sita à variis doctoribus scripta, & longa experientia probata,

*Qui auto-* lege Antidotarium Mesuæ, Nicolai, & Arnaldi de Vilano-  
*res legendi* ua, in quibus medicamenta omnia composita inuenire li-  
*in hoc.* cet: quamuis nostris temporibus extet opus diuinum Ni-  
*Confectio* colai Mirepsij, à Leonardo Fuschio Latinitate donatum.  
*causæ ca-* Hoc medicamentum est à me, & à multis expertum in hoc  
*lidge proba* profluuiio, præcipue à causâ calida: ℞. granorum myrti, spo-  
*tiissima.* diij, sumach, santalorum omnium, gummi Arabici an. 3. j. s.  
 osium myrobalanorum omnium assatorum 3. vii. coriandri  
 præparati tosti 3. iiij. seminis acetosæ, seminis plantaginis,  
 seminis rosarum an. 3. j. omnia in puluerem redacta infun-  
 duntur cum succis plantaginis, agrestæ, & acetosæ per diem,  
 deinde exsiccata, & cum sufficienti quantitate miuæ cydo-  
 neorum fiat confectio ad modum opiata. Dosis 3. iiij. cum a-  
 qua, aut succo aliquo astringente.

*Causæ fri-* In causâ frigida hoc medicamentum est expertum: ℞. li-  
*gidæ.* gni aloes, spicæ, galliæ muscatæ, cyperi, calami aromatici an.  
 3. j. cymini infusi per diem in aceto, deinde tosti, seminis por-  
 ri tosti an. 3. ii. s. seminis nasturtij tosti 3. iiij. granorum myr-  
 ti 3. vii. balaustie, conchularum tostiarum, thuris, fructus len-  
 tisci an. 3. j. ameos 3. j. s. omnia bene puluerizata infundan-  
 tur in vinum rubrum Saguntinum, aut simile per diem, de-  
 inde exsiccantur, & iterum infundantur in aquam cydoneo-  
 rum, aut aliam similem, & cum siccata fuerint omnia cum  
 sufficienti quantitate miuæ aromaticæ fiat confectio. Dosis  
 3. iiij. cum 3. ij. aquæ, aut succi, aut syrupi ex superius dictis  
 alicuius. Quando laborans ventris profluuiio afficitur animi

*Deliquii* deliquio à materia venenosa, hoc remedium est optimum:  
*curatio* ℞. conferuæ rosarum antiquæ, & micletæ ana. 3. j. confectio-  
*quod sym-* nis



nis de hiacintho, & confectionis Gentilis cordialis contra *ptoma est.*  
 melancholiam ana. ℥. ss. coralli rubri præparati, margarita- *Confectio.*  
 rum electarum, seminis portulacæ an. ʒ. ij. lapidis smaragdi  
 ʒ. j. syrupi cydoneorum, quod satis est, misce, & fiat confe-  
 ctio cordialis. Dosis cochlearium vnum omni hora cum a-  
 qua cydoneorum. Lapis smaragdus curat profluuium ven- *Aque sma*  
 tris venenosum auctore sene Auenzoar. Nostri enim tem- *ragdi fa-*  
 poribus curatus fuit hoc lapide illustris Ioannes de Mendo- *cultas.*  
 ga post multa alia auxilia. Quare hac in re non est audien- *Historia.*  
 dus Aloisius mundella, qui sua prima epistola damnat vsum *Arabum*  
 lapidis smaragdi contra Arabes, à quibus certè aliqua scri- *defensio cō*  
 pta sunt partim à Græcis prætermis-*sa*, partim ignorata, vt *tra Alo-*  
 docet Andreas Turinus nostræ ætatis doctissimus medicus. *sum, Mun*  
 Postea, imò semper vacuata causa ventri sunt admouenda *dellam.*  
 vnguenta, emplastra, cataplasmata astringentia, præcipue si *Turinus*  
 præcedat fots hoc, aut simili liquore factus: ℥. aceti caly- *laudatur.*  
 beati partem vnam, aquæ calybeatæ ( præsertim si fuerit in *Arabum*  
 qua extinguantur enses, pugiones, & gladij igniti ) partes *Topica.*  
 duas, foliorum & fructuum myrti, cydoneorum, mespilo- *Fotus.*  
 rum, sorborum an. m. ij. nucum cupressi num. x. fiat ex his  
 decoctum ad medietatem, & reseruetur ad fotum. Bis in die  
 admoueat ventri hæc mixtura: ℥. mastichis, & emplastri *emplastrū*  
 stomatichonis ana. æquas partes, extendantur super alutam *Vnguentū*  
 ad formam scuti, & magnitudinem ventris. Hoc quoque *Cataplas-*  
 vnguentum, si bis, aut ter, in die admoueat, est optimum: *ma opti-*  
 ℥. olei mastichis, cydoneorum, & myrtillorum an. ʒ. j. pul- *mun.*  
 ueris sanguinis draconis, thuris, & gummi draganti ana ʒ. j.  
 ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum. Hoc cataplasma, aut  
 simile, si quolibet die semel ventri admoueat, ventris hoc  
 profluuium curabit: ℥. micæ panis tostæ & infusæ in ace-  
 tum calybeatum, carnis cydoneorum cum melle conditæ a-  
 na partes æquas, decoquantur cum oleo mastichino, & vinq  
 rubro, addendo pulueris mastichis, thuris, sanguinis draco-  
 nis an. ʒ. ij. misce, & fiat cataplasma. Emplastrum diaphæni- *Emplastrū*  
 con Mesuæ ex Alexandro Tralliano, & est secundæ descri- *diaphenico*  
 ptionis ( Syluius non credit esse Alexandri ) omne ventris  
 profluuium sine dubio curat, ventriculūque corroborat,  
 est à me sæpe probatum. Fotus rerum astringentium ( vt *Fotus.*  
 sunt folia & fructus dicta ) per anum confert non parum  
 huic morbo. Similis est & expertus fotus pini habentis no-  
 dos igniti, & postea extincti vino rubro.

Postremò curatur hoc profluuium quemadmodum a-  
 lia omnia immodica profluvia narcoticis medicamentis: *Narcotica*  
 quia



# DE CVRAND. MORB.

**Somni vis** quia somnus omnes vacuationes detinet præter sudorem, iis tamen non est vtendum, nisi cum alia non contulerint, & præfenti aliqua constantia virium: multi namque his me-

**Quid cauendum sit docto medico.** dicamentis perierunt extincto calore natiuo. Quare doctus & prudens medicus primò iis externis admotis vtatur, minus enim hæc nocent, & à medico, & ab astantibus amoueri possunt & debent somno iam incepto: ne nobis contingat quod multis medicis eruditis Italis, præcipientibus famulis, vt statim ab incepto somno amouerēt narcotica fronti, aut ægrorum capiti admoti quibus præcepti oblitis, mul-

**Supposito-  
ria, aut cly-  
steres.** ti perierunt perpetuò dormientes. Secundò, si hæc externa non suffecerint, parti inferiori sunt admouenda narcotica in forma suppositorij, aut clysteris. Tertiò, & in maxima ferme necessitate opiatís & interiùs deuoratis vtendum est.

**Topica ef-  
ficacissima  
ad somnũ  
inducen-  
dum.** Primò igitur fronti & naribus admoueatur parum huius mixturæ: ℞. vnguenti populeonis, & olei papaueris an. ʒ. j. Thebaici grana v. misce, solum tamen vnguentum populeon aliquando somnum inducit. Hoc etiam medicamētum laudatur in hoc genere: ℞. lactis fœminei ʒ. ij. Thebaici ḡ. v. misce, vel ℞. olei violarum & papaueris an. ʒ. j. Thebaici ḡ. v. misce.

**Clyster ad  
somnum.** Secundò, si externa non suffecerint, hic clyster, aut similis somnum affert: ℞. lactis caprini, aut ouini ʒ. vij. olei papaueris ʒ. ij. philonij Romani ʒ. ss. misce, & fiat clyster: vel ℞. philonij Romani, & micletę an. ʒ. j. pinguedinis caprine, aut ceræ. q. s. misce, & fiant duo suppositoria cū philo magno bombicis, aut lini.

**Narcotica  
sumenda.** Tertiò, & vltimò, laudantur interna narcotica, quorum hatanasia, & requies magna sunt tutiora. Dosis horum duorum à drachma semis vsque ad ʒ. j.

**Potentio-  
ra.** Postea potentiora, vt sunt trochisci de karabe, de spodio, de terra figillata. Dosis est ab scrupulo vno vsque ad ʒ. ij. aut drachmam vnam.

**Pilulæ  
Nicolai.** Pilulæ Nicolai contra fluxum sunt probatæ in hoc numero. Dosis est quarta pars vnus drachmæ, fiant ad magnitudinem grani Orobî. Valentiora sunt philonium Romanum, Tarsense, & Persicum ab scrupulo semis vsque ad drachmam semis, vel drachmā vnā. His tamen nar-

**Narcotica  
vetustiora  
laudantur.** coticis non est vtendum, nisi post sex menses, & quanto vetustiora sunt, tantò tutiora, vt sæpe diximus cum Gal. 12. method. Theriaca recens à drachmā semis vsque ad drachmam vnam inter narcotica adnumeratur. Hoc quoque medicamentum in genere remediorum narcoticorum recensetur: ℞. micletæ ʒ. j. cōseruæ rosarum antiquæ ʒ. ss. trochiscorum  
de



de karabe, de spodio, & de tetra sigillata an. 3. ij. pilularum Nicolai contra fluxum 3. j. requiei magnæ 3. ij. s. syrupi myrtillorum. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis semel in die drachmæ duæ cum aqua, aut syrupo astringente ventriculo vacuo. Pilula hæc sumpta hora vndecima noctis omne ventris profluvium curat, experta est à me, & à multis medicis Valentinis, eius author fuit doctor Tortella: ʒ. opij ḡ. j. parci *Pilula do-*  
ponderis, cinnamomi, cassiæ lignæ, croci an. ḡ. iij. cum glu- *storis Tor-*  
tine dragaganti fiat pilula vna. Composita tamen narcotica *telle.*  
post sex menses, & post annum sunt tutiora, vt diximus cum *Quando*  
Gal. quia vis opij, & forma corrupta est saltē maiori ex par- *sunt tutio-*  
te, quod in theriaca fermentata demonstratur, quæ calida est *ra narcoti-*  
in fine secundi ordinis. *ca.*

## De Diarrhæa. CAP. XXXVI.

## Scholium.

**D**iarrhæam barbari.) Diarrhæa, quam Latini alui proflu- *Diarrhæa.*  
uium appellant, est immodica per alium excretio alicuius hu-  
moris, siue hic sit pituita, siue bilis, siue melancholia, siue cor-  
ruptus humor in ventriculo, cuius excretionem diarrhæam venteralem ap-  
pellare solent: siue etiam fiat cum crisi, siue sine crisi, siue cum febre, siue  
sine febre: quamvis diarrhæa ratò fiat ex toto corpore sine febre. Humor  
hic, qui in diarrhæa euacuatur, aut generatur in ventriculo, aut aliunde  
fluit. Si in ventriculo, aut generatur culpa ventriculi, quando intem-  
peratus est, aut prauum humorem in cavitate continet, aut culpa ali-  
menti cum peccat quantitate, aut qualitate. Si humor aliunde ad ven-  
triculum confluat, aut id contingit ex toto corpore, vt in febribus, chole-  
ra, morbo, & super purgationibus: aut ex vnica tantum parte, hepate,  
liene, capite aut alia, quam ex signis eius partis affectæ cognoscet.

Si diarrhæa ventriculi culpa contingat, curabitur eius intemperiem  
corrigeno: si sit humor in eius cavitate, ipsum euacuando. Si verò ali-  
mentum eius sit causa, diminuemus eius quantitatem, aut aliud muta-  
bimus.

Diarrhæa curatur primò.) Diarrhæa bene potest esse epydemia- Error au-  
lis, & sine veneno, & proinde non est, quod semper cum adstringētibus storis.  
misceamus, quæ veneno resistunt.

Sanguinea diarrhæa.) Excretio sanguinis per alium non dicitur Alius er-  
diarrhæas, sed dysenteria, & idem non erat, quod hoc in loco eius faceret ror.  
mentionem.

Diarrhæa biliosa.) Biliosa diarrhæa, quæ frequenter molestare Curatio  
solet, aut est critica, aut symptomatica. Critica in febribus post coctionē diarrhææ.  
apparet, quæ non est sistenda, quia in ea solus humor peccans excerni-

tur.



# DE CVRAND. MORB.

tur, sed solum intestinorum habenda est ratio, ne exulcerentur ab acrimonia humoris, lac tepidum infundentes. Symptomata principis febrium accedit, sit a natura irritata ab acrimonia humoris, aut a calore, quod idem est, quæ, velit nolit Vallesius, semper est mala, Cõtra Val quia cum utilis humor cum inutili mixtus in ea euacuatur, sit cum incom-  
lesum. modo animalis. Neque ratio eius aliquid probat, quia etiam si videamus aliquos homines robustos ferre hanc euacuationem, non proinde colligimus eam esse bonam, reuera enim debilitauit ægrum, qui ob robur eam potuit ferre noxam, & ex accidenti inuari multo humore inutili euacua-  
Diarrhæa to. Hanc ergo euacuationem in principis morborum factam sistemus, nõ  
symptoma sanguinis missione, quia ex Hippocr. fluente aluo sanguinem non detra-  
tica qua hes, sed temperabimus bilis acrimoniam syrupo rosarum, acerositatis ci-  
ratione si- tri, & similibus, cum decocto endiuie & borraginis: deinde purgabi-  
stenda. mus bilem ea ratione, qua purgat auctor. Vbi aduerte nos parum terre-  
Purgatio. facere mirobalanos, & rhabarbarum, ut minuat in eis vis purgans, & au-  
geatur vis corroborans, ut ea ventriculus roboratus non ita facile recipiat humorem. Cibus & potus debent refrigerare, & adstringere: Et ita ante assumptionem alimenti minima citoniorum cum paucis pane torrefacto utilis erit. Quod si persisteret affectus, mane per aliquot dies cochlearium vnum miclet & conueniet, vel pilulas ex ea constringemus hoc modo, ℞. specierum confectionis micletæ 3. j. cum syrupo rosarum sicca-  
Que assu- rum fiant pilule nouem, quas vna vice accipiat æger. Que si nõ profint,  
menda me ad pilulas Nicolai cõtra fluxum deueniendum est. Ex 3. j. facientes pi-  
dicameta. lulas xxx. & assumentes ix. hora decima, aut vndecima noctis, quam quantitatem, poteris pro robore, & imbecillitate ægrotantis augere, aut minuire. Hæ enim pilule ratione medicamentorum adstringentium roborant ventrem, & incrassant humorem, propter opium verò somnum conciliant, & sic sistere faciunt diarrhæam, quia somnus omnes euacuationes cohibet, quæ egent ope facultatis animalis. Inferne per alium in-  
que infun- fundes lac, in quo lapides igniti extincti sint. Regionem hepatis illines  
denda. vnguento refrigerante, quale est rosatum sandalatum. mixtum (ut pe-  
Iecoris vn- netret) cum paucis aceto aut cerato refrigerante Gal. ex 10. meth. Quauis  
Etio. enim ex vniuerso corpore bilis fluat, in iecore tamen focus est putredinis, & per ipsum transit bilis, antequam ad intestina perueniat. Si in fe-  
Animi de- liquium in brium accessionibus bile descendente ad ventriculum fiat cardialgia,  
tuum in- accepsione tunc propina vinum aqua dilutum, aqua enim refrigerat ventrem, & vinum citam facit humoris distributionem. Præcauebis autem in sequen-  
febris. ti accepsione animi deliquium, si antequam præhendat, panem vino madafactum, aut syrupum adstringentem assumat. Si biliosa hæc diarrhæa citra febrem accadat, prædicta curatione alium firmato: si ex toto corpore fluit bilis, eam purgabis: si ex vna parte, eam corroborabis, & cau-  
Ventriculi sam generationis bilis submouebis. Roborabimus etiam ventriculum, qui roboratio. est pars recipiens, medicamentis exterius applicatis: quæ adstringentia  
sint,



int, quale est emplastrum factum ex malo cotoneo, in vino austero decocto, puluerizato cum cinnamomo, mastiche, et myrillis. Quod si bilio- Diarrhæa  
sa hæc alui fluxus ex acri medicamento euenerit, curabitur medicamen- ex acri me-  
tis acrimoniam temperantibus succo agrestæ aut granatorum, sorbitio- dicamento.  
ne ex alica ( pro qua nostra similagine utemur. ) Enematis etiam em-  
plastis ex lacte calybeato, & amylo paratis, vt cap. I. diximus.

Diarrhæa pituitosa curatur. ) Si in hac diarrhæa pituita in vē- Curatio  
triculo generatur copiosa, aut vētriculus multas generet cruditates, ine- diarrhæe  
dia, & abstinentia a potu ( vt coquatur humor ) utemur, purgabimus & pituitosæ.  
roborabimus ventrem, & optima imperabimus alimenta. Si a capite de-  
scendat pituita, ipsi prospiciemus ea ratione, qua capite de distillatione  
diximus. Purgabimus pituitam ex ventre, & ultimo corroborantibus  
utemur, capite de imbecillitate ventriculi descriptis.

Diarrhæa melancholica. ) Si diarrhæa sit ab humore melanco- Melancholico  
lico, & critica, sinenda erit, si symptomatica, sistenda, purgantes humo- lice cura-  
rem corticibus myrobalanorum indorum parum torrefactis, & deinde tio.  
adstringentibus, & aliis superius propositis utentes. Si sit ex atra bile,  
& critica præcedentibus signis coctionis, optima erit. Si symptomatica,  
lethalis, nihilominus tamen in ea idem præstabimus, ac in superiori ex  
melancholico humore orta.

## De lyenteria, id est leuitate intestinorum.

### CAPVT XXXVII.

**I**Yenteriam, quam Latini læuitatem intestinorum *Descriptio,*  
nominant, Gal. aphor. I. sect. 6. tum carentiam con-  
coctionis dicit esse, cum scilicet neque secundum  
consistentiam, neque colorem, vel odorem in ventriculo fa-  
cta fuerit mutatio ciborum: tum velocem exitum eorum, quæ  
comeduntur, & bibuntur, quæ talia deiciuntur, qualia fue-  
rant deuorata. Veteres medici, qui primi lyenteria nomen  
huic affectioni indiderunt, id voluere significare, tale quip-  
piam per hanc affectionem intestinis euenire, quale extrin-  
secus in corporis cuticula ex cicatricibus contingere solet:  
existimarunt enim fieri ipsam propter internæ superficiei  
intestinorum læuitatem, ob quam cibos in eis cōtentos non  
amplius retinet, vt cum suam & sibi a natura inditam aspe-  
ritatem seruarent, retinebant. Si quidem graui aliqua dysen-  
teria præcedente, intestina ab erodentibus humoribus altè  
exulcerantur, deinde cicatricibus densis & læuibus succeden-  
tibus ipsa tum densa, tum læuia redduntur: vnde propter den-  
sitatem ciborum per corpus distributio fieri non potest, cum  
ora vasorum sint velut obturata, vasorum inquam, quæ ali-  
men



# DE CVRAND. MORB.

mentum ex intestinis ad se attrahunt: propter leuitatem verò, cibus antequàm plenè concoquatur, nullo retinente delabitur, atque sic de lyenteria sentiunt: quos Galenus non probat. Quam rem (vt puto) animaduertēs Paulus Aegineta lib. 3. cap. 40. duplex lyenteriae genus facit, alterũ quidem quod ex intestinorum exulcerationibus, & eorum cicatricibus oritur, quod mali genus, intestinorum tormina plerumque sequitur. Aut ex aliis distillationibus rheumatismis que inducitur: Alterum verò, quod ex infirmitate languoreque facultatis, quæ alimentum in stomacho retinet, prouenit: hac enim languente, ac imbecilla, cibi neque cõcoquantur, concoctiue distribuuntur, sed crudi humidi, & nihil immutati excernuntur continuo fluxu tentata aluo. Ex his quæ dicta sunt, constare potest à quibus causis hoc malum proueniat: fit enim vel ab exulcerationibus, & cicatricibus intestinorum, vel à facultatis imbecillitate. Interdum & post voluolosa tormina, & post alui ingens profluuium sequitur. Aliquando etiam & aqua inter cutem per ventrẽ euacuata contingit. Signa sic ab Aetio adnotantur lib. 6. cap. 51. Ex quacũque igitur causa lyenteria orta sit, ægri cibum non sentiunt, & malum corporis habitum acquirunt, quod vtrunque malum inemendabile est: succedit enim ægris assidua excretio cruda, colore subalbida, inæqualis, & aquosissima citra sanguinis ac bilis complexum. Adest autem simul & ardor per tota præcordia se dilatans, quem cibi fastidium comitatur. Videtur autem bonum & amicum signum in eis ructus acidus esse, indicat enim iucundi quippiam factum esse, & ventrem ac intestina non velut inania cibum finire pertransire: Haftenus Aetius. Verum hoc vltimum confirmat etiam aphorismus supra citatus primus sectionis sextę in longis leuitatibus intestinorum, si acidus ructus fiat, qui prius non erat, signum bonum, & quæ à Galeno in commento dicuntur. Præcedenti cap. multa scripsimus non solum diarrhææ vtilia, & necessaria, sed lyenteriae & omni ventris profluuii: ideoque paucis curationem hanc expediemus.


*Curatio lyenterie ex acrimonia.* Si intestinorum & ventriculi leuitas fuerit à re acri irritante expultricem facultatem, & retētricem imbecillam efficiēte curatur primò, ratione victus conueniente, de qua *Victus.* superiori capite. Secundò, vacuatione materiae calidæ per *Purgatio.* rhabbarbũ tostum facta, & per myrobalanos citrinas similiter tostas. Deinde per frigida stiptica corroborãtia, vt sunt *Corroboratio.* electuarum diarhodon. Abbatis syrupus de agresta, syrupus *Curatio ex vlceribus.* rosarum ex infusione ficcarum, & similia. Si fuerit ab vlceribus



us ventriculi & intestinorum (quod per excrementa cogno-  
 sces, & per dolorem, quo tempore sumendus est cibus, præ-  
 tertim acer, & expellenda excrementa) curatur per abstergen-  
 tia, mundificantia, & consolidantia, de quibus cap. de pleu-  
 ritide & suppuratione dictum est. Si fiat a materia multa ven-  
 triculo affixa (a qua sæpius fit) curatur primò, victu tenuan-  
 te, incidete, tergente, vt rebus salis parum amaris, & parum  
 acris. Secundo paretur pituita rhodomelle, syrupo de ab-  
 sinthio & oxymelite. S. cum decocto, aut aquis absinthij, foeniculi,  
 mentæ, & similibus. Tertiò vacuetur vomitu aut de-  
 sectione facta per vnciam semis diaphanicon, aut per 3. j. pi-  
 gularum elephanginarum, aut stomachicarum, aut per 3. j. a-  
 garici trochiscati. Postremo corroboratione facultatis con-  
 coctricis, & retentricis medicari poterimus per ea, quæ dixi-  
 mus cap. 31. de curatione imbecillitatis ventriculi. Hoc cata-  
 plasma est in hoc genere bonum: ℞. mentæ siccæ, balaustiarum, Topica.  
 myrti, corticis mali granati, anteræ, florum roris marini an. Cataplas-  
 3. j. myrrhæ, masticis, gumi Arabici an. 3. ij. vini rubri & suc-  
 ci cydoneorum an. æquas partes & sufficientes pro cataplas-  
 mate. Hoc medicamentum est in hoc expertum: ℞. pulueris  
 caudæ equinæ, balaustiarum, mentæ, mastichis an. 3. ss. foliorum  
 myrti, seminis lini tosti an. 3. iij. syrapi myrtillorum. q. s. mi-  
 sce, & fiat confectio. Dosis drachmæ duæ sunt mane & vespere  
 re cum syrupo & aqua aliqua adstringente. Hoc cataplasma  
 ventriculo & ventri sæpe admotum, est optimum in hoc ge-  
 nere: ℞. acaciæ, psidii, gypsi, granorum vuarum, boli Arme-  
 nici, hypocistidos, balaustiarum, galbani, myrti, mastichis an. 3. ss.  
 ss. gariophyllorum, cinnamomi an. 3. ij. vini rubri optimi, &  
 succi cydoneorum an. æquas partes, & sufficientes pro cata-  
 plasmate. Semper ante cibum comedat æger duo, vel tria co-  
 chlearia miuæ aromaticæ, aut duas offas tostas & madefa-  
 ctas prædicta miua, desuper addendo parum coriandri præ-  
 parati, & cinnamomi, vel parum pulueris scripti capite 31.  
 Ius carnis perdicis elixæ aqua calybeata, & prius plenæ ce-  
 ra noua, pinguedine hirci castrati & cydoneis, mespilisque  
 curat hoc, & quodcunque aliud ventris profluuium.

## De Lyenteria. CAP. XXXVII.

## Scholium.


 Yenteriam, quam Latini.) Lyenteria est affectus præter Lyenteria  
 naturam, in quo celeriter ea, quæ comeduntur talia deliciuntur quia  
 tur, qualia denotata fuerunt. 4. aph. com. 12. vel ex 6. aph. com.



# DE CVRAND. MORB.

10. brevius, est coctionis carentia. Qua in parte errat Hieremias existi-  
mans in ea tenuem alimenti partem concoqui, si enim nō retinetur, quo-  
modo concoquitur. Hic affectus est symptoma in his quę immodice excer-  
nuntur, sequens etiam aliquando aliud symptoma, nempe debilem actio-  
nem facultatis retentricis. Præterea hic affectus solet sequi morbos in-  
strumentorum omnium, quę ad alium pertinent, qualia sunt ventricu-  
lus & intestina. 4. aph. com. 12. sic Hippocr. prædicti commentarii senten-  
tia sic habet. Quorum alui leuitate intestinorum laborant, &c. Unde  
Obiectio. cum Galenus lib. 6. aph. comment. 1. agens de Lyenteria solius ventricu-  
li meminit, adde intestina, aut ea nomine ventericuli intellige. Dicit quis,  
si ventriculus est instrumentum concoctionis, & in lyenteria alimentum  
crudum manet, qua ratione lyenteriam etiam in intestinis collocamus?  
Respondeo intestina etiam concoquere, etsi leuiter, cum habeant com-  
munem tunicam cum ventriculo, ac proinde si alimentum in ipsis mo-  
ram faceret, concoqueretur: in lyenteria vero cum crudum omnino ex-  
cernatur, signum est ipsum neque in ventriculo, neque in intestinis de-  
tineri, & lyenteriam esse affectionem ventriculi & intestinorum. Mor-  
bi, ad quos sequitur lyenteria, duo sunt. Vnus est intemperies quolibet  
duos mor- imbecillam reddens retentricam facultatem, & potissimum frigida, &  
bos sequi- humida, quia hæc molles reddit fibras, quę robur postulant ad reten-  
tionem: Rursus hæc intemperies frigida & humida, aut est nuda, aut  
Primus. (quod ut in plurimum contingit) orta habet ab humore pituitoso in ven-  
triculo generato, aut aliunde fluente. Arque hæc est lyenteria, quę non  
sequitur immediate morbum, sed aliud symptoma, quod est actio aboli-  
ta facultatis retentricis. Secundus morbus lyenteriam efficiens est soluta  
Secundus. continuitas partis internę ventriculi, & intestinorum, quę fit ab a-  
cri humore: in hac enim parte aliquando contingunt exulcerationes mul-  
tę proportionem habentes cum aphthis, qua ratione, existimo in variolis,  
& morbillis lyenteriam fieri: & ideo esse lethalem, & postulare eam  
curationem, qua roboratis partibus internis humores ad externas expel-  
luntur, ut libro secundo videbimus. Fit ergo in hoc secundo morbo lyen-  
teria, eo quod alimentum in vlcusculis dolorem excitans expellitur a fa-  
cultate, & sic noxa refertur ad irritatam expultricem. Præctici sequuntur  
Paulum & Cornelium Celsum tertium morbum in lyenteria addunt,  
Reprehen- quod est leuitas ventriculi a magna cicatrice induc̃ta. Quorum senten-  
duntur præ- tiam non probo, non enim tanta potest viuente animali soluta continui-  
tati tertiū tas in ventriculo incidere, ut eam cicatricem inducat, ex qua sequatur  
morbum lyenteria, ab exigua enim non fiet. Lyenteria acutissimus est affectus,  
addentes. cum enim partes non nutriantur, atrophiam patientur. Neque pugnat,  
quod Hippocr. dicit 6. aphor. In longis leuitatibus intestinorum, quia  
cum hæc sequantur diarrhæas, potissimum ventrales, si tempus deiectionis  
consideremus, longa erunt.

Error au- Si intestinorum & ventriculi.) Si causas lyenteria, hoc est mor-  
bus



bos ad quos sequitur, consideres, intelliges male auctorem curare lyenteriam a re acri irritante factam cum talis non detur: sicut neque illa, quam Curatio a multo alimento oriri scribit. Curabitur ergo hac ratione: si ortum habeat ab intemperie nuda, contraria alterantia conuenient: si cum affluxu pituitæ, si affluxus multus est, corticibus myrobalanorum chebularum torrefactis cum hiera, aut decocto eorum cum hiera & agarico, ut ventriculus purgetur simul, & roboretur? Si autem humor contentus in ventriculi cavitatem multus sit, fluxusque non sit magnus, tunc abstergentem intendemus facultatem, miscentes aloem cum hiera, idque non unica vice præstabimus, hæc enim neque totum humorem euacuabit, neque ventriculi facultatem (quæ multum læsa est) corroborare poterit. Possumus etiam his peractis exterius applicatis ventriculo robur addere. Hoc vnguentum id commodè præstabit. ℞. olei coroneorum, mastichini, & myrtillorum an. ʒ. j. pul. sanguinis draconis, mastichis, gummi dragaganti an. ʒ. j. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum. Vtemur etiam emplastro stomaticho confortatiuo, per os: syrupus de absinthio roborabit ventrem. Si post euacuationem ventriculi & eius corroborationem, ructus acidus apparuerit, bonum est, quia melius est coctionem esse imminutam, quam abolitam.

## De Dysenteria. CAP. XXXVII.

**D** Vm quatuor sint dysenteriarum differentiæ (vt apud Galenū videre est sexto de morbo & symptomate cap. 2. ad finem) de vltima nobis agendum est, quam describentes, & solam dysenteriarum nomine dignantes dicimus, esse vlcus intestinorum: Galenus verò citato loco supra eius notas simul enumerans de hac, hunc in modum loquitur. Per quartam verò, scilicet dysenteriarum differentiam paulatim, & breuibus interuallis deiectio fieri solet, nonnunquam grumosi, cum quo interdum puris quoque nonnihil excerni conspicitur, itidem & ramenta (Græci vocant ephelidas) & partes quædam intestinorum membranæ similes, sæpenumerò densum quoque stercus excernitur cruentis guttis respersum. Porro Latini hanc affectionem tormina appellant, ob id, vt coniecere licet, quod intestina ulcerationis dolore admodum torqueantur: vnde hoc malo affecti torminosi perinde ac Græcè dysenterici dicuntur. Prouenit autem Aetio cap. 43. lib. 9. ab externis causis veluti frigiditate, ardore, perniciosorum medicamentorum potu, vt scammonij & colocynthidis. Item a cruditatibus, & ciborum acrimie sumptione. Galenus verò lib. 1. de loc. affect. mordax humor dysenteriarum causa statuitur, vt qui ab initio & abstergat, & abradat: deinde temporis interuallo ulceret intestinum.



# DE CVRAND. MORB.

Nonnūquam à tenesmo incipit hoc malum, sæpe etiam per se. Si à causis exterioribus accadat, interrogandus æger erit, sin minus per traditas sæpe methodos interne causę sunt inuestigandę. Signa verò quibus morbus cognoscitur, iam supra a Gal. tacta sunt, quibus alia quoq; addit Aetius, sed distinctiorum cta satis sunt. At cum aliquando cōtingat tenuia, aliquando verò crassa intestina in hoc morbo vlcerari, breuiter Paulus in hunc modū docet distinguere. Si cū stercore mixta exulcerationis signa cum labore & circa vmbilicum torminibus excernantur, in gracilibus intestinis exulcerationē esse cognosces. Si verò absq; vllius rei cōmunionē immixtum ster-

*Dysenteria* cus egeratur, in crassioribus. Hęc multò fusiùs ab Aetio, & *curatu difficilis.* a Gal. 5. de loc. affec. cap. 5. tractantur. Cæterū tam grauis est hęc ægritudo, & curatu difficilis, vt quāuis eius curatio nō nunquam sit expectanda, maiori tamen ex parte desperatur, maxime in iis, de quibus Aphor. 3. sect. 6. scriptum est, in longis difficultatibus intestinorū cibi fastidium malū est, & cū febre peius: & 23. sect. 7. a deiectione syncera difficultas intestinorum malum: & Aphorismo 24. sect. 4. difficultas intestinorum si ab atra bile inceperit, lethalis est, cui aphorismo consonare videntur, quę dicuntur sectionis 6. aph. 43. Quicunque lienosi à difficultate intestinorū capiuntur, iis superuenientem longam difficultatem intestinorum aqua intercutem, aut leuitas intestinorum excipit, & moriuntur.

*Curatio.*

*Victus.*

*Quę no-  
ceant.*

*Vacuatio.*

*Potio bi-  
liosæ.*

*Pituitosæ.*

Quatuor itaque remediorum generibus mederi dysenterię possumus: primò, victu refrigerante, & astringente, si sit causa calida (a qua sæpius fit.) Vt cibis parum acidis ad excitandam appetentiam, paucis & facilibus concoctu, & bonum sanguinem gignentibus, quales sunt testes gallorum gallinaceorum, oua forbilia, hepata gallinarum, succus, aut aqua gallinæ, vel perdicis cum succo agrestæ, aut acetosæ.

Vitentur acetum, salsa, acria, quia vlceribus nocent, mordacia. In hoc genere, quę scripta sunt cap. 36. de curatione diarrhææ, conueniunt.

Secundò, materiam vacuantibus biliosam (à qua fit crebrius) vt myrobalanis citrinis parum tostis, rhabarbaro etiam tosto: vt ℥. corticum myrobalanorum citrinorum, parum affatorum, rhabarbari parum tosti an. ʒ. ij. syrupi rosarum ʒ. j. aquæ portulacæ ʒ. ij. misce, & fiat potio. Si à pituita falsa sit dysenteria, hac potione, vel huic alia simili vacuabitur: ℥. corticum myrobalanorum citrinorū, & chebulorum parum tostorum an. ʒ. ʒ. agarici trochiscati ʒ. j. syrupi rosarum ʒ. j. aquæ plantaginis ʒ. ij. misce, & fiat potio. Si fuerit ab

atra



atra bile, myrobalanis indis parum tostis vacuabitur.

In fine 3. generis capit. 35. docuimus purgationem in o- *Melācho-*  
mni ventris profluio esse faciendam per medicamenta a- *lica.*  
stringentia, & quæ omni carent acrimonia, & facultate i-  
gnea, quale rhabbarum parum assatū, & myrobalani mo-  
dicè assati. Quare dicitur Amatus Lusitanus Centuria 2. cu-  
ratione 44. credens lotionem & infusionem solam in aqua  
plantaginis, aut alia simili posse acrimoniam, & vim purga-  
toriam tollere, cum substantia horum sit terrestris, & densa,  
à qua sola decoctio, aut assatio potest rectè acrem, & purgā-  
tem facultatem separare, remanente sola astringente, & pa-  
rum purgante, & vlcerā curante, qua indigemus in ventris  
profluuiis, præsertim in dysenteria, cui maxime nocet mel,  
cum autore Gal. 5. de facultatibus alimentorum cap. 39. mel  
sit tenuium partium habens acrimoniæ quippiam, quæ præ-  
terquam quòd aluum ad excretionē excitat, vlceribus mul-  
tum nocet. Est quoque calidum, & siccum secundo ordine,  
vertiturque in bilem in iuuenibus & biliosis, & non potest  
materiam huius, & alterius profluuij purgare. Neque con-  
trarium sentit Galen. 2. de facultatibus simplicium medica-  
mentorum cap. 12. & 14. docens prius esse educendos humo-  
res facientes morsiones, & postea, quæ morsiones acrimo-  
niam tollunt, dare per os, & per inferiora in aluum infunde-  
re. Purgat Galenus humores facientes morsiones melle, quo  
nunquam Galenus in dysenteria vsus fuit, nisi iniecto per  
clysterem ad lauanda, & tergenda vlcerā, vel per os sumpto  
ad purgationem mixto cum aqua plantaginis, aut alia, &  
pauco decocto. Pari modo lac siue asininū, siue caprinum in-  
iectum per inferna vtilissimum est, præsertim si in eo lapides  
igniti extincti fuerint: per os verò sumptum nocet huic mor-  
bo, maxime si æger fuerit biliosus, laborétque febre putrida.

Tertiò, sanantibus vlcerā, primò lotis intestinis a muco, *Detergen-*  
& materia mordaci hoc, aut simili clystere: ℞. decocti hor- *tia vlcer.*  
dei ℥. j. sacchari rubri ℥. ij. misce. Si vlcerā sint in superiori-  
bus intestinis, bibat vncias quatuor, aut sex superioris liquo-  
ris. Cum maiori egent lotione intestina, hoc aut simili cly-  
stere vtere: ℞. decocti hordei cicerum nigrorum, & furfuris  
℥. x. oxymellis simp. & rhodomellis an. ℥. j. misce: aut bibat ℥.  
v. si vlcerā sint in intestinis superioribus. Si vlcerā fuerint for-  
dida, maiori egent lotione, decocto scilicet lupinorum, myr-  
rhæ & absinthij, & oxymelle simp. & compos. Sed hæc & si- *Lactis ca-*  
milæ vlcerā rarò curatur, etiam si sit in intestinis inferiori- *ly beati*  
bus. Lac calybeatum, vel in quo extincti fuerint lapides ma- *laus.*



## D E C V R A N D. M O R B.

*Sarcotica.*

rini igniti, siue per os, siue per clysterem infundatur, lauat, moderate refrigerat, & dolorem sedat, quare eo sæpè vten- dum est: præcipuè iniecto per clysterem, quando intestina inferiora affecta sunt vlceribus. Lotis intestinis, & eorum vlceribus mundificatis, necessaria est incarnatio, glutina- tio, & consolidatio addendo quæ internam superficiem te- gant, & muniant, vt sunt pinguedines, cera, & similia, quod his clysteribus perfecte fiet: ℞. succi plantaginis, & portula- cæ an. iij. albuminis duorum ouorū, pulueris mastichis, san- guinis draconis, gummi draganti an. 3. j. ℞. ceræ, pinguedinis caprinæ an. 3. ij. misce, & fiat clyster, vel ℞. iuris pedum, in quo sint decocta folia sanguinariæ, plantaginis, portulacæ, & caudæ equinæ 3. viij. pulueris mastichis, sanguinis draco- nis, & boli Armenici an. 3. ij. ceræ, pinguedinis caprinæ an. 3. ℞. misce, & fiat clyster: vel ℞. lentium tostorum, orizæ aslatæ, rosarum, balaustiarum, sanguinariæ, caudæ equinæ an. m. j. fiat decoctum, de quo accipe vncias octo, micletæ 3. ℞. tro- chiscorum de karabe 3. j. vitella ouorum aceto elixorum nu- mero duo, misce & fiat clyster. In hoc profluuiū ventris, &

*Clyster sit minor ℞. j.*

*Antiquæ curatio.*

in quocunque alio quantitas clysteris sit minor vna libra, ne suo pondere noceat. Aliquando in antiqua dysenteria, vbi a- lia non sufficiunt, necessaria sunt narcotica primò externa, secundò iniecta per inferiorem partem, tertio per os sum- pta, obseruando semper, quæ diximus cap. 36. præsertim vi- rium robur, cum in hoc morbo semper fere sit facultas im- becilla.

## De Dysenteria. C A P. XXXVIII.

### Scholium.

*Dysente- ria.*

**C**um quatuor sint.) Dysenteria propriè à veteribus appellatur sanguinis euacuatio per sedem cum torminibus ex vlcere intesti- ni procedens. Vnde tres habet conditiones, prima, vt in ea sanguis coditiones. profluat, secunda, vt profluat cum torminibus, tertia verò, vt ex vlce- re orta re intestinorum nascatur: Inde factum est, vt nomen dysenteria variè fuit, varia accipitur: nam aliquando euacuatio quælibet per aluum, dummodò dysenteria sanguinis sit, dicitur dysenteria, vt in hepatica, & cruenta videre est. signifi- Aliquando etiam quælibet euacuatio per aluum cuiuscunque humoris, dummodò dolorem, & mordicationem excitet, dysenteria gaudet nomi- ne. Hac ratione 3. de causis symptomatum cap. 2. sanguinis nigri ex ieco- re excretio dicitur dysenteria: de hac etiam loquitur Hippocrates 7. A- phor. sent. 5. cum scribit: à furore dysenteriam bonum esse, vbi dysenteria significat mordicationem in intestinis ab humoris translatione factam. Eadem ratione 6. aph. sent. 43. & 48. intelligendum est, cum in lienosis dysen-

dysen



Dysenteriam, euentientem bonum esse docet, in his enim ab humore melancholico, qui exulcerare non potest, per intestina transeunte flatu ex-  
 itantur, a quibus fit dolor. Neque enim est, quod cum Hieremia hunc  
 dolorem a parte humoris putrefacta fieri concedamus: nam hac ratione  
 ienosi habuissent febrem. Dysenteria illa, in qua sanguis excernitur, Cruentaria  
 quam sanguineam appellamus, quatuor habet differentias lib. 3. de deiectionu  
 caus. sympt. cap. 2. a Gal. explicatas nomine cruenti excrementi. Prima 4. differen-  
 est, cum optimus sanguis ex toto excernitur corpore, ob mutilatum insi-  
 gne membrum, aut amissum validum aliquod exercitium, aut suppres-  
 sam consuetam euacuationem, seruat eodem victu, neque sanguine ar-  
 te euacuato sanguinis missione, aut alia ratione. Secunda, cum excerni-  
 tur aquosus sanguis, ex inbecilla coctione iecoris proueniens. Tertia,  
 cum per aluum deiecitur sanguis niger, & splendens, quæ dicitur dy-  
 senteria hepatica. Quarta est deiectio cruenta ex ulcere intestinorum na-  
 ta, quæ proprie dicitur dysenteria, in qua sanguis paulatim, & breui-  
 bus intervallis excernitur: paulatim, quia fluit ex ulcere, & non ex ca-  
 uitate venæ, per breuia intervalla, ob irritationem. Hæc aut est fiens, Dysenteria  
 aut facta. Fiens (in qua iam est dolor) tunc dicitur, cum pinguis (hoc est diuiditur,  
 mucosus humor tunica intestinum hærens, & pinguedo) excernun-  
 tur: Facta vero, cum ramenta, aut carunculis similia. Hanc dysente-  
 riam a frigidi- tate etiam posse fieri scribit Vallesius, adductus ex Hip-  
 pocrate lib. 2. epy. sec. 3. com. 4. ubi frigiditatem ulcerare sentit. Debit  
 tamen Vallesius considerasse ex placiti absurditate illum librum non Vallesius  
 esse Hippocratis, aut debuit legere nam cum Petro Iacobo Steue cine taxatur.  
 nostro medico Valentino, in doctissimis in eum librum commentariis, Laudatur  
 non ut frigus ulceraret, sed ut eger frigus attraheret. Quæ lectio con-  
 textui magis quadrat, ut ibi videre poteris. Errat etiam hac in parte Iacobus  
 Vallesius, existimans Hippocratem agere in prædicta sententia de dy-  
 senteria, cum de diarrhæa loquatur. In hac dysenteria (de qua auctor  
 agit in hoc capite) aut est vlus in intestinis tenuibus, aut in crassis: Vluc in  
 quod distingues ea ratione, qua contextus docet. Si dysenteria in tenui-  
 bus intestinis appareat, difficile curatur. Primo ob situm, quia eò ali-  
 menta iam mutata perueniunt. Secundo ex natura propria, quia sunt guendiam.  
 membranosa, & sicciora, quam crassa. Cause proprie dysenteriae sunt Cause pro-  
 res acres, siue sint humores biliosi, atrabiliarii, aut pituitosi, dummodò priæ dysen-  
 teria salsa sit, aut medicamentum acre. Ut in plurimum tamen ab teria.  
 humoribus biliosis oriri solet.

Secundo, materiam vacuantibus biliosam.) Bilem purgabi- Cur purga-  
 mus, ut prohibeamus, ne vlus maior fiat. Exhibemus verò medicamen- mus bile,  
 ta torrefacta, ut roborentur intestina, ne recipiant fluxum. Quod si et medica-  
 considerassent Amatus, Hollerius, et Rondoletius, non prohibuissent eo- mentis tor-  
 rum usum: præsertim cum adducti sint leni ratione, torrefactio, n. exigua refactis.  
 nō relinquit empirreuma, sed magna, ita ut mutet speciem rei, ut in bile



# DE CVRAND. MORB.

**Aliquorū vitellina, porracea, atra bile, calce, videre poteris.** His medicamentis pur reprehensio. ganibus pluribus vicibus uti oportet, quia una eorum exhibitio non sufficit. Tantāque est necessitas istius purgationis (quam fortasse veteres aloë, aut hiera adstringente exercebant) ut, nisi timeremus phlegmonem, Valles. sen praecederet sanguinis missionem. Qua in parte mirandum est Valles. 2. tentia non epy. sec. 6. com. 27. tantum purgare in maligna dysenteria, quæ non probatur, tuit adstringentibus & extergentibus curari. Si enim sit dysenteria ex bile acri, quæ ratione adstringes non euacuata causatum cum adstringentibus vteris, aut perseverat fluxio, aut non: si perseverat, augetur vlcus, si non perseverat, nonne humor ille sua acrimonia irritans detentus novissimi mali, et peioris fortè erit occasio? Si ergo causæ agentis affectum ratio est habenda, in qualibet dysenteria euacuare oportebit.

**Sanguinis missio.** Tertiò, sanantibus vlcera.) Ante curationem vlcus opus est semper in dysenteria, dummodò vires constant, sanguinem mittere, ob affectum postulantem euacuationem, qui est phlegmon: qui futurus timetur ob dolorem. Et ideo malè Rondolet. existimat, in dysenteria, cum mole- Cur locus sita secari venam. Secta vena vlcus curabis, extergens prius, & deinde affectus di agglutinans, quod rectè præstabis, si distinguas locum affectum, an sci stinguen- licet vlcus sit in tenuibus, aut in crassis intestinis: nam si sit in tenuibus, dus, quæ iuxta ventriculum sita sunt, remediū per os assumptis vtemur, sicut in crassis per clysterem immisissis. Et ideo nescio, quæ ductus ratione Valles. 2. epy. sec. 3. com. 4. in dysenteria, siue malum sit in superioribus intestinis, siue in humilibus, in cibis, & potibus, et medicamentis ore assumptis, curationis spem collocet, ea. n. quæ per os assumuntur, integris viribus ad intestina crassa nunquam pervenient, benè tamen per clysterem infusa. Si ergo vlcus tenuia occupet intestina, ipsum exterges per os assumens decoctum hordei, aut cicerum cum saccharo, aut ʒ. xx. aquæ mul- sæ: quod si lenire etiam velis dolorem, lacte cum amylo vteris. Expur-

**Conglutinancia.** gatio vlcere ad astringentia descendes, quæ vim habent conglutinandi, qualia sunt bolus armena cum aqua plantaginis, syr. etiam de agresta, mirtillorum, & rosarum siccarum, cum decocto rosarum siccarum, &

**Extertio vl hordei.** Vlcus verò crassorum intestinorum extergemus sine acrimonia, ceris crasso clystere infuso ex mulsæ, aut ex lb. j. decocti hordei cum cortice, & mel- rum intesti lis rosati ʒ. j. poteris etiam saccharum, aut mel cum prædicto decocto norum. miscere: quod si volueris addere oleum rosaceum, benè licebit ob dolo-

**In vlcere ad decoctum hordei cum melle centaurei:** aut cum prædicto decocto mi- sordido ex- scebis ʒ. j. vnguent. apostolorum, aut ʒ. ss. vnguenti egiptiaci, aut ʒ. j. tergentia. pul. Ioannis Vigonis. Quod si vlcus sit in intestino recto, prædictis vn-

**Si sit putri- dum erit, cum vlcus est putridum, & serpens, ad caustica, quibus cru- dum et ser- stam inducemus. Assumentes passillorum Andronis, aut Passonis ʒ. ii. pent. cum succo plantaginis, aut decocto myrsinorum, ex quibus etiam possu-**

mus



mus unguentum construere ad inungendam flammulam in ulcere intestini recti. Atramentariis etiam mysi, calcantho, sori, et aliis cum succo Cicatricem plantaginis uti poteris. Expurgato ulcere, quod cognoscas ex paucitate inducentia sanici, & ex sanguine puro egrediente, cicatricem induces adstringenti in dysenteribus medicamentis, permiscens cum eis, quæ acrimoniam bilis temperent. *ria.* Præterea cum hæc affectio vigilias, & dolorem inducat, eis prospicere Ad vigi- oportet, quia vires deiciunt. Vigiliis medebimur ea ratione, qua cap. de lias, ad do- phrenitide diximus: hæc autem potio in hoc affectu est utilis, quæ bilem lo- rem. temperat, adstringit, & somnum conciliat: ℞. Syrupi de papauere ℥. j. ℞. Syrupi myrtillorum ℥. j. diamargaritonis frigidi, ℥. ss. boli D. ss. aqua- rum plantaginis, & caudæ equinæ an. ℥. ii. capiat dormiturus: aut pote- ris exhibere pilulas Nicolai contra fluxum. Dolorem sedabis anodinis propriæ, sæuo anserino cum rosaceo, aut decocto capitis arietis, vel galli- næ cum rosaceo. Quibus si non sedatur, narcotica proderunt, aut supra partem dolentem unguentum comissæ applicabis, in quo grana tria o- pii sint dissoluta.

## De Tenesmo. CAP. XXXIX.

**T**enesmus vehemens, & inanis est deiciendi appe- titus cum paucio sanguine, lenta, & mucosa eie- ctione. Quæ definitio placuit Paulo lib. 3. cap. 41. *Molestus* & Aetio lib. 9. cap. 43. Hic affectus (quamvis Cel- *utro gerē-* so autore lib. 4. cap. 18. neque acutus, neque longus sit, cum fa- *tibus hic* cile tollatur, ut ipse inquit & nunquam per se iugulet) mo- *affectus.* lestus tamen est omnibus, & utrum gerentibus molestior. Nam (sene & sapientissimo Hipp. autore 7. lib. aph. 27.) mu- lieri utrum gerenti si tensio superuenerit, facit abortum: qui aphorif. licet quinquagesimus in antiqua Constantini translatione cum comment. Galeni reperiatur 5. lib. in quo Philotheus exponit sic aphorismum, Tenesmus inquit, est continuus, & violentus motus, & secretio pituitosarum, at- que pinguium materialium, cum paucio stercore, & breui san- guine astricto: in antiquo tamen, & Aldino contextu hic a- phorismus non reperitur in 5. lib. & propterea Theodorus, Leoniceus, Musa, Hieremias, Fuchsius, & alij docti scripto- res tantum in 7. lib. collocant hunc aphorismum, qui siue se- mel in aphorismis ab Hippocrate scribatur, siue bis, ut mul- ti alij nimirum si qualia oportet purgare, &c. & ille utrum gerentes, si conuenit purgare à quarto usque ad septimum, &c. Verus est, ut Galenus in commentario demonstrat, di- cens, ob talem igitur tensionem, atque molestiam, & totum aliud corpus laborat, sed præ ceteris matris, quæ cognata est recto intestino: nihil enim mirum, si propter vehementes, atque



# DE CVRAND. MORB.

*Causa.*

atque crebras exurrectiones foetus abortitur, quando ex aliis omnibus fortibus motibus, atque doloribus mulieres gravidæ solent abortire. Fit hoc malum aliquando ab ulcere intestini recti, quamuis Gal. initio commentarij dicti, 27. visus sit sentire, ab hac causa semper fieri Tenesimum, vt in difficultate intestinorum sit vlcus in intestinis, quæ superius sunt. Neque audiendus est Erasistratus, qui (vt ait Gal. com. 1. 6. lib. aph.) tres esse species leuitatis intestinorum voluit, difficultatem videlicet intestinorum, leuitatem propriè dictam, & tenesimum. Nonnunquam fit a frigiditate externa, aut ab inflatione recti intestini, aut a falsa pituita, aut ab humoribus serosis, acribus, & biliosis. Aliquando (vt scribit Aetius loco superius annotato) obstructio stercoris coacti in intestino cæco efficere potest tenesimum. Frigidam causam externam ex agro deprehendes. Humores & excrementa ex iis, quæ cernuntur, dignosces. Vlcus ex pure, & sanguine minimo stercori immixto inflammationem ex dolore grauante, & ex febre significat. Stercoris multitudinem cognosces ex graui sensu, & distentione circa ventrem imum, & ex priuata deiectione. Pro varia causarum ratione variè etiam medicinam facere consueuimus: curatur tamen primò, victu iam dicto tribus superioribus capitibus, vel saltem contrario causæ. Deinde si ab ulcere fiat, curabitur, vt diximus cap. præcedenti de dysenteria: Si ab aliis causis per

*Nota.*

*Curatio.*

*Victus.*

*Vacuatio*

*bilis, si re-*  
*dundet.*

*Clyster la-*  
*uans.*

*Piuita.*

*Fœcibus in-*  
*duratis.*

*Tapus.*

ordinem curabis. Si ab inflammatione sit, sequenti capite curationem demonstrabo. Si corpus bile redundet, vacuabitur per drachmam vnā rhabarbari, aut per drachmam semis corticum myrobalanorum citrinorum, deinde per clysterem lauante: vt ℞. decocti hordei ℥. v. succi siclæ ℥. ij. sacchari rubri ℥. j. misce, & fiat clyster, adde vitella ouorum numero duo, olei rosati ℥. ij. β. Si causa sit pituita falsa: ℞. decocti furfuris, & cicerum ℥. v. succi siclæ, & rhodomellis an. ℥. ij. misce, & fiat clyster. Si a fœcibus induratis fiat: ℞. foliorum maluarum, violarum, & mercurialis an. m. j. furfuris, passularum sine granis, prunorum damascenorum an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ℥. vij. diacatholicon. & butyri recentis ana. ℥. j. benedictæ ℥. β. olei sesamini ℥. ii. salis ℥. j. misce, & fiat clyster. Si a causa sit frigida, lignum nucis, aut cupressi benè calidum, & ignitum sedi admotum curabit. Saccus ex camomilla, anthos, calendula, vino optimo decoctus sedi admotus est remedium salutare huic tenesimo.

Tapus barbatus diuisus in partes paruas, & vino optimo decoct



olecoctus, sed ad motus sæpè est non mediocriter remedium, & me feliciter expertum. Si dolor & appetitus deliciendi fuerit magnus, & superioribus remediis non curatur, necessaria sunt suppositoria ex athanasia, aut philonio cum pinguedine, aut cera noua, & filo magno: præsertim si ægra fuerit verum gerens, ne abortum patiatur, vt Hippocrates timuit.

## De Tenesmo. CAP. XXXIX.

## Scholium.



Tenesmus vehemens & inanis. Non rectè meo iudicio Aliomarius, & alii semper in tenesmo viceratum esse riuus et alii intestini rectum sentire videntur: sed vt ex 7. aph. com. 27. reprehendimus, tenesmus nil aliud est, quàm vehemens et inanis conatus ad egerendum. Vbi aduerte nos pro tensione legere conatum, essentia tenuera enim in tenesmo nulla est in intestino tensio sed conatus magnus, nesmi. ob quem frequen. issimè exurgunt: & idè tenesmus est molestissimus locus cor. effectus, ex quo abortus solet sequi ob dolorem, quando fit ab vlcere, ob g. compressionem vteri à musculis abdominis factam & ob frequentem motum, ex quo etiam febris diaria oriri solet. Causæ tenesmi sunt ea 9. Causæ tenesmi, quæ facultatem expultricem intestini recti excitant ad vehemens. & continuum motum, qualia sunt quæ irritant, & quæ grauant. Curatio. irritant, pituita ibi impacta, & vlceris dolor: grauant feces immodicæ. Frigiditatem externam existimo nunquam facere tenesmum, benè musculi resolutionem. Curatur tenesmus ea ratione, qua dysenteria ex intestinis crassus dependens.

## De Colico dolore, &amp; ileo. CAP. XL.

**D**olor, qui in intestino laxiore, quod colon Græcè *Descriptio.* vocatur, accidit, colica à nostris medicis dicitur, & aliorum etiam duorum intestinorum crassiorum dolor, de quo Paul. lib. 3. cap. 43. dicit, Colon cum pars sit intestini crassi à dextra iliorum regione procedens ad sinistram, cincturæ modo pertinet. Et Aetius lib. 9. cap. 29. & Gal. *Colicæ* variis locis, præsertim lib. 2. de loc. affec. cap. 1. vbi ponens discrimen inter dolorem, qui fit ab humore acro, & eum, qui fit à multitudine: porro, inquit, mihi ipsi accidisse dolorem vehementissimum, vt mihi viderer in initio ventrem terebro perforari, in eo potissimè spatio, quod à renibus ad vesicam *Galen.* per vretes scimus extendi. Quo loco docet Gal. hunc dolorem sæpè præcedere dysenteriam, & aliquas scribit huius doloris notas, quamuis lib. 6. cap. 2. quomodo medicus hunc affectum à nephritide discernere possit, docet. A variis fit *Causæ.* causis hoc symptoma, vt videre est apud Galen. Paulum, & Aet



## D E C V R A N D. M O R B.

Aetium locis supra notatis. Sed à quatuor potissimum nascitur, interdum à crassis ac pituitosis humoribus oritur, ut Gal. cōtingit, qui laborans hoc symptomate excreuit simul cū dolore grauissimo pituitam vitream. Interdum fit à flatulentis spiritibus, aut propter inflammationem molestantem ac distendentem crassum intestinum, aut ob acres, & erodentes humores prædictum intestinum vehementer affli-

*Natae crassæ humoris.* gentes, fieri solet ab stercore indurato, & aliis. Quando crassus & pituitosus humor est causa, per totum abdomen in alto, præsertim vbi est coli situs, sentitur dolor perinde, ac si intestinum tunderetur, & perforaretur. Adest nausea, ructus,

*Spiritus flatulenti.* vomitus pituitæ maxime si natura ægri, & victus pituitam ament. Qui dolent ex flatulento spiritu, tensionem experiuntur, flatum quoque sentiunt, & emittunt. Qui inflammationis causa dolent, febrium sentiunt feruorem, sitiunt, circa ventrem pulsationem sentiunt, laboriose vrinam & stercora

*Acritu humorum.* depellunt, bilē etiam aliquando euomunt, & hæc colica tanquam grauissima in ileum transire solet. Similes ferme sunt notæ, quando ab acris humoribus: quamuis vrina & deiectiones biliosæ apparent, & earum suppressio sit minor.

*Descriptio ilei.* Ileum malum est tenuium intestinorum, grauissimos & lethales dolores inferens. De quo symptomate Paul. lib. 3. c. 44. dicit ileos cum affectus sit maximus, acutus, & dolorificus, symptoma quoddam habet periculo grauius: & Aetius lib. 9. cap. 28. dicit, voluulus est affectio intestinorū lethalem dolorem inferens, & Gal. com. 10. lib. septimi aph. in quo innuit, in iliis nihil descendere ad inferiora, quod est proprium illis, & inseparabile. Sed vomitus iis non semper adest, sed quando exitiales sunt, etsi vehemētiùs distorqueantur, stercus eis ascendit, atque singultiunt, & alia multa scribit de desipientia, & cōuulsione, quæ in hoc morbo exitialia fiunt.

*Dubitatio.* An reperiatur ileum sine vomitu, ut vult Gal. Musa dubitat, cum longa satis experientia semper vomere iliosos omnes ipse viderit. Huius symptomatis duæ differentiæ ponuntur

*Differentie* à Celso lib. 4. c. 14. Prima est, cum obstructio est in parte superiori gracilioris intestini, in qua cibus per vomitum exit: altera, quando obstructio est in parte inferiori, in qua exit stercus per os. Causæ & notæ similes sunt colicæ causis, quamuis Gal. com. 40. lib. 6. aph. huius, quibus dolor ilium fit absque inflammatione, his febris superueniens morbum soluit, causas omnes ferme huius sympt. scribat, præter illas tamen est illa de veneno sumpto. Nonnunquam verò intestinum vnâ cum stercore descendit in scrotum, quos ferme semper mori

vidi



di sine voce.

Curatur primò, victu contrario causis huius symptoma- *Curatio co*  
 semper tamen molliente, præsertim si ex fœcibus desicca- *lici doloris.*  
 fiat, vt iure pingui, beta, prunis damascenis, passulis sine *Victus in*  
 anis, butyro recenti, oleo sesamino, & oleo amygdalarum *fœcibus de*  
 cilcium. Cibi bonum sanguinem generent, sint faciles con- *siccatis.*  
 ctu ob dissolutionem facultatis, qualia sunt ius gallinæ, *In causa*  
 a sorbilia recentia, testes gallorum gallinaceorum, hepa- *frigida.*  
 gallinarum. In frigida causa misceri oportet parum cin- *In phleg-*  
 namomi, gariophyllorum, croci, & zingiberis. Allia sunt o- *mone.*  
 tima, laudanturque à Gal. 12. methodi, neque sitim efficiunt, *In calida,*  
 cape. Aliquando indiget æger inedia, vt si fiat ab inflam- *In calida,*  
 matione ex cruditate, & flatu, præcipue in principio. In ca-  
 da causa nutriatur iure pullorum gallinaceorum, ptisana  
 ordeacea, spinachiis, prunis damascenis, & similibus. Po-  
 us in frigida sit vinum potens moderatè aqua dilutum, vel  
 aqua cinnamomi, vel seminis fœniculi, vel anisi, vel mulsa.  
 on calida, aqua hordei, aut liquiritiæ, aut aqua sacchari. De-  
 nde curatur abscissione causarum. Sed prius oportet regu-  
 as quasdam generales satis obseruare, & eas maximè me-  
 moriæ mandare. Prima est quamuis propria cuiusque mor- *Regula. I.*  
 i, & symptomatis curatio fiat per causæ abscissionem: in ve- *dolore esse*  
 nementi tamen dolore, breui tempore facultatem vitalem, *sedandum.*  
 ex omnem dissolvente, prius, & subito curandus est dolor,  
 per narcotica medicamenta, quæ sensum partis dolentis po-  
 ius semouent, quam causam amoueant. De his nos abundè  
 ap. 4. de cephalalgia, & 36. de diarrhæa, cum Gal. duodeci-  
 mo methodi diximus, quo lib. Gal. multa satis necessaria in *Appendix.*  
 usu narcoticorum scripsit: vbi etiam docuit narcoticorum *De usu nar-*  
 sum esse vtiliorem in colico dolore à bile: nam præterquam *coticorum.*  
 quod magna refrigeratio minus illi nocet, narcotica etiam  
 incrassant, & concoquunt bilem, ipsamque immobilem fa-  
 ciunt. Hæc regula desumpta est ex Galen. 12. methodi, quam  
 postea confirmauit Auicennas. 4. fen. primi lib. cap. penult.  
 his verbis semibarbaris. Et quandoque est res, in qua fidu- *Auicennæ*  
 cia est, quod dolor ea remoueatur, sed est tarde operans, ita *opinio.*  
 quod dolor ille vsque ad horam illam tolerari non potest, si-  
 cut euacuatio materiæ dolorem facientis colicæ retentæ in  
 villis intestinorum: aut citò operans, sed ex ea timetur finis  
 vehementer malus, sicut stupefactio membri dolentis in co-  
 lica, cum medicinis, quæ hoc operari solent, & sit medicus in  
 hoc non rarò ambiguus. Oportet ergo vt apud ipsum sit æ-  
 stimatiua fortis, vt sciat, quod duorum temporum sit lon-  
 gius



# DE CVRAND. MORB.

gius, aut tempus fixationis virtutis, aut tempus doloris: & etiam quæ duarum rerum deterior, an dolor, an malus finis, qui ex stupefactione timetur, vt eligat prætermittere illud, quod magis est conueniens: fortasse enim si dolor remanserit, fortitudine sua & magnitudine interficiet: & stupefactio forsan non interficiet, licet ex alia parte impediatur, cuius nocumentum fortasse corrigere poteris, & redibit forsan dolor, & tu

**Regula 2.** curabis medicina conuenienti. Secunda regula, colica, quæ *de medio-* fit à materia pituitosa, & flatu, curatur medicamentis *crita cali-* diocriter calidis, incidentibus tenuantibus, coquentibus, & *dis adhibe-* per os aperientibus, externis & internis: nam si initio non va- *dis initio in* cuato humore nimis calidis vteremur, fieret maior attractio *flatu.* ad partem dolentem, dolorque augetur, & pars dolens posset facillime laborare inflammatione, aut alio tumore præter naturam. Perpetuo ergo a clementioribus ad valentiora

**Regula 3.** est procedendum, & vltimis vtendum post vacationem. Ter- *de purgan-* tia regula, vacuatio in dolore intestinorum facienda est per *tibus.* medicamenta clementer purgantia, quæ non attrahant ab

**Discrimen** intestinis fuerit, qualis est hiera simplex, pilulæ elephangi- **sumendi.** næ, & de hiera simplici, agaricus trochiscatus & diaphænicon: hæc tamen, & similia per clysterem in colico dolore, &

**Regula 4.** per os in ileo magis conferunt. Quarta regula, in hoc dolo- *Clyster* re, semper præcedat vacuatio per clysterem mollientem, & *molliens.* clementem, vacationem aliam, siue facienda sit per acres clysteres, siue per potum, aut pilulas, aut alia medicamenta, vt per hoc, aut simile, ℞. decocti maluarum, bis maluæ, seminis lini, fœnugræci, & fursuris lb. j. butyri recentis, dialthææ, & benedictæ, an. ʒ. j. olei sesamini, & de semine lini. an. ʒ. ij. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster, quo sumpto decubat æger in partem dolentem. Si flatus impediatur ingressum clysteris, instrumentum, quo infunditur liquor clysteris, habeat fistulam biforem,

**Clyster a-** vt vna via materiam clysteris iniicias, altera flatus foras e- **periens.** rumpat, sit ita conformatum. His bene consideratis citò curandus est dolor colicus, quia ob vehementiam vires proster- nit. Primum ergo clysteri superiori, aut hoc vacua, vt viam aperias, per quam vacuatio facienda est: ℞. foliorum, maluarum, betæ, bis maluæ, an. m. j. seminis lini, fœnugræci, ficuum siccarum, fursuris an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe uncias decem, cui adde benedictæ, butyri recentis an. ʒ. j. olei camomillæ, & de semine lini an. ʒ. ij. salis ʒ. j. misce, & fiat

**Clyster a-** clyster. Si vero ob stercorea exsiccata, aut aliam causam non **acrior.** fiat vacuatio, vt sæpe contingit, necessarius erit alter clyster acrior



prior, & aliquando tertius, addendo, cum sit decoctum, drach- *substantia*  
 mas duas carthami, drachma vnam hellebori, & drachmam colocynthidæ *colocynthidis*  
 in ligatura, ne substantia colocynthidæ dis- *dis* *nocet*  
 intestinis noceret. Aliquando ad facultatem expultricem ir- *intestinis*  
 tantandam, atque mouendam indiget æger his aut similibus *Suppositoriis*  
 suppositoriis: ℞. pulueris benedictæ, & pulueris hieræ logo- *vit.*  
 nis an. 3. iij. salis gemmæ 3. j. s. mellis q. s. misce, & fiant *Preparatio*  
 duo, aut tria suppositoria filo appensa. Deinde vacuis inte- *tio.*  
 stinis, si materia est in aliis partibus pituitosa (à qua sæpius  
 concoquatur rhodomelle, syr. de absinthio, de duabus ra-  
 dicibus, & similibus, & decocto aut aquis fœniculi, petroseli-  
 ni, melissæ & aliis eiusdem naturæ. Postea vacuetur drach-  
 ma vna pilularum de Agarico, aut drachma vna pilularum  
 trochiscarum, aut hoc simili potu: ℞. diacatholicon. 3. s. agari- *Purgatio*  
 trochiscati 3. j. electuarij indi ma. 3. iij. rhodomellis 3. j. a-  
 quæ fœniculi q. s. misce, & fiat potus. Si materia fuerit in in- *Decoctum*  
 testinis fixa, & in partibus propinquis, sola hiera simp. & aga-  
 rico aut diaphænicon fiat vacuatio. Die sequenti post eua- *Clyster*  
 cuationem bibat æger hunc, aut similem potum: ℞. decocti  
 camomillæ 3. iij. theriacæ magnæ, aut mithridati 3. j. rhodo-  
 mellis 3. j. misce. Aut hic clyster, aut similis iniiciatur: ℞. de-  
 cocti hordei, & radice althææ lb. j. rhodomellis 3. j. olei de  
 semine lini, & camomillæ an. 3. iij. misce, & fiat clyster. Dein- *Sublatæ*  
 de curatur dolor clysteribus ex oleo camomillæ, vino opti- *causa curæ*  
 no, & aqua naphæ, aut ex solo oleo rutæ, & camomillæ, aut *tio doloris*  
 ex iure intestinorum, & pedum arietinorum (quod dicitur *sequitur.*  
 malcozinado) cum oleis camomillæ, de semine lini, & lisa- *Intestina*  
 nino. Si intestina sint lupi, maiorem habebunt facultatem, & *lupi qua-*  
 tim ad corroboranda humana intestina, & eorum dolorem *lia sint.*  
 urandum: stercus tamen lupi per superiorem partem sum- *Stercus*  
 ptum, & per inferiorem iniectum omnem dolorem colicum *lupi.*  
 proprietate curat, quamuis magis à causa frigida. De quo,  
 & aliis, quæ a proprietate iuuant, in fine huius capitis copio-  
 sius dicemus. Si cum colico dolore renalis coniungatur, cu- *Curatio mi-*  
 ratio mixta erit ex hac, quæ nunc traditur, & alia, quæ dice- *sta doloris*  
 tur capite quadragesimo septimo huius libri, vt est hic cly- *coli. & re-*  
 ster: ℞. parietariæ, maluæ, bis maluæ, rutæ, an. m. j. camomillæ, *num.*  
 seminis lini, fœnugræci, anisi, carui, cymini an. p. s. fiat deco-  
 ctum: de quo percolato accipe lb. j. cui adde benedictæ, dia-  
 catholicon. an. vnciam semis, butyri recentis, & dialthææ.  
 an. vnciam vnam, olei camomillæ, & de semine lini. an. vn- *Clyster*  
 ciam vnam semis, olei scorpionum vnciam semis, salis *communis.*  
 drachmam, misce, & fiat clyster. Ex prædictis, & similibus  
 decoct



# DE CVRAND. MORB.

- Fotus.** decoctis in duabus partibus aquæ, & vna vini fotus frequēs, parti dolenti est optimus, vel liquor hic ex clepsidra ab alto ventri affusus, vel potius admotus ex magna spongia expressa, aut in vesica: Aut ex hoc: ℞. foliorum lauri, origani, calamenti, pulegij, saluæ, rutæ. an. m. j. vtriusque stæchadis, camomillæ, meliloti. an. p. j. seminis anisi, anethi, carui, dausi. an. ʒ. ss. vini, & aquæ. an. æquas partes. Fotus etiam ex solis oleis benè calidis camomillæ, de semine lini, rutæ, & scorpiolum curat hunc dolorem à flatu, & causa frigida factum. **Filum ex lixiuio.** Filum ex lixiuio cum cineribus coctum, admotum & benè calidum curat hunc dolorem. In fessu ventris inferioris per semihoram in balneo ex superioribus medicamentis decocto aliquo apparato adiumento est: mora tamen in hoc balneo vires fractas dolore, vigiliis & inedia nimis affligit: quare bono odore, vino & aliis huiusmodi opus est. **Stercus vaccarum.** Stercus vaccarum, præsertim mense Maio collectum, siue recens, siue ancucurbitum sit, est in hoc optimum solum, & cum aliis. **Cucurbitula in flatu.** Cucurbitula magna ventri admota curat dolorem ex flatu. **Clyster hic ex iure galli gallinacei veteris,** & aliis obtinet in curando dolore principatum: ℞. seminis anisi, fœniculi, fœnugræci. an. ʒ. ij. thymi, epithimi an. ʒ. j. agarici, colocynthide, salis indi. an. ʒ. ss. iticados, camomillæ. an. m. ss. carthami. ʒ. ij. his omnibus semipuluerizatis farciatur, & consuatur gallus gallinaceus vetustissimus, ante mortem verberatus, & post decoquatur, donec ossa separentur à carnibus: deinde ex tb. vtilissimus. na huius iuris fiat clyster. Cui iuri percolato si adderes benedictæ vnciam vnam, olei camomillæ vncias tres, esset clysteri maior, & acrior vis. Huic etiam clysteri magna vis inest in hoc dolore curando: ℞. vrine pueri. tb. j. olei de lilio, & de semine lini. an. ʒ. ij. theriacæ magnæ ʒ. ij. misce, & fiat clyster. **Victus.** Si dolor colicus sit à inflammatione, curatur primò victu tenui, & refrigerante. **Renulsiō.** **Repellentia sumenda.** Secundò, auertentibus per sectionem iecorariæ. Tertiò, repellentibus internis per os, cum est in superioribus intestinis, & si in inferioribus sit, per clysterem, vt decocto hordei, & oleo rosato, aut solo lacte caprino, aut ouino, aut solo oleo violaceo, aut de papauere, aut succis plantaginis, portulacæ, solani, & similibus. Quartò, & vltimò, dissipantibus, & resoluentibus, vt decocto camomillæ, fœnugræci, radicis althææ, seminis lini & similibus. Si à bile fiat colicus dolor primò vacuata bile, secundò, moderatè frigidis, vt est lac, & oleum rosatum, & similia, curabitur. Si à veneno fiat hic dolor, curatur statim vomitu per totum, syrupi acetosi simpli-



eis, cum decocto seminis raphani, aut per infusionem helle-  
 bori cum raphano, & postea cum oxymelle simp. secundo, o-  
 leo sesamino, & de semine lini in quantitate vnciarum qua-  
 tuor. Non dormiat veneno sumpto, quia somnus reuocat ve-  
 nenum ad interiora. Tertio, curatur iis, quæ a tota substan-  
 tia, seu proprietate veneno sumpto repugnant. Theriaca ma-  
 gna, & mytridatum omnia ferme venena curant. Si vis scire  
 perfecte naturam cuiusque veneni, & facultatē medicamen-  
 torum contrariorum venenis, lege sextum librum Diosco-  
 ridis, & libros de facultatibus simplicium medicamentorum  
 Galeni, & libros de alexipharmacis, & de theriaca antiquis-  
 simi medici, & poetæ Nicandri: lege etiam opus de venenis  
 doctoris Santes de Ordonyes. Quæ curant omnem dolorem  
 colicum, & iliacum a tota substantia, seu proprietate, omni  
 tempore, sunt stercus lupi per os cū rhodomelle, aut aliquo  
 liquore. Dosis est drachma vna per clysterem cum cōuenien-  
 tium aliorum medicamentorum drachmis duabus, aut tri-  
 bus. Si recens fuerit, ventri admotum ad modum cataplas-  
 matis curabit hūc dolorem. Ossa etiam, quæ reperiuntur in  
 stercore lupi parua quantitate sumpta curant dubio procul  
 eum, & ne iterum fiat, prohibent. Idem os collo suspensum a  
 multis in hoc laudatur. Lupi intestina, si comedantur, cura-  
 bunt ipsum dolorē. Radix iusquiami ventri admota colicum  
 dolorem curat, & qui fieri potest, prohibet. Ventriculus an-  
 feris affatus, si comedatur, curat hunc dolorem. Drachma v-  
 na semis cornu cerui tosti liberat ab hoc symptomate. Vena  
 vmbilici masculi infantis curat colicum dolorem masculi,  
 & foeminae, foeminam sanat Deo auspice. Virgæ cerui puluis  
 laudatur a quibusdā in hac curatione. Pes lupi collo suspen-  
 sus ab aliis laudatur, ius cancrorum hunc dolorem leuat. In  
 vehemēti dolore deueniendum est ad narcotica medica-  
 menta, semper tamen sunt maximè consideranda quæ de ho-  
 rum vsu diximus c. 36. de diarrhæa: primò parti dolenti ad-  
 moueatur hoc cataplasma: ℞. parietariæ, foliorum iusquia-  
 mi an. m. ij. farinæ fœnugræci, seminis lini, & camomillæ an. *Topica.*  
 p. fiat decoctum, & ex his benè pistis fiat cataplasma, adden-  
 do olei de papauere, & de camomilla an. ʒ. ij. croci pulueri-  
 zati drachmam vnā, thebaici scrupulum vnum, vitellos  
 ouorum numero iij. aut si fortiori egeat auxilio narcotico, &  
 simul purgante: ℞. benedictæ ʒ. ss. diaphenicon ʒ. iij. philonij  
 Romani ʒ. j. olei camomillæ, & de semine lini an. ʒ. ij. misce, *Narcotica.*  
 & fiat clyster. Rhazes miscet narcotica cū purgantibus: Ali-  
 quando cogimur in vehemētissimo dolore exhibere drach-

*Pomina.*  
*Somnus*  
*vitandus.*  
*alexiphar-*  
*maca.*

*Qui libri*  
*legendi.*

*Verunque*  
*dolorem cu-*  
*rantia to-*  
*ta substant*  
*tia.*

*De narco-*  
*ticis.*

*Topica.*  
*Cataplas-*  
*ma.*

*Narcotica.*  
*purgans.*



## DE CVRAND. MORB.

mam vnam athanasia, aut requiei magna, aut philonij Romani cum vnciis tribus decocti camomilla, & vncia vna sy-  
*Ilei curatio* rupi papaueris. Ileus dolor curatur iisdem ferme auxiliis,  
*an eade sit.* quāquam valentioribus, iisque magis per os sumptis, quā  
 per clysterem iniectis: semper tamen vti oportet clysteribus  
 non tantum mollientibus, sed acribus, vt per loca apta ster-  
 cora depellantur.

### De cholico dolore, & ileo. CAP. XXXIX.

#### Scholium.

*Colicus do-  
lor.*

**D**olor, qui in intestino.) Dolor colicus ex symptomate & parte affecta nomen sumpsit, afficitur enim in eo colon secundum ex crasis intestinis, quod incipiens à sede dextri renis, et consensuens ad iecoris cauum, hinc secundum ventriculi fundum ad lienis sedem, & dextrum renem complicatur. Vnde cum dolor secundum ventris longitudinem extēditur, aut ex parte dextra in sinistram locum mutat, vt in eo, qui à flatu fit, sine dubio ex situ partis dolorem colicum esse colligimus: cum autem in aliqua parte intestini fixus manet, tunc Aliquando opus est alia addere signa, aliter enim decipiemur. Cum enim intestinum nephriticū hoc attingat duos renes, quando dolet in parte reni coniuncta, non est dolorē pro mirum existimare nos dolorem nephriticum esse, videmus enim hac in colico assu- re Galen. in seipso deceptum. Neque hic error est periculosus, cum in mimus. principio, siue dolor sit nephriticus, siue colicus, eadem remedia applica- Discrimen ri oporteat ea scilicet, quæ sedare possunt dolorem. Hic dolor colicus di- doloris co- stinguitur ab ileo ratione doloris, & ratione situs: ob dolorem, quia do- lici ab ileo. lor ilei maior est. Primo, quia fit à crassiore substantia magis disten- dente, nempe stercore indurato: quod non euenit in colico dolore; quia cum hoc intestinum sit multum capax, non potest obstrui, ita vt prohi- beatur stercoreis descensus. Secundo, dolor est maior, quia membranosius est ileon intestinum, quā colon. Ex situ doloris etiam distinguuntur in affectus, quia dolor ilii manet semper in regione vmbilici, hoc enim inte- stinum suis anfractibus ilia & sedem vndique vmbilico subiectam at- Discrimen que conterminam implet. Dolor colicus distat à nephritico, quia etsi in doloris coli utroque vomitus sequatur (ob debilitatem ventriculi ex defectu spiri- ci et nephri tuum, qui à dolore attrahuntur) maior tamen sequitur in colico, ob rici- tici. niam & continuitatem maiorem cum ventriculo. Tum quia in colico do- lore excrementa retinentur aliquando, ita vt neque flatum, neque ru- etum emittere possint. Tertiò quia à sumpto cibo exacerbatur dolor co- licus, non autem nephriticus, cum renes longè à ventriculo absint. Quar- to in nephritide dolor est semper fixus, at in dolore colico aliquando mu- tat locum. Quinto in nephritide antecedunt vrinae albæ, & perlucida, in quibus deinceps fabulosa subsident, quod in cholico dolore non euenit.

Dolor



Dolor colicus aut fit à causis externis, aut internis. Externæ sunt, alimen- Cause co-  
ta, aer, aut veneni potio, intemperiem frigidam generantes. Internæ, in- lici doloris.  
temperies frigida ex vitrea pituita orta, intemperies calida ex acris hu-  
more, flatus distendens, libro de multitudine cap. 10. aut inflammatio.  
Si dolor fiat à pituita, cum hæc sit glutinosa, infixus erit, ita ut perforari  
videatur intestinum, neque in eo est sitis. Si fiat à bile, erit dolor acutus,  
sitis, oris amaritudo, & præcessit bilis retentio. Si ab inflammatione, fe-  
bris ostendet. Sicut loci mutatio, distentio eum, qui à flatu ortum habet.  
Aliqui, imò omnes dolorem colicum ex stercore indurato fieri scribunt;  
quorum sententia aliquibus non placet considerantibus intestini ampli-  
tudinem.

Ileos affectus est ilei intestini, à quo eorum, quæ per anum excernun- Ileos quid,  
tur, evacuatio omnino supprimitur. Hæc suppressio in aliis duobus inte-  
stinis tenuibus non contingit, propter bilem (quæ in his expurgatur) ma-  
ximè ea intestina irritantem. In intestino vero ileo, cum ita conformatum Ex feci-  
sit, ut in suis anfractibus excrementa crassa possint immorari, hanc vi- bus retentis  
lemus affectionem contingere, non autem in aliquo ex crassis intestinis. non fit do-  
r ex com. 44. libri sexti aph. colligimus. Quod si Gal. 3. epy. par. 2. som. lor in cras-  
s. hunc affectum aliquando ad crassa referat intestina, intelligendum so intestino  
d est de crassiori parte intestini tenuis, quæ crasso intestino adheret. Ex ex Galeno,  
nac varia partium in intestino consideratione Celsus lib. 4. cap. 14. Ileus illi doloris  
luas differentias scribit. Huius symptomatis causæ sunt omnia illa, quæ causæ,  
excrementorum descensum impedire possunt, qualia sunt magna inflam-  
matio, stercus induratum, & mutatus situs intestini, qui herniam inte-  
stinalem efficit. Aliqui addunt quartam causam, crassum scilicet & Ileos non  
viscidum humorem, ab eo enim etiam potest fieri obstructio. Horum sen- fit à crasso  
tentia non placet Gal. 6. aph. com. 44. eo quod (ut existimo) bilis flava humore,  
per ipsum descendens humore extergit. Quæ etiam est causa, ob quam  
ileos et si fiat ab stercore indurato, raro tamen, & cum contingit, id fit  
x esu rerum adstringentium, ut mespilorum, aut ex febre adurere, aut  
x venenoso pharmaco exsiccante stercus, ut ex auri pigmento in socru-  
nea vidit Ludovicus Collado præceptor. Si obicias, Hippocratem in præ- Vietti.  
dicti commentarii sententia sentire, ileon posse fieri ab humore crasso &  
lutinoso. Respondet Gal. in com. dictum aphor. esse suspectum. Magni  
ileos proprium est, nil per inferna excerni, quod si exitiali sit, stercus  
per os educetur. Ex dolore etiam, & tumore in regione mium intesti-  
norum ipsum deprehendes.

Curatur primò, victu contrario. Dolor colicus à causis externis. Curatio co-  
rtus facile curatur: non ita ab internis, & ideo breuiter eius curatione lici doloris.  
proponimus. Si dolor hic fiat à pituita vitrea, & non urgeat, statim non Curatio fi-  
sit, quod discutientibus vtamur: quia et si illa pituita sit materia fla- fiat à pitui-  
us, & hi ex ea eleuati dolorem inducant, nihilominus tamen, cum dis- ta et flaua.  
tinentia medicamenta humorem inflatum murent, augebunt dolorem,



## DE CVRAND. MORB.

ac proinde ab illis abstinendum erit, & vitandum prius illis, quæ pituitam euacuant: quale est clyster factus ex faniculo, anetho, canemelo, thymo, pulegio, semine lini, cum rhodomellis ℥.ii. benedictæ & hieræ picræ ana. ℥.℞. & olei rutacei ℥.iii. Pituita euacuata, sacculos parabimus discutientes flatum, ex furfure, sale, & milio. Fomentabimus etiam locum panno imbuto in aqua & vino, in quibus faniculum, polium, aut anethum bullierint. Clystere etiam vitetur ex oleo cum prædictis herbis decocto addita pinguedine gallinæ, aut anseris. Allia, nisi ad sit febris, si edantur, flatum discutiunt, sicut & cucurbitula supra partem affectam admota, quæ ob utilitatis celeritatem incantamenti ritus id videtur præstare. Debemus tamen post cucurbitulam clystere acri euacuare humorem, si aliquis continetur in intestinis, aliter enim calfacientes partem, aut malo victu statim redibit dolor. Si dolor à bile procedat, & non urgeat, curabitur alimentis frigidis & humidis. Clysteribus etiam, dummodò non sint acres, ne humoris acrimoniam intendant, facultas eorum debet esse abstergens, & refrigerans, cui rei decoctum hordei, cum rhodomelle permixtum conueniet. Et cum bilis duplicem præstet indicationem, in quantum in colo præter naturam detinetur, euacuationem, & in quantum acris, contemperationem, vnum enim diuersis modis consideratum variè indicat: proinde syrupis granatorum, cydoniorum, & similibus temperata bile eam purgabimus, ita, ut si multam voluerimus e-ducere, vitetur hiera parata ex aloe non lota si paucam, ex aloe lota. Ex his intelliges male auctorem, & alios lupinum stercus, & alia medicamenta toto temperamento aut proprietate (ut ipsi dicunt) colicum dolorem curantia, describere: talia enim non reperiri ostendit affectus ipse habens manifestam causam. Si obiicias Galenum libro II. simplicium: Responder multoties eum tanquam superstitiosum omittendum in his remediis.

**Si ab inflā** Si dolor colicus fit ab inflammatione.) In dolore colico ab inflammatione. inflammatione secanda est vena, ut reuellamus, & euacuemus. Vena autem potest esse ea, quæ est in pede, aut brachii basilica, quia colon (sicut & renes) in medio corporis pendet, positum intra testes & iecur. Deinde <sup>sup.</sup> locum affectum repellentia imposita sunt ex vsu, sicut & alia omnia, quæ ad curationem inflammationis applicari solent. Atque hæc Curatio do est colici doloris, quando non urget, curatio. Quod si urgeat, & ab humo-  
**loris vrgen** more acri oriatur, sedabimus narcoticis medicamentis, quæ impro-  
**sis.** priè anodina appellantur à Galeno. Clyster ex decocto hordei, & capitibus papaueris parabitur. Per os assumemus philonii maioris ℥.j. cum decocto lactucæ, & faniculi: hæc enim medicamenta in hoc affectu ex calida causa orio triplici ratione præstunt: Primo, quia partis sensum offerunt, & ideo dolorem, dolor enim non fit sine sensu: Secundo, quia retundunt acrimoniam humoris: Tertiò, quia incrassant tenuem humorem, ne intra membranas intestinorum se insinuet. Si obiicias incommodum (quod



quod est intemperies frigida) ex stupefacientibus medicamentis sequi Narcotica solitum, tibi satisfaciet Gal. 12. method. melius esse intemperiem ex illis in dolore à relictam longo tempore curare, quam breui viriliter mori. Si dolor vr- pituita vi- zeat, & fiat à pituita vitrea, cauendum à narcoticis est, quia duplicem trea vitam inducunt noxam, prima est, densando tunicam intestinorum viam præ- da- cludere spiritui: Secunda est humorem incrassare. His ergo si vtaris me- dicamentis, statim sedabis dolorem, attamen si deinceps calefacientibus cures, ex spiritu aucto dolorem denovo excitabis, ita, vt ad narcotica de- uenire cogaris, quod tertio & quarto efficiens in sanabilis affectus au- ctor eris. Quæ omnia docent hunc dolorem medicum postulare peritum, qui sensim extenuet, & concoquat humorem.

Ileos dolor curatur eisdem ferme.) Ileus si fiat ab inflammatio- Curatio illi- ne (quod cognoscemus ex febre, tumore apparente in regione intestinorum, ab inflam- & pulsu) curatur sanguinis missione, propter causam sæpius dictā. Ex- matione. terius repellentia, oxirrodinum, & alia, quæ applicantur, permiscenda Exterius. sunt cum digerentibus, decocto camemeli, fænugræci, & similibus, quo- niam in hoc affectu principium breuissimum est. Clystere nil infundatur, Clyster. sed per os ob intestini ilei viciniam cum ventriculo, & vt inuent descen- sum excrementorum assimi debent remedia, quæ ideò repellere debent, & non adstringere, imo lubricam reddere aluum. Huiusmodi sunt deco- ctum maluarum, lactuca, scariolæ, solani, semperuiui, syrupus rosarum, & violarum. Ptisana in cibo assumpta aluum lubricat, sedat sitim, re- pellit, humectat, & statim nutrit. Ileus ex stercore indurato emollientia postulat. Partem exteriorē fouebimus decocto lini, maluanisoi, althææ, Curatio illi- fænugræci cum butyro, & axungis, aut oleo solo dulci, aut oleo, in quo doloris ex semen lini, fænugræcum, aut aliud simile efferuerit: Vngemus etiam stercore in eandem partem vnguentis de althæa, de agrippa, & aliis emolliendi durato- rim habentibus, ex feruesfacto etiam semine lini cum radice althææ, & oleo, & pauca cera vnguentum construere poteris. Emolito stercore (quod tactu deprehendes) ad eccoprotica medicamenta accedes, quorum Eccoproti- vis non transcendit iecur, vt ad cassiam per euaporationem extractam ea, cum decocto maluarum lini, & fænugræci. Si hæc non proffit, ad maio- ra deuenies, diacatholicon, cassiam, diaphanicon, diacarthamum, et dia- prunis laxatiuum. Quod si neque ex his vtilitatem animaduertas, colo- V ehemen- cinthide vii poteris: ℞. colocinthidis ꝑ. iii. cassiæ ꝑ. j. cum decocto supe- ter purgan- riori. In stercore verò indurato à veneno, præter ea, quæ diximus, vomiti- toria medicamenta, & quæ toto temperamento veneno aduersantur, Si fiat à ve- conducent. Quando mutatus situs intestini à casu, aut flatu ileos gene- neno ster- rat (quod sensu deprehendes) periculosus est affectus, quoniam statim cus indu- solet inflammari intestinum. Hoc restituetur supino collocato homine, & rante, digitis comprimentes intestinum. Aer etiam per folles fabrorum per a- Si à muta- num immissus sua vi lentia intestinum in suum locum reponit, quod re- to situ inte- medium etiam utile est in ileo à facibus induratis orto. In ileo à qua- stini.



*Nota re-* cunque causa procedat, semper opus est, faeces deponere ab intestino re-  
*medium,* Et, ne reliquorum excrementorum euacuatio impediatur.

## De inflammatione Hepatis. CAP. XLI.

*Inflamma* Inflammatio in hepate perinde fit, atque in aliis visceri-  
*tio hæc &* bus, & ab iisdem causis. Quare quæ diximus capitibus de  
*causa ab* phrenitide, de peripneumonia, & de pleuritide iterum inspi-  
*aliis peten* ce, similiter quæ a Paul. lib. 3. cap. 46. in quo multi alij iecoris  
*da,* affectus demonstrantur. Aetius quoq; de hoc morbo agit lib.  
*Nota.* 10. c. 3. & Gal. lib. 5. de locis affect. cap. 6. quo cap. omnes ferme  
 huius affectus notas describit, dolorem scilicet dextri hypo-  
 chondrij, grauitatemque peruenientem sursum ad iugulum  
 vsque, deorsum verò ad costas spurias: Tumor in eodem dex-  
 tro hypochondrio est, præsertim si gibba pars fuerit inflam-  
 mata: Acuta febris adest, tussis sicca, difficultas spiritus, sitis  
 inexhausta, cibi fastidium. Aliquândo hepatis inflammato sin-  
 gultus aduenit, vt docet vetustissimus Hippocr. aph. 58. lib. 5.  
 non semper, vt inquit in commentario Gal. sed quando ad  
 maximam atollitur inflammatione. Propter neruorū com-  
 municationem singultus hic est per cōsensum vaporis acris,  
 & etiam compressio ventriculi ore: errat ergo Oribasius di-  
 cens, hunc singultum esse ex inanitione. Aphorismum hunc  
 confirmat Celsus Latinus, Hippocr. lib. 2. cap. 7. dicens fre-  
 quens singultus & præter cōsuetudinem continuus iecur ef-  
 se inflammatū significat. Philotheus exponens finem huius  
 aphor. quod iecore, inquit inflammato fit, non talis, sed sin-  
 gultus, & maxime si simam partem inflammari contingat,  
 cum in inflammatione caliditas ad se ipsam humiditates, quæ  
 in stomacho sunt, trahit, & consumit, & hinc stomachus ex-  
 ficcatur, & ex siccitate consumitur, ad quam conuulsoriam  
 dispositionem singultus fit. Quo in loco Philotheus visus est  
 sequi Oribasium, sed ipsis repugnat Gal. comm. quoque 17.  
 lib. 7. aph. dicens, per consensum os ventriculi ab hepatis ma-  
 gna inflammatione laborare, atque morderi, & singultire  
 certum est. Scire quando pars sima inflammata est, & quan-  
 do gibba, & quando muscoli, Gal. aperte, & longo sermone  
 cap. 6. lib. 5. de locis affectis demonstrat.

*Curatio in* Curatur septem remediorum generibus: primò, victu  
*flamatio-* refrigerante, tenui, reddente sanguinem ineptum motui,  
*nis in par-* vt aere natura frigido, vel arte parato, aquis, herbis, & flo-  
*re causa ie-* ribus frigidis, lacte amygdalarum, cremore hordei, suc-  
*coris.* co malorum granatorum, cichorea, & lactuca coctis, pane  
 bene loto, & iure pulli gallinacei, si fuerit imbecilla facultas,  
 abste



abſtinentia vini, carniū & ouorum, & cæterarum rerum,  
quæ ſanguinem augment, & calfaciunt.

Secundò, auertentibus, vt ſanguinis miſſione per ſectio- *Renulſio.*  
nem iecorariæ dextræ, extrahaturque ſanguinis quãtitas, &  
numerus reſpondens plenitudini, & naturæ infirmi, & ma-  
gnitudini morbi. Vbi ætas & vires prohibent venæ ſectio-  
nem, fiat ſanguinis miſſio per cucurbitulas admotas naribus,  
aut ſcapulis cum ſcarificatione. Ligaturæ, fricções, & fotus  
extremorum ſatis auertunt.

Tertiò, repellentibus frigidis, & ſtipticis, internis, & ex- *Repellen-*  
ternis mitioribus, & ſemper admixto aliquo corroborante *tia.*

horum calido, ne conuerſa phlegmone in ſcirrum, aut facta  
obſtructione inter iecur & veſicam fellis, hydrops, aut mors  
ſequatur, vt ſumpto hoc medicamẽto, aut ſimili, tertia qua-  
ſue hora, quantitate duarum vnciarum: ℥. ſyrupi roſarum *Internæ.*

ex infuſione ſiccarum ꝑ. iij. ſyrupi endiuix compoſ. ꝑ. ij. aquæ  
endiuix, & cichoreæ, an. ꝑ. iij. aquæ eupatorii, aut abſinthij  
ꝑ. ij. miſce. Hepati ſæpe admoueatur vnguẽtum ſantalatum, *Externæ.*

vel cerotum ſantalatum tepidum: aut liquor hic remiſſe ca-  
lidus, ℥. aquæ roſarum, & endiuix an. ꝑ. iij. aquæ abſinthij,  
& olei roſati an. ꝑ. ij. aceti ſambucini ꝑ. ſ. miſce, & fiat epi-  
thema, quod ſæpe hepati admoueatur. Hoc vnguẽtum re-  
pellit ſatis bene: ℥. olei roſarũ ꝑ. ij. olei myrtillorum ꝑ. j. olei  
de ſpica, & de abſinthio an. ꝑ. ſ. ſantalorũ omnium, & trochiſ-  
corum de camphora an. ꝑ. j. ceræ q. ſ. miſce, & fiat vnguẽtũ.

Quartò, concoquentibus materiam mixtam ex pituita, *Preparati-*  
& bile, additis ſemper aſtringentibus, partem principem ro- *tio humo-*  
borantibus: vt ℥. rhodomellis vncias iij. ſyrupi roſarum *ris miſti.*  
ꝑ. ij. miſce: & ℥. decocti hordei ſine cortice, endiuix, & ab-  
ſinthij ꝑ. v. ſi magna fuerit copia pituitæ, ſyrupo de duabus  
radicibus, & rhodomelle concoquenda eſt. Si verò atra bilis  
mixta fuerit, ſyrupo de fumoterræ, de bugloſſa, & ſimilibus.

Quintò, vacuantibus materiam mixtam medicamentis *Purgatio.*  
habentibus mixtam facultatem purgandi bilem, & pituitam,  
vt ℥. diacatholicon. ꝑ. v. agarici trochiſcati, & rhabbarbari  
electi infuſi per noctem in aqua endiuix an. ꝑ. j. diaprunis ſo-  
lutiui ꝑ. iij. ſyrupi endiuix ſimplicis ꝑ. j. aquæ borraginis q.  
ſ. miſce, & fiat potus: aut ℥. pilularum aggregatiuarum ꝑ.  
j. fiant pilulæ ſeptem. Ex medicamentis, quæ pituitam, &  
bilem purgant poteris componere augendo, vel minuen-  
do habita ratione humoris dominantis. Si verò atra bilis ſit *Obſerua.*  
mixta cum pituita, aut flaua bile, quæ purgant ipſam, ſunt  
miſcenda: ſemper tamen, quæ iecur corroborat, adde, vt ſunt



# DE CVRAND. MORB.

**Curatio** omnis endiuita, absinthium & spica. Sed si materia fuerit in gibba hepatis parte, mouentibus vrinam vti oportet, vt syrupo capillorum veneris, de liquiritia, de duabus radicibus, & decocto quatuor seminum frigidorum maiorum, & radicum diureticarum in parua quantitate, quia tam purgantia, quam vrinatoria medicamenta clementi, & benigna egent vi, & natura.

**Resolutio** Sexto, resoluentibus, & digerentibus reliquias materiae cum astringentibus, & mixtis stipticis: vt ℞. florum camomillae, meliloti, anethi, althaeae an. p. j. absinthij, m. ss. rosarum p. ss. spicae, squinanti, & mastichis an. 3. iij. fiat decoctum in lb. iij. aquae ad medietatem; quo percolato vtere ad formam foti. Ex his etiam fiat sacculus hepati admouendus, vel oleum camomillae, rosarum & de spica simul calida hepati admoueantur, vel hoc vnguentum: ℞. olei camomillae ʒ. ij. olei de lilio, de absinthio, & nardini an. ʒ. ss. pulueris squinanti, rosatae nouelae & absinthij an. 3. j. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum, quo inungatur hepar.

**Interna** Septimo, intemperiem calidam a sanguine, & bile relictam corrigentibus. **Externa,** corrigentibus internis, vt electuario diatrium santalorum, diarrhodon abbatis, conserua rosata, syrupo rosarum, endiuitie simplici & composito, & similibus. Et externis dictis tertio genere remediorum. Si phlegmone suppuratur (quod scies autore Hippocrate aph. 47. lib. 2. ex febris, & doloris intensione) coctio & suppuratio iuuari debet cataplasmate ex decoctis ficibus, maluis, bismalua, semine lini, fenugræco, vuis passis, oleo amygdalarum dulcium, butyro recenti, vitellis ouorum, & pauco croco. Deinde abscessum motu violento rumpes, saltu videlicet, tussi, vocibus, sternutameto. Postea tergebis, hoc, aut simili medicamento, si est in gibba parte vlcus: ℞. furfuris cicerum nigrorum, hordei, an. p. j. liquiritiae, radicis petroselinij an. ʒ. ss. fiat decoctum: & de quo percolato accipe lb. ij. cui adde mellis & sacchari, an. lb. ss. aceti ʒ. j. misce, & fiat ad modum oxymellis. Si vero fuerit in sima, tergebis cassia, manna, fero caprino, & succo rosarum in parua quantitate, & aliis aluum deicientibus. Postremo vlcus est glutinandum bolo armeno, terra sigillata, sanguine draconis, thure, & similibus. Si hepar obduruit, emplastro de meliloto, aut filij Zachariae molliatur, aut hoc vnguento: ℞. olei sesamini, amygdalarum dulcium, & de semine lini, an. ʒ. j. mucilaginis fenugræci, & de semine lini, aquae bismaluae extractae, an. ʒ. iij. axungiae gallinae, & medullae crurii vituli an. ʒ. ij. emplastri de meliloto loco ceræ, quod sufficit, misce

**Suppuratio,** **Ruptio.** ea tergebis, hoc, aut simili medicamento, si est in gibba parte vlcus: ℞. furfuris cicerum nigrorum, hordei, an. p. j. liquiritiae, radicis petroselinij an. ʒ. ss. fiat decoctum: & de quo percolato accipe lb. ij. cui adde mellis & sacchari, an. lb. ss. aceti ʒ. j. misce, & fiat ad modum oxymellis. Si vero fuerit in sima, tergebis cassia, manna, fero caprino, & succo rosarum in parua quantitate, & aliis aluum deicientibus. Postremo vlcus est glutinandum bolo armeno, terra sigillata, sanguine draconis, thure, & similibus. Si hepar obduruit, emplastro de meliloto, aut filij Zachariae molliatur, aut hoc vnguento: ℞. olei sesamini, amygdalarum dulcium, & de semine lini, an. ʒ. j. mucilaginis fenugræci, & de semine lini, aquae bismaluae extractae, an. ʒ. iij. axungiae gallinae, & medullae crurii vituli an. ʒ. ij. emplastri de meliloto loco ceræ, quod sufficit, misce

**Tertio in parte gibba.** ea tergebis, hoc, aut simili medicamento, si est in gibba parte vlcus: ℞. furfuris cicerum nigrorum, hordei, an. p. j. liquiritiae, radicis petroselinij an. ʒ. ss. fiat decoctum: & de quo percolato accipe lb. ij. cui adde mellis & sacchari, an. lb. ss. aceti ʒ. j. misce, & fiat ad modum oxymellis. Si vero fuerit in sima, tergebis cassia, manna, fero caprino, & succo rosarum in parua quantitate, & aliis aluum deicientibus. Postremo vlcus est glutinandum bolo armeno, terra sigillata, sanguine draconis, thure, & similibus. Si hepar obduruit, emplastro de meliloto, aut filij Zachariae molliatur, aut hoc vnguento: ℞. olei sesamini, amygdalarum dulcium, & de semine lini, an. ʒ. j. mucilaginis fenugræci, & de semine lini, aquae bismaluae extractae, an. ʒ. iij. axungiae gallinae, & medullae crurii vituli an. ʒ. ij. emplastri de meliloto loco ceræ, quod sufficit, misce

**In parte sima.** ea tergebis, hoc, aut simili medicamento, si est in gibba parte vlcus: ℞. furfuris cicerum nigrorum, hordei, an. p. j. liquiritiae, radicis petroselinij an. ʒ. ss. fiat decoctum: & de quo percolato accipe lb. ij. cui adde mellis & sacchari, an. lb. ss. aceti ʒ. j. misce, & fiat ad modum oxymellis. Si vero fuerit in sima, tergebis cassia, manna, fero caprino, & succo rosarum in parua quantitate, & aliis aluum deicientibus. Postremo vlcus est glutinandum bolo armeno, terra sigillata, sanguine draconis, thure, & similibus. Si hepar obduruit, emplastro de meliloto, aut filij Zachariae molliatur, aut hoc vnguento: ℞. olei sesamini, amygdalarum dulcium, & de semine lini, an. ʒ. j. mucilaginis fenugræci, & de semine lini, aquae bismaluae extractae, an. ʒ. iij. axungiae gallinae, & medullae crurii vituli an. ʒ. ij. emplastri de meliloto loco ceræ, quod sufficit, misce

**Glutinatio.** ea tergebis, hoc, aut simili medicamento, si est in gibba parte vlcus: ℞. furfuris cicerum nigrorum, hordei, an. p. j. liquiritiae, radicis petroselinij an. ʒ. ss. fiat decoctum: & de quo percolato accipe lb. ij. cui adde mellis & sacchari, an. lb. ss. aceti ʒ. j. misce, & fiat ad modum oxymellis. Si vero fuerit in sima, tergebis cassia, manna, fero caprino, & succo rosarum in parua quantitate, & aliis aluum deicientibus. Postremo vlcus est glutinandum bolo armeno, terra sigillata, sanguine draconis, thure, & similibus. Si hepar obduruit, emplastro de meliloto, aut filij Zachariae molliatur, aut hoc vnguento: ℞. olei sesamini, amygdalarum dulcium, & de semine lini, an. ʒ. j. mucilaginis fenugræci, & de semine lini, aquae bismaluae extractae, an. ʒ. iij. axungiae gallinae, & medullae crurii vituli an. ʒ. ij. emplastri de meliloto loco ceræ, quod sufficit, misce

**Vnguentum ad diuturnitatem.** ea tergebis, hoc, aut simili medicamento, si est in gibba parte vlcus: ℞. furfuris cicerum nigrorum, hordei, an. p. j. liquiritiae, radicis petroselinij an. ʒ. ss. fiat decoctum: & de quo percolato accipe lb. ij. cui adde mellis & sacchari, an. lb. ss. aceti ʒ. j. misce, & fiat ad modum oxymellis. Si vero fuerit in sima, tergebis cassia, manna, fero caprino, & succo rosarum in parua quantitate, & aliis aluum deicientibus. Postremo vlcus est glutinandum bolo armeno, terra sigillata, sanguine draconis, thure, & similibus. Si hepar obduruit, emplastro de meliloto, aut filij Zachariae molliatur, aut hoc vnguento: ℞. olei sesamini, amygdalarum dulcium, & de semine lini, an. ʒ. j. mucilaginis fenugræci, & de semine lini, aquae bismaluae extractae, an. ʒ. iij. axungiae gallinae, & medullae crurii vituli an. ʒ. ij. emplastri de meliloto loco ceræ, quod sufficit, misce



misce, & fiat vnguentum: vel ʒ. emplastri filij Zachariæ, & de meliloto, an. æquas partes extendantur super alutam ad formam mediæ lunæ, & hepati admoveatur.

## De inflammatione iecoris. CAP. XLI.

### Scholium.

**I**nflammatione in hepate.) Per iecoris inflammationem Per inflā- intelligimus tumorem præter naturam, siue fiat à sanguine, mationem siue à bile, siue à melancholia, nam à pituita non potest fieri, iecoris ut docet Galen. lib. 4. de præf. ex pul. cap. 3. eo quod hæc à iecore conco- quitur, & compactam habet viscus substantiam. Qua ratione fiat in- flammatio, ex libro de ineq. intemperie cap. 3. & ex 2. de diff. feb. cap. de Locis in- fluxione intelliges. In huius visceris inflāmatione primò distingue, an sit flāmatio- in parte gibba, an in caua, hoc enim maximè cōducit ad curationem. Hæc nis cōside- variæ hepatis partes inflāmatæ aliquid habent commune & aliquid randus. proprium, commune habent gravitatem in iugulo inducere, ipsum enim Quid ha- deorsum ferunt quasi pressum: quod ex Gal. 2. de loc. affec. cap. 7. ob venę beant com- caue tensionem, magis quam ob membranas contingit. Vbi si dictionem mune va- illam magis, consideremus, intellectum simul habebimus, Gal. non ne- riæ hepa- gare ob membranas etiam fieri. Secundo habent communem pulsum du- tis partes rum, qui proprius est inflammationum, à quibus solent arteriæ distēdi: inflāmte, communis etiam ipsis est febris acuta, linguæ nigredo, & suis, sicut & ichores semper ex ipsis resudare. Oportet etiam in his inflammationibus propter victum distinguere tempora fluxionis à temporibus concoctio- nis. Proprium, quod habet inflāmatio gibbæ partis, est tussicula sicca Quid pro- ob septi comprēssionem orta, si etiam comprimimus iecoris regionē, dolo- prium, rem excitatum sentiemus. Distingues autem, an inflāmatio sit in mu- sculis necne, ex figura partis. Si inflāmatio cauam occupet partem, dolor ad intestina verget, ventriculus vomitu bilioso, & multis ichori- bus referto tentabitur, deiectiones erunt cruentæ, & singultus aliquan- do apparebit, quod malum signum est ex Hippocrate, quia inflām- tius magnitudinem sequitur.

Curatur septem remediorum generibus.) Victus in hoc af- Victus. fectu debet esse tenuis, & abstergens, ex cichorea, asparagis, piisana cremore, & oxymelite, omittentes mulsam, quæ detenta bile scit. Tum a- limenta adstringentia pirum, malum cydonium, & malū punicum, cum in caua parte mutantur in sanguinem in inflāmatione gibbæ partis con- ceduntur: quæ in sine partis inflāmatione lædunt cōstringendo meatus.

Secundo, auertentibus.) Sanguinis missio non est exercenda pro- Sanguinis pter plenitudinem, ut auctor voluit, quia bene potest esse iecur inflam- missio. matum non existente in corpore plenitudine. Cum ergo in inflammatione Error au- sit aliquid fiens, & aliquid factum, sanguinē mittimus, ut reuellamus etoris. humorem fluentem ad locum affectum, & euacuemus cōtentum in ipso.

Et



## DE CVRAND. MORB.

**Que vena** Et quamvis utraque basilica secari possit, si solam venarum rectitudinem consideremus: consulo tamen semper secare basilicam dextram, quia hæc præter dictam rectitudinem, altæram habet, quæ natura dicitur.

**Repellentia.** Tertio, repellentibus frigidis. Si inflammatio sit in parte gibba iecoris, repellentibus in parte exteriori utemur, dummodo non sint æstu frigida, ne lædant iecur: utemur ergo absinthio cum oleo rosaceo, aut

**Purgatio,** cum aceto. Si inflammatio sit in caua parte, ab his repellentibus abstinendum erit, quia eorum vis eò non penetrat: & apparente concoctione (quod in incremento contingit) per alium oportebit purgare ichores resudantes, ex inflammatione, ut mercuriali, in declinatione verò diacatholicon, & electuario de succo rosarum. In inflammatione verò gibbæ partis, in incremento per urinam benigna purgantia utilia sunt, eupatorium scilicet, urtica, & feniculum: In declinatione verò vehementissima, inter quæ est assarum.

**Error auctoris.** Quarto, concoquētib. Hoc loco errat crassissimè auctor purgans in inflammatione iecoris bilem, & pituitam indiscriminatim, quasi inflammatio semper ab his humoribus fiat. Quæ autem ratione sit purgandum, paulò superius explicauimus, non enim humorem à toto corpore educere intendimus in hoc affectu, sed ichores ex inflammatione resudantes in cavitates venarum iecoris.

## De obstructione hepatis. CAP. XLII.

**Que partes laborant.**

**I**ecoris venæ tam sinæ partis, quam gibbæ obstructionem patiuntur: tametsi priores frequenter: quod ansam (ut reor) Aetio dedit, illas tantum memoradi: reuera tamen utraque in id vitium incidunt, ut obstruantur. Fit autem, ut prioribus id magis contingat, quod alimentum ad cauam iecoris partem crassum adhuc, atque illaboratum perueniat: quam iniuriam gibba non sentit, & si aliquando sentiat, obturatur similiter: nec ob hæc solum causam, sed propter alias quoque, quas tam gibba, quam caua iecoris pars habent communes. Hæ sunt procatartica nonnunquam, ut ictus, casus, aut duræ alicuius rei ad dextrum hypochondrium collisio. Præterea singuli, aut alterius cuiuspiam rei, arcta constrictio, frigus exterius, & quicquid suo compressu hepatis venas potuit arctare, ita ut quasi conniueant, aut saltè doloris sensu per compressionem excitato eam sanguinis molè attrahant, qua venæ ultra modum repletæ in obstructionem incidant. Sæpè verò internæ, quas Gal. lib. de loc. affec. 5. c. 6. binario numero comprehendit. Obstructiones inquiens, iecinoris fieri vel propter crassos, & viscidos humores, qui à crasso & pituitoso alimento generantur, vel a flatuoso spiritu, cui exitus non patet. Causæ

**Causæ externe.**

**Interne.**

**Notæ.**



procatarctica ab ægrotante sunt petendæ. Internæ sic  
prehenduntur, si a crassis, & viscidis humoribus obstru-  
ctio fiat, grauitas in hypochondrio dextro sentitur, si a fla-  
uoso spiritu præter grauitatem, tensionis quoq; sensus ad-  
obstructos pallor totius corporis sequitur, tussis & diffi-  
cultas anhelitus, maxime si exercuerint seipfos, vel in altio-  
rem locum ascendere tentauerint: trahitur enim ad inferio-  
rem propter hepatis grauitatem septum transuersum: vnde dif-  
cultus anhelat. Porro cum multa sint signa tam obstructio-  
nis hepatis, quam inflammationi communia, febris inter a-

Curatio

leso solius inflammationis proprium signum est.

Hepatis obstructio, quæ sit a frigidis, & crassis humoribus, *Victus.*

curatur quinque remedium generibus: primo, victu te-  
nente, calido, & aperiente, non immodico, præsertim ante  
purgationem: cum in quarto genere valentioribus sit vtendum:  
scilicet asparagis, iure cicerum nigrorum, radicum petroselini,  
senationum, vel nasturtij aquatici. Hispani  
berros, de quo Dioscorides lib. quarto cap. 82. & similia

in carne, & sine carne. Potus sit vinum album aqua dilu-  
tum, vel decoctum capilli Veneris, aut ceterac. Vitanda sunt *Vitanda*

omnia alimenta crassioris succi, balnea, coitus, & exercita-

tiō. Secundo, celerissime (quia inueterata obstructio non solum *Præpara-*  
in iecore, sed in omni corporis parte putrefactionem pa- *tio celerri-*  
da, febremque accendit) attenuantibus, & incidentibus ma- *ma.*

teria concoquatur, vt ℞. rhodomellis ℥. vj. oxymellis sim-  
plicis, & syrupi de absinthio an. ℥. ij. Item ℞. decocti aut a-  
marum capillorum Veneris, fœniculi, & absinthij ana. ℥. vj.  
misce, parato humore pituitoso his vel aliis similibus me-  
dicamentis.

Tercio, vacuantibus materiã crassam: vt ℞. diacatholicon. *Vacuatio.*

℞. diaphænicon. & electuarij indi maioris an. ℥. ij. s. rhodo-  
mellis ℥. j. aquæ fœniculi q. s. misce, & fiat potus: vel ℞. pilu-

lum de agarico ℥. j. fiant pilulæ septem. Vacuata pituita,  *Sectio re-*  
c, aut alio medicamento phlegmagogo, de quibus cap. i. *na confert*

in qui laudant sectionem basilicæ dextræ, vt per eam partem  *si ægrotus*  
tumores moti facilius educantur, & viæ melius aperiantur,  *sit sangui-*

obstructioque bene curetur. Hoc non damno, sed aliquando  *neu.*  
olido, præsertim si æger sit sanguineus.

Quarto, curantibus obstructionem hanc internis & ex-  *Obstructio*

ternis, vt iecore lupi, fumo terræ, absinthio, eupatorio, no-  *nem curā-*

is agrimonia, camomilla, asaro, radice acori, quinque ra-  *tia.*

dicibus diureticis, casia lignea, spica, capparibus, amygdalis  
amar



# DE CVRAND. MORB.

- Interna** amar, lupinis. Ex his simplicibus, & aliis similibus fieri solent multa composita. Inter quæ leuant ab hac obstructione
- simplicia.** præclare citra omnem molestiam syr. de bysantiis, de endiuiâ comp. de duabus radicibus, & de quinque radicibus, oxymel comp. diacurcuma, dialaca, trochiscus de eupatorio,
- Composita.** de rhabbaro, de absinthio. His ergo multis diebus sumptis curatur obstructio iecoris, præsertim partis gibbæ hoc medicamento vel simili: ℥. diacurcumæ, & dialaccæ an. ʒ. j. trochiscorum de rhabbaro, & de absinthio an. ʒ. ʒ. pulueris diarhodon. abbatis ʒ. ij. hepatis lupi præp. ʒ. ij. quatuor seminum frig. maiorum mundatorum, an. ʒ. ʒ. syr. de scolopendria. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis quolibet die cochlearium vnum cum ʒ. ij. aquæ capillorum Ve. Curat hanc obstructionem ex multorum experientia syrupus hic: ℥. ceterac, capilli Veneris, lapathij, lentisci, & rutæ an. m. ʒ. quinque radicum diureticarum, radicis acori gladioli, an. ʒ. j. quatuor seminum frigidorum maiorum ʒ. ij. seminis apij, fœniculi, petroselini Macedonici, an. ʒ. ij. camædreos, camæpyteos, vallerianæ, an. m. j. hordei mundi, p. j. infundantur radices & semina per noctem in aceto, & postea fiat decoctum in vino albo, & aqua sufficienti, cui percolato adde mellis. q. s. m. & fiat syrup. Dosis quolibet die ʒ. ij. Bis in die post duas primas concoctiones vngatur hoc vnguento: ℥. succorum apij, petroselini, fœniculi, sanationum, endiuiæ & cichoreæ, an. ʒ. j. aceti ʒ. ʒ. olei ʒ. ij. bulliant omnia ad consumptionem vsque succorum & aceti: deinde adde santalorum omnium & spice, an. ʒ. ʒ. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum.
- Topica.** Quinto, corroborantibus iecur: vt theriaca magna, mithridato, & trochiscis de rhabbaro, puluere diarhodon. Abbatis. ʒ. j. alicuius medicamenti ex his cum aqua absinthij, & endiuiæ multis diebus sumpta corroborat iecur. Hepar lupi, auellanæ, passulæ, & cichorea, & endiuiâ corroborant iecur.
- Corroborantia.** Hæc confectio est optima in hepate corroborando: ℥. trochiscorum de eupatorio ʒ. j. trochiscorum de spodio cum semina acetosæ ʒ. ʒ. seminis endiuiæ, cassiæ lignæ, spicæ, cinnamomi, ameos, hepatis lupi, an. ʒ. j. seminis lentisci ʒ. ij. rhabbari electi puluerizati ʒ. ij. ʒ. sacchari tb. ʒ. misce, & fiat confectio. Dosis ʒ. ij. cum aqua absinthij, & endiuiæ.
- Confectio optima.** Et hoc vnguentum est maximo auxilio: R. ceroti santalini ʒ. j. olei de spica ʒ. ʒ. pulueris absinthij, & rosarum, an. ʒ. j. misce.
- Vnguentum vtilissimū.**

De obstructione hepatis. CAP. XLII.

Scholium.

Iecor




Ecoris venæ tam simæ partis.) Iecur pars est instrumentaria Cur in ie-  
exercens propriam actionem nempe sanguificationem ex chylo, core fre-  
inquam ex materia. Chylus autem non continetur in aliqua insi- quenter  
ni cavitare, quoniam ea destituitur iecur: sed in venis multis, a fias obstru-  
nibus tanquam ex radicibus ortum habet vena portæ. Orificia ha- ctio.  
m venarum in iecoris extremitate adherent orificiis venarum  
libbæ partis iecoris, ut sanguis in cana partis venis generatus, &  
b excrementis repurgatus, ad gibbam ascendat partem, & inde ad  
venam cauiam. Cum ergo anostomosis illa venarum angusta sit, non  
st mirum, si inter omnes corporis partes iecur magis sit obstructioni-  
ous oportuno. Obstructio iecori, morbus est in via, habens vnicam Quis affe-  
antum causam, nempe humorem crassum fluentem, ut constat ex 8. Etus sit.  
le comp. secundum locos cap. 6. & lib. 5. de loc. affec. cap. 6. unde mi-  
randum est de his, qui practicas ediderunt, alteram causam iecoris  
obstructionis ad flatum referentibus, & quod magis est, Altomarius Error Al-  
id probat ex Gal. supradicto loco, cum nec id somniauerit, et repugnet tomar. au-  
rei nature. Quod autem hec non sit sententia Gal. manifestè patebit etoris, &  
eum locum legenti, in quo postquam scripsit iecur pati morbos in in- aliorum.  
temperie nuda, & cum fluxione, ut in erysipellate, schirro, & flatuosa  
distentione, pati etiam obstructionem a crassis humoribus addit. Si-  
gnum obstructionis est grauitas in dextro hypochondrio, quod si in eo  
preter grauitatem sit tensio, una cum humore erit ibi inclusus statulen-  
tus spiritus. Hec Gal. Ex quo loco, si animum aduertis, nunquam colli-  
ges ipsum existimare spiritus esse causam obstructionis, sed si cum ob-  
structione sit statulentus spiritus tensionem sentiri. Dices, cur in ob-  
structione iecoris non est semper febris coniuncta, cum obstructio sit  
causa putredinis? Respondeo in iecore esse multas venas, & ideo hu- Obiectio.  
mores difflari, quod si aliqua est putredo exigua tamen, ita, ut vapo-  
res ex ea eleuari non sufficiant ad generationem febris. Curationem Curatio.  
huius affectus lege apud auctore, solum animaduertas velim, ictum, Auctor  
casum, dure alicuius rei ad dextrum hypochondrium collisionem, & reprehensio-  
cinguli constrictionem, que inter causas externas connumerantur ab ditur.  
auctore, non esse causas: quia ictus casus, et constructio, si violenter fiant,  
& constringant iecur, sanguinem expriment, non autem obstruent,  
cum non habeant vim generandi crassos humores, sicut nec cingulum.  
Preterea iecur Lupinum permiscet in compositionibus deobstruenti- De iecore  
bus iecur, existimans toto temperamento operari. Quod non probatur lupino ad-  
a Galen. lib. 11. simpl. cap. de iecore lupino. Fortasse adductus fuit ex eo- uerte.  
dem Gal. qui lib. 8. de comp. secun. locos cap. 7. iecur lupinum toto tem-  
peramento hepaticis conuenire scribit, non animaduertens Galenum  
eo in loco non proponere medicamenta toto temperamento hepaticos  
iuuantia, sed postquam scripsit multa medicamenta ex Asclepiade ad  
hepaticos addidit ipsum scripsisse pharmacum ex cochleis tritis cum vino,  
quod



## DE CVRAND. MORB.

quod toto temperamento inuat, sicut & lupinum hepar non una aut altera qualitate. Vbi Galenus hec toto temperamento inuare scribit, quia sunt alimenta, quæ eadem ratione paulo supra riuas passas visceri secundum totam substantiam familiares esse ducit.

### De Ictero. CAP. XLIII.

*Quid icterus.*  Votiescunque vniuersi corporis color propter bilis aut flauæ, aut porraceæ, aut nigre effusionem immutatur, malum fit, quod Græci icterum appellant, Latini regium, & arquatum, & originem ab iis, quæ tum in morbo, tum in eius curatione accidunt, appellatione sumpta, quod longū esset referre. Porro errant, quicunque vitio tantum hepatis hanc affectionem putant provenire: sæpe enim nihil patiente iecinore, saltem primaria affectione icterus oboritur, nonnunquam ex indicio naturæ, quoties in febribus bilis vniuersa ad cutem defertur. Qui si ante septimum appareat, malum est signum iuxta aph. 62. sect. 4. Si verò post septimum, non perpetuò bonum, præsertim si dextrum hypochondrium obdurescit, vt ex aph. 64. sect. 4. colligitur. Interdum ex venenatorum animalium morfu, vt Imperatoris cuiusdam seruo contigit, qui ex vipere ictu, quarum viperarum venatio ipsi commissa erat, ictericus est effectus nimirum colore totius corporis prasinâ, aut si maius porraceam bilem referente: vt fusius Gal. ait 5. de locis affect. cap. 7. sæpe tamē hepatis occasione fit, vel quia inflammatum fit, aut intemperie calida laboret, aut obstructione. Accidit quandoque ob imbecillitatem (vt ait Aetius) vesicę bilem excipientis, quæ biliosum humorem, veluti consuevit, in sese ex hepate non attrahit, ideoque impurum sanguinem relinquit. Fieri etiam potest, vt ipsa nimium repleatur, & propter repletionem multam non euacuetur. Magna tamen ex parte contingit hic morbus ex obturatione, aut debilitatione venarum, quarum ora ex ipsa ad hepar feruntur, aut illius meatus, qui bilem ad intestina effundit. Sed neque illud tacendum erit, quod lien quoque ictericam affectionem parit, illam inquam, in qua tota cutis nigro colore inficitur, quod accidit: aut quia ab ipso liene hepar non benè purgatur, aut seipsum purgare per solitos canales non potest: vtrūque verò, vel propter imbecillitatem aliquam, aut obstructionem fit. Præter iam dictas causas a procatarcticis quoque generatur, vt ab immoderata exercitatione, rerum calidarum vsu, & aeris ambientis calida intemperie. Vnde in Sardinia ex aeris corruptione scribunt quidam, ineunte æstate, aut in autum-

tum



in hanc affectionem incidere indigenas ferè omnes  
 exceptis iis, qui propter robur téperamenti, aut alia de causa  
 resistere malo possunt. Cæterû si a causis procatarcticis icte- *Notæ.*  
 rus contingat, aut ex venenatæ ferè morfu, interrogare egrû  
 tantum conuenit, aut aeris naturâ considerare. Aliarum cau-  
 sarû signa nunc docuimus. Si igitur ex indicio naturæ factus  
 sit arquatus morbus, tam vrina, quam alui excrementa à na-  
 turali modo non recedunt, si ab inflâmatione hepatis, febris  
 adest, & dextri hypochondrij grauitas, & deiectiones sunt bi-  
 diosæ. Si ab intemperie, citra grauitatem furor inest. Si ab ob-  
 struptione, citra grauitatem vna cum grauitatis alicuius sen-  
 su circa dextrum hypochondrion alui excrementa alba dei-  
 ciuntur. Si ab imbecillitate facultatis, vel attractricis, quæ bi-  
 lem ab hepate trahit: vel expultricis, quæ ipsam ad intestina  
 expellit citra grauitatem, & stercorea alba sunt, & vrina bilio-  
 sissima. Deniq; si a vitio splenis contingat, quod genus icte-  
 ri atrum appellât: fit enim ab atra bile vna cum sanguine ad  
 cutem delata, grauius multò afficiuntur, consequitur enim  
 eos (vt inquit Aëtius lib. x. e. xvij. cuius placet verba referre)  
 tristitia præter rationem, & mordacitas eorû, quæ circa ven-  
 trem sunt, difficultasq; spirâdi. Cibos auersantur, & nigram  
 lotium excernunt: Aliquando autem & per interualla quæ-  
 dam corpora ipsorum tepescunt, stercorea verò chalcanti co-  
 lorem referunt, & aluius magis his exsiccat. Cæterum eos,  
 qui ex pallida bile arquatum contrahunt, nulla mordacitas  
 eorum, quæ circa ventrem sunt, consequitur: neq; etiam tan-  
 tum auersantur cibos, sed obtusior aliquâdo fit in iis ciborû  
 appetitus. Et stercorea quidem albida egerûtur: vrinæ autem  
 crocei coloris, turbatæ tamen, & tenebras referentes perma-  
 nent. ¶ Signa præterea omnibus ictericis communia sic Ae- *Signa commu-*  
 tius scribit. Communiter autem omnibus ictericis pigritia *munia.*  
 ad motum corporis accidit, & à dulcibus cibis sunt animo  
 alieno: amatos verò nõ admodum auersantur: Et variis ima-  
 ginationibus vexantur: Pruritus etiâ vniuersi corporis co-  
 mitatur, & difficulter exudant. porro alba oculorum, & par-  
 tes faciei temporibus propinquæ, itémque malæ pallorem  
 ostendunt. Venæ etiam sub lingua repletæ reperiuntur, &  
 abundantem humorem significant.

Curatur icterus criticus quatuor generibus auxiliorum: *Curatio*  
 quamuis si perfecta fuerit crisis permutationis, nihilque bi- *icteri cri-*  
 lis interius remaneat, sola cutis infectio, & intemperies eget *tici.*  
 curatione. Si aliquid intus sit, & hepatis & venarû intempe-  
 ries calida fuerit primò, curatur victu refrigerante, & hume-  
 ctan



# DE CURAND. MORB.

stante, vt cremore hordei, endiuia, cichorea, lactuca, & similibus. Et aqua hordei, aut vino albo bene aqua dilato.

*preparatio* Secundo, apparantibus bilem: vt syrupis endiuia simp. & compos. granatorum, violarum, nenupharis, acetositis lemonum, & citri, cum duplo aquarum, vel decocti cichorea, endiuia, lactuca, portulaca.

*Vacuatio.* Tertiò, vacuantibus bilem: vt cassia fistula, manna, tamarindis, rhabarbaro, & aliis cholagogis: vt ℥. medullæ cassiæ fistulæ recens extracta, & medullæ tamarindorum an. ʒ. β. infusionis rhabarbari in aqua endiuia per noctem facta. ʒ. iij. cum ʒ. iij. squinanti, diaprunis solutiui ʒ. iij. syrupi violarum ʒ. j. aquæ borraginis. q. s. misce, & fiat potus, vel, si malit pilulas: ℥. pilularum de rhabarbaro ʒ. j. fiant cum aqua endiuia vij. pilulæ. Si toti corpori est communis intemperies, aut æger iuuenis, & carnosus venæ iecorariæ dextræ sectio est necessaria, extrahaturque sanguinis copia respondens naturæ ægri & morbi.

*Alteratio.* Quartò, tollentibus intemperiem calidam hepatis internis, & externis medicamentis, dictis tertio, & septimo genere remediorum cap. 41. de curatione inflammationis hepatis.

*Curatio* Si verò icterus est ab obstructione per crassam bilem, aut icteri ab pituitam, quatuor remediorum generibus curatur, primò, obstructione victu tenuante, aperiente, & calfaciente: minus si a bile est, ne crassi quam a pituita, vt alimentis, & aliis iam dictis cap. præced. humoris. de hepatis obstructione.

*preparatio* Secundo, apparantibus materiam, vt syrupis, & aquis, incidentibus, tenuantibus, & aperientibus, primò mitioribus, dictum est cap. præced. secundo auxiliorum genere.

*Vacuatio.* Tertiò, vacuantibus bilem crassam, & pituitam ei admixtam: vt medicamentis dictis cap. præced. tertio auxiliorum genere. Vena secatur quoque basilica, vel salua tella media inter anularem, & minimum dextræ manus digitum, si fuerit iuuenis aut bilis, vel pituita sanguini mixta per eam humores hepatis fixi agitantur, faciliusque obediunt medicamentis leuantibus obstructionem.

*Aperientia.* Quartò, aperientibus meatus, vt medicamentis dictis secundo, & quarto genere remediorum cap. præced. 42. ʒ. iij. aquæ, vel decocti foliorum raphani, aut eupatorii, aut

*Simplicia.* prasilij, aut matris syluæ matutinis quinque, vel septem sumptæ sanant icterum. ʒ. j. pulueris lumbricorum terrestrium tribus matutinis sumpta, vel pluribus cum vino albo, & saccharo saporis boni gratia sanat icterum, vel fiant pilulæ au-



intestæ ex eodem puluere lumbricorum cum syrupo de  
 zantiis. Idem præstat stercus canis ossibus tantum nutriti,  
 rum capræ nutritæ herbis aperientibus, vt fœniculo, apio,  
 otroselino, senationibus, & similibus factum cum semine  
 rthami, quantitas carthami ʒ. s. ad lb. iij. lactis. Sanant *Composita.*  
 quoque icterum aperientia hæc, dialacca scilicet diacurcu-  
 a ʒ. ij. ad iij. & trochisci de rhabarbaro, de eupatorio, &  
 ablinthio ad ʒ. j. cum aquis prædictis aperientibus, sæpe  
 utata remedij forma, & specie, vt in asthma, & cæteris  
 æctibus diuturnis: ne natura vni afflescat. Decoctum ca-  
 ifolij, scolopendriæ, hepaticæ, capil. Veneris, & quatuor  
 minum frigidorum maiorum septem matutinis sumptum  
 rat icterum, præsertim si postea sumatur hic potus tribus  
 matutinis: ʒ. feri caprini lb. j. rhabarbari electi ʒ. ij. pulpæ  
 oloquintidæ, spicæ nardi ana ʒ. j. sacchari rosati, & violati  
 a ʒ. s. misce, & fiat potus. Quidam tempore Arnaldi de *Historia.*  
 illanoua multos laborantes ictero sanauit hoc medicamen-  
 t, vacuatione per sudorem & vrinam: ʒ. stercoris asini re-  
 ntis pugillum semis, vini albi odoriferi ʒ. iij. misce. Color *Color fla-*  
 uus cutis, & oculorum tollitur mouentibus vrinam præ- *uus quib.*  
 ctis medicamentis aperientibus, & balneo ex decocto ca- *tollatur.*  
 omillæ, meliloti, althææ, & similibus, aut sulphureo aere  
 lido, & aliis omnibus aperientibus poros. Conferunt ocu-  
 sternutamenta, fots camomillæ, & parum croci in ace-  
 quamuis antequam appareat icterus, oculis aqua rosacea  
 admouenda, vt in variolis, & morbillis fieri solet. Si alia *Aqua ro-*  
 media, & omnia ferme scripta à grauiissimis doctoribus sci facea ocu-  
 cupis, lege c. 5. ferm. 5. tract. 6. Nicolai Florentini. Si icterus *lis admo-*  
 ger est, vt præcedens curatur, sed remediis valentioribus, *uenda.*  
 melancholiæ debitis, de quibus in affectibus lienis dice- *Icteri ni-*  
 us cap. scilicet 45. *gri curatio*

## De Ictero. CAP. XLIII.

## Scholium.



Votiescunque vniuersi corporis.) Morbus regius (qui Icteros  
 plura habet nomina, & vulgò dicitur aliacea) nil aliud est quid.  
 quàm effusio biliosi humoris per vniuersum corpus: Vbi per  
 lem non solum flauam intelligas, sed & eam, quæ præter naturam  
 t: ex morsu enim animalis solet fieri icterus, bile porracea per corpus Quis affe-  
 fusa, sicut in indiciis morborum bile vitellina. Morbus regius, icterus à ctus sit.  
 racis dictus, symptoma est in affectu corporis, est enim color vitiatu,



# DE CVRAND. MORB.

sequens alterum symptoma, nempe vitium excrementi: quod etiam ex altero symptoma dependet, nempe ex actione laesa: quæ malè separat, aut non separat bilem: vel ex actione corporis depravata, cum in toto eo multa bilis generatur. Aliquando tamen icteros non sequitur morbum, sed naturæ robur, quando in crisis appareret. Morbus, ad quem hæc actio laesa sequitur, varius est: nam aliquando est instrumentarius, aliquando similis. Hoc intelligemus, si varias icteri causas ex Gal. lib. 5. de loc. affec. cap. 7. in hunc locum transferamus. Prima est natura, quæ in crisis ad cutem humorem peccantem expellit: Secunda sanguis ita corruptus, ut mutetur in bilem porraceam: quod contingere solet ex veneno in corpore genito, aut exterius inflicto, ut Imperatoris seruo ex vipere morfu accidisse scribit Gal. Tertia intemperies calida iecoris multam bilem generans, quæ tota, cum non possit expurgari à vesica bilis, una cum sanguine ad partes delata eas colorat. Quarta est intemperies calida totius corporis bilem ex tenui parte generans. Quinta obstructio iecoris in meatu, qui ex iecore defert bilem ad vesicam, aut illius, qui ex vesica eam ad duodenum intestinum expurgat: Sexta inflammatio iecoris: Septima schirrus iecoris: quæ duæ causæ media obstructione impediunt, quo minus vesica bilis attrahat bilem. Sunt autem hæ causæ distinctæ ab obstructione, quia sine his obstructio sola potest morbum regium efficere. Octava imbecillitas vesicæ bilis orta ex aliqua fori intemperie, ob quam non rectè attrahit bilem. Ultima verò causa est immodica quantitas bilis in vesica coaceruata impediens, quominus (à magna distentione vesica impedita) possit contrahi: quod in vesica lotii lib. 3. de caus. symp. aliquando accidere scribit Gal. Ex his facile intelliges hoc symptoma icteros appellatum sequi varios morbos: Quorum unus est intemperies manifesta, à qua icteros ex imbecillitate vesicæ, aut iecoris & totius corporis calore contingit. Alter est intemperies occulta, à qua icteros ex veneno fit. Tertius est morbus in via, qui icterum ex obstructione, inflammatione, & schirro generat. Inter hos morbos obstructio, inflammatio & schirrus mali sunt, non ita intemperies: ac proinde cum ante septimum diem in febribus icteros apparet 4. aph. comm. 62. malum significat, hoc est aliquem ex illis tribus affectibus. Quod si post septimum diem ex aliquo prædictorum affectuum appareat, etiam malum est. Si verò sine affectu aliquo in febribus post septimum diem in die decretorio eneniat, bonum est, ex 4. aph. sent. 64. Si criticè fiat morbus regius, tunc solam euacuare oportet bilem, quæ est in habitu corporis, & intemperiem calidam (etsi morbosa non sit) in ipso corrigere, quod balneo commodè præstabis. Si venenum causa sit, alexipharmacum exhibebis illi veneno contrarium. In ictero ab intemperie calida

Morbus.

Variæ  
icteri  
causæ.

Curatio.



calida, aut obstructione oris sanguinem mittes, nam venelles, & una cum sanguine prauo partem humoris euacuabis, et deinde efficies ea, quæ auctor docet. Si icteros ab inflammatione ortum habeat, lege caput de iecoris inflammatione. Si ab schirro eueniat (quem tactu cognosces) sanguinem mittes, ut sanguinem educaas prauum, vteris syrupis inscindentibus, & emollientibus inunctionibus, miscens, semper ea, quæ robur seruent visceris; quod perpetuò faciendum est in affectibus partium, quæ actionem habent toti corpori necessariam, quales sunt iecur, ventriculus, & lien.

## De Hydrope. CAP. XLIIII.

**H**Ydrops omnis vitiato hepate, & in frigidam intemperiem perducto oritur. Neque enim quod dudum de ictero dictum est: nempe non semper vitiato hepate fieri, id quoque de hydrope dici poterit. Quicumque enim hydrops hepatis vitium causam habet, siue illud per primariam affectionem, siue per consensum aliarum partium nascatur. Negari enim non potest aliarum quoque partium occasione, cum scilicet vehementer fuerint debilitatæ, hydropem oriri: non tamen ob id fateri cogimur intacto hepate tale quippiam contigisse, cum eam affectionem, nisi ipsum in sui consensum illæ vocassent, nunquam potuissent inducere. Sunt autem in vniuersum hydropis, seu aquæ intercutem tres species, quarum primam Græci Ascitem, secundam Tympanitem, tertiam Anasarcam, hypofarcam, & leucophlegmatiam appellant. Ascites, quam Barbari corrupto vocabulo asclitidem nominant, fit ab humore aquoso cum perexiguo spiritu inter peritonæum, & partes sibi subiectas coaceruato: sic dicitur Græcis, quod vtrem aqua plenum ea pellicula referre videatur, ascos enim latine vtrem sonat. Tympanites accidit, quoties in prædictis locis multus spiritus flatulentus modico humori commixtus includitur. Sic affectis venter tympani instar sonitum, si percutiatur, edit vnde malo nomen inditum est. Hypofarca contingit, cum vniuersa corporis moles prætumida est, & spongiæ instar laxa, & madefacta propter frigidum & pituitosum sanguinem per vniuersum quidæ corpus diffusum, non tamè vnitum. Omnis hydrops, ut supra dictum est, vitio contingit hepatis, aut per primariam affectionem, aut per societatem affecti: per primariam affectionem, vel quia inflammatione, schirro, aut obstructione laboret, quando per has, aut similes affectiones impense refrigeratur: per societatem autem aliarum partium, ut lienis, ventriculi, intestinorum maximè gracilium, pulmonis,

Quid hydrops

Species

hydropis

Ascites

nude

Tympanites

Anasarca



# DE CVRAND. MORB.

renum, & septi transuersi. Ex immodica præterea hæmor-  
rhoidum euacuatione, aut menstruorum, & eorundem re-  
tentione, & ex quocunque alio vteri affectu, si ingens fuerit,  
hydrops contingit: in omnibus enim his affectionibus ex so-  
la hepatis frigidityte hydrops nascitur non secus, ac solet o-  
riri, quoties ob intempestiuam refrigerationem iecur valde  
refrigeratur: tunc enim antequam in tumorem scirrhusum  
attollatur, aqua intercutem sequitur: magna tamen ex parte  
euenit iis, qui cibum non sentiunt, & malo corporis habitu  
præditi sunt, & ictero infestantur, aut dysenteria, aut colica  
affectione. Generaliter omnibus hydropicis spirandi diffi-  
cultas adest, & rumor, & grauitas, & vitiatu color ex virore,

*Communia  
signa.*

*differentia*

*Curatio*

*anasarca.*

*Prepara-  
tio.*

Anasarca curatur quatuor remediorū generibus, primò,  
victu calido, & sicco: vt aere æstiuo natura, vel arte parato,  
fuga frigidi, & humidus, qualis est pluuialis, & nebulosus: pau-  
co cibo, & raro, facili concoctu ob facultatis naturalis imbe-  
cillitatem: & tenui potius quam crasso, vt pane biscocto, car-  
nibus auium montanarum, & herbis diureticis: vt fœnicu-  
lo, asparagis, & senationibus, cinnamomo, zingibere, gario-  
phyllis, pipere, aniso, vino albo, & pauco. Si vires valent, ex-  
ercitatio, quæ sudorem excitet, est saluberrima. Quare sem-  
per tergendum, aut vice eius frictio multa, mollis, & medio-  
cris vigiliæ, & affectus animi exsiccantes vtiles sunt, nisi de-  
ficiant vires.

Secundò, apparantibus pituitam per totum corpus spar-  
sam: vt rhodomelle simp. syrupo de hyssopo, de duabus radi-  
cibus, oxymelle composito, & syrupo de quinque radicibus  
cum aquis aut decocto herbarum calidarum, & quæ pitui-  
tam



ritam parant. ¶ Tertiò, vacuantibus pituitam per medica- *Vacuatio.*  
 menta phlegmagoga, aliquando tamen utilis est sanguinis *Sectio ve-*  
 missio, si ex menibus, aut hemorrhoidibus suppressis fiat, & *na.*  
 nunquam alias, nisi æger esset maxime sanguineus, & iuue-  
 nis, sanguisque pituitæ esset permixtus, sed semper parcè  
 extrahatur sanguis, ne iecur imbecillus reddatur, à cuius im-  
 becillitate fit. In primis duobus affectibus venæ tibiæ, aut  
 pedum sunt secandæ, in tertio vena hepatis: sed in hoc  
 affectu cautè sanguis est mittendus. Sint medicamenta pur- *Quæ venæ*  
 gantia in hac, & omni specie hydropis, benigna, & quæ he- *secandæ.*  
 par non lædant: vt agaricus, hiera simp. diaphænicon: vt ℥.  
 diaphænicon. 3. iij. agarici trochiscati 3. j. s. rhodomellis 3. j. *Purgatio.*  
 aquæ fœniculi quod. s. misce, & fiat potus: vel ℥. pilularum  
 de hiera simplici 3. ij. agarici trochiscati 3. j. fiant cum aqua  
 absinthij pilulæ vij. vel ℥. Hieræ simplicis 3. j. frequens vsus  
 & longus hieræ simplicis est utilis, & necessarius huic, & om-  
 ni speciei hydropis. Vacuatur quoque materia hæc diureti- *Laus hie-*  
 cis, vt syrupo de duabus radicibus, de quinque radicibus, *ræ simp.*  
 aqua vel decocto quinque radicum diureticarum, vel præ- *Canthari-*  
 fij. *Cantharides* à quibusdam laudantur in hac, & ascite, sed *des impro-*  
 vitandæ sunt, quia potenter vesicam vlcérant, & hepati mul- *bantur.*  
 tum nocent. Materiam hanc resoluunt, sol æstius incidens  
 in nudum corpus, aut arenæ calefactæ sole, aut igne, fots ex  
 vino, & rebus calidis, suffitus per lapides ignitos ex deco-  
 ctis in vino, foliis lauri, camomillæ, ruta, rore marino, origa-  
 no, salvia, pulegio, & similibus. Balneum salsum, alumino-  
 sum, aut sulphureum, naturale & artificiale mirificè prodest.

Quartò, tollentibus dispositionem hepatis, & causam a- *Alteratio.*  
 nasarcæ, vt obstructionem hepatis, aut duritiem remediis  
 dictis cap. 24. de obstructione hepatis, & contrariis sananti-  
 bus intemperiem frigidam simul, & obstructionem, & cor-  
 roborantibus: vt dialacca, diacurcuma, trochiscis de absin-  
 thio, de rhabarbaro, de eupatorio cum puluere rosatæ no-  
 uellæ, aut diarrhodon Abbatis, si calida intemperies timea-  
 tur. Tympanites curatur quatuor remediorum generibus, *Curatio*  
 primò, victu calido, & sicco flatu resoluente, vt fame, siti, e- *Tympani-*  
 xercitatione, pane biscocto, & cum aniso, & fuga eorum om- *tæ.*  
 nium, quæ flatu gignunt: vt sunt legumina, herbæ frigidæ, *Victus.*  
 & crudæ, pisces, & similia.

Secundò, apparantibus pituitam, vt rhodomelle, & aliis *Præpara-*  
 dictis superius hoc cap. de curatione anasarcæ, quamvis in *tio.*  
 hac specie sit minus necessaria euacuatio, quam in anasarca, *Observa di-*  
 & ascite, in quibus multa est copia humoris, & pauca flatu, *sermen.*



# DE CVRAND. MORB.

in Tympanite verò plus flatus est, & minus humoris.

- Vacuatio.* Tertio, vacuantibus materiam frigidam, vt agarico trochiscato, hiera simp. benedicta & similibus tam per os sumptis, quam per clysterem iniectis. Quidam medicus doctus, & senex curauit pilulis mezereon sacerdotem quendam senem tympanite laborantem. Flatum resoluunt balneum sulphureum, salsum, arena calfacta sole, aut igne: fofus, & suffitus per lapides ignitos, & alia dicta tertio genere remediorum superius hoc capite. Puluis hic optime resoluit flatum: vt *℞.* anisi, anethi, seminis fœniculi, carui, cymini, origani, cinnamomi, gariophyllorum an. *℥.* iiij. sacchari *℥.* iiij. misce, & fiat puluis. Dosis cochlearium vnum ante cibum cum vino, & summo mane. Diagalanga, diamosus, theriaca magna, mithridatum, diatriumpiperon, diacyminum, & similia resoluunt, & euacuant flatum. Sacculi quoque ex sulphure, sale, milio, camomilla, kalendula, origano, pulegio, anthos & similibus, ventri actu calidi admoti dissipant. Cucurbitula magna flamma multa vmbilico affixa valenter resoluit. Hoc cataplasma potentissime discutit flatum multis diebus ventri admotum: *℞.* stercoris vaccini, columbini, & caprini an. p. j. pulueris cymini, carui, ameos, baccarum lauri, origani, rutæ syluestris, & anthos an. *℥.* ss. sapæ, q. s. misce, & fiat cataplasma, adde aquæ vitæ vncias duas.
- Alteratio & corroboratio.* Quarto, & vltimo, tollentibus hepatis affectionem, mali causam per contraria, & corroborantibus hepar, de quibus dictum est superius quarto genere in curatione anasarcae, & de his dicemus in curatione ascitæ.
- Curatio ascitæ.* Ascites curatur quatuor auxiliorum generibus, victu calido, & sicco dicto initio huius capitis. Carnes semper sint faciles coctu, & boni sanguinis, & magis tostæ, quam elixæ.
- Victus.* Secundo, apparantibus humorem quo sum, & corruptum: vt *℞.* syrupi endiuicæ compositi, & de scolopendria an. *℥.* ij. rhodomellis *℥.* iiij. misce. Item *℞.* decocti, vel aquarum absinthij, fœniculi, & capillorum veneris an. *℥.* iiij. misce, parato humore hoc vel simili medicamento. ¶ Tertio, vacuantibus aquas excitâtes hydropem, primò purgatoriis nō valentibus, & nocentibus iecori, vt sero lactis caprini, aut ouini, agarico, myrobalanis citrinis, & kebulis simul, puluere hieræ simplicis, vel hiera simplici, succo, aut puluere brassicæ marinæ (quā vulgus sedanellā, Arabes cachitam vocant) citra molestim purgante aquā, & hepar roborante: quæ duo sunt summe necessaria ad curandum hydropem. Dosis est à *℥.* ij. vsque ad *℥.* 3, quatuor, & ego exhibui drachmas septem frequenter manē
- Duo necessaria.*



manè laboranti hoc genere hydropis, & foeliciter successit. piliquando hic morbus ob sui vehementiam eget valentio- *Laus seda*  
 bus purgantibus, etiam si ab iis iecur lædatur: inter quæ *nella.*  
 Succus radicis ireos dempto sedimento ab omnibus lauda-  
 tur. Dosis à drachmis duabus vsque ad drachmas tres semel *Valenter*  
 hebdomada, dummodò inter has vacuationes valentes ie- *purgantia.*  
 tur corroboretur puluere diarrhodon. Abbatis, vel trochis- *Hepar cor*  
 is de rhabarbaro, vel syrupo de absinthio, vel puluere hepa- *roborantia.*  
 is lupi, vel alimento ex vuis passis, ex auellanis, & ex lima- *Laus pul-*  
 cibis. Hoc succo ireos multi hydropici deplorati ferme sa- *ueris ireos.*  
 nati sunt. *Molestè*

Pilulæ de serapino, de euphorbio, & mezereon potenter *purgantis.*  
 purgant aquam, sed molestè, & violenter, quare iis non nisi  
 raro, & coactè vtendum est. Dosis est ab scrupulis duobus vs-  
 que ad drachmam vnā. Succus quoque cucumeris agre-  
 stis siccatus, quem elaterium vocant, potentissime purgat: &  
 moranium maximè durat, autore Plinio, seruatur enim cen- *Elaterium.*  
 tum annis integer. Sauonarola medicus sua ætate celeberr- *Sauonaro-*  
 mus dabat scrupulum semis huius succi siccati mense Augu- *la experie*  
 sti, & mixti cum speciebus elephanginis reductis in pilulas *ria.*  
 cum succo absinthij, & multos curauit hoc medicamento.  
 Syrupus hic ex decocto radicis cucumeris agrestis est effi-  
 cax in curatione hydropis & ascitæ, & eruditissimus doctor  
 meus Iacobus de Leon Compluti Architielinum illustris *Doctoris*  
 Comitis de Salinas hydropicum confirmatum curauit: *U. de Leo sy-*  
 radicis cucumeris syluestris ꝑ. iiij. decoquatur in libris dua- *rupus exi-*  
 bus aquæ ad dimidium, deinde accipe mellis libras duas, a- *minus.*  
 que libras octo, bulliant per se ad dimidij vsque cõsumptio-  
 nem, cui percolato adde lb. j. decocti radicis cucumeris syl-  
 uestris percolati quoque, & fiat syrupus, addendo in fine  
 pulueris dragagati vnciam vnā, cinnamomi electi drach-  
 mam vnā: Dosis quolibet mane cochlearium vnum. Me- *Galenī me-*  
 dicamentum benè paratum ex cantharidibus in maxima *dicamentis*  
 hydrope, tam ascite, quam anasarca, ex Galeno purgat per  
 vrinam valenter aquosum hunc humorem, sed iis non vtē-  
 dum, nisi cum alia non contulerint.

Valescus tamen de Taranta vir doctissimus & magnæ ex- *Valesci cu-*  
 perientiæ hoc medicamento multos laborantes, & Anasar- *ratio.*  
 ca, & Ascite sanitati restituit. Castigantur cantharides absci-  
 sis capitibus, & pedibus, nō alis (vt quidam malè docent con-  
 tra Hippocratem & Plinium, & veritatem) accipe ergo vnā *Error quo-*  
 cantharidem absque capite & pedibus, quatuor seminum *randam.*  
 frigidorum maiorum mundatorum an. ꝑ. semis sacchari



# DE CVRAND. MORB.

candi violati 3.ij. gumi crassi, vel dragaganti 3.vj. misce, & fiat ad modum pulueris. Dosis est vncia vna summo mane: sed defende vesicam admoendo ei lac caprinum, vel oleum

*Vesica de-* rosatum tepidum: autore enim Actio cap. de dolore capitis  
*fensio.* sexto sermone, cantharides capiti admotæ nocent vesicæ, &

*Vis cãtha-* quod magis incredibile videtur, quidam chirurgus Medio-  
*ridum quã* lanensis bis sanguinis profluuiò correptus fuit per vrinam  
*ta sit.* solum, portando cauterium ex cantharidibus in Byrsa. Tria

*Purgantia* grana alkekengi in puluerem redacta cum vino albo curant  
*per vrinã,* hydropem, vacuando per vrinã. Quæ per vrinam clementer  
*et iecur cor* purgant, & corroborant iecur, sunt diacurcuma, dialacca, &  
*roborãtia.* trochisci de rhabarbaro, hi enim obtinent principatum in

*Historia.* hoc curando morbo, quibus curatus fuit excellentissimus  
Dux mediolanensis Franciscus: Dosis à drachma vna vsque  
ad drachmas duas. Propter illorum amaritudinem fiant pi-

*Altera nō* lulæ cum aqua absinthij. *Iisdem trochiscis curauit ego ma-*  
*minus infi-* gnificam vxorem magnifici Francisci Marci, quæ laborauit  
*gnis.* principio ascite cum febre fermè habituali: cui dedi præ-  
ter hos trochiscos multis diebus lac asinæ, quæ pasceret

*Lac an no-* herbis diureticis, *lac enim non nocet hydropi,* vt multis gra-  
*ceat hydro* uissimis medicis placet, præsertim, si ab ea animante emul-  
*pici.* geatur, quæ pascatur herbis diureticis. Ideoque à quibusdã

*Clysteres* laudatur lac caprarum arabicarum propter pastum. *Clyste-*  
*laudatur.* res acres purgant hanc aquositatem, & flatum. Vacuatio hæc  
*Clyster o-* tutior est aliis purgationibus: quare frequens illorũ vsus est  
*ptimus.* utilis, & necessarius. Hic clyster, vel huic similis est optimus:

℞. furfuris, camomillæ stichados an. p. j. rutæ, & saluix an.  
m. j. hellebori, agarici, & turbit an. 3.ij. carthami 3.ß. roris ma-  
rini, cyclaminis an. m. j. fiat decoctum: de quo percolato ac-  
cipe ℥. j. olei de ruta, & de lilio an. vncias duas, salis drach-

*Pilulæ.* mam vnam 8. misce, & fiat clyster. Pilulæ hæ purgant mate-  
riam hydropis: ℞. cinnamomi, squinanti, cuscutæ, croci, ca-  
lami aromatici, seminis apij, su, prasij, nardi, asari, masti-  
chis, mirrhæ an. 3.ß. serapini, agarici, an. 3.iiij. euphorbij, tur-

*Serum ca-* bit, colocinthidis an. 3. j. rhabarbari 3.iiij. aloes ad pondus o-  
*prinum,* mnium, misce, & cum succo absinthij fiant pilulæ: Dosis qua-  
*maiorana.* libet hebdomada drachma vna. Sex vnciæ feri caprini cum

drachma vna semis pulueris spicæ nardi mane sæpè sumptæ  
purgant clementissime hanc aquositatem. Succus maioranæ  
cum oxymelle, si mane frequenter sumatur, hydropem hanc

*Prasium.* curat, purgando aquositatem. Idem facit succus prasij defic-  
*Coturnix.* catus, & mistus cum vino albo. Idem præstat sanguis cotur-  
nicis: resoluunt ventris aquositatem omnia superius dicta in

resol



resoluendo flatu in tympanite: quamuis valentioribus egeat *De tympanite.*  
 Ascites cum difficilius vacuetur humor, quā flatu posita pa-  
 rilitate. Hoc, aut simile cataplasma est optimum in resoluendo *Topica.*  
 do: ℞. foliorum althææ m. ij. radicum cucumeris sylvestris, *Cataplasma.*  
 & ireos an. ℥. j. ficus siccas numero 20. omnia decoquantur in *mata resolu-*  
 vino albo, & fiat cataplasma: vel ℞. fellis tauri, nitri, an. par- *uentia.*  
 tem vnam, piperis puluerizati, partem semis, cum melle, fiat  
 ad modum cataplasmatum, quod per dimidiæ horæ spatium  
 admoueat vtri, ne vesica, aut vlcera intumescant: vel ℞.  
 stercoreis bubuli, & caprini an. p. j. cineris quercini, & vitis  
 an. p. ℞. salis sulphuris an. ℥. ℞. baccarum lauri, staphisagriae  
 an. ℥. j. ex his decoctis cum vino fiat cataplasma, cui adde vn-  
 guenti Aragon, & marciaton an. vncias duas. Cauteria mul- *Cauteria.*  
 ta ventri sæpe admota non profunda purgāt hanc materiam  
 & his curauit quidam Agareus duos Valentinus nobiles. *Historia.*  
 Idem præstant cauteria tibiis infixa, vt per ea materia vacue-  
 tur, quia illarum vlcera in hydropo difficulter curantur, nisi  
 prius hydrops tollatur. Aliqui scroto fetanum immittūt, vt *Incisio pri-*  
 eo multis diebus, & sensim vacuetur materia. Postremò, si æ- *denter fa-*  
 ger fuerit iuuenis, & fatis robustus, incisione ei extrahatur *Etia.*  
 hæc aquositas, non vna eductione, sed multis & sensim ad vi- *Exemplū.*  
 res conseruandas, præcedente tamen mortis præfagio, ne no-  
 bis ascribatur: nam præfente Sauonarola, & aliis doctissimis  
 medicis Patauij Ioannes Ludouicus vtriusque iuris doctor  
 eximius sexagenarius subita facta incisione in manibus chi-  
 rurgorum interijt. Eodem tempore quædam mulier quin- *Alterum*  
 quaginta annos nata laborauit Ascite sex annis, & ex casu *exemplum*  
 in lapidem fuit vulneratus venter eius, per quod vulnus su- *admiran-*  
 bitò omnis aquositas euacuata fuit, incidit illa quidem in a- *dum.*  
 nimi deliquium, sed post in xenodochio Patauino bonis ali-  
 mentis pristinam recuperauit sanitatem: quæ res digna est  
 admiratione: fiat igitur incisio musculi obliqui dextri ascen-  
 dentis, si primò fuerit hepar affectum, & sinistri si lien: prius  
 cute deorsum reuulsa, vt post incisionem, & aliquam aquæ  
 extractionem locum naturalem repetens foramen obturet,  
 ne aqua affluat largior, vel immisso syphone in hiatum. A-  
 qua autem quotidie bis, aut ter syphonis operculo ablato  
 mittatur, tunc æger roboretur cibis optimis.

Quartò, affectionem hepatis causam mali tollentibus per *Alteratio*  
 contraria & corroborantia hepar, vt puluere diarrhodon. *& corrobo-*  
 Abbatis, hepate lupi, & aliis iam dictis superius. *ratio.*

## De Hydrope.

## CAP. XLIIII.

Schol



## Scholium.

Hydrops  
nomen.

Hydrops  
Symptoma  
est.  
Morbus.



Ydrops omnis. ) Hydrops nomen ex aqua assumpsit : in omnibus enim hydropis speciebus , aquosus generatur humor. Quod in tympanite, in quo id difficile videtur, etiam verum est, quia in eo humor etsi paucus in abdominis regione coaceruatus apparet. Hydrops symptoma est, tumor scilicet præter naturam venis, aut totius corporis sequens aliud symptoma, quod est ætio iecoris deprauata. Morbus, ad quem sequitur, est intemperies frigida iecoris. Hæc vel primam in eo generationem habet, quando à iecoris schirro, aut obstructione fit: aut per consensum ei aduenit, ex affectu lienis, ventriculi, intestinorum, & pulmonis. Hæ enim partes refrigeratæ, per venas frigiditatem transmittunt, venis cavæ aut gibbæ partis iecoris, & inde eius carni. Iecur etiam frigiditatē concipit ex immodica sanguinis per hæmorrhoidas euacuatione, aut suppressione, sicut ex suppressione mēstrui, quorum immoderata euacuatio, nec hydropē, nec cachexiam efficit, ex Galeni sententia, li. de curan. per sang. missionem, c. 19. eo quod euacuatio mēstrua euacuatio secundum naturam fieri solet. Frigida iecoris intemperies in Hydrope, aliquando à causa calida ortum habet : in febribus enim ardentibus (etsi raro) etiam in principio visus est Hydrops. Qui malum signum est, ex eo enim colligimus adeo esse intensum calorem, ut vi-  
Hydrops à iata coctione iecoris, aquosa humilitas in eo, pro sanguine generetur. causa calida. Quod si Lupeius, & alii, sequuti Alexandrum, frigida (quibus hunc da. Hydropem curari aiunt) post febrem concedant, grauius errabunt: non autem si eis vtantur, ut febrem curent. A causis externis etiam potest hy-  
Causæ ex-ternæ hy- drops nasci, potu aquæ frigidæ, aut natatione in ea. Existimo autem aerem dropis. frigidum, hydropem nunquam effecisse, eius enim vis non potest integris viribus ad iecur vsque penetrare, præsertim cum eius tenuitas non sinat ipsum magnam, & perdurantem actionem exercere. Iam cum hydrops, refrigerato iecore fiat, inde pro maiori aut minori refrigeratione, tres hy-  
Prima hy dropis differentiæ ortum habent. Prima dicitur hydrops tympanites, in dropis dif-  
ferentia. qua in iecore exigua est imbecillitas, ita ut chyli maiorem partem, in optimum sanguinem mutet, & alteram, quæ minor est, in aquam: ex qua in cavitare naturali multum flatum eleuant partes, adeo ut in ea multus  
Secunda. flatus, & paucus humor collectus sit. Secunda nominatur Ascites, in qua iecur maiorem habens frigiditatem, et imbecillitatem, quam in prima, ex chylo paucum sanguinem, etsi optimum generat, et simul multam aquam: quæ cum sanguine non est multum permixta, eo quod iecur, ut eam separet, aliquod seruat robur. Hæc aqua per iecoris carnem in cavitatem à peritoneo circumscriptam permeans, eam replet: quod non contingit aquæ ex obstructione renū in venis coaceruata, non quia est paucæ, ut sentit Valles. lib. 5. de loc. affect. cap. 6. sed quia non generatur in iecore, neque in eo moram facit. Tertia differentia hydropis ea est, quam  
Tertia. ana



bus



# DE CVRAND. MORB.

bus cantharides miscentur, tantum ut sint vehiculum. Neque est quod timeamus, totas eas integras assumere, cum Galenum libris simpl. cap. de cantharidibus subscriptorem habeamus.

**Medicamenta** Quartò, tollentibus dispositionem.) Hydrops ut in plurimum ad solet fieri ex obstructione iecoris & lienis: quem post purgationem cum hydropicos, agarico, in eo qui fit ex obstructione iecoris: & cum confectione hameci altero, utere unguentis, capitibus de obstructione iecoris, & lienis descriptis, & hac confectione: ℞. diacurcumæ, & dialaccæ Isac. ana. ʒ. j. trochiscorum de absintio, & de rhabarbaro an. ʒ. ii. conserva capillorum veneris ʒ. j. cum syrupo de bizantiis fiat confectio.

**In ascite** Secundò, apparantibus humorem aquosum.) Ex Gal. 4. a. aqua non cutorum com. 113. humor in ascite aquosus est, & tenuis, non ergo egebit est præparatio: si memor es eorum, quæ primo Scholio docuimus.

**Varia a-** Tertiò, vacuantibus aqua.) Nonnulli, ut educant aquam in hydropicis, utuntur brasicæ marina, quam vulgò soldanellā appellant: eam quæ purgatio. exsiccantes, & ex pulvere assumentes singulis diebus ʒ. j. usque ad ʒ. ii.

**Prima.** ℞. (si vires constant) cum mulsæ & decocto eupatorii. Alii ex eius succo expresso & percolato, ob eius tenacitatem cum melle aut saccharo syrupum parant, cuius ʒ. j. singulis diebus propinare solet. Alii tithimalum

**Secunda.** marinum (quem Dioscorides tithimalum paralyon nominat) exsiccant, & eius pulueris ʒ. j. ℞. uno quoque die, cum mulsæ aut decocto eupatorii exhibent. Alii virosque dictos pulveres permiscunt, addentes propter

**Quarta.** suavitatem, semen anisi, carui, & fœniculi. Quæ omnia etsi euacuent humorem aquosum, nihilominus tamen succus radicis iridis principatum

**Quinta.** hac in parte habet, cui uni debetur desiderata aquæ euacuatio: potenter enim eam educit, minusque prædictis omnibus molestus est ventriculo. Præcedentibus ergo syrupis (si opus fuerit) purgare poteris succo iridis, agarico trochiscato, diaphænicone & aliis. Potionem in hunc modum parare poteris: ℞. succi radicis ireos ʒ. ii. aquæ mulsæ ʒ. ii. misce. Aut ex eodem succo iridis conservam efficere poteris hoc modo: ℞. radicis iridis rectè excorticatæ lib. i. mellis ʒ. xiiii. fiat conserva ea ratione, qua fit caro cydoniorum, quæ in vase vitreo ponatur, commiscendo semen anisi, fœniculi & carui: cuius unum cochlearium singulo mane assumet. Quamvis verum sit in hydrope, humorem esse euacuandum, magis tamen incuratione. tentos esse oportet ad roborandum iecur & lienem: quia ea medicamenta, quæ humorem euacuant, vehementia cum sint, imbecillitatem viscerum augent, atque hæc est causa, ob quam culpa medicorum, plus ad humorem quàm ad iecur respicientium, agroti in peius semper abeant, & miserè moriantur. Curabitur ergo rectè hydrops, sensim euacuantes humorem medicamentis benignis, & simul viscera roborantes: cumque sit morbus longus, longo tempore oportet assumere medicamenta, potissimum ea, quæ a nobis modò describentur. Tria enim sunt, in quibus tota hydropis curatio reposita est, primum mane sumendum est, secundum nocte

**Nota hæc** niculi & carui: cuius unum cochlearium singulo mane assumet. Quamvis verum sit in hydrope, humorem esse euacuandum, magis tamen incuratione. tentos esse oportet ad roborandum iecur & lienem: quia ea medicamenta, quæ humorem euacuant, vehementia cum sint, imbecillitatem viscerum augent, atque hæc est causa, ob quam culpa medicorum, plus ad humorem quàm ad iecur respicientium, agroti in peius semper abeant, & miserè moriantur. Curabitur ergo rectè hydrops, sensim euacuantes humorem medicamentis benignis, & simul viscera roborantes: cumque sit morbus longus, longo tempore oportet assumere medicamenta, potissimum ea, quæ a nobis modò describentur. Tria enim sunt, in quibus tota hydropis curatio reposita est, primum mane sumendum est, secundum nocte



Et tertium est vnguentum, quo regionem ventris inungemus. Me Medicamentum, quod mane assumi debet, parabitur hac ratione. Noctu ex mentu ma asinae, aut in eius defectu, ouis, & in huius defectu, caprae extrahe ne assumē- ser, ita vt in eo clauos numero duos, trochiscorum de eupatorio, dum. capparibus an. 3. s. cum pauco cinnamomo apponas. Hoc serum assumatur, ita vt aeger neque ad prandii horam abstineat a cibo. Hoc medicamentum clemente purgans, deobstruens, & viscera ro- ns. Aduerte tamen praedictos trochiscos de tertio in tertium diem, re esse construendos. Medicamentum noctu assumendum, quatuor Medica- or post caenam in hora qua aeger dormire vult vtile erit: quo tempore mentum recur schirro careat) assumat tria cochlearia, confectionis ab Andro- noctu assis- o descriptae, quae dicitur cyphoides; superbibens 3. vj. vini albi vete- mendum. et medicamentum ad hepar permeet. Istius compositionis laudes le- apud Galenum lib. 8. de compos. medi. sec. locos. Vnguentum hoc est. Vnguen- vnguenti de Althaea 3. ii. olei nardini & absinthii ana. 3. iii. olei lau- tum. 3. j. s. vnguenti aragon. 3. iii. vnguenti marciaton. 3. iiii. misceantur ia, & cum pauca cera fiat vnguentu, quo calido regio ventris inun- ur. Atque hec de curatione istius affectus. Soluū superest, ne cū au- Taxatur e decipiaris, fugere xsum lactis in tympanite propter flatum: in aliis auctor in- o, quia non poterit recte concoqui, & sic acescens intemperiem frigi- lactis exhi- bitione. augebit.

## De lienis obstructione. CAP. XLV.

Ien perinde, ac hepar obstructione quoque laborat, Descriptio. quod bifariam contingit, aut obturato eo meatu, per quē humoris melancholici, qui sanguinis velut anus est, ad splenem fit deriuatio, vt hepar purgetur, & san- is purior reddatur: aut eo, qui eundem humorē ad ventri- Causa. lum eructat. Cause cap. de hepatis obstructione dictae iam Notae. ant. Notae hae sunt. In primis Gal. 5. de loc. affect. cap. 7. solo Galeni pe- dolore cognoscebat hepatis, & splenis affectum nulla audita rnia. ateritorum accidentium enarratione: imò (quod grauius non) non inuestigato viscerum affectu per tactum: hoc tamen tellige cū ab hepatis, vel splenis vitio fit icterus. Si ob- structio in eo meatu fiat, qui crassum, atrūque sanguinem splenem mittit, nullus in splene tumor, aut grauitas sen- tur: cutis tamen color, praesertim faciei nigrior euadit ad- vo, vt ater icterus saepe oriatur impuro scilicet sanguine per corpus fuso. Quod si non huius, sed alterius meatus, qui ad Vtilitas mentriculum atram bilem desert, obstructio infestet, & tu- succi me- mor, & grauitas sinistri hypochondrij adsunt, & ventricu- lancholici- is ea commoda nō sentit, quae eum humorem in ipsum de- in ventricu- mutum sequuntur: hae sunt constructio eius atque corrobo- lū delati. ratio



# DE CVRAND. MORB.

ratio : cuiuscunque tamen meatus obstructio sit, qui sic afficiuntur, timorem, atque tristitiam patiuntur, spiritus præterea difficultatem, & somnos turbulentos habent, & hepar per consensum iis quam primum læditur, vnde in aquam intercutem sæpe incidunt, præsertim si lien induratus fuerit consentiente iecore, vt docet Gal. 6. de loc. affect. cap. 1.

*Curatio ob* Lienis obstructio curatur quinque remediorum generibus, quemadmodum hepatis obstructio, sed valentioribus, *fructuonis.* propter maiorem distantiam, & partis ignobilitatem. *Indicatio* Consideranda sunt ergo, quæ diximus cap. 42. in 4. tamen genere *ex natura* remediorum præcedenti fortu ex aceto, tamarisco, & ceterac *partis.* simul decoctis bis in die ventriculo vacuo vngatur lien hoc *Topica.* vnguento, aut huic simili: ℞. oleorum amygdalarum amararum, & de capparibus an. ʒ. ij. armoniaci dissoluti in aceto *Fomētum.* ʒ. iij. vnguenti Aragon, & dialthææ compositæ an. ʒ. ʒ. cera. *Vnguentum.* ʒ. iij. misce, & fiat vnguentum. Scirrhus lienis curatur quinque remediorum generibus, primo, victu tenuante, & mediocriter calido, ne parte tenuiori resoluta augeatur durities. Sint ergo cibi boni succi, & faciles concoctu, & tenuis substantiæ, & humidi, vt iura pingua cum radice petroselinæ vel fœniculi, vel foliis raphani, & similibus.

*Præparatio.* Secundò, apparantibus materiam terrestrem hæc aut simili mixtura: ℞. syrupi de scolopendria ʒ. iij. syrupi buglossæ, & rhodomellis an. ʒ. ij. misce. Item ℞. aquarum aut decoctionis buglossæ, capilli Veneris, ceterac, & tamarisci an. ʒ. iij. misce.

*Purgatio.* Tertiò, vacuantibus hanc materiam melancholicam, hoc *Potus.* aut simili potu: ℞. confectionis diasenæ ʒ. ʒ. confectionis medicaminis hamec ʒ. iij. agarici trochiscati ʒ. j. syrupi buglossæ ʒ. j. aquæ borraginis. q. s. misce, vel si magis amat pilulas: ℞. pilularum indarum, & de fumo terræ an. ʒ. ʒ. diagridij ʒ. iij. cum aqua buglossæ fiant pilulæ septem.

*Mollientia.* Quartò, curantibus duritiem internis, & externis mollientibus: vt ℞. caricas numero xx. vuarum passarum sine granis p. j. foliorum maluarum, & althææ an. m. j. seminis lini, & fœnu-græci an. p. fiat decoctum in libris sex aquæ ad dimidium, de quo percolato accipe ℞. ij. ʒ. & cum ℞. j. mellis

*Sumenda.* fiat ad modum syrupi non perfecte decocti. Adde syrupi de scolopendria ʒ. vj. Dosis quolibet mane vnciæ quinque. Lien bis ter in die vngatur hoc, vel simili vnguento: ℞. olei sesamini, & amygdalarum dulcium an. ʒ. j. olei de capparibus ʒ. ʒ. axungie gallinæ, & anatis, medullæ crurum vituli, an. ʒ. ij. ʒ. dialthææ simplicis & hyssopi humidæ an. ʒ. iij. armoniaci

*Curatio.* dissol



diffoluti in aceto 3. ij. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vn- *Fomētum.*  
uentum. ante tamen vnctionem semper lien hoc vel simili  
fotu præmuniatur: ℞. caricarum vuarum passarum sine gra-  
uis, seminis lini, & fœnugræci an. p. j. radice althææ, & ta-  
marisci an. 3. j. ℞. aceti albi lb. iij. fiat decoctum ad medietatem.  
Lien hoc aut simile emplastrum imponatur: ℞. em- *Empla-*  
plastri de meliloto, & filij Zachariæ loco ceræ quod sufficit *strum.*  
extendatur super alutam ad formam linguæ bubulæ, adde  
rmoniæ diffoluti in aceto 3. iij. pulueris radice ireos 3. j. *Corrobo-*  
Quintò, corroborantibus lienem, vt trochiscis de rhabar *rancia.*  
paro, & de capparibus simul, & puluere diarrhodon. Abba-  
is cum syrupo de scolopendria, & hoc aut simili fotu: ℞. ra- *Fotus.*  
licis scolopendriæ. m. ij. radice cappar. p. j. rosarum. m. j.  
aceti calibeati lb. ij. fiat decoctum ad medietatem.

## De Lienis obstructione. CAP. XLV.

*Scholium.*

**L**ien perinde. In toto hoc capite solum est quod addas, san-  
guinis missionem ( cuius auctor nullam fecit mentionem ) vs  
reuellas ab obstructione sanguinem prauum, nempe melan-  
cholicum. Quod si non fuerit melancholicus, à sanguinis missione absti-  
nebis.

## De suppressione vrinæ. CAP. XLVI.

**S**uppressionem vrinæ Græci ischuriam nominant, *Descriptio.*  
ea sit, quoties lotium in totum supprimitur, ita vt  
eo egrotantes nihil reddant. Hæc sit nonnunquam *Causæ.*  
propter vesicæ imbecillitatem, cum id, quod in ipsa contine-  
tur comprehendere non potest, ita, vt exprimat. Interdum  
etiam obstructo inferiori meatu à crassis humoribus, aut ab  
impacto lapide, aut à pure, aut à caruncula, vel callo ibi ge-  
nito, aut à sanguinis grumo. Aliquando accidit ab inflamma-  
tione, aut aliquo alio huiusmodi tumore præter naturam.  
Quorum occasione vel angustior redditur meatus, aut in to-  
tū obstruitur. Propter obtusum quoq; vesicæ sensum suppres-  
sam vrinā aliquando vidimus, & Gal. de quodam scribit, cui  
torpente vesicæ sensu ob male affectos nervos vrina fuerat  
cohibita. Accidit & sanis sæpe, vt ait Aetius, vrinā ipsorum  
cohiberi, aut ob negotiorum importunitatem, aut in con-  
cionibus, aut foro iudiciario, aut somnis, si diutius cōtinue-  
rint lotium. Hactenus de causis, nunc de notis agamus. Si ab  
imbec



*Notæ ex imbecillitate.* imbecillitate vesicæ vrina supprimatur, frigida eius intemperiem considerare oportet, & num ipsa manu compressa urinam reddat: si enim hoc contigerit, & insuper eam intemperie frigida laborare ex propriis notis coniicimus, argumentum certissimum habebimus suppressionis urinæ causam vesicæ imbecillitatem extitisse. Si obstructus inferior meatus sit à glutinosis humoribus, ante actam vitam disquiremus, num in otio educatus sit, (vt inquit Galenus) qui sic affectus est, multis cibis crassis viscososq; humores generare valentibus fuerit vsus. Si à lapide, notas ex sequenti capite desumemus. Si à pure, inuestigabimus per proprias notas num in renibus, vel in parte aliqua renibus superiori abscessus aliquis fuerit, quo abrupto pus in renes, & vesicā fuerit transmissum. Præterea num vesica malo aliquo laborauerit, ex quo ea puris generatio potuerit prouenire. Si à caruncula, aut callo genito, ex præcedentibus vlcere notis colligitur. Si à sanguine in grumum concreto, præcessit sanguinis per eam partem excretio. Atque in huiusmodi coniecturis maximus est æneæ fistulæ vsus, siue lapidis interpositio, siue glutinosorum humorum, siue carunculæ, aut grumosi sanguinis obstructus meatus fuerit, ex eo quod traiecto cathetere (sic enim ænea fistula Græcis appellatur) mingitur sæpe obstruentis rei vestigia apparent. Si oborta inflammatio, aut tumor aliquis meatum urinæ angustiores reddat, aut omnino obstruat, vt in eo accidit, qui vulneratus in ea parte, quæ femen appellatur, (est autem spatium anum, & penem intercedens, Græci perineon, dicunt) urinæ passus est suppressionem, vt refert Gal. i. de loc. affect. cap. i. notæ facillè patent. Reliquas causas ex ægrotantis sermone discas.

*Curatio* Si ab inflammatione renum, vel viarum urinæ fiat, curatur primò, victu tenui, & simili victui dicto cap. 41. de curatione inflammationis hepatis.

*Suppressione urinæ ex inflammatione.* Secundò, auertentibus per sanguinis missionem ex venis tibiarum, aut pedum autore Hippocrate aph. 36. sexti libri, & 48. septimi. Confirmat id Galenus comment. 36. sexti libri aph. quamuis in libello de curandi ratione per sanguinis missionem doceat, posse in morbis renum tam venas brachiorum, quàm tibiarum secari, licet Arabes, & plerique alij nõ contemnendi medici tam in initio inflammationis renum, quàm vesicæ primò secant venas brachiorum, deinde tibiarum, si æger sit multo sanguine repletus: ne prius sectis venis pedum trahatur ad infernas partes à toto, augeaturque inflammatio.

Tert



Tertiò, vacuantibus bilem, vt rhabarbaro, cassia fistula, *Purgatio.*  
 sina, tamarindis, & similibus: vt ℥. medullæ cassiæ recens  
 extractæ 3. vj. infusionis 3. iij. rhabarbari in aqua endiuia  
 per noctem bene factæ, syrupi violarum 3. j. aquæ buglossæ, q.  
 misce, & fiat potus.

Quartò, parti affectæ sunt sæpe admouenda non repel- *Topica me-*  
 lita stiptica, ne claudantur meatus: sed temperate frigida, *diocriter*  
 sunt lac caprinum, ouinum, oleum rosatum, & similia. *frigida.*

Vltimò, digerentibus, & resoluentibus, vt oleo camomil- *Resolutio.*  
 l, de semine lini, & decocto radicis althææ, & similibus, de  
 quibus actum est cap. 41.

Si sola intemperie fiat, curatur contrariis alterantibus. Si *Sublatio*  
 vesicæ imbecillitate, corroborantibus, vt fotu vini rubri, & *aliorum*  
 nilium. Si à lapide renum, aut vesicæ, per illorum abscissio *causarum.*  
 nam, de qua capite sequenti loquemur. Si à callo genito in

vis vrinariis, curatur per recisionem calli, per medicamen-  
 tem temperatè corrodentia imposita callo, seu carni additæ,  
 undela cerea, vel tenui ligno petroselini: hæc tamen à pru-  
 denti chirurgo sunt experta, eligendæque ne vlcus fiat in viis

vrinariis. Quidam Lusitanus Romæ nostris tēporibus mul- *Historia*  
 tis curauit laborantes hac vrinæ difficultate: & inter alios *Valenti-*  
 Valentia curati sunt perfectè nobilis Gaspar Aguilar, & fi- *na.*

nis magnifici Ximen Peres de Pertusa. Si fiat à grumis san- *Curatio se*  
 guinis, vel à pure implète vias vrinarias, curatur primo san- *fiat à gru-*  
 guinis missione, si fuerit æger sanguineus, per sectionem ba- *mis, aut à*  
 micæ dextræ, deinde, si opus fuerit, purgatione. Postea mol- *pure.*

lientibus, & aperientibus vias vrinarias, vt balneis fotibus,  
 aquentis, & cataplasmaris, quæ dicemus capite sequenti.

Vltimò vero, curatur dissoluentibus, & vacuantibus gru-  
 sos sanguinis medicamentis necessariis, vt theriaca magna,  
 ut mithridato à drachma semis vsque ad 3. j. cum 3. ij. aquæ  
 rubæ tinctorum, vel milij solis, vel ℥. coaguli hœdi 3. ss. a- *Si à pitui-*  
 quæ quinque radicum 3. v. syrupi capillorum veneris 3. j. mi- *ta.*

ta, & fiat potus. Si fiat à pituita crassa obstruente vias vri-  
 narias, curatur, primò, victu calido, attenuante, & aperien- *Victus.*  
 te, de quo sequenti capite loquemur.

Secundo, apparantibus materiam frigidam breui tempo- *Præpara-*  
 re propter necessitatem, quamuis pituita egeat per se longa, *tio brevis.*  
 magna concoctione: vt ℥. rhodomellis 3. vj. decocti capil-  
 lorum veneris, vel fœniculi 3. ix. misce hoc, vel simili medi-  
 camento. sumpto primo die summo mane, meridie, & duo-  
 decima hora noctis.

Tertiò, vacuantibus medicamentis phlegmagogis, vt 3. j. *Purgatio.*  
 r hier



# DE CVRAND. MORB.

- Clyster.** hieræ simplicis, vel drachma vna semis agarici trochiscatis, vel saltem vacuetur hoc, aut simili clystere: ℥. foliorum vtriusque maluæ, & parietariæ an. m. j. furfuris, camomillæ, minimis lini, fœnugræci an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ꝑ. ix. olei sesamini, & amygdalarum dulcium an. ꝑ. j. s. butyri recentis, & benedictæ an. ꝑ. j. salis ꝑ. j. misce, & fiat clyster. Vacuatio, quæ fit per clysteres, est tutior in his, & si-  
**Quæ va-** milibus affectionibus præter naturam, tutissima autem, quæ  
**cuatio sit** turissima, fit per suppositoria, quæ minorem extensionem in intestinis  
**trissima,** efficiunt, minusque comprimunt vias vrinarias.  
**Et suavis-**  
**sima.** Quarto, prouocantibus vrinam primum mitioribus, v-  
**Vrina pro** compressione imi ventris, glâde acri ex sale, aut felle, aut frigiditate  
**uocatio.** ctione peritonæi, & pudendi prope ignem, pediculo immisso in primam virilis membri partem qui motu titillet, & ir-  
ritat expultricem facultatem sopitam, aut ægri iacentis su-  
pra dorsum tibiæ, & pedes in altum sâpe, & valide mouean-  
**Vnguen-** tur: quæ si non sufficiant, pecten illinatur oleo scorpionum  
**tum.** & lilij cû pinguedine cuniculi, vel imponatur parietaria fri-  
xa, vel apium, vel hoc vnguentum: ℥. olei scorpionum ꝑ. ij.  
olei sesamini, & axungie cuniculi an. ꝑ. j. croci puluerizati ꝑ.  
**Fotus.** j. ceræ q. s. misce, & fiat vnguentum. Valentior est fotus imi  
ventris ex spongia cum camomilla, radice althææ, semine  
lini, fœnugræco, origano, pulegio, abrotano, mentastro &  
similibus: & infusus ex decocto prædictorum, & similium  
**Spuma sa** Spuma saponis vmbilico adnota vrinam prouocat, sed va-  
**ponis.** valentiùs Galerius vetus (quo vtuntur fullones, genibus, im-  
**Galerius** posito ad lanam oleo imbutam apparandam) cum aceto a-  
**fullonum.** cri, calido, vmbilico admotus. Oleum amygdalarum dulcium  
vel sesaminum cum saccharo vrinam prouocat, meatibusq; red-  
**Quæ prio-** dit molliores, & ideò prius his vtendum, vel hoc: ℥. decoctio-  
**ra esse de-** maluæ syluestris ꝑ. iij. butyri recentis, & mellis an. ꝑ. j. misce  
**beant.** & fiat potus: vel ℥. pulueris seminis dauci ꝑ. s. aquæ mili-  
**Potus va-** solis ꝑ. ij. syrupi de duabus radicibus ꝑ. j. misce, & fiat potus  
**rii.** vel ℥. pulueris corticū ouorum, è quibus pulli egressi sunt  
ꝑ. j. sacchari candi ꝑ. ij. vini albi optimi ꝑ. ij. misce, & fiat po-  
**A tēpore** tus, vel valentiùs: ℥. duo capita alliorum vini albi optimi  
**Et etate** ꝑ. vj. decoquantur ad medietatem: cui percolato adde theria-  
**coindica-** cæ magnæ ꝑ. j. In hyeme & sene tutior est hic potus, vel: ℥.  
**zio.** corticum limacum parū adustarum ꝑ. ij. decocti capillorum  
**Laus po-** Veneris ꝑ. iij. vini albi ꝑ. j. misce, & fiat potus. Hoc potu mul-  
**tus.** ti ex suppressione vrinæ morti propinqui sunt ad pristinam  
sanitatem restituti. Vinum alkekengi valenter, & certissimè  
vrinam prouocat. Vide historiam ab Arnaldo de Villanouaro  
tradit



traditam, qua demonstrat Cardinalem quendam affectum *Historia*  
 suppressione vrinæ quatuor diebus hoc vino fuisse curatum *eximia*.  
 à medico quodam indocto, & nullius fere nominis, qui ex  
 paupere diues factus est hac sola curatione. Fiat vinum al- *Vini alke*  
 kekengi hoc modo, accipe poma rubra (quæ ab antiquis di- *kengi con-*  
 cuntur solanum rubeum) quo tempore vinum fit, quum hæc *fectio*.  
 poma rubescunt, vt cerasa, & sunt plena granis paruis, simi-  
 libus granis ficuum, habentque tum saporem bonum cum  
 amaritudine quadam, conseruanturque per annum filo ap-  
 pensa: & vbi hoc caremus vino, accipe quinque, vel septem  
 poma in puluerem redacta, & vino albo parum decoquan-  
 tur: quod percolatum bibat æger. Vrinam quoque prouocat  
 calamus gallinæ oleo tinctus, si meatui penis imponatur, vel  
 cādela cerea, vel algalia argentea a viro experto, (quam ca- *Admoni-*  
 theterem appellant Græci) vt si a vesica ad penis extrema- *tio*.  
 tem sit aliquid impediens exitum vrinæ, facilius in vesicam  
 redeat, sed hoc non est faciendum nisi a viro docto, & in hoc  
 multum exercitato, ne viæ vrinariæ exulcerentur, vt sæpe fit.

## De vrinæ suppressione. CAP. XLVI.

## Scholium.

**S**uppressionem vrinæ.) Vesica pars est instrumentaria,  
 quæ vrinam seruat, quo ad molestiam sentiat ab eius mul-  
 titudine, aut acrimonia, tunc enim eam excernit. Vrinæ  
 excretio propria actio est vesicæ, in qua tria symptomata  
 solent accidere, cum non sit actio, cum male sit, & cum deprauatæ.  
 Quando non sit actio, dicitur à Græcis hoc symptoma ischuria, à Latinis Ischuria  
 verò vrinæ suppressio, de qua disputat auctor præsentis capite. Ischu- duobus mo-  
 ria sumitur improprie, aut proprie. Improprie pro vrinæ retentione in dis sumi-  
 qualibet parte sit affectus: hac ratione, obstructio in renibus à lapide tur-  
 arenulis, pure, aut humore crasso facta, vrinæ transitu impediens, is-  
 churia dicitur. Eā cognosces ex eo, quod in regione pubis nullus in ve-  
 fica apparet tumor, quia vacua est: tū quia nullū est irritamentū ad  
 vrinā excernendā. De hac ischuria nō agimus modò, sed de illa, quæ Ischuriæ  
 proprie sumitur, in qua vrina in vesica cōtenta nō potest excerni. Cui proprie  
 se illius ischuriæ ex Gal. lib. 3. de caus. symp. c. 2. duæ sunt, imbecilli-  
 tas vesicæ, & angustia meatus, per quæ vrina excernitur. Imbecillitas  
 vesicæ ab intemperie potissimum frigida ortū habet. Angustia meatus  
 duæ sunt causæ, præclusio, et obstructio. Præclusio etiā duas habet cau-  
 sas. Prima est tumor præter naturā, qui in ceruice vesicæ ortus, ipsam  
 cogit cōcidere. Secunda est siccitas. Obstructionis quinque sunt causæ.  
 Prima est grūmus sanguinis: Secunda pus: Tertia lapis, ad quā reuo-  
 cari possunt arenulæ, & crassa excrementa, quæ communem habent



## DE CVRAND. MORB.

materiam. Quarta corpulentū tuberculum ceruicis vesicæ, aut meatu  
vrinarij, ex vlcere non rectè curato ortum: quod nostris temporibus e  
morbo gallico, frequenter accidere videmus. Quinta, callus in eisdem  
partibus. Qua ratione hæc distinguantur, & curentur, & quod præter  
dictas ischuriae causas, soleant esse aliæ duæ, nempe sensus exiguus ve  
sicæ, & immodica quantitas vrinæ in præsentī capite habes ab aucto  
re rectè tradita. Dysuria, id est vrinæ difficultas ab eisdem causis fit,  
quibus ischuria, sed remissioribus.

**Sanguinis** Secundo, auertentibus.) In sanguinis missione, quæ in renibus  
missis in inflammatis exercetur, hac ratione distinguens, habebis conciliatos G  
renibus leni locos. Si inflammatio (hoc est tumor præter naturam) sit recens  
inflamma cum in parte paucus sanguis sit collectus, & multus fluat, sanguinem  
tis. mitte ex basilica, maiorem enim ex ea facies reuulsionem. Si verò si  
inflamatio inueterata, cum in parte multus sit iam coaceruatus hu  
mor, & paucus fluat: tunc ex pede sanguis missus iuuabit, multo hu  
more ex parte affecta euacuato. Quod quamuis ita sit, Galenus ta  
men in methodo semper, ex pede secat venam.

**Curatio** Tertiò, vacuantibus bilem.) Consuevit auctor semper, in qua  
ischurie libet inflammatione purgare bilem: nescio certè qua ratione ductus.

**ab humo-** Si fiat à pituita crassa.) Si ischuria ab humore crasso originem  
**re crasso** ducat: primo sanguinem mittes propter venarum affectum, hac e  
**factæ.** nim ratione minuemus humorem obstruentem, ne fluat ad renes. De  
inde si occasio locum det præparabimus humorem, cum oximelle, rho  
domelle, & aliis. Postea eum purgabimus cum pilulis paratis ex 3

**An sit pur** j. benedictæ cum aqua fœniculi. Dices, nōne purgabis helleboro, ea  
**gandum** ratione, qua docet Galenus lib. 6. epyd. par. I. sent. 6. Respondeo, non  
**helleboro.** licet, quia ex eodem Galeno in hellebori assumptione debet fieri ma  
gna corporis preparatio, qualis non poterit exerceri in ischuria ob  
urgentiam symptomatis: bene tamen in eo, quem dolorem grauem  
in renibus per multos dies perdurātem, pati videmus. Post purgatio  
nem balnea, in sequenti capite descripta, vtilia erunt. Quæ si non

**Balnea.** profint, in balneo medicamentū ex cantharidibus constitutum exhi  
**Medica-** bebis. ʒ. cantharidum præparatarum ʒ. vii. (quantitatem pro vir  
**mentum** tutis robore, aut imbecillitate augens, aut minuens) cum aqua pa  
**canthari-** stinacæ fiat potio.  
**dibus pa-**  
**ratum.**

Quartò, prouocantibus vrinam.) Optima aliqua medicamen  
ta hoc in loco proponuntur, solum aduerte, nullum ex his imponen  
dum vmbilico, sed pubi, aut perineo. Medicamentum etiam ex allio  
rum capitibus, tãquam ingratum omittatur, sicut illud, quod ex cor  
ticibus ouorum, tanquam inutile.

### De renum calculo, & vesicæ.

#### CAPVT XLVII.

Ren



**R**enum & vesicæ calculi duplex est causa, altera, *ut Cause.*  
 materia: altera ut efficiens. Materia, est humor visci *Materia.*  
 dus, & pituitosus in ventriculo ob assiduas crudita-  
 tes genitus. Efficiens tum renū, tum vesicæ calor materiam *Efficiens.*  
 adatiāns, & in lapidem indurans. Differunt inuicem hi lapi- *Discrimē.*  
 des: nam renum minores sunt, friabiliores, asperiores, & ru-  
 bri: vesicæ contra: & quantum ad colorem attinet, albi sunt,  
 aut paulū ad cineris colorem declinant. Præterea illis pro-  
 uectæ ætatis homines sæpius quam pueri: his pueri, quam *Puerorū*  
 ætate prouecti frequentius corripuntur. Voraces enim sunt *natura.*  
 pueri, cibisque largiū vtuntur, & nulla temporis, ordinis, &  
 illos sumēdi habita ratione: quiescere a cibo ingesto nō pos-  
 sunt perpetuōq; mouētur: vnde crudum alimentū per venas  
 & vniuersum corpus distribuitur. Mollia verò cum sint illo-  
 rum corpuscula, & facile cedentia obturari renes non pa-  
 tiuntur. Crassissimæ igitur vrinæ in vesicæ amplitudinē nul-  
 lo impediēte recipiuntur, ibiq; velut in vino fæx, & in aqua  
 limus, crassum illarum sedimentum subsistit, & a caliditate,  
 quæ multa in pueris est, cogitur desiccātū, & lapidescit: quo  
 fit, vt frequentius in vesicæ lapidem pueri incidant, quem *Notæ.*  
 cum patiuntur, vrinas habent aquæ similes, in quibus sub- *Sabulum.*  
 sident sabulosa quædam: ipsi insuper assidue pudendum scal- *Scalptio.*  
 punt, idque vel laxum, vel intentum præter rationem. Vri- *Suppres-*  
 na repente aut in totum supprimitur, aut non nisi guttatim *sio.*  
 redditur. Sæpe etiam comitatur ani procidentia: certius ta- *Prociden-*  
 men nullum signum est, quàm digitus immissus in rectum *tia ani.*  
 intestinum: sic enim num lapis vesicam infestet, & quantus *Notæ cal-*  
 ille sit, detegitur. Renum calculus sic deprehenditur: renem *culorum*  
 grauis dolor, & infixi aculei instar, nullo foris tumore appa- *renum.*  
 rente infestat. Spina ægre, inflecti potest, crus stupet: quod è  
 directo laboranti reni respondet. Vomitus præterea, & cibi  
 fastidium adest. Vrina inchoante obturatione pauca, & a-  
 quosa mingitur, post in totū supprimitur. Aluus cū iam ni-  
 hil excernat, ad egerendum subinde mouetur. Calculo e re-  
 nibus emoto vrina subsidentiam arenosam habet, & sanguis  
 plerūque excernitur, ob violentiam videlicet asperioris cal-  
 culi excussi. Porro cum dolores coli sæpe cum nephritide  
 confundantur, non ab re fuerit signa quibus inuicem distin- *Distinctio*  
 guantur, proponere: sunt autem, quæ sequuntur. Renum do- *doloris co-*  
 lor, breue occupans spatium, vno loco innititur immobilis, *lici & re-*  
 aut saltem per vteretres decliuis ad vesicam protenditur: co- *num.*  
 licus verò magna apprehendit sedem, hac illac reuoluitur, *Differunt*  
 & ab vno latere incipiens in alterum fertur, dolore interim *loco.*



# DE EVRAND. MORB.

ventriculo per transitum infestato. Præterea colicus affectus a cibo intenditur, nephritis remittitur. Denique in colico dolore vehemētiore est, ac magis frequens & vomitus, & nausea: per vomitū verò excreta tum biliosa, tum pituitosa sunt, quibus assumpti cibi aliquid admixtum videtur. Sunt & alia signa, sed breuitati studentibus hæc sufficiant.

*Curatio.*

*Victus.*

*Quæ no-  
ceant.*

Lapis in renibus, & vesica gigni prohibetur: primò fugiendū eorum, quæ augment pituitam in corpore, calculi scilicet materiam: qualia sunt, alimenta frigida, crassa, lenta, & difficultia concoctu, vt caseus, præsertim antiquus, salsus, panis azimus, animalium partes pingues, & nervosæ: vt sunt intestina, ventriculus, cor, & similes partes, aues aquaticæ, fures, bos, lepus, hircus, pisces, præsertim grandiores, legumina, demptis ciceribus: herbarum frigida, crudæ, & cibus largior, motus a cibo somnus, Venus, labor, & balneum, & animi perturbationes, vt ira, tristitia, timor, & similes, quæ omni temporis nocent: sumendi ergo sunt cibi parcius, quam pro appetentia, bonique sint succi, & faciles concoctu, quales sunt pullus gallinaceus, gallina, motacilla, quæ dicitur à quibusdā canibus da tremula, coturnix, perdix, hœdus, carnes arietinæ præsertim in Hispania, & similes. Potus sit vinum album, aqua liquiritiæ bene dilutū, vel aqua cinnamomi, vel aqua solis optimi fluij, aut fontis, vel pluuiæ percolata lapide Balneario, vel saltem sine arena, & terrestri residentia.

*Remissio.*

*Clyster leni-  
ens.*

*Cassia.*

*Catholico.*

*Terebin-*

*rhina.*

*Pilula.*

Secundò, pituitam genitam nobis praua victus ratione ventibus (ne ad renes ruat) retrahentibus, & auertentibus vniuersis iniecto bis in hebdomada clystere hoc leniente, vel simili: ʒ. decocti maluarum, radice althææ, seminis lini, & fœnugræci ci lb. j. butyri recentis, & benedictæ an. ʒ. j. olei sesamini, & camomille an. ʒ. ij. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster. vel ʒ. j. medullæ cassiæ fistularis sumpta in hebdomada, vel ʒ. j. diacatholicon, semel in hebdomada sumpta, vel terebinthina bene lota aqua capilli veneris, vel maluæ, & postea cū saccharo mixta: hæc enim ventriculū, intestina, renes, & vesicam purgant sine alicuius partis detrimento. Vel pilula vna elephangina aut ex hiera sumpta singulis diebus, vel alternis sumpta.

*Diuretica*

*pituitosam  
materiam  
expellētia*

Tertiò, pituitosam materiam, si viis vrinariis hæsit, ne in renibus, aut vesica lapidescat, expellemus vreticis, vt ʒ. vij. decocti maluæ syluestris cum ʒ. j. sacchari candi, vel ʒ. v. decocti cicerum, & liquiritiæ, aut ʒ. vij. feri caprini, decoctionis liquiritiæ cum ʒ. j. sacchari candi, vel ʒ. viij. iuris galli gallinacei decrepiti decoctionis liquiritiæ, maluarum & capilli veneris, seminis lini, & fœnugræci.

Quartus



Quartò, temperamus calorem harum partium, calculi *Alteratio*  
causam effectricem emulsione quatuor seminum frigido-  
rum maiorum, syrupis violato, nenupharino summo mane  
sumptis, oleo violato tepido renibus, & vesicæ sæpe admo-  
to, lacte caprino, vnguento santalato, & similibus: vitamus  
tamen astringentia, ne materia calculi retineatur, sæpe, præ- *Expende.*  
sertim æstate lumbos aeri aperimus, pelles, plumas, cætera-  
que, calorifica contingere lumbos prohibemus.

Calculus concretus in renibus, si dolorem efficiat vbicun- *De cura-*  
que fuerit, sed potissimum in vreteribus expellentibus cura- *tione calcu-*  
tur, frangentibus scilicet lapidem, lubricantibus, aperienti- *li renum.*  
bus, dilatantibus, & vrinam prouocantibus: prius tamen ob- *Sanguinis*  
seruare oportet necessariam esse corporis euacuationem an- *missio.*  
te vretica, & lapidem frangentia medicamenta, siue per san- *Vomitur.*  
guinis missionem, si dolor fuerit magnus, æger carnosus, ne *Clyster.*  
partes dolentes inflammentur, siue per vomitum, si ventri-  
culus abundauerit cruditatibus, siue per clysteres, si intesti-  
na, & meatus propinqui, siue per alia medicamenta pur-  
gantia, si fuerit his opus, ne trahantur excrementa à ven-  
triculo, vel aliis partibus ad vias vrinarias, & ibi augeatur  
dolor, vel vrina omnino supprimatur.

Secundò, considerandum satis est, tutiorem esse purgatio- *Clyster po-*  
nem, quæ fit per clysterem lenientem, & parum acrem, ea *tioni ante*  
quæ fit per potionem purgantem, seu pilulas præsertim, si sit *ponendus.*  
paucus clyster, ne suo pondere extendens comprimat vias *Cur potio*  
vrinarias, dolorémque in ipsis augeat: quia medicamentis non pro- *pur-*  
purgantibus, præsertim valentibus moti humores per cor- *betur.*  
pus à partibus dolentibus attraherentur. Nonnulli hanc e- *Opinio non*  
uacuationem per suppositoria, seu glandes faciendam esse *nullorum.*  
tutiùs censent, quos ego non omni ex parte laudo. *Dolor in*

Tertiò, sciendum est, necessariam esse ante lapidis fra- *primis se-*  
ctionem doloris curationem omni auxiliorum genere. po- *dandus.*  
tionibus videlicet, clysteribus exiguae quantitatis, fotibus,  
vnguentis, cataplasmatibus, & balneis, vt hoc, aut simili po-  
tu: ℞. decocti radicis althææ, foliorum maluæ, & seminis li- *Potus.*  
ni ʒ. ij. sacchari ʒ. j. misce, & fiat potus: vel ℞. olei amygdala-  
rum dulcium recentis ʒ. iij. sacchari ʒ. j. misce: vel ℞. de-  
cocti camomillæ, & radicis althææ ʒ. vj. sacchari ʒ. ij. misce,  
& fiat potus. Hic vel similis clyster dolorem harum par- *Clyster.*  
tium curat, intestina purgat, ac vtramque viam lenit: ℞. pa-  
rietariæ, foliorum maluarum, bismaluæ ana. m. j. semi-  
nis lini, fœnugræci, & camomillæ ana p. j. fiat decoctum,  
de quo percolato accipe ʒ. vj. olei sesamini, & de semine lini



*Forus.*

an. 3. ij. benedictæ, & butyri recentis an. 3. j. salis 3. j. misce, & fiat clyster. Dolor quoque curatur hoc, aut simili foru ex decocto seminis lini, fœnugræci, camomillæ, meliloti, radicis althææ, maluæ, parietariæ, & similibus. Inde facit hoc, aut simile vnguentum sæpe renibus & vesicæ, & viis vrinariis ad-

*Vnguentum.*

motum: ℞. olei scorpionum sesamini, & camomillæ an. 3. j. axungia cuniculi 3. ij. mucilaginis seminis lini, & fœnugræci, & pulueris croci an. 3. j. ceræ quod sat est, misce, & fiat vnguentum. Vel admoueatur hoc, aut simile cataplasma bis in-

*Cataplasma.*

die renibus, & vesicæ: ℞. foliorum parietariæ, senationum, apij, & herbæ medicæ, hoc est alfalfa ana m. j. decoquantur omnia, deinde cum oleis scorpionum, & de semine lini sufficientibus fiat cataplasma, addendo farinæ camomillæ, fœnugræci, & de semine lini, an. 3. s. axungia cuniculi, vituli, & gallinæ an. 3. ij. croci puluerizati 3. ij. Optimum quoque est in hoc genere remediorum sæpe admoovere renibus, aut vesicæ parietariam, vel herbam medicam diuisam in partes paruas, & parum cum vino albo decoctam, vel rorem marinum cum cineribus calidis, & pauco vino, quod à nostris fœ-

*Tabalet.*

minis dicitur tabalet. Tortella ex ouis v. aut vj. cum aqua

*Tortella.*

nasæ benè permixtis, & postea frixa cum cepæ albo diuiso

*Inseffus in balneo.*

in partes minimas, & cum pinguedine porci, & oleo scorpionum iuuat multum. Inseffus vsque ad vmbilicum in balneo per semihoram ex decocto radicis althææ, seminis lini,

fœnugræci, parietariæ, camomillæ, ficuum v. radicum diure-

ticarum, foliorum alliorum & caparum, capilli veneris, li-

quiritiæ, & similibus. Et dum æger sedet in balneo, bibat

potum aliquem lapidem frangentem, de quo postea dice-

mus: his peractis si dolor augeatur, aut si vehemens, nec

spem vllam frangendi lapidem det sine periculo vitæ, tunc

narcotica sunt necessaria mixta medicamentis externis, vel

clysteribus, vel potionibus, semper attentè considerando,

quæ diximus in vsu narcoticorum capitibus superioribus,

præsertim cap. 40. de curatione colici doloris: in hoc tamen

dolore 3. j. theriacæ magnæ ferme recentis sex, vel octo men-

sium est tutior aliis narcoticis, quia simul sensum morbi eri-

pit, vrinam prouocat, & lapidem frangit: vt ℞. theriacæ ma-

gnæ sex, vel octo mensium vsque ad annum 3. j. aquæ capilli

veneris 3. ij. syrupi de duabus radicibus 3. j. misce, & fiat po-

tus. His sic adnotatis accedamus ad medicamenta, quæ lapi-

dem frangunt, & vrinam prouocant, quorum quædam à

qualitate manifesta id faciunt, alia tantum à substantia, seu

propriate, alia sunt, quæ à propriate, & qualitate simul

manifest



manifesta. Quæ à manifesta qualitate agunt, amara, non vehementis caloris: quia vehemens caliditas exiccando, & resoluendo lapidem duriores faceret: incisio enim in his materia lapideior solet esse caliditate: quæ tamen lapidem renum frangunt (præter pauca) possunt vesicæ lapidem frangere, quamuis maiori vi egeat lapis vesicæ ob magnitudinem, duritiem, & distantiam maiorem. Medicamenta, quæ recte lapidem renum, aut vesicæ frangunt, multis facultatibus, ac naturis egent, quæ raro vel nunquam in simplicibus reperiuntur. Primò, urinam prouocant, ac humores secum ad vias urinarias trahunt. Secundò in renibus, aut vesica ipsa, vel facultates earum tempore debito detinentur, vt possint lapidem frangere. Tertiò, renes, & vesica ab ipsis corroborantur, vt postea lapidem fractum expellere possint: hoc Galenus docet 10. de compositione medicamentorum secundum locos. Simplicia quæ lapidem renum, & vesicæ frangunt, à grauissimis & antiquis medicis, & à me sæpe experta hæc sunt, vinum scilicet, præsertim album, radix graminis, semen maluæ sylvestris, ceterac, capillus veneris, pentaphyllon, radices cannarum, blitis, crocus, cinnamomum, polium maius, cicera nigra, radices v. diureticæ, asparagi scilicet, petroselinis, foeniculi, brusci, & apiij, raphanus, bdelium, cortex ciperi Aegyptij, cortex radices capparis, armoniacum, ameos, saxifragia, vrtica, chamæpitys, milium solis, amygdalæ amaræ, nuclei cerasorum, grana hederæ, nuclei persicorum, siliqua fabarum, eryngium, cuius vim in hoc morbo vide apud Aetium. Aqua seu decoctum ex his, & similibus quantitate 3. iij. vsque ad 3. vj. cum melle in hyeme, & saccharo in æstate ventriculo vacuo est exhibendum: semper tamen præcedat lenitio, & mollificatio viarum urinæ per oleum sesamini recens, vel amygdalarum dulcium cum saccharo cando, vel per decoctum maluæ sylvestris cum butyro, & melle, vel per terebinthinam benè lotam.

Sunt etiam & multa alia valentiora medicamenta lapidem frangentia, vt lapis Iudaicus (de quo Dioscorides lib. 5. cap. 93.) quantitate ciceris, præparatus in lapide marmoreo, ad modum sieph, lapidem vesicæ frangit cum 3. iij. semis decocti diuretici, vt capilli veneris: aliqui tamen, vt Galenus nono, de facultatibus simplicium medicamentorum, lapidem solum renum frangere existimant. Quidam huius lapidis præparati drachmam semis præbent cum paucio vino albo.

Cinis scorpionum affatorum validè, & violenter calculum

Frangen-

tia lapide

à qualita

te mani-

festa.

Discrimen

renum &amp;

vesicæ.

Simplicia

lapides

frangētia.

Lenitio

præcedat.

Valentio-

ra.

Lapis

Iudaicus

Cinis scor-

pionum.

lum



# DE CVRAND. MORB.

lum vesicæ frangit pondere granorum quatuor hordei curio  
vino maluatico. Ego non auderem eo vti: oleum tamen scoli  
pionum pectini admotum sæpe confert, & eius iniectio per  
penem.

**Lapis** Lapis spongiæ renum tantum calculos frangit, vt quibus  
**spongiæ.** dam medicis grauissimis placet. Dioscorides tamen scribit  
frangere etiam vesicæ lapidem. Cuius dosis est à drachma  
ad drachmam vnam cum pauco vino, vel decocto aliquo  
vretico.

**Lapis** Lapis lyncis calculos renum, & vesicæ frangit. Dos  
**lyncis.** drachma vna cum pauco vino albo, aut liquore aliquo vretico.

**Cinis lepo-** Cinis leporis combusti valenter frangit lapides renum  
**ris combusti** & vesicæ. Dos cochlearium vnum, vel drachma vna vsque  
ad drachmam vnam semis. Forma comburendi lepore  
tradita est à multis, & à Matthæo de Gradi. capit. de lapidib.  
renum, & vesicæ, & ab omnibus fermè pharmacopolis co-  
gnita est: Plinius tamen lib. 28. scribit renes leporis exsicca-  
tos lapides renum, & vesicæ frangere.

**Cinis corti** Cinis corticum ouorum adustorum, à quibus pulli fun-  
**cum ouo-** egressi, valenter frangit lapides renum, & vesicæ, à me sæpe  
**rinn galli-** est expertum hoc medicamentum. Dos a drachma semis  
**naceorum.** vsque ad drachmam vnam cum vino albo, vel aliquo alio li-  
quore vretico.

**Sanguis** Sanguis hirci præparatus valenter frangit lapidem re-  
**hirci.** num & vesicæ, est expertus à multis, & à me, facileque ob-  
net principatum in curando hoc morbo. Eius dos est à 3. s.  
vsque ad 3. j.

**Cinis mo-** Cinis motacillæ, quam caudatremulam vocant, valenter  
**racillæ.** frangit lapides renum, & vesicæ, & caro huius auiculæ tam  
elixa, quam tosta habet eandem facultatem.

**Lapis ho-** Lapis hominis, vel porci lapides renum frangit, autore  
**minis, vel** Galeno, sed aliorum sententia renalis lapis frangit renum  
**porci.** lapides, & vesicæ calculus comminuit vesicæ calculum. A  
me non est expertum medicamentum, neque à meis præce-  
ptoribus.

**Puluis ci-** Puluis cimicis lapides quoque frangit. Dos 3. s. cum vi-  
**nucis.** no albo, vel aliquo alio liquore vretico. Non sum expertus  
viuæ tamen per penem immissæ vrinam prouocant, quem  
admodum pediculi.

**Offa me-** Puluis offium mespilorum lapillos renum, & vesicæ fran-  
**spilorum.** git. Dos à 3. s. vsque ad 3. j. Est à multis, & à me hic puluis  
sæpe expertus.

Puluis



Puluis corticum auellandarum frangit lapidem : Dosis 3.j. *Puluis corticum auellandarum.*  
 decoctum etiam earum eadem vi pollet. Est expertum medicamentum.

Puluis anseris combusti cum pauco vino albo frangit lapidem, vt aliquibus autoribus placet. *Puluis anseris.*

Puluis pullorum hirundinum combustorum frangit lapidem. Dosis drachma vna: Carnes eadem facultate præditæ sunt. *Pullorum hirundinum puluis.*

Lapides inuenti in capitibus gallorum, & columborum veterum frangunt lapidem cum pauco vino albo : Dosis a drachma semis vsque ad drachmam vnam autore Plinio libro 30. *Lapides gallorum gallinaceo rum, & columborum.*  
 Christa galli gallinacei habet eandem vim, vt quidam arbitrantur.

Puluis vesicæ mustellæ frangit lapidem : Dosis drachmæ duæ. *Puluis vesicæ mustellæ.*

Puluis vesicæ apri cum vrina exiccata (Plinio autore libro 15.) frangit lapidem. Multi alij volunt solam vrinam apri hac eadem vi præditam esse. *Puluis vesicæ apri.*

Puluis cornucervi assati frangit lapidem. Dosis 3.j. *Cornu cerui.*

Puluis foliorum mori valenter frangit lapidem : Dosis drachma vna. *Puluis foliorum mori.*

Pellicula interior ventriculorum pullorum gallinaceorum frangit lapidem, vt docet Plin. libro 30. *Pellicula interior.*

Lapides inuenti in vesica fellis bouis frangunt lapidem. *Lapides vesicæ fellis bouis.*

Puluis renum asinorum frangit lapidem, vt scribit Plinius libro 18. *Renes asinorum.*

Cinis glandium frangit quoque lapidem, vt docet Plin. libro 24. *Cinis glandium.*

Lumbrici terrestres frangunt lapidem, autore Plinio, libro 30. *Lumbrici.*

Lapides reperti in hepate apri lapidem quoque frangunt, vt vult Plin. libro 28. *Lapides hepatis apri.*

Cinis Erinacei combusti rumpit lapidem, præsertim si reperiatur iuxta rubum, quia rubi fructus habent hanc vim, vt ego sum expertus. Dosis a drachma semis vsque ad drachmam vnam. *Cinis Erinacii.*

Stercus columbinum mistum cinnamomo, & theriacæ magnæ frangit lapidem: vt ʒ. pulueris stercoris columbini, cinnamomi, & theriacæ magnæ. an. 3.ʒ. aquæ capilli veneris 3.ʒ. syrupi de duabus radicibus 3.ʒ. misce, & fiat potus. *Stercus columbini.*

Puluis scarabei combusti, & apis fortiter comminuit calculum. Dosis ab ʒ.ʒ. vsque ad 3.ʒ. semis. *Puluis scarabei.*

Cinis leporis, & præsertim capitis valenter frangit lapidem. *Cinis leporis.*



# DE CVRAND. MORB.

dem, & carnes eiusdem habent eandem vim, si comedantur. Pulvis cā tharidum, lucarum valentissimæ frangit lapides, & eo nō est vtendum cicadarū, nisi cū alia non suffecerint. Præparandi forma scripta est in *cap. 44. de curatione hydropis*: quam etiam hic decreui in- carum. dicare. Accipe duas, aut tres cantharides demptis capitibus & pedibus tantum, vt Hippocrates, & Dioscorides docent paradi can & non alis, vt Arabes volunt, benè pistas: quibus adde dra- tharides. gaganti, & gummi Arabici in aqua maluarum dissoluti. an. 3. iij. postea in vmbra exiccentur, & eodem modo bis, vel terti- infundantur omnia in decoctum maluarum, & tandem fiant trochisci. Quorum dosis est ab scrupulo vno cum paucis oleo sesamino, vel amygdalarum dulcium, vel decocto ma- luarum.

*Composita* Composita medicamenta, quæ lapides renum & vesicæ lapides frā frangunt, parari possunt omnia necessaria, & vtilia huic mor- gentia. bo, melius quam simplicia, vt superius diximus. Et quamuis Confectio sint multa à doctoribus tradita, in præsentio nobiliora, & ma- saluberrima. tis experta trademus: vt ℥. cineris vitri, cineris scorpionū, cineris caulis nabati, cineris leporis, spongiæ, sanguinis hirci præparati, cineris corticum ouorum, à quibus pulli egres- si sunt, lapidis Iudaici, gummi, nucis, macis, acori. an. partes æquales, seminis petroselini, dauci, pulegij, gummi Arabici, seminis althææ, & piperis. an. partem vnam, & semis, mellis. q. s. misce, & fiat confectio. Dos, drachmæ tres cum aqua, vel aliquo decocto vretico, est medicamentum expertum, & saluberrimum.

*Alter* *confectio.* Hoc quoque medicamentum est optimum, & ab eruditissimis medicis probatum: ℥. lapidis Iudaici, gummi cerasi, lapidis spongiæ, corticis melonis, liquiritiæ. an. 3. iij. seminis dauci, vitri combusti, abrotani. an. 3. j. medullæ granorum pini, & amygdalarum dulcium. an. 3. iij. mellis. q. s. misce, & fiat confectio: Dos drachmæ tres. Hoc etiam medicamentum est vtilissimum, & valenter frangit la- pides renum, & vesicæ: ℥. sanguinis hirci præparati, lapidis Iudaici, lapidis inuenti in vesica fellis vaccæ aut tauri, anisi, asari, amygdalarum amararum, seminis cucumeris, bdellij, costi. an. æquales partes, mellis quod sufficit, misce, & fiat confectio. Dos drachmæ duæ cum decocto rubeæ, vel asari, vel camomillæ. Hoc medicamentum Gal. ro. de composi- tione medicamentorum secundum locos valenter frangit la- pides, & purgat renes, & vesicam, & dolores curat: ℥. cassiæ lignæ 3. ij. seminis apiij 3. iij. myrrhæ 3. x. piperis 3. ij. olivani 3. iij. lapidis de syria masculi, vel foeminæ 3. j. seminis pastina- cæ

*Quarta.*



nace, anisi. an. 3. ij. spice nardi 3. ij. amygdalarum amararum, *Medici cu*  
 asari. an. 3. ij. storacis, ireos. an. 3. ij. seminis papaueris albi 3. *insdam ei-*  
 ij. seminis cyperi 3. ij. mellis quod sufficit, misce, & fiat con- *bus, aut bo*  
 fectio. Quidam medicus eruditus laudat non parum ad la- *lus.*  
 pides frangēdos cibum, qui fit ex hepate, pulmone, renibus,  
 & testiculis cum priapo hirci, cum croco, cinnamomo, &  
 melle, & postea imple intestina hirci hac mixtura. Dosis sunt  
 duæ, aut tres bucellæ. Habet tantam vim hoc medicamentū  
 ad lapides expellendos, vt non solum à renibus, & vesica, sed  
 ab annulo comedentis fracti omnes excutiantur. Res est  
 monstrosa, si vera est. Præter supradicta quatuor medica-  
 menta composita, sunt multa alia à doctoribus laudata, &  
 probata, inter quæ litrontipon à 3. j. vsque ad 3. ij. theriaca  
 magna, & mithrydatum, electuariū ducis, dialacca, & dia-  
 curcuma sunt magis in vsu, & magis experta: quamuis mul-  
 ta alia scripta sint, & etiam componi possint ex simplicibus  
 superius dictis, & similibus: semper tamen, vt superius ad-  
 monuimus, præcedant hæc vretica, & quæ lapidem frangūt  
 mollientia, & anodina externa, & interna: de quibus iam sa-  
 tis diximus. Sed præter illa utilis erit hic, aut similis clyster *Observa-*  
 semel, vt minimum in die: ℥. florum camomillæ, p. ij. meli- *tio.*  
 loti, fœnugræci, seminis lini. an. p. ij. s. seminis fœniculi 3. s. *Clyster.*  
 olei lib. vj. vini lib. j. decoquantur omnia ad vini cōsumptio-  
 nem, postea conseruetur oleum percolatum. Dosis cuiuslibet  
 clysteris vnciæ sex. Sæpè in die, vel saltem ter vngatur pe-  
 ctus, femur, & tota regio vesicæ, & renes, si opus fuerit, hoc  
 vnguento: ℥. axungie capi 3. j. axungie anatis, gallinæ, & *Vnguentū*  
 cuniculi. an. 3. s. axungie vrsi, medullæ crurum vrsi, vel vitu-  
 li, & theriacæ magnæ. an. 3. ij. emplastri filij Zachariæ 3. vj.  
 olei scorpionum, lumbricorum, camomillæ, & anethi, an. 3.  
 s. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum. Sepe quoque admouea-  
 tur parti dolenti vesica porci, vel hirci plena sequenti oleo: *Vesica ad*  
 ℥. olei lb. j. florum camomillæ. p. j. s. vini optimi lb. s. deco- *mouenda.*  
 quantur omnia donec vinum consumatur: cui percolato ad-  
 de olei lumbricorum, de lilio, & sesamini. an. 3. ij. olei scor-  
 pionum 3. ij. misce, his impletur prima vesica. Ad implendas  
 alias vesicas, ℥. florum camomillæ, meliloti, vtriusque sti-  
 chados, iux arteticæ. an. p. j. foliorum vrticæ. m. ij. parietariæ.  
 m. iij. radicum althææ 3. ij. maluarum. m. ij. s. seminis lini,  
 fœnugræci, & milij solis. an. 3. j. seminis fœniculi, & carui.  
 an. 3. ij. liquiritiæ 3. j. s. fiat decoctum in libris duodecim a- *Balneorum*  
 quæ, donec tertia pars consumatur. Inter ea, quæ maximè *usus mode*  
 vtilia, & necessaria sunt ante vsu, & in vsu vreticorum, *rars.*  
 sunt



## D E C V R A N D. M O R B.

sunt balnea vsque ad vmbilicum ex decocto rerum dictarum superius, quæ vias vrinarias aperiunt, molliunt, & dolores sedant: hæc tamen temperate, & non in frequentissimo vsu conferunt, ne pars dolens, & ægra fiat nimis apta ad recipienda excrementa totius corporis, & humores, & iterum generentur lapides: semper tamen ventriculo, & intestinis vacuis oportet ingredi balneū. Præter hæc balnea, quæ fiunt ex rebus vreticis, & lenientibus, sunt alia multa naturalia balnea calida, sulphurea, vel salsa, quæ habent vim manifestam, & occultam prouocandi vrinam, & lapidem frangendi: quæ quotidie experimur apud Italos, Gallos, Hispanos, & præcipue inter Vasconiam & montes Perineos sunt optima balnea dicta de Cautes. De his Philosophus 24. particula problem. vltimo.

*Proble.  
vltimo.  
24. part.*

*Cautè dū-  
retica esse  
exhibenda.*

In exhibendis vreticis medicamentis debet esse prudens medicus, & non audax: sed semper, si fieri potest, ab iis abstinere, præsertim valentibus, nisi vrgente dolore, & præsentē calculo, & necessitate: quia sæpe ex vsu eorum immodico fiunt vlcera, vel ardor vrinæ, profluuium, & tandem alij morbi perniciosi.

*Cucurbitu-  
la.*

Cucurbitula renibus admota mouet lapidem, & postea admota per vretes versus vesicam ducit ipsum ad eam.

*Si vrina  
supprimatur.*

Aliquando lapis inter vesicam, & penem infixus vrinam supprimit, & instrumento argenteo dicto cathetere, seu algalia impellenda est ad vesicam, vel scapo petroselini, vel calamo gallinæ, vel candela cerea. Si verò appareat, ferro in-

*Incisio, &  
eius cura-  
tio.*

strumento extrahatur. Aliquando necessaria est incisio in pene. Si fuerit prædurus, & magnus lapis in vesica, sola incisione extrahi potest: hæc tamen facienda est à viro perito, & docto: incisio verò pro magnitudine lapidis erit facienda, quæ cognoscetur immisso digito per anum: & postea curetur vlcus per consolidantia, & glutinosa, & per cibi, & potus abstinentiam. Si sanguis in vesicam descenderit, ibique coalescat, antequam putrefiat, theriaca magna, vel coagulo hœdici cum decocto liquiritiæ euacuabitur per vrinam.

## De Renum calculo, & vesicæ. CAP. XLVII.

### Scholium.

**R**enum & vesicæ calculi.) Vrina frequenter supprimitur à renum calculo, aut vesicæ. Proinde breuiter, quæ ratione huic malo occurrendum sit, explicabo. Prius autem scias velim, me consulto omittere multa, quæ in calculi disputatione propo-

nunt



nuntur (ea enim habeo diffusè scripta, in libr. de simpl. med. fac. quem imprimendum statim, domi seruo) solumque supponere, materiam, causam efficientem, & generationem calculi, ut inde colligamus essentiam Calculi medicamentorum, quæ ipsum comminuerè nata sunt. Calculi materia est materia humor crassius, siue sit pituita, aut melancholia. 3. de alim. fac. cap. 6. si- Causa efficiens purulenta substantia epy. 6. par. 1. comm. 15. Causa, quæ calculum efficiens, fit, est calor immodicus quantitate, aut tempore, non autem frigiditas, Vallesius ut male voluit Vallesius, lib. 6. epyd. non considerans ex Galeno, ac pro- errat. inde ex veritate, viuente animali non posse, tantum frigiditatem intendi, Modus generat ex ea aliquid concreseat in duritiem. Generatur calculus, calore ena- generationis porante humidam partem crassi humoris, & reliquam concrecente, ita calculi. ut si ille concretus humor in renibus moram faciat ab altero augeatur, quoad lapidis magnitudinem ex arenula acquirat. Lapis in renibus generatus, & detentus, dolorem grauem efficit 6. epy. par. 1. sent. 6. quia renes non sentiunt nisi per membranam. Vallesius eodem loco existimat, Doctor gra- magnum lapidem, quando exciditur ex carne renis, acutum dolorem uis. inducere. Id colligit ex eo, quod hunc dolorem, difficile distinguere pos- Vallesius sumus, à colico dolore. Quæ sententia facile refutabitur, ab eo qui consi- errat. derat, carnem renis esse intensilem, ac proinde neque à magno lapide posse acutè dolere, quod exemplo inflammationis docet Galen. 6. aphor. comm. 5. Adde in carne renis, non posse generari lapidem, quia deficit locus, nempe cavitatis: & ita Galenus 6. epy. agens de lapidis generatione, semper eius meminit: Accidit quòd si in carne renis lapis generaretur, non posset ad vterem permeare. Probatio etiam infirma est, quia cum principium vteris, sit iuxta colon, dolor à lapide in eo contento excita- tus, bene poterit à nobis colicus indicari, præcipuè acutissimus cum sit, vteres enim multum sensiles ex natura sunt. Hunc renum dolorem ne- phritim appellamus. Quem vomitus primò pituitæ, & deinde bilis æ- Nephritis ruginosæ comitatur. Ratio hæc est. Hic dolor ad se attrahit sanguinem, Vomitus & spiritum magis, quibus destitutus ventriculus debilitatur, & cum in nephri- fit pituitæ naturalis officina eam euomit: in renis autem quæ sunt iux- tide. ta renem, à caliditate bilis adurit, & fit æruginosa, quæ ad ventricu- lum languidum expulsa vomitu euacuatur. Franciscus Vallesius 7. Dubitatio epy. com. 59. dubitat, qua ratione lapide existente in vno rene, aquosa à Vallesio fiat vrina, aut supprimatur: si verum est ex Galeni sententia, partes ge- proposita. minas affectas esse, ut vna læsa, altera ageret. Respondet venas emul- Solutio gentes, simul oriri ex vena caua, ac proinde, raro vnum renem, lapidem eiusdem. congerere, quin alter, à crassis succis & arenis obstruatur: & ideo vri- nam supprimi, aut colatam per ambos renes puriorem excerni. Hoc au- tem intelligendū est, in affectibus dolore generantibus, quia in indolen- tibus bene potest esse affectio in vno rene, altero non cessante ab actione. Quod confirmat in homine, quæ totū renē corruptū habuisse, et per vri- nā excretū, se vidisse testatur, qui vrinā altero rene solo reddebat. Quid si



## D E C V R A N D. M O R B.

si in vterem prodiit lapis, & supprimatur vrina? id inquit fieri, qui ob dolorem perit nixus musculorum abdominis, qui ad reddendam vrinam **Refutatur** nam necessarius maxime est: Hæc **Vallesius**. Quæ omnia falsa sunt, in **Vallesius**. primis cum respondet, emulgentes venas à caua oriri, ac proinde affectu vno rene, alterum affici, rem falsam supponit: nempe simul debere affici duos renes, hoc enim est contra experientiam, quia in dies experimur lapidem in vno rene existente, alterum renem recte operari, ea ratione quod abiectione vno oculo sæpe, alter illæsus seruetur. Neque distinguit recte quia siue sit affectus dolorificus siue indolens, affecta vna parte, reliqua optime aget. Præterea si duo sunt renes, & duo vteres, quis sibi poterit persuadere, lapidem, vnum vterem obstruentem supprimere vrinam? Ratio ex nixu musculorum desumpta nil persuadet, quia musculi abdominis non habent vesicam subiectam, quæ intra ossa pubis latitat. & sic potest comprimi solum, quando repleta est, à musculis rectis, ea parte qua ossibus pubis adhærent. Adde, vrinam excerni à facultate naturali, quæ expultrix dicitur. Tum si propter dolorem cessat musculorum nixus, debuit etiam in colico dolore cessare, et eadem ratione vrinam supprimere. Experimentum etiam illud, quod adducit, corrupti renis & per vrinam excreti, tanquam impossibile omittendum est: si enim vteres teneserentur à renibus, non corruptus per quam partem ingredi poterit vterem laxatum? tum si rem corruptus, vrinam non atrahebat, quæ ratione renis frustula deducebantur ad vesicam? omisso ergo hac in parte **Dubitatio** te **Vallesio**, qui controuersiam ponit ubi non est: dico naturam duos fabricasse renes, ut impeditam vnius actionem, alter suppleret (non ut voluit **Vallesius**, ne facile obstruerentur) & inde sequi, esse impossibile (recte se habente collo vesicæ) à lapide in vno rene contento, posse vrinam supprimi. Quod si vrinæ suppressio contingat, necessario in duobus renibus erit obstructio: aut si in vno tantum rene sit lapis (quod ex dolore colliges) excrementa crassa in vesicam delapsa obstruere eius collum, & impedire vrinæ transitum. Quæ ratione distinguatur dolor nephriticus, à colico capite de dolore colico explicatum habes.

**Medica-** Calculus concretus in renibus.) Quando aliquis solitus est lapidem in renibus generare, eo tempore quo arenulas emittit, neque dolores expurgantia: qualia sunt mel cum vino albo, mel cum puluere ossium mespilorum, decoctum pastinacæ cum melle, aqua distillatitia florum fabarum cum melle, & similia. Si lapis existat in vterem acutum excitans dolorem, dilatantibus viam indigemus, simul etiam possumus frangentia lapidem assumere. In dolore hoc nephritico auctor sanguinem mittit, si æger sit carnosus: quasi solum oporteat secare venam in plethoricis affectibus. Secabimus ergo venam in magno dolore, non propter dolorem, quia hic cum deiciat vires, potius eam impedit: neque propter morbum, quia lapis sui ablationem indicat, quæ sanguinis missione, excerni non potest, sed



sed propter morbum magnum, qui futurus timetur, nempe inflamma-  
tionem.

Secundò considerandum.) Non rectè hoc in loco rem explicat Taxatur  
auctor, quia si multus humor continetur in venis, potius medicamento auctor.  
purganti per os assumpto euacuabitur, quàm clysteribus lenibus.

Tertio sciendum est.) Dolor nephriticus aut vrget, aut non. Si vr- Curatio do  
get, cum deiciat vires, ad se trahit curationem, & ideo sedandus est. loris vrget  
Quod commodè præstabit hoc unguentum, exterius positum in ilibus suis.  
pra locum dolentem. ℞. olei scorpionum, et camomillæ an. ℥. ii. unguenti  
aragon, & axungia gallinæ an. ℥. j. Philonii maioris ℥. iii. ceræ parum  
fiat unguentum. Hoc dilatat partem emollientibus, & stupefacit narco-  
tico medicamento. Possumus etiam uti aliquo ex dictis oleis, cum gra. iii.  
opii permixto. Per os assumere potest æger theriacam magnam, quando  
fermentationem patitur, quo tempore stuporem inducet, quia opium ad-  
huc seruat vim: aut ℥. i. Philonii maioris (quod post duos annos totius  
est) cum aqua pastinacæ, aut faniculi, ut permeet. Quod si neque reme-  
diis dictis sedatur dolor, in balneo (quod statim describetur) bibat medi-  
camentum narcoticum: aut, si hoc non possit, assumat, quæ vim habent  
calculum comminuendi, oleum amygdalarum dulcium, cum melle, aut  
saccharo candi appellato, quod etiam habet lubricandi vim: pulvis etiam  
ossium mespilorum, vulgò axerolles utilis est, sicut & hæc potio: ℞. li-  
tontripon. ℥. j. ℞. pul. elec. ductis. ℥. ℞. cum ℥. iii. aquæ pastinacæ, fiat po-  
tus. Si dolor non vrget, curatio à causæ ablatione inchoabitur, propellen Curatio ne  
tes lapidem à renibus ad vesicam, medicamentis, quæ calore et humidi- phritidis,  
tate laxando, veteres dilatabunt. Hoc exterius applicatis, et clysteribus cum nō vr-  
præstabis. Exterius multis poteris uti unguentis, illud, quod paulo supra get dolor.  
descripsimus, ab eo auferentes Philonium, accommodatum est. Sicut & Exterius  
hoc alterum: ℞. unguenti agrippæ ℥. j. olei scorpionum, ℥. ij. olei ruta- applicanda.  
cei. ℥. ℞. ceræ parum, fiat unguentum, cui adde axungia cuniculi. ℥. ii. His  
inungatur ilii regio, & superponantur herbæ medicæ folia, à caliditate  
moderate madentia, vulgò alfalfa ab asuor. Clysteres parare poteris ex Clysteres.  
ruta, anetho, feniculo, maluis, fursure, semine lini, & fenugræci: deco-  
ctioni addens, benedictæ confectionem, cassiam, saccharum rubrū, oleum Balneum.  
rutaceum, aut butirum. Quod si his remediis dolor non remittitur, ad  
balneum vniuersale deueniendum erit, paratum ex aqua, in qua lauer  
seu sion vulgò crexenases, parietaria, althæa, malua, & semen lini bul-  
lierim: ita ut ex eisdem herbis meatus urinarii fricentur, ut dilatentur.  
Quod si æger intuerit ingredi balneum, prædictas partes, eadem aqua  
fouebit, spongia vel lana. Si his omnibus peractis lapis semper resistat,  
neque excernatur, imò suppressionem urinæ efficiat, paucos ab ea libe- Si lapis in  
rari videbis. Quod si descendat ad vesicam lapis, & ibi urinam suppri- vesica vri-  
mat (quod ex pubis tumore intelliges) veteres solebant aeneam fistulam, la- nam sup-  
pidem à meatu amouere. Sed quoniam nimium est dolorificum instru- primat.



## DE CVRAND. MORB.

mentum hoc, præstabit id cerea candela, oleo amigdalorum dulcium  
 Si sit in r- (ob dolorem) inuncta efficere. Si verò per vrinæ meatum excernatur  
 ring me- lapis, eisdem medicamentis vtete. Quæ si non profint, & lapis i  
 tu. medio via quiescat, extrahendus erit sectione recta per meatum fa  
 Et, cauendo semper, ne fistulosa vulnerentur corpora, quia non pote  
 rit vlcus ad cicatricem venire.

Non da- His sic adnotatis accedamus ad medicamenta. ) Nullum  
 tur medi- datur medicamentum à tota substantia lapidem frangens : quia la  
 cametum pis non est morbus tota substantia nobis contrarius, ac proinde pelli  
 tota sub- leporis cremata, lepus decollatus, aut viuis in fictili vase crematus  
 stantia frā leporis renes cremati, cinis ungulæ equi, plumæ palumborum, testa  
 gēs lapidē. cochlearum, sterco murium, cinis cancrorum, vermium terrestrium.  
 & passeruli: calculus, quem quis prius reiecerit, lorium capræ mon-  
 Medica- tanæ, cicadæ aridæ, hepar asini, & similia à practicis descripta som-  
 nenta la- nia sunt. Erunt ergo solum ea medicamenta lapidem frangencia, quæ  
 pidem frā calida modicè sunt, & tenuium partium : hæc enim penetrando pen-  
 gentia. \* lapidis substantiam eam diuidere possunt. Calculi vesicæ difficulter  
 Calculi ve aut nulla ratione possunt frangi, propter loci distantiam, ob quam in  
 ficæ non transitu exoluitur medicamentorum vis : ac proinde ad chirurgiam  
 possunt veniendum erit, aperientes vesicæ collum, & calculum extrahentes.  
 frangi. Quam sectionem multi nostris temporibus, felici successu exercent.

## De ardore vrinæ. CAP. XLVIII.

Descriptio **A**RDOR vrinæ, quem medici & stranguriam, & stil-  
 licidium vrinæ nominant, tum fit, cum ægri assidue  
 ad meiendum irritantur, vrinaque paulatim, & gut-  
 tatim redditur. Prouenit propter vrinæ acrimoniam, quam  
 Cause. ipsa acquisiuit vel ob caliditatem hepatis, aut rerum acrium  
 vsum, maiori tamen ex parte ob bilem commixtam, quam  
 natura sæpè per eam partem expellit : à quacunque tamen  
 causa proueniat, ea qualitate prædita est vrina, vt & ad mei-  
 iendum cōtinuò stimulet, & renes sæpè, atque vesicam exul-  
 ceret. Nonnunquam etiam accidit hæc passio ex vlceratione  
 vesicæ, aut, ex abscessu rupto vel in renibus, vel in vesica.  
 Puris enim acrimonia idem, quod de vrina dictum est, præ-  
 stare potest. Cæterum si ex acri vrinæ qualitate hoc contingat,  
 Nota. vrinæ sunt biliosissimæ, & vniuersus corporis habitus,  
 Vitanda & reliquæ etiam notæ bilem testantur. Si vel ex vlcere, aut  
 esse medi- & abscessu, ex propriis tum vlceris, tum abscessus notis hoc i-  
 camenta lapidē frā psu dignoscitur. Monendi in hoc modo tyrones in medi-  
 lapidē frā gentia. ca arte sunt, ne conuiuentibus, quod aiunt oculis, causas  
 huius mali inspiciant : decipiantur enim passim credentes  
 ex vesicæ calculo oriri, vnde medicinas comminuendis cal-  
 culis



his accommodatas miseris ægrotantibus ministrant, quod  
eorum perniciem vertitur: augetur enim per ea medica-  
menta, quæ calida facultate sunt prædita, urinæ acrimonia:  
inde vlcus aut in renibus, aut in vesica generari necessum  
est, ideoque iugi cruciatu torqueri, qui in tam impias carni-  
cum manus inciderunt, quemadmodum cuidam meo tem-  
ore contigit, qui initio remedia necessaria fugiēs, post em-  
iricorum omnia remedia amplectens in urinæ multitudi-  
em lapsus est, & eos morbos, a quibus deinde periti medici  
euare minime potuerunt.

*Historia  
observari-  
da:*

Stranguria, si à calculo fiat, curatur iis, quæ diximus su-  
eriori capite. Si ab vlcere, abstergentibus, mundificantibus,  
& incarnantibus (vt ita dicam) vlcus: de quibus cap. 28. de  
uratione sputi sanguinei diximus: quanquam hæc miscen-  
ta sunt, quæ clementer ad vias vrinarias alia medicamenta  
eferant. Si ab acrimonia, auferentibus causam. Primò, si bi-  
s est urinæ mixta, victu frigido, & humido, vt vsu lactucæ,  
portulacæ, cichoreæ, vtriusque maluæ, cremoris hordei, &  
miliū: quatuor tamen semina frigida maiora sola nocent  
rouocando urinam. Prodest fugere acria, salsa, acetum, coi-  
um, labores animi, & corporis. ¶ Secundò, sanguinis mis-  
ione per sectionem venæ hepaticæ dextræ, euacuando san-  
guinem plenitu dini & robori respondentem. Hæc refrige-  
at hepar, bilem vacuat, & à viis vrinariis auertit.

*Curatio:*

*Si ab a-  
crimonia  
curatio:*

*Quæ fu-  
gienda.  
Sectio ve-  
næ:*

Tertiò, purgantibus bilem prius sumpto syrupo rosarum  
& infusione siccarum cum aqua portulacæ per tres, aut qua-  
uor dies ad tollendam bilis acrimoniam, & caliditatem, me-  
dicamentis clementibus, vt cassia fistulari, manna, tamarin-  
is, myrobalanis citrinis, & rhabarbaro, vt hoc aut simili po-  
tu: ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ℥. j. rha-  
barbari electi infusi per noctem in aqua endiuæ ℥. iij. syru-  
bi violarum ℥. j. aquæ borraginis. q. s. misce, & fiat potus. Et  
quia morbus est diuturnus, hac cōfectione fiat vacuatio fre-  
uens: ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ℥. j. me-  
dullæ tamarindorum, & diaprunis solutiui, & conseruæ ro-  
sarum recentis. an. ℥. ss. mucilaginis seminis psyllij in aqua  
maluarum extractæ ℥. iij. pulueris diarhodon. Abbatis ℥. ij.  
acchari dissoluti in aqua rosarum ℥. iij. misce, & fiat confe-  
ctio. Dosis qualibet hebdomada cochlearia duo. Hoc etiam,  
vel simili clystere purgatio frequens est utilis: ℞. foliorum  
maluarū, lactucæ, violarū, & portulacæ. an. m. j. hordei excor-  
ticati. p. j. seminis psyllij, & cydoniorum. an. ℥. ij. fiat decoctū:  
de quo percolato accipe vncias decem, cui adde olei violarū

*Prepara-  
tio.*

*Purgatio:*

*Potio:*

*Confectio  
ad vsu.*

*Dosis.*

*Clyster.*



## DE CVRAND. MORB.

vncias tres, cassiæ fistularis præparatæ ʒ. j. vitellos ouorum numero duos, misce, & fiat clyster. Ex solo lacte ouino, vel primo clyster est optimus, & eius frequens vsus vtilissimus huic morbo.

*Alteratio.* Quartò, refrigerantibus hepar, renes, & totum corpus ternis & acrimoniam vrinæ tollentibus, & externis auxiliis.

*Balnea.* vt balneo folius aquæ tepidæ, electuario diatrium santalorum, diarhodonis Abbatis, conseruis violarum, rosarum, nenupharis, & acetosæ: aquis, vel decocto portulacæ, endiuie, cichoreæ, acetosæ, & similibus. Vnguento santalato pari & renibus bis in die admoto, vel hoc, & simili vnguento: ʒ. oleorum rosarum, nenupharis, & violarum aqua rosata lotorum. an. ʒ. j. mucilaginis seminis psyllij, & cydoniorum aqua rosata extractæ an. ʒ. ij. santalorum omnium, & trochiscorum de camphora. an. ʒ. j. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum.

*Vfus vitellorum ouorum laudatur.* Vfus longus vitellorum ouorum recentium cum syrupo violato tollit vrinæ acrimoniam, & stranguriam. Puluis hic comendatur quoque eam: ʒ. seminis papaueris ʒ. j. seminis lactucæ, portulacæ parum tosti an. ʒ. ij. pulueris liquiritiæ, quatum seminum frigidorum maiorum mundatorum. an. ʒ. j. sacchari candi violati ʒ. iij. misce, & fiat puluis, qui cum ouo recocti summo mane, vel cum iure ante cibum quantitate vini cochlearij sumatur. Syrupus de mucilaginibus ex Matthaeo de Gradi, curat hanc vrinæ acrimoniam, & prohibet vlceri fieri in viis vrinariis: estque medicamentum singulare, optimum, & expertum, cuius hæc est descriptio: ʒ. seminis althææ, maluarum, & cydoniorum. an. ʒ. j. dragaganti ʒ. iij. infundantur in aqua tepida decoctionis maluarum, seminis papaueris albi, & granorum alkekengi. an. quantum sufficit: postea fiant expressiones dictorum seminum, & dragaganti de quorum mucilaginibus fiat syrupus, vt ʒ. prædictarum mucilaginum ʒ. j. s. decoctionis prædictæ ʒ. iij. sacchari optimi ʒ. ij. misce ad vnā dosim, quæ per sex, vel octo dies exhibenda est: & si fuerit vehemens caliditas, adde parum mucilaginis seminis psyllij. Aliquando in maxima acrimonia, & caliditate vrinæ oportet syringe argenteo per penem lac ouinum sæpè iniicere, vel aquam plantaginis, vel hordei decoctum cum mucilagine seminis psyllij, vel cydoniorum, vel collyrio albo Rhasæ sine opio, & in maximo dolore cum opio.

De Ardore vrinæ. CAP. XLVIII.

*Scholium.*

Ardor



**A**rdor vrinae quem medici.) Stranguria, à latinis vrinae stillicidium dicitur, in quo vrinam parum, et frequenter reddimus, lib. 5. aph. com. 33. Quod symptoma proprium est vesicae leprauiatē expellentis vrinam. Neque enim loquimur de stranguria ritica. Cuius meminit Hipp. epy. par. 1. sent. 41. in qua humores acres per Cause enes ex toto corpore expurgantur. Cause symptomaticae stranguriae, ex strangu- Galeni sententia lib. 3. de caus. symp. cap. 2. duae sunt, imbecillitas facul- riae duae. atis reteniricis vesicae, & vrinae acrimonia. Imbecillitas vesicae fit ab Imbecilli- eto intemperiebus, quatuor nudis ex lib. 3. aph. com. 16. & potissimum tatis vesti- frigida 7. aph. com. 48. aut à quatuor cum fluxione humoris 3. aphor. cae cause. om. 16. Acrimonia vrinae varias habet causas. Prima est abscessus ru- Variæ cau- otus in renibus, aut aliis partibus, & per vrinam expurgatus. Ad hanc sae acrimo- causam reducenda est bilis acris, quae permixta cum vrina stranguriam niæ vrinae. efficere solet: de qua intelligendus est Gal. 3. aph. comm. supradicto, cum Prima. scribit intemperiem primò calidam, secundò calidam & siccam, & ter- iò humidam acrem reddere vrinam. Quo loco, ubi Gal. habet humidam, lege siccam, quia humida intemperies impedit humoris acris generatio- nem, quam ipsam generare possit. Secunda causa est pituitosum simul- Secunda. que salsum excrementum. Hoc autem salsum redditum est, non à putre- dine, sed ex permixtione salis serosae humiditatis, hoc est vrinae, quae sal- ta est: pituita enim crassa & glutinosa cum sit, habensque permixtam salsam serosam substantiam detineatur in vesica, magis irritat, quam faciat vrina sola. Tertiam causam stranguriae addit Gal. 6. de loc. aff. c. Terziq. 4. vlcus in vesica, aut meatu pudendi. Vbi per meatum pudendi intelli- ge vesicae principium, quod cervicem vesicae appellant. Potest tamen ali- Excusatur quis hoc in loco Galen. tanquam diminutum accusare, quia omittit lapi- Galenus. dem, & arenulas, à quibus stranguria excitari solet. Cui satisfacimus ea ad acrimoniam reuocantes, quia reuera arenulae, & lapis calidita- tem, & ardorem habent: aut ad vlcus, quia haec in transitu per corpora sentientia (saltem lapis) sua asperitate molestiam inducunt. Quod si la- pis in cervice vesicae contineatur, stranguriae etiam causa est, quia ob- Curatio struens, & si non omnino liberum vrinae transitum impedit. Si acrimo- stranguriae nia vrinae, quae stranguriam facit, à pure abscessus rupti ortum habeat, ab acrimo- abstergemus vlcus renis, mulsa permixta cum decocto pastinacae, & nia vrinae maluarum: pastinacae, vt sit vehiculum, maluarum verò propter acri- facta. moniam. Mundato vlcere (quod ex paucis pure, minori fœtore vrinae, & paucis sanguine excreto colliges) cicatricem inducemus cum decocto ca- pitum glandium, aut malicorū, addito paucis melle, aut saccharo cando, vt penetret. Exterius ad conglutinandum illines, vnguento commitissae cum paucis aceto, vt penetrare possit. Alia etiam vnguenta ex oleis myr- tillorum, r. farum, & cydoniorum cum pulueribus myrtilorum, corticis mali granati, & similibus, quae adstringere nata sunt, construere pote- ris cum paucis cera. In acrimonia vrinae à pituita salsa, aut bile, sangui-



## DE CVRAND. MORB.

nem mittes propter venarum affectum, tum etiam, quia sanguinis mixtio, ex accidenti refrigerabit euacuato humore calido. Secundo preparabis hunc morem, si sit pituita, oximelle, rhodomelle & aliis decocto maluarum, & liquiritia propter acrimoniam. Si sit bilis non eget preparatione, quia tenuis est. Tertiò purgabimus bilis castia simul cum electuario de succo rosarum, & syrupo rosarum alexand. ex 9. infusionibus: pituitam vero diacatholicone, diaphanone, & agarico cum prædicto decocto. Aduerte tamen, in ardore rene ex pituita salsa maximè utilitatis esse, vsum therebentine acrinæ: si eam à 3. ij. vsque ad 3. ʒ. cum syrupo violaceo assumamus. Renes & iecur in stranguria vnguento refrigerante illines, ceris sandalino, aut ceroto refrigerante Galen. cum paucis aceto. Hoc est ʒ. ceroti sandalini ʒ. iij. olei nenupharini ʒ. ij. aceti ʒ. ʒ. cera parua fiat vnguentum. Neque omittendum erit balneum aque tepide quod excrementa renum refrigerat, & dilatat vias, vt ipsa euacuari possint. Syrupus de mucilaginibus à Matthæo de Gradi, compertus maximè ardorem extinguit: si tamen non sint in renibus crassa excrementa: Tunc enim permiscebimus cum eo oximel, aut paucum oximel schillitici. Syrupus hoc modo parari poterit: ʒ. seminis phææ, maluarum, & cydoniorum ana ʒ. j. dragaganti ʒ. iij. infundatur in aqua decoctionis maluarum, seminis papaueris, & granorum Alkekengi, ana. q. s. deinde fiant expressiones dictorum seminum, & dragaganti: de quorum mucilaginibus, & decocto prædicto q. s. cum saccharo albisimo conficiatur syrupus benè coctus. Huius assumptio manè ʒ. ij. cum hoc decocto: ʒ. decoctionis maluarum, liquiritia, seminis papaueris & granorum Alkekengi lib. i. Si stranguria à lapide & arenulis oriatur, curabitur ea ratione qua diximus cap. superiori.

**Catether**  
construendus.

Aliquando in maximâ acrimonia. Si instrumento argento ab auctore posito, liquorem immittas, non perueniet ad vesicam, si poteris construere catether, quod habeat longitudinem quindecim digitorum, ita vt in parte superiori sit latius.

## De mictu sanguinis. CAP. XLIX.

**Causa.**  
**Externa.**



Anguinis mictus sæpe à causis exterioribus fit nonnunquam etiam ab interioribus. Exteriores sunt casus, & ictus maxime cum partibus, quæ iuxta vrinæ instrumenta sunt, inferuntur: rumpitur enim ex hac occasione vena aliqua in illis locis, vnde sanguinis mixtio cōtingit. Præterea rerum calidarum vsus, & immoderata corporis agitatio, & ea omnia, quæ sanguinem attenuare, & ad renes, & vesicâ propellere possunt, hoc malû pariunt. Internæ sunt corporis plenitudo, hepatis imbecillitas, renum in attrahendo valida facultas, eorundem, atque vesicæ exulceratio.

**Internæ.**



tio. Calculus porrò in renibus, aut abscessus aliquis, & naturæ iudicium, quam crîsim appellant, causæ sunt. Si a causis externis proueniat hoc malum, ægrotum, quod millies dictum est, interrogabimus. Si ab internis, in causarum cognitionem sic deueniemus: si corporis plenitudo in causa fuerit per methodos superius traditas, maxime cap. de cephalalgia, signa patebunt. Si hepatis imbecillitas, vrina emittitur cruenta, carniû recēs cæsarum lotioni non absimilis. Si renum in attrahendo robur, vrina pari ratione cruenta, sed aliquanto albidior. Si exulceratio renum aut vesicæ, sanguis puri commixtus, & modicus excernitur: ad hæc dolor sentitur circa locum, cui vlcus inest. Si calculus renum aut abscessus, signa ex propriis capitibus mutuari oportet. Si naturæ iudicium, iuuari ab ea re laborantem cernimus.

Mictus sanguinis, qui à redundantia fit, vel criticus, nisi *Curatio.* vires deiciat, non est suppressendus. Si fiat ab vlcere corrodente, curetur prius vlcus: si ab immodico coitu, instauratione & glutinatione succurrendum est. Si a recenti solutione, victu frigido astringente, sanguinis missione, & astringentibus medicamentis externis, & internis curabitur: de quibus dictum est cap. de sanguinis profluuiio e naribus, & hic quoque de iis agemus. Si ab imbecillitate retertricis facultatis renum, curabitur primo, victu frigido astringente, de quo capitibus de curatione profluuij sanguinis e naribus, & de curatione sputi sanguinei. ¶ Secundo, sanguinis missione, à qua cūque fiat causa, dempto coitu, per sectionem venę iecorariæ. *Si ab imbecillitate retertricis facultatis renum, curatio.*

Tertio, concoquentibus bilem, vel pituitam, vel atram bilem, si alius humor fuerit sanguini mixtus, quem cognoscet colore, & multis aliis argumentis. *Præparatio.*

Quarto, vacuantibus per medicamenta dicta c. 1. & c. 21. *Vacuatio.* de profluuiio sanguinis e naribus.

Quinto, astringentibus, & glutinantibus internis, & externis, vt syrupo rosarum ex infusione siccarum, myrtillorum, cydoneorum cum aqua, vel decocto plantaginis, portulacæ, & similium, lacte ouino calybeato cum pauco bolo Armenico, conferua rosarum antiqua: vel hac mixtura: ℞. melle, conferuæ rosarum antiquæ ana. ℥. j. pulueris corallij rubri præparati, Karabæ, lapidis hematitis præparati, spodij, dragaganti, corticum glandium, boli Armenici, quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum an. ℥. j. syrupi rosarum quod sufficit, misce, & fiat cōfectio. Dosis cochlearium vnum cum aqua portulacæ, vel plantaginis summo mane, & omni hora, præsertim vacuo ventriculo. Renibus & vesicæ



## D E C V R A N D. M O R B.

**Vnguentum.** admoueat<sup>r</sup> vnguentum santalatum, vel cerotum santalatum, & panni linei perfusi hoc, vel simili liquore: ℞. succi plantaginis, & portulacæ, an ℥.iiij. aceti rosati ℥.j. misce. Aliquando necessaria sunt narcotica simul & astringentia, vnde sunt trochisci de spodio, de terra sigillata, & de Karabe, quorum dosis est a ʒ.ʒ. vsque ad ʒ.ʒ. Et in maximo sanguinis mictu sequens potus est necessarius: ℞. philonij Romani ℥.ij. syrupi papaueris ℥.j. aquæ portulacæ ℥.j. misce, & fiat potus. Si sanguis in vesica coalescat, curatur per medicamenta dicta cap. 28. de sputo sanguinis, qualia sunt theriaca magna, coagulum hœdi, & similia.

### De mictu sanguinis. C A P. X L I X. *Scholium.*

**S**anguinis mictus.) Omnes cause mictus sanguinis redtendæ sunt ad tres illas, quas capite de sanguinis è naribus profluvio, ex Galeni sententia proposuimus.

### De Diabete. C A P. L.

**Descriptio.** **D**iabetes à quibusdam fluor vrinæ dicitur, ab aliis hydrops matulæ, & diapfacon à nonnullis nominatur: differt non parum ab vrinæ multitudine, nam in sincera diabete potus non mutatur, vt in lyenteria cibus, expellitur. In non vera, quamuis aliquando vrina potum superet, mutatur tamen, & non sunt omnia signa veræ diabetis. Puella olim Mediolanensis per sexaginta dies singulos sexdecim matulas vrinæ mictu impleuit, cum biberet circiter tres ampullas, corpus tamen perfanatę puellæ parũ considerat magno exempli miraculo, medici illius tēporis credebant aerem in vrinam conuertij. Hæc igitur spuria diabetes, si non curatur, in synceram transit, quæ à Galeno tātũ bis visa est, & à me quater, ab Aegyptiis tamẽ sæpe, siue propter cælum, siue propter aquam Nili. Est autore Gal. 6. de locis affect. cap. 3. affectus renum proprius, in quo tātus inest vrinę fluor, vt totum corpus exhauriatur, quo quicquid bibitur, quale sumptum est, tale per vrinam redditur: qua parte similis est hæc affectio ventriculi, intestinorũque læuitati, illi proportionē respondens.

**Historia inaudita.** Prouenit ex imbecillitate retentricis facultatis renum, attractricis verò magno robore: attrahunt enim ad se renes vehementer aquosum id excrementum, quod in sanguine est, quod cum retinere ipsi præ imbecillitate non possint, ad vesicam demittunt, quæ res cum continuo fiat, continuus quoq

**Causa.**



quoque adest vrinæ fluor, adeò vt poculenta omnia nulla sui qualitate mutata per vrinam continuò excernantur. Comi- *Signa.*  
tatur sic affectos sitis vehemēs, & quæ satiari alicuius liquo-  
ris hauſtu non poſſit, vnde etiam aſſiduè bibere cupiunt, aut  
bibunt, nec ab re: cùm id quod fuerit iniectum continuò ad  
renes, & veſicā delabatur. viſcera præ nimia caliditate exu-  
ri videntur: tumor autem magnus lumbos teſtes, ac coxas  
infeſtat. Quod ſi ampliùs viſcerum calor increuerit, ſupe-  
rior venter corrugatur, & venæ, quæ in ipſo ſunt, attollun-  
tur. Vniuerſus habitus corporis gracileſcit, & tabe quadam  
generali afficitur.

Multitudo vrinæ, quæ propriè non eſt diabetes, ſi à potu *Curatio.*  
largiori fiat, curatur abſtinentia potus. Si à qualitate falſa,  
& acri, cibi & potus vt largo eſu alliorum, caparum, & por-  
rorum abſtineat ab iis. Si a frigore externo, calidis internis,  
& externis, de quibus dictum eſt cap. 31. de imbecillitate, vt  
aſcites curabitur. Si à paralyſi, per ea quæ diximus cap. 13. Si  
à muſculo rupto, vel dilacerato, curatio eſt difficilis, & fer-  
mè impoſſibilis, vt in quibuſdam à partu laborioſo vidimus.  
Si autem inuitis vrina excidat, vt pueris, & aliis quandoque  
dormientibus, cauſa auferatur per euacuationē, ſi ſit humor  
calidus medicamentis cholagogis, de quibus cap. 1. & aliis  
multis locis dictū eſt: deinde per refrigerātia dicta ſuperiori  
cap. & in hoc in curanda diabete. Si ſit humor frigidus pi- *Ex pirui-*  
tuitoſus poſt illius concoctionem, & vacuationem per ea, *toſo humo-*  
quæ dicta ſunt cap. 1. & etiam cap. 13. de paralyſi, curabitur *re curatio.*  
his pilulis. ℞. caſtorei, myrrhæ, maſtichis, thuris, pyrethri, *Pilula.*  
cupularum, glandium, an. partes æquales, cum ſyrupo myr-  
tillorum fiant pilulæ ſeptem pro drachma. Doſis drachma  
vna. Hi trochiſci, autore Arnaldo de Villanoua, ſunt optimi *Trochiſci*  
in hoc affectu, quibus curatus fuit iuuenis affectus diabete, *meientibus*  
& vrinæ profluuiò in lecto: ℞. roſarum, ſpodij ana. 3. v. ſe- *in lecto.*  
minis portulacæ, liquiritiæ, boli armenici, ſumac an. 3. j. ſe-  
minis lactucæ, coriandri, ſantalorum, berberis an. 3. ſ. draga-  
ganti, gummi Arabici, balauſtiæ an. 3. j. cum ſucco malorum  
granatorum acidorum fiant trochiſci. Doſis 3. j. in die cum  
ſyrupo roſarum, & aqua calybeata.

Diabetes, ſeu tranſitus vrinæ non mutata curatur ſex re- *Curatio ve-*  
mediorum generibus: primò, viſtu refrigerāte, & aſtringen- *næ diabe-*  
te, dempris cydoneis, quæ vretica ſunt, & ex eorum eſu ſere- *tis.*  
niſſimus Rex Neapolitanus Alſonſus incidit in diabeterem: *Viſtus.*  
vehemēter enim nocent huic morbo calida vretica, & etiam *Hiſtoria.*  
animi, corporis labores, & coitus. Potus ſit aqua calybeata  
non



# DE CVRAND. MORB.

non frequens, neque magnus, quamuis caliditas immodica ipsum semper appetat, & eo egeat: quare si potus multæ frigida aquæ euomatur, est utilis: refrigerat enim, & humectat ventriculum, iecur, & renes, a quorum immodico calore attrahitur potus non mutatus.

**Reuulsio** Secundo, auertentibus, & refrigerantibus simul, ut san-  
**et refrige** guinis missione per sectionem basilicæ in initio cum virent  
**ratio.** adsunt, & frequenti vsu clysteris huius, vel similis: ℞. foliolo-  
**Clyster se-** rum lactucæ, violarum, maluarum, & portulacæ an. m. j. hon-  
**pe inicien-** dei præparati p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ℞. opo-  
**ans.** j. cui adde olei rosarum, & papaueris an. ℥. ij. cassiæ fistularis  
 præparatæ, & diacatholiconis ana. ℥. j. sacchari rubri ℥. j. f. s.  
 misce, & fiat clyster.

**Concoctio.** Tertiò, concoquentibus bilem, ut syrupo rosarum, violarum,  
 rum, myrtillorum, & papaueris, & aquis vel decocto portu-  
 lacæ, lactucæ, bursæ pastoris, & similibus.

**Purgatio.** Quarto, vacuantibus bilem, ut cassia fistulari, tamarin-  
 dis, manna, rhabarbaro, myrobalanis citrinis, & aliis, si opus  
 fuerit, valentioribus: ut ℞. medullæ cassiæ fistularis, & tamarin-  
 rindorum ana. ℥. ss. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua  
 endiuivæ ℥. j. diaprunis solutiui ℥. iij. syrupi rosarum ℥. j. aqua  
 buglossæ q. s. misce, & fiat potus.

**Alteratio.** Quinto, refrigerantibus hepar, renes, & totum corpus in-  
 ternis, & externis, ut electuario diatrium santalorum, diatrio  
 donis Abbatis, diamargaritonis frigidi, conseruis rosarum  
 violarum nenupharis, & acetosæ, & trochiscis de campho-  
 ra, & aliis multis, ut hac mixtura: ℞. mucilaginis, semini

**Confectio.** psyllij, aqua rosarum extractæ ℥. j. conseruæ rosarum ℥. ij. con-  
 seruæ acetosæ, violarum, & nenupharis an. ℥. ss. trochiscorum  
 de camphora, pulueris diatrium santalorum, & diamarga-  
 ritonis frigidi, an. ℥. ij. syrupi myrtillorum, quod satis est, mi-

**Balneum** sce, & fiat confectio. Dosis duo cochlearia quolibet die sum-  
**laudatur,** mo mane cum aqua, aut decocto refrigerante. Balneum a-  
**sed non a-** quæ tepide est in hoc genere optimum auxilium bis in heb-  
**quæ frigi-** domada ventriculo vacuo. Multi etiam viri prudentes bal-  
**de.** neum aquæ actu frigida ab umbilico ad partes infernas lau-

**Epithema.** dant: ego tamen nisi in iuvene, & assueto, & ætate non au-  
 derem eo uti. Hepati, & renibus admoveantur epithemata  
 & vnguenta refrigerantia: ut ℞. aquarum endiuivæ rosarum  
 & portulacæ an. ℥. iij. aceti rosati ℥. j. sandalorum omnium  
 & trochiscorum de camphora an. ℥. j. misce, & fiat epithema

**Vnguen-** ad hepar, & renes, quod post hoc, aut simile vnguentum sæ-  
**um.** pe admoveatur ætate frigidū actu: ℞. olei rosarum, & myr-



tillorum ana. ʒ. j. s. vnguenti populeonis ʒ. s. pulueris mastichis, thuris, sanguinis draconis an. ʒ. j. ceræ, quod sufficit, misce, & fiat vnguentum.

Sexto, corroborantibus renes, vt lacte ouino, vel caprino Corroborā epoto, & per clysteres sæpè iniecto cum succo renum arietis, & lamina plumbi tenuissima, & perforata supra renes, & Vis lumbos posita curat non solum hoc vrinæ profluuium, sed næ plumbæ etiam gonorrhæam.

## De Diabete. CAP. I.

## Scholium.

**D**iabetes à quibusdam.) Diabetes variè nominatur, Diabeta à celeri vrinæ transitu: hydrops ad matulam, ob vrinæ quantitatem. Sicut enim in hydrope naturalis cavitatis a-na, qua impletur, ita in hoc affectu matula: vnde malè Vallesius existimat hydropem ad matulam dici ob sitim, cum propter hanc dyspnoeam appetitur. Diabetes est velox exitus per vrinam eius, quod potatum est, Diabetes eodem à sua qualitate non mutato. Vbi per qualitatem, speciem intel- quid. lige: quia aqua epota suam seruans integram naturam excernitur, nec tantillum in colore, odore, aut consistencia mutata, Diabetes est symptoma in actione renum laesa: deprauate enim attrahunt, si immodicum est symptomum motum consideremus: Inde sequitur imbecilla retentio & alteratio, tantam enim vrinæ quantitatem non possunt continere renes, & ideo nec alterare, quia res, quæ alteratur, quæta sit oportet. Morbus, ad Morbus, quem sequitur hoc symptoma, est intemperies calida renū, quæ vim habet attrahendi. Modus generationis is est. Renes multum appetentes, Modus ex venis trahunt serum, hæ ex iecore, hoc ex intestinis & ventriculo. quo generis. Orificium autem ventriculi inanitum, & suctionis sensum sentiens, sic ratur hic immouet, hoc est appetitum potus: quo assumpto, statim à renis, iecore affectus. & renibus rapitur, suæque mole irritat renum expultricem. Hic affectus raro contingit, ita vt bis tantum eum viderit Gal. & ferè lethalis etus est fectus. est, quia cum cognoscitur, iam ægri in magnam imbecillitatem deueni- re lethalis. runt: quia in principio ægrè cognoscitur, cum sensim fiat, in augmento, quando iam cognoscitur, extenuatos videmus egrotos, non enim possunt rectè nutrirī, cum ob defectum vehiculi, alimentum non rectè distribuatur.

Multitudo vrinæ.) Auctor & alii quandam diabete non re- Error pri- ram fixerunt, & quod peius est, curant multam vrinam ex alimentis eticorum, & aliis causis generatam: quæ, cum non sequatur affectum morbosum, non eget curatione. Neque paralysis musculi vesicæ multam efficiet vrinam, cum non excernatur vna vice multa.

Diabetes, seu transitus vrinæ.) Alimenta non solum frigidam, sed crassa sint ex Alexandro, ne facili in vrinam mutantur, aut in diabete, à ren



## D E C V R A N D. M O R B.


à renum calore attrahantur: Concedantur ergo caro suilla, pedes arietini, poma, pyra, & similia.

*Sanguinis* Secundò, auertentibus.) Sanguinem mittes, quando renum calida intemperies, ex calido humore orta erit.

*Balneum.* Quintò, refrigerantibus.) Balneum sit ex aqua, in qua malua, lactuca, oxalis, viola et alia herba frigida sint decocta. Quibus regionem renis fricabis, quam postea ceroto refrigerante Galeni inunges. Assumet æger per os ʒ. j. sacchari rosacei cum lb. j. aquæ hordei.

## De Lumbricis.

C A P. L I.

*Differen-*  
*tia.*  Vmbricorum (vt autor est Gal. 3. aphor. com. 26.) tres sunt differentia, quidam enim rotundi, seu teretes sunt, alij lati, alij, quos Græci Ascarides appellant. Rotundi, seu teretes in superioribus intestinis magis generantur magnitudine palmari, & aliquando maiori, & ad ventriculum ipsum nonnunquam ascendunt, ibique pessima excitant symptomata: in ipso tamen ventriculo vermes gigni non possunt, vt docent Aristoteles, & Hieronymus Gabucinus libro suo de lumbricis: quamuis in auribus, dentibus, renibus, & matrice aliquando fiant: intestinis tamen magis, & plures generantur: ego enim anno 1545. vidi puellam nobilem expulisse mille ferme vermes paucis diebus & spatio quatuor horarum quadringentos, quorum aliqui etiam viui, & alij mortui, & vixit, viuítque nunc incolumis, Deo fauente. Sæpè etiam per os & nares eiiciuntur.

*Ab Ari-*  
*sto. dissen-*  
*tit Ama-*  
*tus Lusita-*  
*nus centu-*  
*ria I. cura-*  
*zione 6.*  
*Historia.*  
*Ascarides.* Ascarides tenues sunt lumbrici, qui in parte inferiori crassi intestini magis gignuntur, & plurimi manifestè apparent in iumentis malè cibum concoquentibus, quorum malam concoctionem fœtor indicat excrementorum. Latus lumbricus rarò accidit, longissimus tamen est, & sæpè per tota extenditur intestina. Paulus verò Aegineta lib. 4. cap. 57. & Aetius lib. 9. cap. 40. affirmant lati lumbrici generationem permutationem esse membranæ intrinsecus tenuia intestina ambientis in corpus quoddam viuum, quod continuos stomachi morsus infert. Generantur in humano corpore huiusmodi animalcula ex frigidis, & pituitosis humoribus putredini tamen accommodis, & vi caloris animatis, perinde ac externis cætera animalia videmus gigni, quæ non ex semine, sed ex putredine ortum habent. Signa, quibus singulas lumbricorum differentias cognoscas, ex Paulo, & Aetio in hunc modum desumpsimus. Teretes lumbricos habentes morsum ventriculi, tum etiam intestinorum corripuntur, & tussi item arida, & non magna: verum frequenter irritanti. Quidam



dam etiam singultiant, & dormientes tremunt, & præter rationem expergefiunt, quod nonnulli vociferantes faciunt, atque profilientes, sed rursus in soporem conuersi prosteruntur. Pulsus inordinatus habent febrēsque citra ordinē errantes, refrigeratis extremis partibus, augentur tertia interim quarta die, vel nocte, sine ratione accessionem habentes. Pueri verò, & grandiores natu linguam exerunt, atque oculis clausis silentium, & taciturnitatem amant, ideòque excitantibus irascuntur ob imbecillitatē vigilare nequeunt. Quibusdam, dum dormiunt, linguæ accidit manducatio & conformatio oris in modum lactentium, aut accipientium cibos: qui aliquando etiam dentibus strident, & conuiuent oculis, qui aliquando sanguine suffusi sunt, & habent faciem, maxime iuxtas malas rubicundam, quæ rursus mutato colore liuescit: breui verò hæc, & ex interuallis fiunt. Quibusdam in ventriculum ex intestinis ascendunt nausearum ibi, atque vellicationum causæ futuri: vnde laborantes cibum auersantur, quos si ad comedendum impuleris, nauseabundi, quod dentibus terunt, aut non deglutiunt, aut illico euomunt. Venter nonnunquam corruptos cibos excernit, & tympani modo intumescit: reliquum verò corpus tabe citra rationem consumitur, neque inedia, neque immodica vacuatione aliqua exinanitum. Multi quasi delirantes absurda in somno loquuntur, alij decubitus huc illuc mutant, ex loco ad locum sese vicissim proiciunt. Qui ab ascaridibus infestantur, vehementem habent ani pruritus, subindeque ad egerendum irritantur, & post excretionem, ut plurimum melius habent. Quibus verò lati lumbrici fiunt, ij morsus in ventriculo vellicantes sentiunt, & ad cibos potentem & cui corrigi non possit, appetitum habent: rapiunt enim, atque consumunt huiusmodi animalia quicquid alimenti oblatum fuerit: vnde denuò cibos assumi expedit, alioqui erodentur intestina: & ideo quædam puella (ut diximus cap. 33.) ob vermem duodecim cubitorum incidit in famem caninam. Consequitur sic affectus corporis gracilitas, *Historia.* & imbecillitas cum tarditate: minimè verò fallax signum erit, si cum recrementis quædam cucurbitæ semini similia *Curatio.* excernantur.

Duplex est lumbricorum curatio, prima eorum generationem prohibet, secunda eos genitos enecat, & expellit: de quorum omnium speciebus, & generationis locis multi multa scripserunt: inter quos edidit librum Hieronymus Gabu- *Præcautio* cinus Fanensis de lumbricis. *Præcautio* itaque fit per ea, quæ *Victus.* pituit



# DE CVRAND. MORB.

pituitam gigni prohibent, à qua & cruditatibus putrescentibus fiunt vermes. Necessaria est tunc alimentorum pituitam generantium priuatio, nocetque immodicus eibus, & deprauata victus ratio, vt si cibus crassior præcedat tenuem, si a cibo animi & corporis labores adsint, vt coitus, præsertim si sit immodicus, & si manus & pedes a cibo lauentur a-

*Vacuatio.* qua calida. Frequens quoque vacuatio per picram simp. non solum enecat vermes, sed ipsos fieri prohibet, vacuando materiam pituitosam, & crudam.

*Vera cura ratio.* Lumbrici iam geniti curantur primò, victu tenui calido & sicco, acri & amaro. Aliquando eorum morsus, si fame seuiant, rebus dulcibus est placandus.

*Victus.* *Necantia vermes.* Secundò, medicamentis enecantibus à tota substantia, seu proprietate, vel à qualitate manifesta calida in tertio gradu, & amara, quæ sua vi natura eos enecat. Et horum quædã sunt simplicia, de quibus Hieronymus Gabucinus c. 22. sui operis, & quædam composita, de quibus idem autor cap. 25. loquitur: in præsentia aliqua meliora, & probata scribã, quæ ventri admouentur, sunt tutiora, & infantibus, & pueris magis admouenda. Sed interna per os aliquando exhibentur, præsertim cum in superioribus intestinis reperiuntur: aliquando per clysteres, si locus vermiũ sint intestina inferiora.

*Calida simplicia.* Calida medicamenta simplicia, quæ vermes enecant, sunt mentastruum fluuiiale, cordumeni, semen porri, nigella, nucleï, & folia persicorum, cortex arboris celli, & succus eius, radix filicis, myrrha, aqua rutæ, semen apij cum lacte aut syrupo acetoso, nasturtium, semẽ erucæ, semẽ Alexandrinum

*Seminis Alexadrini excellẽtia.* obtinet inter omnia principatũ, quæ vermes enecant. Dosis eius cum aceto infusi 3. j. Absinthium vtrũque, abrotanum, allium, præcipuè cum aceto, amygdalæ amaræ, amonium, aristologia, præsertim longa, calametum, radix camaleontis, eupatorium, gith, succus lapathij breui tẽpore, cetaurea, costus, enula, lupini, puluis marrubij statim, origani succus, polium, scabiosa valẽter, semẽ vrticẽ, hyssopus, zedoaria, granũ milij indũ. Succus chelidonix, raphani succus, cardamomũ, puluis dictami, santonicum valenter, gentiana, semen brassicæ valenter, omnis matricaria, herba, quæ à nostris Valẽtinis dicitur cuquera, seu lumbrigera, quæ in littoribus inuenitur, & sub aqua maris iuxta saxa nascitur, vt in oppido de

*Laus herbe contra vermes, quæ mo-* Xabea regni Valẽtini, & aliis multis locis: hæc enim vermes hominis non solum interficit, sed terrestres, si imposta ipsis fuerit, vt à pharmacopola fide digno accepi, & nos sæpe experti sumus hoc. Dosis in infantibus est scrupulus semis vsque



que ad scrupulum vnum cum melle & aqua portulacæ, seu *scus mari-*  
graminis. Errant nostræ fœminæ Valentinae, quæ opinantur *nus à Dio-*  
huius herbæ vsum vermes efficere, cum sit falsum, & ratio- *scorde di-*  
ni cōtrarium: vulgò dicitur à quibusdam corallina, & à Dio- *citur.*  
coride lib. 4. cap. 84. marinus moscus. vide quid de ea sentiat *Error fæ-*  
Anton. Musa lib. de examine simplicium. *minarum.*

Frigida medicamenta, quæ vermes interficiunt, sunt, gra- *Frigida*  
num coriandri, si sæpe comedatur, sumac, acacia, hypoqui- *simplicia.*  
tis, portulacæ semen, & aqua, & succus, malum granatum a-  
cidum, cortex mali granati, flos, & radix ipsius, plantago mi-  
nor, endiuia, cichorea, lactuca, acetosa, rubus, lac asinæ, suc-  
cus citrangelorum, acetositas citri, & omnia acida, quæ pi-  
uitosam materiam incidunt.

Composita medicamenta, quæ vermes interficiunt, multa *Composita.*  
sunt, vt theriaca magna, mitridatū, syrupus de absinthio, siru-  
pus de mēta, syrupus de prasio, syrupus de calamento. Et hic  
syrupus valēter ipsos enecat: ℞. succi mētastrī, succi radices  
enulæ, succi absinthij, succi rutæ, an. ℥. iij. succi lactucæ asi-  
næ, succi cichoreæ, succi graminis an. ℥. vj. sumac, cornu cerui  
adusti, seminis portulacæ, & corticis granatorū an. ℥. iij. fiat de *Syrupus.*  
coctum ad medietatē, de quo percolato, & sufficienti quan-  
tate mellis, vel sacchari in ætate, & ægro bilioso fiat syru-  
pus, cuius dosis ab ℥. j. vsq; ad ℥. ij. Hoc medicamentū poten- *Confectio.*  
ter vermes interficit, & est vtile omnibus: ℞. theriacæ de ci-  
ro ℥. j. rasuræ cornu cerui adusti, seminis Alexandrini an. ℥.  
j. ℞. seminis portulacæ, corticis mali granati, an. ℥. ij. nigellæ,  
nyrrhæ, an. ℥. j. theriacæ magnæ ℥. j. ℞. rasuræ eboris, corticis  
nori celsi, an. ℥. iij. syrupi de absinthio. q. s. misce, & fiat con-  
fectio. Dos is est cochlearium vnum cum aqua portulacæ, vel  
graminis. Hiera simp. Gal. a drachmis tribus vsq; ad vnciam *Hiera.*  
vnam vermes enecat, & expellit. Agaricus trochiscatus ha- *Agaricus*  
bet eandem vim, & rhababarum quoque vt ego expertus *Rhabar-*  
sum. Et si prius bibat lac, vel per clysterem mittatur, citius *barum.*  
peribunt vermes. Si infans habuerit vermes, & noluerit bi-  
bere potum ex hiera simplici, vel ex aliis medicamentis ver- *Topica.*  
mes enecantibus, ventri & vmbilico admoueat fel arietis,  
vel bouis, cum pauco puluere aloes, lupinorum, centaureæ,  
coloquintidæ & similibus. Hoc cataplasma ventri sæpe ad- *Catapla-*  
notum vermes interficit: ℞. centaureæ vtriusq; absinthij, *sma.*  
polypodij quercini an. ℥. ij. centonicæ ℥. ℞. decoquatur omnia  
cū aceto, & postea cū felle arietis, vel bouis fiat cataplasma.  
Hoc vnguentum valenter eos interficit: ℞. absinthij, costi, *Vnguen-*  
amari, calamenti, origani, pulegij, persicariæ, foliorū persici, *tum.*  
an.



# DE CVRAND. MORB.

an. m. j. decoquantur omnia in aceto, & post pīnsantur, & percolentur ad modum carnis cydoniorum, cui adde aloes agarici, an. vnciam vnam, colōquintidā vnciam semis, oleo amygdalarum amararum, & pellis bubuli, quod sufficit, misce, & fiat ad formam vnguēti.

## De Lumbricis. CAP. LI.

### Scholium.

**L**umbricorum vt autor est.) Non est quod in hoc loco immoremur, inquirentes, an elminthes vox significet omnes lumbricos: an verò duò tantum eorum genera. Neque an lumbrici in omnibus possint generari partibus. Sufficit enim ei qui rectè curare volet, scire ex Gal. lumbricorum esse tria genera. Tum lumbricos posse generari in vètriculo, renibus, vesica, vtero & aliis partibus. Quod quamuis ita sit, cum in intestinis frequentissimè, et in aliis partibus raro generentur, proinde Gal. lumbricos in intestinis generari in lib. de locis affectis scripsit. Præctici in radice dentium, vermem generari existimant, decepti ex nervo ibi implantato. Lumbricorum ex 3. aph. com. 26. Primum tria sunt genera: Primum continet eos lumbricos, quos teretes, aut rotundi genus lumbricos ex figura nominamus: Qui in tenuibus generati intestinis, aliquando ad ventriculum ascendunt, vbi humores agitantés varia pariant symptomata. Hos per nares & os aliquando excerni videmus quos melius esset infernè egredi ex 2. prog. sent. 17. quia gula nō est fabricata propter expulsionem. Secundum genus est lumbricorum elatorum. Hi in duplici genus. sunt differentia, quidam adeo magni sunt, vt eandem intestinorum figuram habeant, & appellantur teniæ, hoc est fasciæ. Vidi ego à Ludouico Cucurbiti- Collado præceptore accersitus fasciam adeo magnam, vt ferè vlnæ longi- tudinem attingeret, & adeo caua, vt totam manum includeret. Alii Generatio appellantur cucurbitini lumbrici, ob figuram, quam habent semini cuculorum ex cucurbitulæ similem. Generantur lumbrici lati, vt præctici scribunt sequens prædictorū ti Paulum ex interna membrana intestinorum animata, & mutata sententia. in vermem. Cucurbitini verò, ea eadem membrana in latas, sed minores Refutatur partes animata. Quorum sententia falsa est, quia si interna intestinorum tunica animari debet, ex putredine id fiet. Qua autem ratione poterit tam magnum vlcus viuente animali in intestinis excitari, & quod magis est, sine febre? Hi lati lumbrici cum raro generentur, proinde Gal. Tertium 3. lib. aph. com. 26. eorum non meminit. Tertiū lumbrici ascharides ap- genus. pellantur, in intestino recto generari soliti. Qui similes sunt vermibus in stercore iumentorum & caseo ortis, vehementissimos inducentes pruritus. Hi omnes lumbrici tribus differentiis inclusi, conueniunt in materia, Materia & in causa efficiente. Materiam habent pituitosum humorem putresca- lumbricorū. etum, cuius effatu digna quantitas (generatur enim in ventriculo) in in- testin



testinis coaceruari solet. Causa efficiens calor est præter naturam, ex- Causa ef-  
 citatus in pituita putrescente, at proinde Gal. lib. 3. de locis affect. com. ficiens.  
 26. a magno calore eos fieri scribit. Si dicitis, non videri rationi consonum, Obiectio.  
 calorem præter naturam (cuius proprium est omnia corrumpere) rei vi-  
 uentis esse causam. Respondeo, illum calorem respectu nostri, esse præ-  
 ter naturam, at respectu materia prædictæ esse naturalem, & in ea cer-  
 to modo permiscere elementa, & ideo posse rem viuam efficere.

Secundò, medicamentis enecantibus.) Lumbricus pars est in Quomodo  
 corpore addita toto genere præter naturam, ac proinde auferenda. Au- auferuntur  
 feritur à duobus generibus medicamentorum: Primum toto tempera- lumbrici.  
 mento operatur, cum enim lumbrici animalia sint, habent sua venena,  
 corallum, cornu ceruinum, lumbricos terrestres & similia, solo experi-  
 mento cognita. Secundum genus medicamentorum, qualitate manife-  
 sta lumbricos interficit amaritudine videlicet, 14. method. cap. ultimo,  
 vel quia amarum non est esculentum, ac ideo eo assumpto ex defectu  
 nutrimenti moriuntur vermes: vel quia amara eis infesta sunt. Aliqui  
 ab acribus etiam, lumbricos interfici sentiunt. Quorum sententia nobis Acrida non  
 non placet, quia si loquantur de acribus non esculentis, squamma æ-interficiunt  
 ris, & aliis decipiuntur, cum hæc per os non assumantur: si de esculen- lumbricos.  
 tis, alimenta sunt, poterunt ergo vermes nutrire. Sentis ergo acrida me-  
 dicamenta non interficere lumbricos, sed mediis ipsis expelli, cum acrida  
 irritent. Lumbrici teretes & lati medicamentis per os assumptis oppu-  
 gnantur, at Ascharides clysterem infusus, decocto hordei cum lupinis,  
 & aliis amaris (dummodò non astringant) addita hiera picra.

## De hæmorrhoidibus. CAP. LII.

**H**æmorrhoides, vt ex Aetio lib. 14. cap. 5. aliisque Descriptio.  
 grauiſſimis autoribus colligere possumus, vena-  
 rum in sede sunt explicationes, dilatationesque à  
 crebro sanguinis defluxu sic appellatæ, qui nos à  
 multis morbis lethaliſſimis liberat, autore Hippocrate lib. 6.  
 Aphor. quamuis Gal. lib. 6. de symptomatum causis, cap. 2.  
 velit omnem sanguinis fluorem præter naturam toto gene-  
 re esse, excepto eo, qui mulieribus ab utero defluit: hæmor-  
 rhoidum tamen fluor, si ordinem seruet, & non sit immodi-  
 cus, melancholicum morbum, affectionesque renum curat,  
 & ipsæ longo tempore suppressæ hydropè, & tabem faciant,  
 autore Hippocrate aph. 12. lib. 6. Quare idem pater, & magi-  
 ster noster Hippocrates lib. 4. Aphor. 26. sanguinem supra e-  
 missum, malum esse, & infra bonum vult: & Gal. in commet.  
 confirmans sententiam, dicit: frab hæmorrhoidibus, & men-  
 sibus fluat. Quidam putant aliquos ex genere Hebræorum  
 hoc sanguinis fluore esse singulis mensibus affectos diuina



# DE CVRAND. MORB.

- Differen-* ultione: alij credunt ob perpetuum timorem ipsos sanguine  
*tie.* atro abundare, & ideo hoc sanguinis defluxu indigere. Ha-
- Manardi* rum quædam sunt cæcæ, quædam apertæ: cæcæ a Græcis  
*opinio.* condylomata dicuntur, Manardus tamen lib. 7. epist. dicit,  
condylomata esse tubercula in ambitu matricis sanguinem  
fundentia a similitudine extremorum in pugno clauso in  
quatuor digitis nodorum. Nihil ex his, sanguinis euacua-  
tur, aut parum: perpetuò tamen intumescunt, & illarum va-  
riæ sunt differentia & species, si Arabibus, barbaris, & ex-  
perientia credimus, verrucæ videlicet, vucæ, morales, &  
vesicales propter variam earum figuram, & naturam san-  
guinis. Apertæ verò sunt, a quibus certis temporibus defluit  
sanguis, aliquando seruato, vt diximus, ordine, sæpe non ser-  
uato, nec debita quantitate. Et omnes præsertim cæcæ, re-  
*Causæ.* periuntur cum dolore, & aliquando sine ipso. Proueniunt v-  
træque ex copia, & malitia sanguinis melancholici, cuius  
causæ externæ, & internæ solent esse variæ, vt ex cap. 9. hu-
- Signa.* ius libri cognoscere possumus. Signa quibus hoc malum de-  
prehenditur, sunt satis nota: cæcas tamen sæpe comitatur  
dolor ani, cum stercus excernitur.
- Curatio.* Hic fluxus immodicus curatur quatuor auxiliorum gene-  
*Victus.* ribus: Primò, victu frigido astringente, & incrassante sangui-  
nem, sensim tamen, & cautè: nam si fuerit antiquus, non o-  
mninò est astringendus, cum ex doctrina Hippocratis Aphor.  
12. lib. 6. si vna earum non fuerit relictæ, periculum est, ne fiat
- Aetius re-* hydrops, vel tabes: neque enim Aetius 14. sermone. cap. 5. esse  
*prehendi-* audiendus, qui contra Hippocratem, rationem, & experien-  
*tur.* tiam docet omnes has venas esse claudendas, post antiquum  
sanguinis profluium, si ægri vtantur debita victus ratione.  
Sit ergo victus similis victui illi, qui præscribitur in proflu-  
*Aduerte.* uio sanguinis è naribus, & sputo sanguinis, de quo cap. 21. &  
28. dictum est: quamuis hic sit alius lenienda vis passis sine  
granis, prunis damascenis, iure mercurialis, & blitis, ne ster-  
cus sua duritie noceat.
- Reversio.* Secundò, auertentibus, vt secta vena iecoraria dextra va-  
cuatione larga, & quæ respondeat plenitudini, & natura æ-  
gri. Et cucurbitulis hepatis, & partibus superioribus affixis,  
& vinculis, & frictionibus earundem & foribus, post sangui-  
nis tamen missionem, vel sine ipsa, & ob virium defectum ve-  
na rumpenda non sit.
- Obturbatio.* Tertiò, contrahentibus, & glutinantibus ora illarum ve-  
*Sumenda.* narum, & refrigerantibus, & incrassantibus sanguinem sum-  
ptis, & admodis, vt syrupo rosarum, malorum granatorum,



myrtillorum, cydoniorū, aquis, vel decocto portulacæ, plantaginis, acetosæ, solani, & similibus: Conserua rosarum antiqua, conserua cydoniorum, bolo Armēno, terra sigillata. Karabe, hæmatite lapide, sanguine draconis, spodio, & similibus. Hæc mixtura est utilis, & necessaria huic profluuiō: *Confectio*  
 ℞. micletæ, conseruæ rosarum antiquæ. an. ʒ. j. β. corallij rubri præparati, lapidis hæmatitis, Karabæ, gummi dragaganti an. ʒ. ij. sanguinis draconis, thuris, mastichis. an. ʒ. j. syrupi cydoniorum. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis cochlearium vnum summo mane, & omni hora cum aqua sanguinariæ, vel portulacæ, vel plantaginis. Aliquando necessaria sunt *Narcotica* narcotica, si fuerit immodicus fluxus hic. Si supradictis, & *ca.* similibus non curatur, inter quæ trochisci de Karabe, vel spodio, vel de terra sigillata a drachma semis vsque ad drachmam vnam sunt optimi, & athanasia, & requies magna ab scrupulo vno vsque ad drachmam vnam cum aqua, aut syrupo astringente aliquando seruatis legibus, & ordine capite 36. descripto de curatione scilicet diarrhææ est necessarium philonium maius, vel Persicum, vel Romanum ab scrupulo vno vsque ad drachmam vnam. Sistit hoc profluuium *Admonē-* albumen oui mixtum aqua rosata, & puluere mastichis, *da.* sanguinis draconis, thuris, & aliorum medicamentorum astringentium ipsis venis actu frigidum admotum, de his tamen abundè diximus capite 21. de curatione profluuij sanguinis è naribus. Aliquando in hoc sanguinis profluuiō, quemadmodum in aliis, sunt necessaria cauteria, vel *Cauteria* medicamenta narcotica, vt suppositorium ex rebus astringentibus cum paucio opio, seruata tamen vna si antiquus fuerit fluxus, vt diximus cum Hippocrate. Si verò summa *Si fluxus* esset imbecillitas virium, totus est sistendus fluxus hic, & sit cū im- *postea* postea facultate per alimenta optima corroborata iterum *becillitate* posset scindi aliqua vena ex iis, ne hydrops, vel tabes, vel *cōiunctus* mania fieri possint.

Quartò, emendantibus sanguinem victu, & aliis: nam si *Emenda-* sanguis largior sit in corpore, victu tenui curatur, & sangui- *tio sangui-* nis missione. Si biliosus, victu frigido, & purgatione per *nis copiosi.* myrobalaños citrinas, rhabarbarum, tamarindos & cassiam *Biliosi.* fistularē. Si pituitosus, victu sicco cū temperata caliditate, & *Pituitosi.* astrictione, & purgatione per myrobalaños Kebulos, agari- *Emendati-* cum, & alia medicamēta phlegmagoga: dummodò ipsi *tia sangui-* sceantur astringētia. Emendant sanguinem, postea electua- *nem post-* rium diatrion santalorū, diarhodonis Abbatis, cōserua bu- *enacti-* glosa, rosarū, & cydoniorū. Squāma ferri debite præparata, *nem*



# DE CVRAND. MORB.

sæpe videlicet in aceto infusa, & decocta, & exiccata prodest: Eius drachma vna, vel duæ bis in hebdomada sumptæ ventriculum, & hepar roborant, & humorum malignitatem leniunt, & castigant.

**Curatio doloris.** Dolor hæmorrhoidum curatur per causæ abscissionem, quando nō est vehemēs, nec facultatem nimis resoluit: nam si vehemens dolor est, amouendus etiam erit per narcotica, vt sæpe dictum est, non habita ratione causæ. Dolor, si ab inflammatione fiat primò, curatur victu tenui, & refrigerante: Secundo, quertentibus, vt sanguinis missione per sectionem basilicæ, & vinculis, frictionibus, & fotibus partium superiorū: Tertiò, repellentibus, vt aqua rosarū, portulacæ, plantaginis, & candido oui cum oleo rosato, mucilagine seminis psyllij, & cydoniorum. Quartò, in augmēto, & vigore repellentibus, & resoluentibus, vt oleo camomillæ, & rosarū misto, vel hoc vnguento: ℞. olei rosarū, & camomillæ, an. ʒ. j. mucilaginis seminis psyllij, & fœnugræci, & seminis althææ an. ʒ. ij. ceræ, q. s. misce, & fiat vnguentum. In declinatione resoluentibus tantum curatur. Si inflammatio in suppurationem transeat, ab arte est natura corroboranda, & iuuanda: quæ tamē post primam dictā tutior est duabus aliis, nempe quæ in lapidificationem, vel corruptionem finiantur: pessimi enim, sunt hi duo vltimi modi omnium tumorū præter naturam, præsertim huius partis, cuius affectus, autore Gal. 9. de compositione medicamentorum secundum locos, difficulter curatur quatuor de causis: Prima, ob eius sensum: Secūda, propter vsum partis, excrementa enim sua vi acri mouent facultatem expultricem: Tertia, medicamēta vtilia non detinentur tempore necessario in ea parte: Quarta, ob caliditatem, & humiditatem partis huius, ideoque amat hic locus siccātia, & refrigerantia medicamenta, vt sunt metalla, præsertim tuthiam. Suppurata ergo inflammata parte à natura, & ab arte per medicamenta suppurantia, de quibus fermē omnibus Iacobus Hollerius lib. i. c. 5. de materia chirurgica abundē scripsit: mixtura tamen ex farina tritici sine furfure, aqua decoctionis maluarum, & oleo satis suppurationē efficit, est tripharmacum Galeni, & si addas parum croci, & vitellos ouorum, erit efficacior: deprehēdes pus genitum esse per febris, & doloris remissionem. Post, necessaria est puris extractio aperto suppurato loco ferro, aut igne. Tandem curatur absterfio abstergentibus & vltimò consolidantibus: sed in hoc consule doctum chirurgum, & sequere Iacobi Holerij librum secundum de materia chirurgica.

Quan



Quando dolor hic à sanguine implente has venas absque *Doloris à*  
inflammatione, & fluxu fit, quod per tumorem, & colorem *sanguinis*  
deprehendes, sanguis ab illis est mittendus, præcipue si æ- *plenitudi-*  
groti soliti sint habere hunc fluxū, quod fiet, primò magnis *ne curatio.*  
frictionibus partium infernarum, & pudendorum, secundò,  
cucurbitulis admotis partibus internis coxarum, & parti,  
quæ est inter anum, & testes. Tertio, secta vena saphena, vel  
poplitis. Quarto, aperiione harum venarum lanceola, vel  
ferro tenuissimo. Et si ipsæ non appareant exterius, magna  
compressione versus inferiora, & magna cucurbitula fient  
manifestæ. Ex ipsis vna, vel plures rumpantur, & secundum  
tumorem vnius, vel plurium extrahatur sanguinis copia re-  
spondens plenitudini, id fieri potest per hirudines. Quintò,  
acubus argenteis, vel aureis, præsertim si fuerit sanguis te-  
nuis, vel foëminarum. Sextò, frictionibus per medicamenta *Aperien-*  
acria, qualia sunt calamentum, origanum, cyclaminus, pi- *tia orificia*  
per, nitrum, & fel, quod est aliis potentius. Septimò, per me- *venarum.*  
dicamenta excoarantia, qualia sunt folia ficus, scylla, & alia  
lacticia, & pulvis cantharidum, qui est aliis valentior in  
hoc morbo. Octaua, per ignem, seu cauterium actuale: hæc  
tamen aperiio non fit, nisi cum est initium corruptionis, &  
gangrenæ. Tutius ab eis mittitur sanguis quarto & quinto  
auxiliis sanguinem mittentibus. Emissio sanguine sufficien-  
ti, locus affectus curandus est mundificantibus, & abster-  
gentibus clementibus, & consolidantibus hoc, aut simili vn-  
guento: ℞. vnguenti basiliconis ℥. ij. olei de chrysomellis, *Vnguentū*  
terebinthinæ abietis, bene lotæ. an. ℥. j. camphoræ & tuthiæ *detergens*  
præparatæ an. ℥. j. ceræ albæ ℥. iij. misce, & fiat vnguentum. *& consoli-*  
Quando dolor est ob earum magnitudinem, & fluxum im- *dans.*  
modicum, & antiquum, curantur exsiccantibus, & resolu- *Doloris à*  
tibus post debitas vacuationes, & auersiones. Ligatura earū *fluxu im-*  
in radice filo tenui serico sensim arctius astringendo, donec *modico, &*  
in totū abscindantur: est probata, & satis tuta aperiio earum *antiquo*  
secundum longitudinē per cauteria parua admouendo por- *curatio:*  
ci pinguedinem non salitam, donec eschara, seu crusta deci-  
dat: & postea secūdo, & tertio, & quarto eiusdem paruis cau-  
teriiis eodem modo apponendo pinguedinem, donec crusta,  
& tota substantia earum putrida consumatur. Aliqui in hoc  
morbo laudant medicamenta corrodentia: sed ego non lau-  
do ea, neque ignem actuale. Hæc sunt experta, & tutiora *Quorum-*  
ad hæmorrhoidas has exiccandas, & ad curanda earum, & dā *opinio*  
ani vlcera, & incisuras, drachmæ scilicet dimidium pulue- *improba-*  
ris radices, vel floris lilij cum paucio vino rubro multis die- *tur.*



# DE CVRAND. MORB.

bus sumptum. Eandem vim dimidium drachmæ vnus pul-  
ueris radicis pentaphilonis cum pauca aqua frigida in æsta-  
te, & calida in hyeme sæpe mane sumptum. Idem fit squinā-  
tij puluere. Drachmæ duæ galbani ter sumptæ cum aqua  
*¶ si nostro* frigida potenter exiccant has hæmorrhoidas. Ego hoc sum  
*probata.* expertus. Pulvis capitis piscis saliti, & casei antiqui æquis  
ponderibus: idem facit electuarium de scorïa ferri, & pilulæ  
de bdellio valenter exiccant has hæmorrhoidas, si interius  
sumantur. Multa quoq; sunt, quæ admota ano valenter exic-  
cant, & sanant has hæmorrhoidas, quorum aliqua meliora,  
*¶ vnguen-* & experta in præsentia adducam: vt ℥. mellis ʒ. j. ꝑ. aceti ʒ.  
*tum.* j. vitreoli viridis, floris æris, tuthiæ præparatæ, lithargirij,  
plumbi vsti, an. ʒ. ij. mel, & acetum prius feruiscant, deinde  
extra ignem misce pulueres, & fiat vnguentum: vel ℥. radi-  
dicis hyari sine cortice. ʒ. ij. radicum liliorum alborum ʒ. j.  
ꝑ. pulueris panis porcini, & pulueris panis furfuracei an. ʒ. j.  
ꝑ. pulueris nucum cupressi ʒ. j. granorum myrti, seminis plā-  
taginis, thuris, sandaracæ Arabum an. ʒ. ꝑ. farine fabarum ʒ.  
ij. olei laurini, & de chrysomellis an. ʒ. ij. misce, & fiat ad mo-  
*Cataplas-* dum cataplasmatidis, addendo parum decocti radicum præ-  
*ma.* cedentium, antequam admoueaturo, fiat fotus cum vino  
rubro, exiccat, & resoluit has hæmorrhoidas, & repellit hu-  
mores fluentes ad eas. Balnea naturalia, quæ habent vim de-  
siccandi sunt optima in hoc, vt sulphurea, salsa, aluminosa.  
*Balnea.* Balneum, vel fotus ex decocto, cannarum, filipendulæ, gra-  
norum myrti, radicum hyari, & similium valenter exsiccat,  
*Supposito-* Suppositoria, seu glandes ex radice peucedani, vel gentia-  
*ria.* næ, vel hyari, vel ireos valde has hæmorrhoidas exiccat.  
*Suffitus.* Suffitus etiam stercoris vaccæ, vel spoliij serpentis est in hoc  
*¶ vnguen-* optimus, & suffitus huius pulueris: ℥. anacardi ʒ. ij. galba-  
*tum.* ni ʒ. j. stercoris columbini, & stercoris vaccini an. ʒ. j. ꝑ. mi-  
sce, & fiat pulvis. Hoc vnguentum, hæmorrhoidas has curat  
exiccando, resoluendo, & aliquando aperiendo: ℥. melon-  
genarum in partes paruas diuisarum ʒ. iij. radicum iridis in  
partes paruas diuisarum ʒ. ij. olei li. j. fiat decoctum ad vini con-  
sumptionem, cui percolato adde axungia anatis, & gallinæ  
an. ʒ. j. olei scorpionum ʒ. j. ꝑ. cere q. s. misce & fiat vnguentum.  
*Historia.* Ego expertus sum quendam nobilem affectum his antiquis hæ-  
morrhoidibus cum dolore vehemēti & rhagadibus, seu scissu-  
ris post multas vacuationes, & auersiones incidisse ex crassa  
natura, & constitutione corporis in satis macram; curatum  
tamen fuisse fotu frequēti ex decocto rubi, & additione post  
fotum pulueris eiusdem rubi, & vnguenti pompholygos.  
Sed



Sed quia dolor in hoc morbo est grauissimum symptoma, & ad se omnem curationem trahit, nulla habita ratione causę eius, omni studio oportet ipsum curare. Quare considera be *Doloris* nę, quę Iacobus Hollerius scripsit cap. 5. tertij libri: in prę- *curatio.* sentia tamę aliqua probata adducemus. Primò, curatur dolor hic & quicunque alius fotu, & lotionē frequentē ex decocto croci: Secundò, ex fotu, & vnctione sępe: Tertio, ℞. pulueris camomillę 3.ij. pulueris anethi 3.ij. croci puluerizati 3.j. vitellos ouorum numero ij. sępe. q. s. misce, & fiat cataplasma: quod valentiũs dolorem curat duobus prioribus auxiliis. Quarto, ℞. olei rosati 3.iiij. vitellos ouorũ numero iiij. croci puluerizati 3.j. misce, & fiat ad modum vnguenti, quod est prestantissimum remedium. Quintò, ℞. olei nenupharis, & camomillę an. 3.j. succi lactucę 3.ij. farinę hordei 3.j. simul parum feruefiant, & in fine adde croci puluerizati 3.j. vitellos ouorum numero iiij. misce, & fiat ad modum cataplasmatidis. Si dolor fuerit maximus, adde iusquiami, vel mandragorę, vel opij 3.j. Maximum hunc dolorem curabit etiam suppositorium ex solo philonio. Hoc vnguentum est *Vnguen-* in hoc symptomate optimum: ℞. olei de nenuphare, & olei *tum.* de papauere an. 3.j. olei mandragorę 3.j. croci puluerizati 3.j. tuthię, cerusę lichargirij. an. 3. s. amydi, terrę sigillatę an. 3.ij. opij 3. s. vitellos ouorum numero iiij. misce, & fiat ad modum vnguenti in instrumento plumbeo. Hoc cataplasma *Cataplas-* est valentissimum in dolore curando: ℞. radicũ althęę lb. *ma.* s. radicũ liliorũ 3.ij. foliorũ maluarũ, & iusquiami an. m. j. camomillę 3.j. meliloti, seminis anethi an. 3. s. farinę fœnugręci, seminis lini, & hordei an. 3.j. s. olei sesamini 3. iiij. opij. 3.j. misce, & fiat cataplasma cum decocto herbarũ, & radicũ præcedentium.

## De Hæmorrhoidibus. CAP. LII.

## Scholium.

**H**æmorrhoides vt ex Actio.) Hæmorrhoids nil aliud signi- *Nomen* ficat, quàm sanguinis euacuationem: ac proinde, per quamli- *explicatur.* bet partem contingant sanguinis euacuationes, si vim nominis consideremus, hæmorrhoides dici poterunt. Consueuerunt tamen veteres medici, fluores sanguinis per venas an tantũ hæmorrhoides appellare, quia per has venas solet frequenter sanguis præter naturam excerni: Et ideo existimo Gal. lib. 6. epyd. par. 5. com. 25. hæmorrhoides appellare sanguifluas venas. Et quatuor hæmorrhoides, quędam sint cactę,



Et quedam reclusæ, cum frequenter soleant esse reclusæ, proinde huius  
 affectui, nomen impositum est, euacuationem significans: sunt enim hæ-  
 morrhoides euacuationes per venas ani. Inde videbis male aliquos, hæ-  
 morrhoides appellare dissectiones venarum ani. Hæmorrhoides reclusæ  
 reclusæ symptoma sunt, in iis quæ excernuntur toto genere præter naturam.  
 clusæ sym- Morbus est instrumentarius, in via, aut cavitare. Hæmorrhoides cecæ,  
 ptoma sūt. dolorem inferunt: qui symptoma est, ortum, ex inflammatione illarum  
 Morbus venarum, & continentium parium, ut ex nimia earum mole colligi-  
 cecæ. mus. Causa supradicti morbi in via, humor est varius tamen, & va-  
 Causa mor- rio modo ad eam perveniens partem. Quia aliquando melancholia, aut  
 bi supra sanguis abundans, à natura expulsa per dictas venas euacuatur: ali-  
 dicti. quando verò ex Galeno 6. epyd. par. 5. com. 25. sine naturæ providentiâ,  
 aut conatu, sanguis dilatans impetu orificium venæ excernitur. Hinc  
 varias intelligemus Hippocratis sententias. Quarum una est 33. lib.  
 6. Epyd. par. 3. altera verò 11. libri 6. aphorismorum: si enim per ani  
 venas sanguis fluens, optimus sit, & solum quantitate peccans, libe-  
 ratur æger a pleuritide & peripneumonia. Si sit cacochimia melan-  
 cholica, aut sanguis melancholicus, non patietur phagedenica ulcera,  
 id est, corrodenia, neque furunculos, neque exanthemata in cruribus  
 oriri solita, quæ similia sunt cum terebinti fructu: neque melancholiam,  
 nec nephritim à lapide (cuius melancholicus humor est materia) ortam.  
 Controuer- Solet quæri à medicis exortus, venarum ani, quas hæmorrhoides ap-  
 sia de ve- pellare solent Rondoletius, Altomarius & alii existimant, per partem  
 nis hæmor- exterioris intestini recti, disseminari exiguas venas à caua ortas: at  
 rhydibus. per internam partem venas maiores, ex vena portæ procedentes. Un-  
 Sententia de colligunt hæmorrhoides venas, esse ramos venæ cauæ, & venæ por-  
 Rondole- tæ: & ita euacuatione humoris in toto corpore, iecore, & renibus con-  
 tui & alio- tenti, per venas exteriores intestini, qui à caua procedunt, excerni: at e-  
 rum. uacuationem melancholiæ ex liene per venas internas. Curtius in hæ-  
 Sententia morrhoidibus, per utrasq; venas sanguinem excerni persuadet, raro ta-  
 Curtii. mē per ramos venæ portæ, quia hi non propter expulsionē, sed propter  
 Omnes su- attractionē fabricati sunt a natura. Certè si exactè rem consideremus,  
 pradicti videbimus omnes hos errare: quia venæ sanguisflue se aperiunt in ca-  
 errant. vitatem intestini, aliter non possent sanguinem profundere. Et idcō so-  
 lum venæ à porta enatæ, hæmorrhoides dicuntur, quia habent ora in  
 cavitatem intestini patentia. Adde per hæmorrhoides venas copiosum  
 excerni sanguinem aliquando, quē per propaggines venæ cauæ per mu-  
 sculum disseminatas, & intestini partem exteriorē euacuari non pos-  
 Altomarii se ostendit earū paruitas. Id quod Altomarius scribit de euacuatione  
 lapsus. totius corporis per hæmorrhoidas, fieri scilicet per venas à caua ortas,  
 falsum est. Nā præterquam quod per illas nō potest fieri (ut diximus)  
 copiosa euacuatio, nil impedit, quo minus per alias fiat, habētes cū ve-  
 nā portæ cōmuni- cationē, ob quā frequēter natura s: let totū expurgare  
 corp



pus. Neq; Curtij ratio cōcludit, si aduertias Gal. in lib. de natu. fac. Curtii ra-  
professo probare, per easdem venas, per quas distribuitur alimētum tio nulla.  
corpus, fieri etiam humoris, aut excrementorum euacuationem.

Hic fluxus immodicus curatur. ) Si in hæmorrhoidibus eua-  
etur plethora, aut peccans humor, cum liberentur homines à supra-  
tis malis, nihil efficiendum erit, quia euacuatio cum commodo ani-  
lis exercetur. Si sit excedens, solet cachexiam, & hydropem efficere Quæ se-  
rigerato iecore. Si sit deficiens, & diminuta euacuatio, si supprima- quantur,  
humor melancholicus: fit melancholia, & iecoris refrigeratio: si suppressis  
ro sanguis, hydrops, & cachexia suffocato calore contingunt: sicut hæmor-  
uritis, peripneumonia, aut in alia parte inflammatio, sanguine ad rhoidibus.  
uram, pulmonem, aut aliquam aliam partem decumbēte. Cum ergo  
immoderata, hæmorrhoidum euacuatione, aut suppressione, tot eue-  
ant mala, oportebit diligenter occurrere. Si immodica euacuatio sit, Curatio.

ul & recens, tota supprimenda erit. Dubium autē est de inueterata. Dubium  
pocrates 6. aphorismorum sent. 12. in antiquis hæmorrhoidibus, re- de inuete-  
m apertam relinquit: at Aetius purgato corpore omnes claudit. Ve-rata flu-  
r tamen est Hippocrates, quia in antiquis hæmorrhoidibus natura xione.

anum consuevit sarcinam deponere: quam consuetudinem si repen-  
mutemus, supradicta mala excitabimus. Quod exemplo confirmauit  
epy. sentent. 132. ubi Alippum (qui hæmorrhoidibus affectus erat)  
ratum, insanum redditum scribit. Dices, nonne si vna vena aperta re-  
quitur, totum corpus refrigerabitur? Respondeo maius malum, &  
uorem mortem sequi, si eam statim supprimamus. Si hæmorrhoides  
n fluant, aut nunquam fluxerunt, aut aliquando fluxerunt: Si nun-  
am fluxerunt, aperiendæ à nobis sunt, videntes hominem lienosum,  
t melancholicum. Si fluxerunt aliquando, multò melius eas moue-  
mus, potissimum si videamus ex earum suppressione aliqua mala iam  
qui. In fluxu immodico hæmorrhoidum, victum frigidum & adstrin- Iacotius  
ntem imperat auctor, & alii cum ipsi. Malè tamen, quia ea quæ fri- reprehē-  
da sunt, & adstringentia, stercus indurant: quod magno egens cona- ditur.  
, & forti expresseione ad hoc vt expellatur, sanguinis fluxus augebi-  
r. Sint ergo alimenta temperata, aut lenientia aluum propter dictam  
usam.

Secundò auertentibus.) Distinctione opus erit, si noluerimus er- Vnde san-  
re cum auctore. In immodica euacuatione humoris melancholici ex guinis mis-  
ne, basilicam sinistram seca, quæ vasorum & naturæ habet rectitu- sio exercē-  
nem: in ea verò quæ ex toto corpore, aut iecore fit, basilicam dextram. da.  
em seruandum est in cucurbitularum applicatione.

Tertiò, contrahentibus.) Omnia medicamenta, quæ ab auctore Lapsus  
e in loco, per os assumenda describuntur, omitte: quia sua adstrictione auctoris.  
reus indurant. Adde ab his non posse obstrui venam reclusam, quæ  
ano posita multum distat ab ore: vti tamē poteris illis medicamentis,  
quæ



que ab auctore ano applicantur.

**Medica-** Quartò, emendantibus.) Medicamenta ex squamma ferri præp-  
**mentum** rat, non est quod utaris per os: bene exterius applicando sequuntur G  
ex squam lenum lib. 5. metho. cap. 10. qui eo exsiccat vlcera auris & ani.

**ma ferri,** Septimò per medicamenta excoriantia.) Fel taurinum co-  
ubi vile, venientissimum anostomoticum est.

**Ligatura** Ligatura earum in radicem.) Si tenues sunt, ligatura vti-  
quando est: secus si crassæ.


**prodest.** Aliqui in hoc morbo laudant.) Abstinentum à corrodentibus  
medicamentis, quia fluxionem mouent: Et ab igne actuali propter  
cinas partes.

Vt ℥. mellis 3. j. & c.) Omittatur hoc medicamentum, quia  
triolum, & flos æris caustica sunt.

**Error au-** Vel ℥. radice hiari.) Si radix hiari, & liliorum, & puluis, p-  
**cloris.** nis porcini aperiendi habent vim, cur ea miscet auctor in hac cõpositi-  
ne, in qua vlcera ani exsiccare instituit: suppositoria deme ab his acria-

Hoc vnguentum est in hoc symptomate optimum.) Op-  
imum est, sed nonne breuius oleo rosaceo, omi luteo, & opio id præstabit

## De procidentia ani. C A P. L I I I.

**Descriptio**  Vm anus aut propter musculorum obliquorum so-  
dem sursum reuellentium imbecillitatem, & resolu-  
tionem, aut propter ingentem in egerendo conat-  
tum procidit, aliquandò ab inflammatione, vel alio tumore  
præter naturam, cuius curatio necessariò præcedere debet  
reductionem intestini, malū fit nulli non notissimum quā-  
procidentiam ani nominamus, barbari exitum ani, aut lan-  
gaonis dicunt.

**Curatio.** Si ani procidentia sit à sola intemperie, contrariis cura-  
tur sedi admotis in forma vnguenti, vel cataplasmatidis, ve-  
fotus: in omni tamen quiescat altis clunibus, & iunctis præ-  
cipue ano reducto in suum locum. Si sit ob imbecillitatem  
vel resolutionem, seu paralyfim musculorum, curabitur pri-  
mò, victu exiccante, & calfaciente, de quo cap. 13. Secundò  
pituitam apparantibus: Tertiò vacuantibus medicamentis  
conuenientibus, de quibus eodem 13. capite egimus: quartò  
& vltimò, dissipantibus, & resoluentibus, vt hoc, vel simile

**Vnguentū.** vnguento: ℥. olei costini, & castorei. an. 3. j. olei rutæ 3. j. f.  
pulueris castorei, & anthos. an. 3. j. pulueris mastichis 3. ss. co-  
ræ. q. f. misce, & fiat vnguentum. Ante cuius appositionem  
pars affecta fotu huius decoctionis præparetur: ℥. camo-  
millæ, anthos, saluæ, balauftiarum, foliorum lauri an. p.  
nucum cupressi, & gallarum an. paria. vj. fiat decoctum in li-  
bri







# DE CVRAND. MORB.

**Causa.** nem matricis, & exitum appellant. Cuius causæ quamplurimæ sunt: nonnunquam enim accidit ob casum ab alto decidente scilicet muliere in coxarum vertebra: rumpuntur enim tunc membranæ quædā, quibus vulua propinquis partibus annectitur: vnde procidere ipsam necesse est sæpe ob ingentem conatum, quo premitur mulier in laborioso, & difficili partu, maxime verò in abortu, vt secundam expellat.

**Laboriosus partus.** Aliquādo propter inconsideratam partus extractionem, aut nimiam spiritus detentionem, aut immensi ponderis elevationem, aut percussione vteri, aut animi vehementes affectiones hoc ipsum accidit: & ob humoris plurimi, ac tenacioris defluxum, partuumque frequentiam: laxantur siquidem, atque solvuntur appendices profundo vtero superius inhærentes. Iam & sine vlla causa istarum hic morbus contingere solet, cum debilitato corpore membranæ, musculique vuluam sustinentes exoluuntur, quod ingrauescente ætate fieri consuevit. Morbus satis per se patet, cum vterus ipse procidens oculis cerni possit. Procidit autem secundum os eius, & quod pendet struthiocameli ouum similitudine refert, maioris tantum, & minoris ratione differēs. Causarum porro notæ tum ex ægotantis sermonibus, tum ex corporis constitutione notatæ intelliguntur.

**Curatio.** Similis est hæc curatio præcedenti: causa enim in illa & in hac est auferenda, si possit, & vterus loco nativo est restituendus, nisi impediatur tumor vteri magnus, quem dissipabis fotu, & lotionem ex decocto cymini, anisi, baccarum lauri, caryophyllorum, & similibus facto vino rubro. Post insperges pulveribus stipticis, ne recidat, de quibus superiori capite dictum est. Suffitus rerum graue olentium, vt pennarum perdicis, assæ foetidæ, castorei soleæ combustæ, capillorum, sulphuris, & similibus exceptus per vuluam in fundibulo, vel cathedra perforata est necessarius. Ouum sub gallina fractum, agitaturn, lanis inuolutum, & vuluæ admotum vterum reducit ad proprium locum: quia vterus maxime abhorret foetida, & ab iis fugit. Amat non parum redolentia, quare naribus admouenda sunt, vt moschus, ambræ, vel alia minoris pretij, vt galia, & flores citranguli, rosæ, violæ, & similia. Cucurbitula magna fixa vmbilico vterum ad proprium locum trahit, & conseruat. Reducto vtero ad proprium locum cubet clunibus sublatis in sublime aliquot diebus, & vmbilico imponatur hæc mixtura: conseruat enim vterum in propria sede, confert etiam suffocationi, & omni inordinato motui vteri: ℞. alitæ muscata, galia muscata. an. ʒ. iij. ambræ, musci,



usci, an. g. v. vtriusque sthoracis an. 3. ij. β. resinæ electæ, 3. ij. nnia cum oleo ex sthorace misceantur, & extendantur super pannū coccineum forma rotūda ad præsidium vmbilici.

## De procidentia vteri. CAP. LIIII.

## Scholium.

**Q**uando vterus.) Vterus situs est inter intestinum rectum & vesicam lotii: Qui locus maxime accommodatus est ad recipiendum semen, ad fatum vsque ad iustam magnitudinem seruandum, & cum vsus postulat, excernendum. Habet vterus varia ligamenta. Recto intestino, & vesicæ fibrosis quibusdam, & te-  
 nibus ansulis alligatur, sacro osi (vt multi sentiunt) quibusdam ner-  
 ofis, & musculosis vinculis, lumborū etiam vertebrae ex Galeno, quod  
 medio peritonæo intelligendum est. Prædictis ligamentis suo loco ser-  
 atur vterus, quæ si laxentur, mutabit situm ad vnum, aut alterum fiat  
 tus declinans, aut prominens exterius. Nunquam tamen, vteri pro-  
 ipso contingit eius fundo per os egrediente, vt multis placuit: hoc e-  
 im ab oris vteri angustia impeditur. Si obiciis fatum maiorem per  
 anc egredi partem: Respondeo non esse parem rationem, quia fetus soluitur.  
 onderosus est, & à natura expellitur. Curationem pete ab autore, so-  
 um adde, modum, quo vterus debet restitutus seruari, ne procidat. Quomodo  
 seruabitur ergo vterus repositus armilla, aut circulo ex ære facto, in vterus re-  
 uluam immisso, ita vt cerea candela per ipsum circumuoluatur, ne  
 es carnem contingat. Aduerte etiam auctorem, non rectè animi ve-  
 ementes affectiones, & imbecillitatem corporis prolapsus vteri cau-  
 as statuere, quia ab his non possunt vteri vincula laxari.

## De immodicis mensibus. CAP. LV.

**I**mmodicè fluere menses in foeminis tunc dicimus, Quid mē-  
 autore Aetio, quando conferta sanguinis menstrui sum im-  
 copia pluribus diebus effluxerit, quod multis de modicum  
 causis accidit. Prima: quia iusto tenuior redditus sit sanguis: profluuiū.  
 quæ res ab externis vt plurimum causis euenire solet, tam-  
 et si ab internis etiam contingat. Etenim & legimus ipsi, & Cause.  
 vidimus aliquando in muliere, quæ se plus æquo exercuis-  
 set, huiusmodi mensium defluxum cōtigisse, qui multis me-  
 dicorum prædiis sisti non potuit, & in mulieribus tempe-  
 ramento bilioso hoc ipsum accidere quotidie experimur.  
 Porro quæ sint causæ tum externæ, tum internæ, quæ san-  
 guinem possint attenuare, superfluum esset recensere, cum  
 sapius dictæ sint, & per se lector facillè inuenire possit. Ac-  
 cidit præterea symptoma propter vasa aliqua aut aperta, aut  
 fracta, aut etiam erosa, siue magna ea sint, siue parua: Non-  
 nunq



nunquam etiam ob partus grandiores, & post abortus, quoniam  
 ut plurimum mensium immoderate purgationes solent  
 consequi. Ceterum si à sanguinis tenuitate oriatur hæc af-  
 fectio, considerare oportet anteaquam vitam, & eas omnes  
 causas tam exteriores, quam interiores, quæ sanguinem ten-  
 uiorem solent reddere. Si verò vasorum accidat vitio, ve-  
 quia fracta, aut erosa sunt, erumpentis sanguinis multitudi-  
 nem (ut inquit Aetius) conuenit considerare: cuius verba  
 hæc sunt: amplioribus vasis fractis, aut apertis, magna & cō-  
 ferta sanguinis copia defluit: ab angustioribus verò opposi-  
 tum accidit, sicut ab erosione paulatim, & cum maximo do-  
 lore delabitur. Ab aliis causis si accidat, facile ex ægroti fer-  
 monibus deprehendetur. Consequitur sic affectos cutis de-  
 coloratio, appetitus imbecillitas, concoctionis difficultas  
 nonnunquam pedum, & totius corporis tumores quidam  
 laxi, & generatim ea omnia, quæ excedentem hæmorrhoi-  
 dum defluxum consequuntur.

*Nota.*

*Curratio*

*quando est*

*à sangui-*

*nis copia.*

*Victus.*

*Sectio ve-*

*ne.*

*Si à bile*

*victus.*

*Purgatio.*

Si immodicus fluor mensium est à sanguinis copia, cura-  
 tur victu tenui, & astringente, ut cydoniis, pyris, agresta, a-  
 cetosa, amydo, & oriza cum lacte amygdalarum, vel capra-  
 rum calybeato, fuga carniū, ouorum, & sanguinē augen-  
 tium. Secetur vena interna dextra, extrahaturque sanguis  
 respondens plenitudini, & viribus ægri. Si ob bilem mixtam  
 sanguini, præcedenti victu frigido, & astringente, de quo ca-  
 pitibus vigesimo primo, & vigesimo octauo, de sanguinis  
 profluuio e naribus, & de sputo. Vacuetur bilis cholagogis,  
 ut myrobalanis citrinis, rhabarbaro, tamarindis, cassia fistu-  
 lari, & similibus, ut ℞. medullæ tamarindorum, & medulla  
 cassiæ fistularis recens extractæ an. ʒ. ss. pulueris corticum  
 myrobalanorum citrinorum, & rhabarbari electi infusi per  
 noctem in aqua endiuie an. ʒ. j. syrupi rosarū ʒ. j. aquæ por-  
 tulacæ quod satis est, misce, & fiat potus.

*Quæ si-*

*stunt san-*

*guinem.*

*Purgatio*

*pituitam.*

Deinde sanguis refrigeretur, & sistatur syrupo rosarum,  
 granatorum, myrtillorum, cydoniorum, de agresta, & de ri-  
 bes, & aquis portulacæ, plantaginis, sanguinariæ, & similiū  
 Dosis quolibet die summo mane syruporum vnciæ duæ, &  
 aquarum vnciæ quatuor. Si ob mixtam pituitam (quod co-  
 lor sanguinis albus ostendit, quemadmodum flauus bilem)  
 phlegmagogis vacuetur, ut myrobalanis chebulis, agarico,  
 & aliis: ut ℞. diacatholiconis ʒ. ss. corticum myrobalano-  
 rum chebulorum, & agarici trochiscati an. ʒ. j. diaphænico-  
 nis ʒ. ij. rhodomellis ʒ. j. aquæ fœniculi q. s. misce, & fiat po-  
 tus: præcedenti tamen pituitæ aquosæ concoctione per sy-  
 rupos



opos de absinthio, & rhodomel. cum aqua fœniculi, & ab-  
 nthij. Si ob atram bilem mistam, quod niger color indi- *Atram bi*  
 ut: vacuetur epythimo, myrobalanis indis, sero, & aliis: vt *lem pur-*  
 L. confectionis diasenæ 3. iij. pulueris epithymi, & corti- *ganis.*  
 um myrobalanorum indorum an. 3. j. syrupi buglossæ 3. j.  
 quæ borraginis, q. s. misce, & fiat potus, prius tamen appa-  
 etur bene atra bilis per medicamenta dicta cap. 1. & cap. 9.  
 le curatione melancholiæ. Facta iam corporis euacuatio- *Auerten-*  
 ne, & factis etiam auersionibus omnibus tum per sanguinis *tia.*  
 missionem, tum per purgationes, per frictiones partium su-  
 periorum, & ligaturas dolorificas, & fotum earundem, &  
 per frequentes cucurbitulas scapulis, & potius mammis af-  
 fixas. Sanguis omni studio refrigerandus, & increassandus *Refrige-*  
 est, vt quiete animi, & corporis. Scimus enim vicecomitem *ratio, &*  
 ipsam Castri boni periisse menstruorum immodico fluore, *quies.*  
 cuius causa fuit magnus motus: confecit enim pedibus iter *Historia.*  
 trium leucarum, vt vocant, ad visendam imaginem virginis *Stiptica*  
 Mariæ de Serrançã. Et aliis etiam omnibus internis, & ex- *sanguinè*  
 ternis stipticis, & refrigerantibus est increassandus, vt drach- *increassan-*  
 ma vna pulueris Karabæ, & corallij rubri multis diebus *tia.*  
 sumpta cum paucò syrupo, vel aqua frigida, & astringente, *Mixtura*  
 vel iure arietis, vel pedum suis, vel vituli, vel amydo prædi- *maximè*  
 cto iure decocto, vel lacte calybeato. Dimidium vnciæ con- *astringēs.*  
 seruæ rosarum vetustæ cum syrupo, vel aqua astringente per  
 aliquot dies sumptum sistit hunc fluxum sanguinis. Idem fit  
 drachmis tribus micletæ: vel ʒ. micletæ, conseruæ rosarum  
 antiquæ, an. 3. j. ʒ. pulueris spodij, sanguinis draconis, Kara-  
 bæ, lapidis hæmatitæ præparati, balaustiarum, rosarum, co-  
 rallij rubri præparati, mastichis, cornucervi viti, thuris, a-  
 caciæ, gummi dragaganti, & gummi Arabici ana. drach-  
 mas duas syrupi myrtillorum, quātum sufficit, misce, & fiat  
 confectio. Dosis est cochlearium vnum cum aqua plantagi-  
 nis, portulacæ, vel sanguinariæ. Vteri loco anteriori, vt & *Vtero ad-*  
 posteriori medicamenta astringentia, & frigida actu & po- *mouenda.*  
 tentia admota sistunt hunc sanguinis fluorem: vt sunt suc-  
 ci, vel aquæ plantaginis, portulacæ, solani, & similium cum  
 aceto, & bolo armeno, & aliis pulueribus astringentibus.  
 Stercus asininum non solum interiùs sumptum cum syrupo *Asini ster-*  
 aliquo, & aqua astringente: sed exteriùs admotum cum a- *cus.*  
 qua calybeata, & paucò aceto sistit hunc sanguinis, &  
 quemcunque alium fluorem, vt ego expertus sum. Hoc vn-  
 guētum est in hoc genere probatum: ʒ. olei myrtillorū, cy- *Vnguen-*  
 doniorū, & mastichis an. 3. j. pulueris boli Armeni præparati, *tum.*  
 sang



# DE CVRAND. MORB.

sanguinis draconis, & trochiscorum de Karabe an. 3.j.ace  
*Quæ in v-* cochlearium vnum ceræ.q.s.misce, & fiat vnguentum. In v  
*rerum in-* teri cauitatem necessarię, & vtilissimæ sunt iniectiones me  
*tus admo-* dicamentorum astringentium, glutinantium, & ora venar  
*nenda.* rum ruptarum consolidantium, quales sunt aquæ, vel succo  
*Galenii me* portulacæ, plantaginis, solani, sanguinariæ, & similibus: Ga  
*dicamentū.* lenus enim diebus quatuor solo succo plātiginis infuso pe  
metrenchitas curauit antiquum mensium fluorem, qui nullo alio auxilio curari potuit. Si his liquoribus addas pulue  
*Pessalus.* res astringentes, erit auxilium efficacius. Pessalus, seu pessarium longum ex supradictis succis, & pulueribus astringentibus cum terebinthina, vel pice & lana pudendo mulieris  
*Suffitus.* affixus valenter sistit hunc fluorem. Suffitus stercoris ouini,  
*Historia.* vel asinini per vuluam susceptus inhibet hoc sanguinis profluuium. Suffitus ranarum combustarum egregie retinet hunc defluxum sanguinis, vt ego expertus sum in excellentissima domina mea duce Cardonæ & Sugurbi anno 1544. hoc fluore affecta septem ferme mensibus, quæ diuino fauore ad pristinam restituta est valetudinem. Suffitum vngulæ  
*Vngula* mulæ sistere mirifice hunc sanguinem expertus sum: quamuis ab eo fiat per mensem sterilis fœmina, vt quibusdam placet. Hoc medicamentum multas nobiles Cottalanas laborantes hoc affectu satis antiquo curauit: R. corticum duorum ouorum recentium adustorum, thuris, mastichis, an. 3. s. margaritarum electarum, corallij rubri præparati, Karabæ, ana. 3. ij. lapidis hæmatitæ, & smaragdi præparati an. 3. s. farinæ hordei sine furfure. p. ij. albumina quatuor ouorum, & si opus fuerit, adde parum aquæ calibeatæ, & fiant duo panes, seu placentæ, & coquantur in furno, vt possint in puluerem redigi: dosis huius pulueris est à drachma semis vsque ad drachmam vnam cum iurē pedum arietinorum summo mane. Vltimò curatur hic fluor, vt cæteri narcoticis seruatis omnibus, quæ sæpe diximus, præcipuè capite 40. de  
*Narcotica* curatione colici doloris: quia periculosiora sunt narcotica  
*ultima au-* xilia & curatio colici doloris: quia periculosiora sunt narcotica  
*externa* interius sumpta iis, quæ iniiciuntur, vel admouentur parti  
*minus pe-* inferiori, & omnibus minus periculosa sunt exterius admou  
*riculosa.* ta: inter ea quæ sumuntur, requies magna vt clementius narcoticum, deinde athanasia, postea trochisci de Karabe, de  
*Ordo inter* spodio, & de terra sigillata, postea philonium maius, vel Romanum, vel Persicum, vel Tharsense: hæc tamen nullo modo sunt admouenda, neque exhibenda, quando facultas est imbecilla, ne paucus natiuus calor extinguatur à medicamento tam frigidis, sed potius facultas est roboranda succo  
*Monitio.* carniū



arnium & iure optimo cum succis cydoniorum, acetosæ, & grestæ. Sed quia hoc sanguinis fluore, & aliis omnibus venriculus imbecillior redditur, prudenter alimentis frigidis est nutriendus æger, ne magis debilitetur, & externis dictis *Ventriculi* capit. 31. est corroborandus, & nullo modo internis, ne san- *li corrobo-* quis calefactus aptior sit motui. *ratio.*

## De immodicis mensibus. CAP. LV.

## Scholium.

**I**mmodicè fluere menses.) In ea sanguinis euacuatio-  
ne, quam singulis mensibus utiliter in mulieribus experi-  
mur, hæc omnia considerare opus est. Primò substantiam, Considerã  
quæ euacuatur: Secundò locum, per quem euacuatur: da in men-  
tèrto tempus, in quo incipit, & desinit euacuatio: Quartò quantita-  
tum flu-  
em sanguinis euacuat. Vltimò an possint concipere mulieres illæ, in xu.  
quibus non fluunt menses. Quenam sit substantia, quæ in menstrua Quis san-  
curatione excernitur, ex Galeno facile colligimus: fœmina enim ex quibus pro-  
ib. 14. de usu par. capit. 6. ratione sexus mare est frigidior, eò usque, ut fluat.  
alimentum, quod conficit, totum discutere non possit: domi etiam agit,  
neque vehementibus motibus exercetur, aut sub claro sole vivit lib.  
de venæ sec. aduer. Eras. cap. 7. ac prinde in venis copiosum sangui-  
nem coacervat: qui, tempore, quo non concepit, à natura (multitudine  
eius grauata) per uterum (qui pars languida est) salubriter expelli-  
tur: at tempore, quo utero gestat, idonea est ipsi fœtui materia. Vnde  
colliges duo: Primum sanguinem menstruum optimum esse, & ex  
quatuor humoribus constitutum: quem natura consultò per uterum  
expellit, quia est alterum principium nostræ generationis, & alimẽ-  
tum seminis & fœtus. Secundum, ridicula esse, quæ Plinius lib. 7. Plinii la-  
nat. hist. cap. 15. de sanguine menstruo scribit, cum nititur probare, p̄suc.  
nil mulierum profluvio, magis monstificum esse: locus per quem  
sanguis menstruus excernitur, uterus est: ad ipsum enim perueniunt  
venæ magnæ, & arteriæ ex vasis, quæ sunt iuxta os sacrum. Ex qui- Venarum  
bus quædam inseruntur in uterum, per quarum orificia in eius cavi- uteri va-  
tatem patetia (corylidonas Græci, & Latini acetabula appellant, rius locus.  
quibus venæ & arteriæ umbilicales dictæ adhærescunt) sanguis ex-  
erni solet in virginibus, & mulieribus quæ non conceperunt. Quæ- In graui-  
dam verò in collum uteri, & pudendum disseminatur, per quas tem- dis per  
pore conceptus, solet fieri in aliquibus gravidis menstrua euacua- quas ve-  
tio. Non ab interioribus, quæ sunt in cavitare uteri, quia ab his se- nas sit hæc  
cundæ pendent, & ideo nil possunt in uteri sinum immittere, ut an- euacuatio.  
etor est Gal. lib. 5. aph. com. 60. Ex his intelligemus, an, quæ Iacotius  
in suo scholio scribit, vera sint: duo enim persuadere conatur. Pri- Sententia  
mum est, in gravidis fluere aliquando sanguinem menstruum nõ per Iacotii.

coll



collum vteri, sed per eius cavitatem: in primo tamen mense, in quo os vteri multum non est constrictum, ut ostendit superfetatio, quæ e tempore fieri solet. Secundum est euacuationem sanguinis factam per venas, quæ sunt in collo vteri, non esse menstruam, sed hæmorrhoidalem, quia sanguis ille crassus est, & venæ sunt iuxta anum, & habent orificia in cavitatem patentia. Ex curatione hoc ipsum probat quia si hæc euacuatio per vteri collum facta supprimatur, curatu sanguine misso non ex pede, ut in suppressis mensibus: sed ex brachio ea ratione, quæ in hæmorrhoidibus suppressis, facere solemus. Hæc Iacotius

**Iacotius** cotius, qui maximè & crassè decipitur. Primò quia si orificia venarum in cavitatem vteri patentia, tempore conceptus, adherent orificiis vasorum, quæ per chorion disseminantur, non poterit, ut rectè docuit Galenus, sanguis per illas in cavitatem vteri excerni. Neque igitur rectè ex superfetatione probat, quia hæc non solum in primo mense

**Historia.** sed & in quarto, & quinto contingit: ut enim multa taceam exempla vxor cuiusdam doctoris, qui hinc Valentie regie cancellarie præsedebat Gallart appellati, post quatuor menses ab obitu viri filium peperit, & deinde nono mense alterum. Neque enim causa superfetationis consistit, in eo quod orificium vteri sit apertum aliquantulum (ut simul etiam voluit Vallesius lib. 5. epy. comm. II.) quæ semper evenit orificio ita clauso, ut ne specilli cuspidem admittat: sed in vteri attractione, quæ tunc contingit, quia dilatur in coitu à frictione, & calore orificium vteri, & ita semen attractum potest vteri cavitatem

**Causa superfetationis.** Secundo **Iacotius.** si sanguis per collum vteri euacuatus, semper ex vena caua fluit, & euacuatur non per venas in ani cavitatem patentem, quomodo erit hæmorrhoidalis? Præsertim cum non sit sanguis crassus (ut ipse sentit) sed optimus venas quantitate grauius. Ratio ex curatione desumpta nil concludit, quia si supprimatur illa euacuatio, quæ in gravidis per collum vteri contingit, si lædit, non mouemus eam, secantes venâ pedis, ne multo sanguine euacuato, qui infernè habet impetum, fœtus moriatur, sed ex brachio, ut euacuemus redundantiâ. De tempore quo incipit, eodè tempore hæc definit hæc euacuatio, nil certi diffinire possumus, quia pro quantitate sanguinis, & eius consistentia maximè euariet. In quibus enim euacuatio. mulieribus, multus est sanguis, aut tenuis, citius incipit, & tardius definit menstrua euacuatio: contra verò in quibus crassus est aut paucus.

Quod quamuis ita sit, maiori tamen ex parte incipiunt menses 13. aut 14. anno, eo quod tunc iam non absumunt femine tantum sanguinem in corporis augmentum: desinunt autem 45. aut 50. quo tempore iam sanguis ea copia non generatur, qua possit abundare singulis mensibus. Quantitas sanguinis, qui solet euacuari singulis mensibus, non euacuandi est certo diffinienda: quia pro natura & victus ratione mutatur.

**Quantitas sanguinis.** incerta. Ad vltimum (quod in hac disputatione inquirendum diximus) respond



bondet Aristoteles, bene posse concipere mulieres, antequam menses  
 luant. Aliqui experientiam ad id confirmandum addunt. Caterum Gale. Ari-  
 Galenum habet contrarium Aristoteles, qui libro de vteri dissec. capite stoteli con-  
 o. ante mensium eruptionem non posse fieri conceptum scribit, quia se-  
 trarius, nen caret vero alimento, sanguine videlicet: Tum quia levis vterus  
 st, ob vasorum occlusionem, & sic decidit semen: aptius enim est ad  
 oncretionem asperum quam leue: quod in lignis & lapidibus vtere  
 st, quæ si volumus vrire, prius (vt recte dixit Diocles) scalpello exa-  
 peramus. Neque experientia potest dicere contrarium, quia in femi-  
 nis, quæ sine præcedentibus mensibus conceperunt, tempore coitus mo-  
 tum habuerunt. Prædicta ergo euacuatio menstrua si tempestinè fiat,  
 utilis est: si verò immodica (quam ex noxa colliges) mala, vt docuit Hi-  
 pocrates 5. aphorismorum, sententia 57. mensivis enim largius fluen-  
 tibus morbi fiunt, refrigeratio totius corporis habitus, fædus color, tu-  
 mor pedum, omnium virium imbecillitas, animi etiam deliquium, &  
 conuulsio libro quinto aphorismorum, sententia 56. Quod si immodi-  
 ratus hic fluor in gravidis contingat, fœtus afficitur iuxta Hippocra-  
 tem, eodem libro, sentent. 60. Hæc immoderata sanguinis per vterum fluxus  
 euacuatio, symptoma est in his, quæ excernuntur, quantitate peccan-  
 est. Eius causæ ex libro quinto aphorismorum, commenta. 53. tres sunt: Causæ im-  
 Aperiio orificiorum eorum vasorum, quæ in vteri cavitatem desinunt, modici flus  
 sanguis calidus, & tenuis, & totum corpus (propter malum habitum, xus tres.  
 hoc est, imbecillitatem à sanguine etiam moderato aggravatum) ex-  
 pellens ad venas vteri. Prima causa est morbus instrumentarius causa.  
 in via: Secunda intemperies calida iecoris, multam bilem generans: Secunda.  
 Tertia intemperies est totius habitus corporis valida tamen, aliter i-  
 psius vires non deiecerit. Præter hos morbos, nullus alius prædictum  
 efficit symptoma, & idè auctor, Rondoletius, Altomarius, & alii  
 Aetium sequuti decipiuntur, existimantes erosionem, & venarum Error mul-  
 rupturam menses immodicos efficere: quia immodica mensium e-  
 ruptio, consueto naturæ tempore fit, ea verò quæ ex erosionem, aut  
 ruptura procedit, quolibet tempore contingere potest. Vnde hæc  
 sanguinis euacuatio per vterum nominabitur, non mensium im-  
 modica euacuatio. Ea autem sanguinis præter modum euacuatio,  
 quæ post partum aut abortum, aliquando euenit, vt ex Galeno li-  
 bro tertio epyd. parte 3. comment. 35. colligimus, menstrua euacua-  
 tio appellatur, quia quod expellitur est sanguis menstruus propter  
 fœtum in vterum immoratus: quamvis ille sanguis distinguatur ab  
 eo qui singulis mensibus euacuatur, vt libro de atra bile cap. 8. docet  
 Galenus: ille enim qui post partum expurgatur, portio est deterrima:  
 (nam optimum sanguinem fœtus attraxit) non solum peccans quan-  
 titate, sed & qualitate: & ita in epydemiis supradicto loco, hunc san-  
 guinem melancholicum esse scribit.



## DE CVRAND. MORB.

Si immodicus fluor mensium.) Si ex imbecillo corporis habitus partes gravatae expellant ad uterum sanguinem, & hac ratione Venae se- fiat immodicus mensium fluxus, secabimus venam basilicam dextri Etio quan aut sinistri brachii, nihil enim refert. Cucurbitulam etiam magnan- do est exer sub mammis insigemus, iuxta Hipp. 5. apho. sent. 50. sunt enim com- cenda. munes utero & mammis vena: hac enim ratione reuellemus sangui- nem à parte affecta. Alimenti quantitatem minuemus, & corporis habitum roborabimus.

Si ob bilem mixtam sanguini.) Bilis sanguini mixta ipsum tenuem reddet, & fluxioni aptum. Sanguinem ergo mittemus & v- temur cucurbitulis, ut reuellemus. Alimenta frigida sint, aut tem- perata, frigidis tamen alterata.

Melancho Si ob mixtam pituitam.) Si melancholia & pituita sangui- lia & pi- nem crassum reddunt, quomodo immodicos menses efficiunt. tuita non Facta iam corporis euacuatione.) Tota ratio curandi hoc sunt cau- symptoma hac ratione procedat. Symptoma hoc aut vrget, aut non sa. vrget: Si vrget, ei prospiciendum est alimentis & medicamentis in- Ratio tota crassantibus sanguinem: Auxiliis etiam repulso- riis. Si verò non vr- curadi hoc get, cause remedia applicabimus, habitum corporis roborantes, san- symptoma. guinem tenuem incrassantes, & intemperiem, à qua procedit corri- gentes. Vltimò etiam meatuum laxitatem constringentes.

## De suppressis mensibus. C A P. L V I.



Vemadmodum menstruæ purgationes cum modum excedunt multarum ægritudinum causæ sunt, ita quoque cum in totum supprimuntur, multos pariunt morbos, ut ex aphorif. 57. sectionis quintæ colligitur:

**Descriptio** de suppressis igitur mensibus pauca dicamus. Suppressos **Quibus** autem menses tunc dicimus esse, quoties cum secundum **fæminis** naturam fluere deberent, non fluunt: debent autem secundum **menses nò** naturam fluere in iis, quæ neque gravidæ sunt, neque infra **fluunt.** decimum quartum annum, aut supra quinquagesimum cõ- stituuntur, & præter has etiam illæ, quæ aut cætatrices sunt, aut saltatrices, aut immodicè se exercent, menstruis purga- tionibus naturaliter carèt. Atque ut summam dicam iux- ta sententiam Aetij mulieres calidioris temperaturæ, vali- disque exercitationibus addictæ, & agrestes parum admodum purgantur. Præter has quæcunque suppressos habent men- ses ægrotare necesse est: supprimuntur autem menses, vel quia summa adest sanguinis plenitudo venas replentis, at- que obturantis, vel quia sanguis sit crassus, viscidus, ac len- tus, à quo etiam venas obstrui necesse est. Non purgantur **Causæ.** etiam mulieres, quæ longa aliqua ægritudine, aut acuta la- borant



porant, vt phthifi, quartana, hectica febris, ardēti, atque aliis  
id genus. Præterea quæ insigni aliqua vacuatione sunt exi-  
nariæ, vt sanguinis missione, vomitu, sudore sanguinis e  
naribus profluuiū, alui fluore. Ad hæc & quibus puris copia  
allicunde emanat, & pustulæ in cute effloruerunt. Ob pecu-  
liare vteri vitium menses quoque interdum retinentur, ver-  
o gratia ob pinguedinis copiam, aut carnis excrescentiam,  
aut callum, aut cicatricem ex vlcere, quod in vtero anteces-  
sit. Hæc enim vasorum vteri ora obstruere possunt. Causæ *Nota.*  
facile patere possunt: generaliter verò quibus menses præ-  
ter naturam retinentur, dolores circa lumbos, femora, collū,  
inciput, & oculorum radices accidere solent. Corporis præ-  
terea grauitatem, quæ sic laborant, patiuntur, nauseant ci-  
bum, auersanturque, fastidiunt, & horridos quosdam per v-  
niuersum corpus discursus habent, quales iis, quæ concepe-  
runt, accidere solent: vrina interdum in nonnullis difficul-  
ter redditur, interdum planè suppressitur. Cæterum men-  
sium suppressio si à pituita copiosa, & venarū ora obstruen-  
te contingat, videre est laboratē somnolentam, ad omnem  
motum segnem, colore cādidam: plumbi quoque interdum  
colori similem pituitam assidue excreantem, & aliquando  
euomentem. Vrina quoque aquosa esse solet.

Menses si ob sanguinis inopiam ex inedia, aut victu par-  
co, aut longo morbo, aut alia vacuatione per se constiterint, *Curatio*  
proprie non sunt suppressi, cieri possunt, antequam mulier *quando ex*  
redierit ad propriam naturam. Si verò alia de causa suppressio *sanguinis*  
fi sint, per abscissionem causæ euocantur, vt si a siccitate fiat, *defectu fit*  
rebus humidis curatur, non calidis, & exiccantibus, ne au- *A siccita-*  
geatur morbus. Si ab obstructione, à qua fere semper fit, cu- *te.*  
ratur primò victu tenui attenuante & aperiente, de quo ca- *Ab obstru-*  
pitibus 42. & 45. de obstructione hepatis, & lienis. *Etione vi-*  
*Etus.*

Secundò abigentibus causam suppressionis, & obstructio- *Sanguinis*  
nis, quæ si sanguis fuerit per sectionem saphenæ, aut vena- *missio.*  
rum pedum abigeretur: quamuis Matthæo de Gradi videatur *Matth. de*  
primam sanguinis missionem esse faciendam ex basilica, *Gradi.*  
quando corpus est multo sanguine plenum, ne attracto san- *Euocatio*  
guine multo ad infernas partes augeatur obstructio. Deinde *mensum,*  
euocandi sunt menses frictionibus, ligaturis, & cucurbitu-  
lis partium internarum, & coxarum, lotionibus, & fotibus  
earundem. Vltimò, per medicamenta aperientia, & diureti-  
ca, de quibus statim dicemus: clemētiora tamen in hac con-  
ueniunt, quam in facta ab humoribus pituitosis, & crassis,  
quæ primò curatur victu tenuante, & aperiente, vt diximus.



# DE CVRAND. MORB.

*A pituita* Secūdo apparantibus pituitam rhodomelle, oxymelle simp-  
*Victus cō* syrupo de duabus radicibus, & aliis dictis 1. cap. cum deco-  
*coctio.* cto, vel aquis eodem cap. dictis ad concoquendam pituitam

*Purgatio.* Tertiō vacuantibus phlegmagogis eodem 1. cap. dictis, vt a-  
 garico, turbit, diaphanicone, electuario, indo maiori, & aliis  
 similibus: vt ℥. pilularum de agarico, & cochiarum an. 3. s.

*Quæ men* cum aqua fœniculi fiant pilulæ septem. Quartō menses o-  
*ses euocāt,* mni arte sunt euocandi, cucurbitulis videlicet coxis affixis,  
 frictionibus, ligaturis, & fotibus partium infernarum, vt sy-  
 rupo capilli Veneris, de artemisia, de duabus, & de quinque  
 radicibus quantitate duarum vnciarum quolibet mane  
 sumpto per multos dies cum aquis duplis, vel decocto radi-  
 cum diureticarum croci, cinnamomi, calamenti, artemisias,

*Potus, &* fauinæ, & similibus. Potus, & infessus ex decocto medica-  
*infessus.* mentorum supradictorum aperientium in tempore consue-  
 tæ purgationis valenter ciēt menses, præcipue, si sumatur  
 tunc potus, hic aut huic similis: ℥. hæmagogi 3. j. aquæ ca-

*Potus va-* pilli veneris, & fauinæ, ana. 3. ij. syrapi de artemisia vnciam  
*lenter mē-* vnam, misce.

*ses educēs.* Et si menses inceperint, sanguinis missio ex poplite, vel

*Suffitus.* pede valenter euocat menses. Suffitu per vuluam excepto  
 rerum aperientium, & redolentium cum Hippocrate quin-  
 to aphorismorum 28. aphorismo menses euocantur. A fotu,

*Vnguentū* & infessu vngatur locus anterior, & posterior vteri hoc vn-  
 gueto: ℥. olei de lilio, sesamini, & scorpionum, an. 3. j. axun-  
 giæ cuniculi, & gallinæ an. 3. ij. pulueris croci, spicæ, & faui-

*Mixtura* næ an. 3. j. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum. Hoc  
*optima in* medicamentum valenter menses euocat: ℥. diacurcumæ, &  
*hoc genere* dialaccæ an. 3. j. trochiscorum de myrrha, de capparibus an.

3. iij. pulueris spicæ, croci & cinnamomi an. 3. j. syrapi de  
 artemisia quod sufficit, misce, & fiat cōfectio. Dosis cochlea-  
 rium vnū quolibet die mane cum vncis tribus decocti, vel  
 aquæ capilli veneris, vel artemisias, vel fauinæ, drachma vna,  
 vel duæ theriacæ diateffaron cum decocto: vel aqua prædi-  
 ctarum rerum menses prouocat, valentius tamen theriaca  
 magna, & mithridatus id efficiunt cum electuario hæma-

*Alia mix-* gogo. Hoc medicamentum optimē menses excitat etiam  
*tura in hoc* suppressos septem anni: ℥. myrrhæ, calamenti montani, an.  
*potentissi-* 3. iij. medullæ passularum 3. ij. rutæ recentis 3. iij. fauinæ 3.  
*ma.* vj. Ex omnibus contusis bene, & sufficienti quantitate mel-  
 lis fiat cōfectio. Dosis drachmæ duæ cum decocto rubeæ  
 tinctorum. Pessi longi ex superiori cōfectione, & felle tauri  
 cum lana in vuluam & vterum affixi aperiendo venarum


ora



ra menses prouocant. Pessus ex radice rubeæ tinctorum *Pessi.*  
 um felle tauri, vel alicuius animalis rapacis clemēter men-  
 ses euocat. Idem facit hic: ℥. pulueris castorei 3. j. ℥. musci  
 rana iij. olei sambucini, & terebinthinæ, an. quod sufficit,  
 misce, & cum lana fiat pessus longus: vel ℥. medullæ cari-  
 arum 3. ℥. succi mercurialis 3. j. pulueris radice gentianæ,  
 & pulegij an. 3. ij. pulueris nigellæ 3. j. cum pauca terebin-  
 thina, & lana vel gossypio fiant pessi, seu pessarij duo, vel tres  
 ongi. Pessi facti ex armoniaco, opopanace, galbano, sagape-  
 no, & euphorbio sunt valentiores ad menses euocandos a-  
 iis dictis superius, præcipue si addas cyclaminum, cuius ra- *Radix cy-*  
 dix valentissime menses ciet, & vt quibusdam videtur, si su- *clamini.*  
 ber eam foemina transeat, etiam menses euocat. Si vulua, &  
 yterus ab his, & similibus pessis, & aliis medicamentis cali-  
 dis aperientibus afficiantur calida intemperie, initio vlce- *Caliditate*  
 rum necessarium erit consilium docti chirurgi. Interim fo- *Ulcus*  
 tus & lotio ex decocto plantaginis, & maluarum iuuat mul- *curantia.*  
 tum hoc affectu vexatos, & vnguentum album camphora- *Pilula.*  
 tum. Pilulæ hæ valenter menses euocant: ℥. musci, myrrhæ  
 an. 3. ij. stechados, rubeæ tinctorum, pulegij, corticum citri,  
 piperis longi, corticis cassiæ lignæ, granorum pœoniæ, ca-  
 lami aromatici an. 3. iij. spicæ nardi 3. j. cum aqua artemisiæ,  
 fiant pilulæ septem pro drachma: dosis drachma vna: syru- *Syrupus.*  
 pus hic egregie menstrua mouet: ℥. rubeæ tinctorum, ar-  
 themisiæ, sauinæ ana. man. ℥. mentæ, absinthij, radicum fœ-  
 niculi, radicum acori, squinantij, anisi, origani, nepitæ, ma-  
 tris syluæ ana. 3. ℥. gariophyllorum, melissæ, linguæ bouis an.  
 3. iij. cyperij, galangæ, calami aromatici, fœniculi, ameos, cy-  
 mini rustici an. 3. ij. cinnamomi, medullæ passularum an. 3. v.  
 fiat decoctum secundum artem, cum quo percolato, & melle  
 sufficienti fiat syrupus: Dosis vnciæ tres.

## De suppressis mensibus. CAP. LVI.

*Scholium.*

 Vemadmodum menstruæ.) Ex Hippo. lib. 5. apho. sent.  
 57. Si menstrua non sunt, ex vtero morbi contingunt, quia  
 ex sanguine detento processu temporis vterus patitur affe-  
 ctionem similem aut inflammationi, aut æri sypelati, aut schirro, aut  
 cancro, ex quibus lege consortij afficitur totum corpus. Et quamuis  
 mensium suppressio noxia sit, magis tamen noxia est ea, quæ a par-  
 tu contingit, eò quod hæc non solum abundantiam, sed insignem



Sanguinis etiam humorum pariat prauitatem 3. epy. par. 3. com. 73. quia pos-  
 menstrui partum, ut auctor est Galenus lib. de atra bile, euacuatur portio san-  
 suppressio guinis deterrima. Solet menstrua euacuatio, in quibus consueta era-  
 causae. cessare, ob defectum materiae, nempe sanguinis: in his quae morbo a-  
 De qua liquo laborant mulieribus, quae multum se exercuerunt, & in quibus  
 suppressio copiosa sanguinis euacuatio praecessit. De hac mensum suppressione  
 ne hic sit non loquimur modò, quia suppressionem menstruam illam appella-  
 sermo. mus, in qua sanguine in venis non deficiente, eius per uterum fluor,  
 Prima ab aliqua affectione impeditur. Affectio haec aut est in utero, aut in  
 causa ra- sanguine. In utero varia esse solet: Prima est, angustia venarum v-  
 zione uteri. teri, à prima conformatione contracta: Quam affectionem morbosam  
 Secunda non licet appellare, cum à natura indita sit, & morbus innatus non  
 causa. detur: erit autem morbus simpliciter, qui est intra limites sanitatis.  
 Tertia Secunda est uteri densitas, quae à frigidityte contrahente corpus ute-  
 causa. ri, & vase in eo contenta ortum habet, & ideo non fluit sanguis, vel si  
 Quarta fluit, tenuis & aquosus. Quod considerans Hippocat. lib. 5. aphor. sent.  
 causa. 62. mulieres uteros densos habentes, non concipere scripsit. Tertia est  
 Quinta compressio vasorum uteri. Quae fit aut à tumore praeter naturam cir-  
 causa. cumiacentium partium, aut ab omenti multa pinguedine, ut in obesis  
 Sexta mulieribus, in quibus descendit omentum usque ad os uteri: non cu-  
 causa. rantes hac in parte Vesalius, qui omentum non posse usque ad os v-  
 Quid per uteri descendere sentit. Quarta est obstructio, quae fit à crasso, glutino-  
 robur ute- so, aut multo humore. Quinta intemperies uteri frigida densans ute-  
 ri intelli- rum: aut sicca eum indurans. Sexta affectio suppressio mensis, tra-  
 gar Gal. ditur à Galeno lib. 5. apho. com. 57. est autem robur vasorum uteri, adeò  
 ut quod influit, non admittant. Quod certè difficile mihi videtur, con-  
 sideranti uterum à natura esse fabricatum languidum, ut sarcinam  
 Aliæ cau per ipsum deponeret: ac proinde per robur non nativum, sed factum à  
 sa à pra- medicamentis adstringentibus intelligo. Aliæ causae (quae sunt cal-  
 eticis tra- lus, oris uteri distortio, aut inflammatio, carnis excrescentia, & pelli-  
 dite nulle. cula supra os uteri generata in his, quas vulgò clofes appellamus) à  
 practicis adductae nobis non placet, quia non possumus impedire mensum  
 euacuationem, quae etsi per os uteri non fiat, potest tamè fieri per venas  
 ad eius collum peruenientes. Tum quia non possum mihi persuadere,  
 tam magni callum in utero posse generari, ut omnium venarum orificia  
 occludat. Affectus sanguinis est, cum est crassus aut glutinosus. Quae  
 causa non est distincta ab obstructione, quia si nullus sit in venis impe-  
 dimentum, sanguis etsi crassus & glutinosus, fluet, & excernetur. Dices,  
 cur ergo Gal. obstructionem causam distinctam, à sanguine crasso & glu-  
 tinoso statuit? Respondeo, quia aliquando est obstructio, sine tali san-  
 guine. Quamvis varia sint istius suppressionis sanguinis causae, ut in  
 plurimum tamè fit ab obstructione à sanguine crasso orta: ac proinde  
 li. 5. aphor. com. 36. ad excitandum mēstruas suppressiones, duos scopos  
 deser



describit Galenus, aperitionem orificiorum vasorum ad iterum peruenientium, & sanguinis extenuationē. De hac ergo suppressione, est præsens caput.

Secundò, abigentibus causam. ) Ut sanguinem menstruum retentum moueas, non euacues ex brachio, quia eum reuelles, & contrarium motum ab eo, quem molitur natura, induces: sed ex pede, cum sanguis per uterum faciat impetum. Vnde male multi ex medicis sequuntur Aetium, prius secant venam brachii, ut euacuent venas, & deinde pedis, ut moueant menses. Quasi euacuatio ex pede, plenitudinem ex Vbi exet-  
vena causa non euacuet? Vbi nomine pedis intellige totum illud, quod cenda san-  
est ab articulatione coxæ usque ad digitos. Euacuatio ergo (quam, ut guinis mis-  
moueamus menses, exercemus) potest fieri scarificatione, aut sanguinis mis-  
missione. Scarificatione fiet, quando mulier candida est, aut simul can- In mulie-  
dida & obesa. Ratio hæc est: Mulier candida habet tenuem, & aquo- re candida  
sum sanguinem ( & ideo Hippocrates 6. epyd. par. 1. sent. 6. has mulie- scarifica-  
res appellat aqua laborantes ) & ita poterit per locum scarificatum tione mo-  
recte egredi. Dices, nonne melius egredietur secta vena? Respondeo verum uendi men-  
esse, sed ex ea sequi aliud malum, quod est multos spiritus euacuari: at ses.  
scarificantes, præterquam quod commodè fluit sanguis, exigua spirituum  
fit iactura. In muliere obesa, cum habeat exiguas venas in cruribus, e-  
tiam si eas probe inscindamus, non poterit sanguis nec mediocriter flue-  
re: ac proinde eam scarificare oportet. Sanguis missione euacuabimus ex  
pede, si mulier sit nigra, et magis, si magnas habuerit venas. Nigræ e- Nigræ cur-  
nim mulieres, sanguinem habent crassum, qui per scarificatum locum, non scarifi-  
commodè non euacuabitur. Hæc Gal. in lib. de curat. per sanguinis mis- centur.  
sionem cap. 11. videant ergo qui in hoc affectu semper venam secant, &  
nunquam ex poplite euacuant, an secundum artis præcepta operentur.  
Euacuatio autem sanguinis missione, siue scarificatione ex pede facta,  
non debet exerceri, quando iam fluunt menses, sed duobus aut tribus  
diebus antea, quo tempore futura expectatur euacuatio, ut libro de cu-  
rat. ra. per sang. miss. cap. 17. docet Galenus, & hoc fecisse medicos Ro-  
mæ medentes in libro de venæ sec. aduersus Erasistrateos cap. 7. scribit.  
Rationem huius rei hanc esse existimo, Cum in missione sanguinis soleat  
sequi animi deliquium (in quo sanguis recurrit ad cor) si quo tempore  
fluunt iam menses, ex missione sanguinis, animo linqueret mulier, eua-  
cuatio supprimeretur: quod cum non timeamus antequam fluant, ideo  
tunc euacuare oportet. Hoc verum est cum deficientem euacuationem  
curamus. Ratio videtur sit extenuans.

Deinde euocandi sunt menses frictionibus. ) Amara calida Vetus ra-  
cum sint, & tenuium partium, menses mouent, quamuis etiam habeant tio.  
partes adstringentes (ut in absinthio videre est) quia hæc adstrictio po- Quæ eur-  
ros internos, qui magni sunt, non occludet. Omnia etiam medicamenta, cent menses.  
quæ habent vim inscindendi, & attenuandi, id præstant, ut mulla in-

per



## DE CVRAND. MORB.

Spersa pulueri nepitæ, aut pulegii. Possumus mane hac vii potione: ℞. mithridat. ʒ. j. syrupi capillorum veneris ʒ. j. misce cum aqua cap. veneris, & fiat potio. Hæc confectio accommodatissima est: ℞. diacurcumæ ʒ. ii. trochiscorum de absinthio, de rhabarbaro, & de myrrha, aut de capparibus an. ʒ. j. s. quatuor sem. frig. an. ʒ. j. pulueris diarrhodon. Abbatis ʒ. iii. pulueris soliorum sabinae ʒ. ii. cum syrupo capillorum veneris fiat confectio. Cuius singulo mane assumet æger cochlearium vnum, cum aqua sabinae & borraginis, & deinde se exercebit quoad incipiat sudor, aut difficilis respiratio. Solemus in hac Valentini ciuitate, in hoc affectu exhibere medicamentum ex scobe ferri paratum, cum felicissimo successu. Debet autem hac ratione parari: ℞. trochiscorum de absinthio, & de rhabarbaro ana. ʒ. j. antidoti hæmagogi ʒ. j. s. artemisiæ, cinnamoni, ana. ʒ. j. limaturæ ferri præparati ʒ. j. cum syrupo capillorum veneris fiat confectio. In hac compositione, quamuis limatura ferri videatur basis, ei tamen non debetur medicamenti totius actio, sed aliis, quæ propter hanc limaturam melius agunt, cum enim sit crassarum partium, in causa est, vt immorentur, & ita tota compositio, propter limaturam redditur anostomoticum medicamentum. Aduerte vltimò ex Galeni 4. method. cap. 7. oportuum tempus exhibendi medicamenta menses mouentia esse, statim post balneum adhuc linteo inuolutis.

*Medica-  
mentum  
Valentini  
vsitatum.*

## De vteri suffocatione. CAP. LVII.

*Varia no-  
mina.*

**V**teri suffocationem, alij stragulatam vteri, aliis hysteri-  
cam suffocationem, alij spirationis ob vterum  
ablationem, alij vterinam apnæam vocant (quam  
animi defectio præcedit, vt docet Gal. 1. de arte curatiua ad  
Glaucōnē) quamuis Stephanus Atheniensis discrimen esse  
inter apnæam, & vterinam strangulationem velit: fit enim i-  
pso dicente, apnæa ex superfluitate seminis putrescētis, pra-  
uâsq; quasdam exhalationes ac præsertim frigidas ad cor mit-  
tentis ipsum, atque ita spirationem intercipientis. Contingit  
verò quandoq; melancholicas exhalationes, quæ ex ipso  
semine feruntur sursum ad cerebrum recurrere, symptomata-  
que melancholica facere. Stragulatio apud eum fit ex spas-  
mo matricis sursum tractæ, & per continuitatem intestina  
ventriculū, septum transuersum, ac respiratoria alia mem-  
bra comprimētis. Sed quia frequenter ab vteri strangula-  
tione fit morbus comitialis, & syncope per consensum, pro-  
pria, & vera huius affectus diffinitio erit hæc: malū tunc ac-  
cidēs, cum vterus vaporis copia ita intenditur, vt modò sur-  
sum, modò in latus retrahi videatur. Eius duæ in vniuersum  
causæ sunt, retentum scilicet semen genitale, & menstruæ  
purg

*Apnæa.*

*Definitio.*

*Causæ.*



purgationes cessantes. Et licet nunquam hæc affectio acci- *A semine*  
 dat, quin alterutri horum accepta referenda sit, frequentius *sæpe eius*  
 tamen euenire solet feminis detenti causa, & quæ ob hanc *sympto-*  
 causam fiunt vteri suffocationes, vehementius solent affli- *mata.*  
 gere, & symptomata multò seuiora inducere, vt copiosè Ga-  
 len. disputat. 6. de locis affectis cap. 5. Quem locum si quis o-  
 ptimè consulat, multa quæ ad hanc affectionem pertinere  
 videntur, & speculatione digna sunt dilucidè à Galeno tra-  
 ctata comperiet eos igitur ad eum librum remittimus, qui-  
 cunque diligentes naturæ inquisitores magna interdum ad-  
 miratione tenentur, quærentes qui fiat, vt cum in hac affe-  
 ctione intercepta nonnunquam respiratio in totum sit, & ar-  
 teriarum pulsatio intermissa: ægrotans tamē viuat, & paulò  
 post ad solitas operationes, perinde ac si tale quippiā nō ef-  
 set passa, reuertatur. Cur præterea tāta varietas accidat sym-  
 ptomatum pro intentionis remissionisq; modo differētium,  
 & quomodo detentum semen, cum mole quam minimum  
 sit, tam grauium symptomatum sit causa. Quarum omnium  
 quæstionum causas ibi leges: nos enim breuitati studentes  
 maluimus his omnibus prætermisissis ad signorū enarratio-  
 nem conuerti, quàm in iis, quæ ad artis opera non sunt ne-  
 cessaria, diutius immorari. Ex signis igitur alia sunt, quæ i- *Notæ.*  
 psam accessionem solent præire, alia quæ comitari. Præire  
 solent, & maximè cum accessio proxima est, mentis torpor,  
 pigritia, crurum imbecillitas, faciei pallor, aspectus mœstus.  
 Comitantur hæc, quæ sequuntur laborantes. Interdum ia-  
 cent sine sensu immobiles cum obscuro paruoque pulsu, vel  
 omnino sine vllò. Interdum sentiunt quidem, & mouentur,  
 integræque sunt ratione: cæterum animi defectione, & diffi-  
 cili spiratione laborant. Interdum verò, & crura, & brachia  
 contrahuntur. Adest præterea inclinatio ad somnū, desipien-  
 tia detentio instrumētorum sensus, vox obmutescit, & con-  
 uelluntur nonnunquam. Cum iam inclinat accessio, rubore  
 suffundi malæ incipiunt, & oculi attolli, atque aperiri. Hu-  
 miditas præterea quædam perceptibilis è mulieribus locel-  
 lis excurrit: Intestina immurmurant, atque vterus ipse pau-  
 latim laxatur mēte scilicet, sensu, ac motu iam redeuntibus.  
 Per circuitus malum hoc solet corripere infirmas, præcipuè  
 eas, quæ viduæ sunt, aut alias viri concubitu sunt vsæ, & cū  
 omni tempore possit, maximè inuadit hyeme, & autumnò.  
 Reliqua ex Gal. Paulo, & Aetio sunt petenda. In accessione *Cirratio in*  
 oportet vniuersum corpus perfricare, & extrema præcipuè *accessione.*  
 partes infernas ligare, ægrotantq; collocare, ceruice, & sca-  
 pulis



pulis accliuioribus, & femoribus, & inguinibus decliuioribus. Naribus eius sunt admouenda foetida, vt funiculus lucerne nuper extinctus, plumę maxime perdicę, laneę soleę combustę, capilli, cornu caprę vstum, pix eliquata super carbones, galbanum, castoreum, assa foetida, vrina multorum die-  
*In accessio- ne est va-* rum, & sulphur, quod valentissime excitat ab accessione: in  
*cuandum* qua raro facienda est vacuatio, nisi timeatur suffocatio &  
*aliquando.* mors repentina: nam ad prohibendā eam necessaria esset sanguinis missio ex saphæna, vel vena pedis, præsertim si ex sup-  
 pressis mensibus sit morbus. Quæ etiam sternutamentum faciunt, naribus sunt admouenda, & vacuatio per acres clysteres non est negligenda, de quibus cap. 12. de curat. apoplexię.  
*Si causa* Si à detento semine sit, curabit maritus, vel si non habet, nec  
*est semen.* possit, obstetrix suis digitis, & rebus aromaticis ad inferiora euocet vterum, & per vuluam frictionibus purget semen, si citra peccatū fieri possit hoc. Hęc mixtura est optima huic  
*Optima* rei: ℥. olei de lilio, nardini, & cheyrini an. 3. j. galie muscata, & alitæ muscata an. 3. j. musci, & ambre an. 5. vij. zibeti 3. 5. misce. In omni tamen causa in ipsa accessione pili pesti-  
*mixtura.* nis radicitus, & vi magna sunt auellendi ad excitandum. Item  
*Medica-* dem præstant cucurbitulæ coxis & tibiis affixæ, quæ si ma-  
*mentum o-* gna fuerit vmbilico affixa, vterum reducit ad propriam se-  
*derum, va-* dem, vaporésque à capite, & partibus superioribus auertit,  
*lenter tra-* hēs ad pro trahitque ad inferiora: sed reducto vtero ad suum locum ad  
*hīs ad pro-* illius conseruationem debitam vmbilico sunt admouenda,  
*prium lo-* quæ diximus cap. 54. de curatione procidetiæ vteri. Vel hoc:  
*cum vterū* ℥. emplastri stomaticonis quod s. galbani 3. ij. galie muscata  
*et conser-* 3. j. musci & ambre an. 5. vij. misceantur omnia cum oleo  
*uans.* sambucino, & extendantur super pannum coccineum ad formam rotundam pro vmbilico. Morbus comitialis, & syncope, si cum hac vteri suffocatione coniungantur, vt sæpe fit, curantur eo modo, quem diximus cap. 8. & 30. semper tamen habenda est prima curandi ratio partis eius, quæ prius affecta est, post aliarum quæ per consensum laborant.

*Extra ac-* Extra accessionem ipsam curatur per causę abscissionem,  
*cessionem* vt si ex suppressis mensibus nascatur, adhibeantur, quæ diximus capite superiori. Si verò ex semine detento & corrupto, vocetur maritus. Si non possit viro vti, precibus, & ieiunio curabitur. Nutriatur ergo pane, & aqua: menta tamē & ruta, & agnus castus semē minuunt. Ad purgationem vteri iniectus hic liquor ad modum clysteris instrumento argenteo est efficax remedium: ℥. aquæ naphæ, seu florum aranciorum lb. 1. aquæ ocymi 3. iij. galie muscata 3. ij. galbani 3. ij.



.iiij. musci, & ambræ an. ḡ. v. syrupi de artemisia ḡ. iiij. croci  
puluerizati, cinnamomi & gariophyllorum an. ʒ. ḡ. misce.

## De suffocatione vteri. CAP. LVIII.

## Scholium.

**V**teri suffocationem.) Per vterū singulis mensibus excer-  
ni solet sanguis, vt superius docuimus: solet etiam & ex te- tractio  
stibus fæminæ semen in eius cavitatē immitti, vt ex his duo- quomodo  
bus principiis (quæ vicem habent causæ efficientis & materiæ) gene- fiat.  
ratio omnis fieret. Inde in corpore solent consortii lege ex vtero tanquam  
ex radice varii morbi prodire, cum aliqua ex dictis substantiis in vte-  
ro abundat. Si substantia, quæ abundat, sit sanguis mēstruus ob aliquē  
affectū retentus, cum vteri venæ, quæ multæ sunt, & magnæ replean-  
tur: vteri sequetur retractio, recta, si ex æquo venæ sanguine abundant,  
si verò non ex æquo, sed solum vnius partis venæ, versus illam partem  
vterus retrahetur, ita vt semper vterus sursum aliquantulum recur-  
rat. Adde aliquantulum, quia eius ligamenta non patiuntur ipsum  
multum eleuari. Hic sanguis detentus si putrescat, febrem synochum Sanguis  
accendit, quæ ex hac sola parte accidit, ob venas quæ multæ & magnæ menstruus  
sunt, vt docet Gal. lib. 6. epyd. par. 1. com. 2. Si sine putredine corrumpa- putrefa-  
tur sanguis, si sit biliosus & acris, solet ad principium nervorum mitte- tus & de-  
re vapores, & eo nomine motus conuulsuos efficere: aut ad cerebrum tētus feb,  
eos mittens, conuulsionem vniuersalem quæ dicitur epilepsy. Quod si synochum  
aliquando vera eueniat conuulsio, id proveniet, quia in corpore disposi- parit.  
to, agitatione humor motus & fluens replebit nervosa corpora. Si san- Sympto-  
guis sit melancholicus, ex vaporibus eius cerebrum petentibus, melan- mata quæ  
cholica deliria excitantur, sicut ex pituitoso sanguine sopores. Quod si sequantur  
multi vapores septum comprimant, efficiunt (sicut in gravidis, & his ex isto san-  
qui ob alimenti copiam distentum habent ventriculum) difficilem re- guine bi-  
spirationem, nō autem suffocationē, quā à vaporibus gutturis muscu- liofo.  
los replentibus, fieri existimo. Quod colligo, quia quæ hāc affectionem Quomodo  
patiuntur mulieres, eas partes habent eleuatas, & manus ipsis adhi- suffocatio  
bent, indicantes molestiam & suffocationem. Refrigerationem totius vteri con-  
corporis, quam comitatur respirationis (quoad sensum) priuatio, san- tingat.  
guis detentus nunquam efficiet: neque Galenus lib. 6. affectorum loc.  
ubi ex professo de hac materia disputat, id significauit, nisi dixerimus  
sanguinem aliquando venenatam induere naturam, & eius vapores  
cordis caliditatem celeriter extinguere. Nam si aliter sanguis men-  
struus detentus refrigerare posset cor, cum frequenter supprimatur,  
frequenter etiam cor refrigeraret. At rarissime, aut nunquā contingit  
vni medico etiam multis annis exercenti medicinam eam videre, &  
tunc in vidua, aut virgine. Si substantia, quæ in vtero abundat, semen  
sit, tunc non contingit retractio, quia vasculum spermaticorum sola di-  
stent



# DE CVRAND. MORB.

**Rondoletii** stentio id non poterit prestare, ut ex affec. 6. colliges, quod non recte con- sideravit Rondoletius. Neque retrahetur uterus (ut sentit *Vallesius*) error. eo quod ob appetitum, veneris extendatur, sicut pene in viris: quia ob *Vallesius* talem appetitum non retrahitur, imò descendit versus collum uteri, reprehenditur ut cum virili membro iungatur: Quod similitudine ostendit Galenus diu. libro 1. de semine cap. 5. ex ventriculo desumpta: hic enim quando appe- Semen pu- tit cum fundo suo ad stomachum recurrit. Si ergo semen retentum pu- trefactum trefiat venenata putredine, vapores ex eo ascendentes cum toto tempe- quæ sequa- ramento contrarii sint, & corruptrices, calidum innatum cordis extin- tur.

guentes, totum corpus refrigerant, ita ut sequatur respirationis (quoad sensum) abolitio, quæ omnino vivente animali non potest cessare. Quod si semen non ita prave corrumpatur, prout fuerint vapores ex eo ascen- dentes, aut acres, aut aliam habentes qualitatem, sequentur animi de- liquium & alia symptomata peiora, quam sint illa, quæ ex sanguine retento afficiunt: quia corruptio seminis peior est sanguinis corruptio- ne, ut experientia docet in symptomatis, quæ viduis evenire solent. Ex his, quæ diximus, intelliges, quam male *Altomarius*, *Rondoletius*, &

**Error Pau** alii sequuntur *Paulum* suffocationem uteri appellant uteri retractionem: li & alio- cum neque ex retractione suffocatio sequatur, neque in ea suffocatio- rum de v- ne, quæ ex semine retento fit, retractio contingat. Nec minus errant teri. suffo- existimantes symptomata in suffocatione uteri evenientia fieri, ex eo catione.

quod semen, aut sanguis menstruus ex retentione, & mora refrigeretur, refrigerentque uterum, & simul alteratione, aut vapore medio cor, et cerebrum. Non enim est necesse, ut semine, aut sanguis refrigerentur, quia hac ratione semper in suffocatione uteri sequeretur corporis re- frigeratio, quod falsum esse supra vidisti. Adde ex prædictarum sub- stantiarum frigiditate, non posse sequi tantam corporis refrigeratio- nem, quæ ad pituitam vitream, quam frigidiorē esse certum est, nun- quam sequitur. Et ita tam magna in corpore frigiditas, maiorem cau-

**Rondoletii** sam arguit. Posset quis per contrarium dicere, semen uteri suffocatio- sententia. nem efficit, ubi immoratur. Respondet *Rondoletius*, non retineri semen

in vasis spermaticis, quia ibi conservatur, aut in eorum alimētum ab- sumitur: sed in cavitate uteri, ubi quando gravat quantitate sua, in-

**Rondoletii** ter somniandum expellitur. Hæc sententia mihi videtur falsa, quia in sententia viris ex retento semine in vasis spermaticis, videmus sequi capitis gra- tuitatem, corporis pigritiam, inappetentiam, & alia symptomata. Se- falsa.

cundo, si semen in cavitate uteri continetur, ergo per eius os effluet, neque enim retinebitur ab utero, cum solum non possit conceptum ef- ficere, sine maris semine. Tertiò etiam si non somniet mulier, si semen peccat quantitate poterit expelli. Dicendum ergo erit semen retineri in vasis spermaticis & glandulis illis, quarum meminit *Fallopius*, quæ ad servandum semen videntur factæ. Symptomata varia, quæ in uteri suffocatione apparerent, quem morbum uteri sequuntur. *Altoma-*

rins



rius vteri suffocationem dicit esse morbum in situ. Quæ maximè deci- *Altomati*  
 pitur, quia ea vteri retractio non lædit actionem, neque ex ea sym- *error.*  
 ptomata prædicta lege consortii sequuntur. Alii eam, intemperiem Alii ta-  
 frigidam esse fatentur. Qui etiam errant, quia ut iam probauimus, xantur,  
 vterus non refrigeratur in vteri suffocatione. Obiicies, nonne in suf-  
 focatione vteri eleuantur flatus, qui à diminuto calore artum habet?  
 Respondeo, vteri calorem, comparatum ad multam substantiam ibi  
 detentam, dici languidum, non quod talis sit in sua essentia. Ego in  
 vteri suffocatione, in vtero non vnum morbum, sed multos esse exi-  
 stimo. Si vteri suffocatio, à sanguine retento eueniat, varios poterit ha- *Auctoris*  
 bere morbos, quos capite de menstrua retentione videbis. Si à semine sententia  
 oriatur, distinguere oportet. Non enim semen retentum & corru- de vteri  
 ptum (etsi ex eo sequantur aliqua accideria) semper est morbus, sicut suffocati-  
 neque cibus corruptus in ventre, etsi ex eo vertigo dolor capitis, & ne.  
 alia sequantur: Quia quando accideria sunt exigua, videntur esse  
 intra limites sanitatis: & tunc semen, & cibus afficiunt nos ea ra-  
 tione, qua causa externa. Quomodo verò symptomata magna sunt,  
 molesteque afficiunt, sequuntur tunc morbum in numero addito,  
 semen enim est pars addita præter naturam ea ratione, qua cibus  
 corruptus in ventre, & humor in atheromate, steatheomate, & me-  
 liceride.

In accessione oportet vniuersum corpus perfricare.) Ante In suffoca-  
 accessionem proposuit auctor aliqua signa ex Aetio desumpta: quæ rione à se-  
 non sunt inseparabilia, nam aliquando videntibus, & ludentibus fa mine san-  
 minis, repente præhendit accessio. In accessione si sit corporis frigidi-  
 tas, non licet sanguinem mittere, quia illa non est sine animi deli- mittendus.  
 quio. Ea non existente, ex pede sanguinem educes.

Si à detento semine sit.) Si suffocatio proueniat à detento se-  
 mine, non mittes sanguinē, quia sanguinis missio non euacuat semen.  
 An verò liceat fricatione facta in pudēdo, irritare naturam, ad ex-  
 pellendum semen, Theologis discutiendum relinquo. Solum illis ad-  
 uertendum propono (ut melius iudicare possint) semen quod eo tem-  
 pore irritatione excernitur, faminis inuitis, aut saltem non consen-  
 tiens excerni.

Et secundo illud semen, iam non esse prolificum, imò venenum, &  
 corporis excrementum inutile, & multorum malorum, imò sæpe cer-  
 te mortis occasionem.

## De Mola in vtero. CAP. LVIII.

**M**ola, autore Galeno, informis quædam caro est, aut Descriptio.  
 si maius cum Aetio, & Paulo, affectus quidam vte-  
 ri ad scyrrhi naturam tendens nunc in vteri ostio-  
 lo, nunc in toto ipso ad tactum lapidosus apparens, à motus  
 autem



- Causa.* autem difficultate, & grauitate molæ nomen assumpsit. Finit hoc mali genus interdum post inflammationem præcedentem euentens, interdum post locale vlcus, cui caro supercreuerit: Nascitur etiam à semine muliebri, & sanguine menstruo ad vterum utroque fluente, atque retento ibique caloris immodici vi tum coacto, tum in carnis formam transmutato. Signa ab Aetio sic ponuntur. Affectum tumor immitis consequitur cum hypochondriorum retractione, gracilitate, decoloratione, appetendique deiectione, ac primò conceptionis opinio suboritur: nam & menses supprimuntur, mammae intumescunt, stomachus euertitur, lumbi grauantur, venter attollitur: temporis verò progressu discernitur: molam enim dolor punctiōis sensum inferēs subsequitur, nec in ea motus vllus, sicut in vero conceptu percipitur, post toto corpore diminuto, & ventre ampliato certa hydropis imago deprehenditur, a qua tamen distinguitur: neque enim hic vt in hydrope manus impulsu tumor recedit, aut excauatur, aut tympani sonum reddit, neque eiusdem manus concursu vlla fluctuatio percipitur: interdū tamen tempore præcedente iecur refrigeratur, & hydrops superuenit:
- Historia.* animaduertere tamen oportet, hæc omnia signa, ne cum senne 135. annos nato Auenzoar, & doctissimo Mattheo de Gra-di, decipiamur: ille vxorem vterum gerentem purgauit sexto mense: hic verò vxoris partum ad decimum tertium mensem expectauit: quæ post mola laborare inuenta, optimè ab eodem curata fuit.
- Historia.* Curator vteri mola victu earum, quæ mensibus detentis
- stupenda.* laborant, de quibus cap. 56. diximus: post remediis euocantibus menses, de quibus eodem cap. Si ob flatum fiat mola (vt contigit cuidam fœminæ Iudææ Olysi-ponen-si, quæ arbitrata se fœtum in vtero habere, ventum tantum peperit) curatur primo frequenti vacuatione per elephanginas pilulas, quæ in hac & omni fermè causa obtinent principatum. Euacuato corpore flatus dissipandus est, diacymino, diagalanga, dianthos cum decocto camomillæ, seminis fœniculi, capilli veneris, & artemisiæ. Clyster hic valenter dissipat flatum: ℞. camomillæ p. j. baccarum lauri, anethi, cymini, seminis fœniculi, & anisi an. ʒ. j. anthos, stichados calendulæ an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ʒ. x. cui adde diamusci dulcis, & diagalangæ an. ʒ. ʒ. misce, & fiat clyster. Si in vterum iniiciatur aliquid prædictæ mixturæ purgabit flatum vteri. Pessi ex rebus dictis cap. 56. sunt optimi huic quoque morbo: vt ℞. pulue. seminis melanthij cardamomi ana.



j. pulueris euphorbij, & castorei an. 3. ss. succi mercurialis, terebinthinæ, an. quod sufficit, misce, & fiant cum lana, el gossypio duo pessi longi.

## De mola in vtero. CAP. LVIII.

### Scholium.

**M**ola auctore Gal.) Nomine molæ non intelligimus cum Quid nq= Paulo tumorem vteri, sed cum Gal. 14. de vsu. par. cap. 7. mine molæ carnem inutilem, atque informem. Quæ inutilis dicitur, quia intelligens nec est pars corporis, nec ex ea animal fit: informis verò, quia hominis, dum. nec alicuius animalis figuram seruat. Hæc mola ex Sylui sententia in libro de hom. natura, in Scholio illius sententiæ, quæ sic habet. Primum igitur necesse est, &c.) Fit à sola fœmina, sine masculi semine, & ratione, quæ oua hypenemia, hoc est subuentanea appellata, ex galina sine galli coitu. Errat tamen Sylius ut ex prædicto Galeni loco intelliges, in eo enim probat bene posse in volucribus animalibus, solam feminam formam artificiosam induere, ob eorum caliditatem & siccitatem: non autem in gressilibus, in quibus, ob humiditatem fœminæ corpus omnino est imbecillum. Mola morbus est in numero, est enim pars addita in corpore toto genere præter naturam ex 14. method. cap. 13. morbus. Quod videtur falsum, quia si mola est caro, erit ergo pars addita totum genere secundum naturam ea ratione qua sextus digitus. Respondeo, molam non esse veram carnem, aut si concedamus esse carnem, Galenum eam appellare toto genere præter naturam, quia non habet formationem, quam sextum digitum habere videmus. Mola non fit sine coitu, ita tamen, ut viri semen sit modicum, & morbosum, quod incipiat totum conceptui tribuere, & non perficiat. Ab hoc semine fit membrana chorion, quæ multis vasibus adheret vtero, quibus mola viuens attrahit sanguinem, quo nutritur, & augetur, ita ut viri conceptus spem non adimat: proinde non recte Vega existimat, molam augeri non nutritione, sed appositione & agglutinatione. Solet tamen mola, ex venis Mole manut:um attrahere (potissimum in principio) & hac ratione iecore regna attraherato (sicut in copiosa euacuatione) hydrops sequi. Ex hac etiam va etio. Mola attrahitione fit, ut in principio suæ generationis in mammis non coaceruetur lac, quamuis deinceps copiosum generetur. Ex his colliges difficile esse cognoscere, an mulier conceperit necne: videmus enim in molæ generatione, & suppressione mēstruorum, sequi generationem lactis, augmentum mamillarum, tumorem in ventre, & flatum in eo motum. Ac proinde non est mirum, si libri 4. epyd. vxor Antigenis ignoraret, an prægnas esset: & similiter Himene soror, quæ ex suppressione mensibus intenta habebat hypochondria. Alomariss & alii molæ causam materialem, semen & sanguinem: at efficient in modicum calorem statuunt. Errant tamen, quia calor est instrumentum molæ, quæ Mola non

x

a rem



à calore à temperamento seminis, & sanguinis ea ratione, qua verus conceptus fit, ut vult generatur, aliter enim non viveret, quia quæ à calore concreverunt, non vivunt. Curabitur mola, si auferatur, cum sit res inutilis adrita. Altrius, sed à feretur verò medicamentis eis, quibus secundas retentas expellimus. tempera-  
men'o se-  
minis.

De partu laborioso, & secundis detentis.

CAPVT LIX.

Causas & notas pene à Rhodione.



Vius rei copiosam, & necessariam doctrinam scriptam reliquit Eucharis Rhodius suo lib. de hœminis partu, in quo cuiuslibet partus naturalis & non naturalis formas depinxit: nos tamē omni-

Curatio. Ante par-tū victus.

sis causis, & signis breuitati studentes, & suo ordine curatio nem tantum indicabimus. Quando tēpus pariendi accedit, vterum gerens vtatur exercitatione moderata, nutriaturq; alimentis facilibus concoctu, & mollientibus, quales sunt

Balneum. Fotus.

vuæ passæ sine granis, caricæ, pruna, vuæ, butyrum, malua ius pingue. Balneum quoque ex decocto rerum mollientium est optimum, & necessarium, & fetus partis inferioris vtero proximæ cuiusmodi sunt malua, bis malua, semen lini, fœnu græcum, vuæ passæ sine granis, caricæ, melilotum, & similia

Quæ faci-lem partū faciant. Impedien-tia partū.

Amet ea quæ partum faciem, cuiusmodi sunt lapis smaragdus, iaspis, corallus, storax, radix cyclamini, & radix artemisiæ sinistra coxæ alligata. Abstineat ab iis, quæ partum impediunt, ut est aer frigidus comprimendo, & intense calidus vires matris, & fœtus dissoluendo. Pyra a tota substantia impediunt partū, etiam si nō comedantur. Cum tempus pariēdi appropinquat, prægna ambulet pedetētim per loca

Iuxta par-tū victus.

decliua, & initio partus bibat ius pinguis gallinæ cū facultate seminis lini, vel fœnugræci, addendo parū croci, vel cinamomi, & parū vini albi generosi, vel rubri mediocris substantiæ. Partes etiam vëtris inferioris, & pudēda hoc vnguento bene calido vngatur: ℞. olei sisamini, & amygdalarū dul-

Vnguentum.

cium, & de semine lini, an. ʒ. j. vtriusq; dialthææ, hysopi humidæ an. ʒ. ʒ. mucilaginis fœnugræci, & seminis lini, an. ʒ. ij. axungie gallinæ, & anatis an. ʒ. j. croci puluerizati ʒ. ʒ. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentū. Comprimere anhelitū versu

Lapis a-quila.

inferiora faciem partū reddit. Lapis aquilæ suspēsus de coxa parturientis valēter trahit fœtum non solum viuum, sed mortuum, & secundas ipsas: oportet tamē post partū statim

Causæ laboriosi par-tus.

lapidē amouere à coxa, ne attrahat ad se vterū. Difficilis partus fit vel ob defectum matris, vel vitium fœtus, vel secundarum. Si vitio parientis, quia nimis crassa sit, vel animo putillo, aut in experta dolorem, aut suapte natura imbecilla, aut

hab



abbeat vterum exiguum ob ætatem, aut propter errorem in compositione, aut quia laborat vteri inflammatione, vel a-  
 rum partium vtero proximarum. Si ob primam causam,  
 ante partum est emacianda ciborum paucitate, & multo la-  
 ore, multis vigiliis, & curis. Si sit timida, animus addendus  
 est. Si doloribus non assuefacta, validissime spiritum compri-  
 nat, & locus vteri superiori vnguento, vel huic simili bene  
 ngatur. Si imbecilla sit, optimo iure caponum, vel gallina-  
 um, & aqua carniū, vino bono, & odoribus nutriatur. Si *Curatio*  
 ob paruitatem vteri, superiori vngueto, vel oleo cōmuni, vel *per causa-*  
 ure pingui, & similibus mollientibus partes pudēdæ vngan *rum abscis-*  
 ur sæpe, bene humectatæ, & mollitæ extendatur satis, & a- *sionem.*  
 periantur in partu. Si ab inflammatione, vel alio vteri morbo  
 propriam pete curationem. Si vitio fœtus difficilis reddatur  
 partus, quia magnus sit vterus, & pudendū fotu balneo, vn-  
 guento vterū mollientium egēt, vt diximus, in exiguo vtero:  
 si ob figurā naturæ aduersam, educatur ad naturalē figurā: *Figura nat-*  
 est enim naturalis figura partus, quādo caput fœtus a prin- *turalis*  
 cipio, deinde reliqua mēbra manibus super fœmoribus por- *partus*  
 rectis, & capite in neutram partem declinante egrediuntur.  
 Proxima huic figura est, quando pedes ambo priores ap-  
 parent, & manus non supra femora, sed in sublime erectæ  
 fuerint. Aliæ omnes figuræ præter has duas a natura abhor-  
 rent, quas omnes Eucharius Rhodio exactissime suo libro  
 demonstravit. Quando igitur est figura naturæ contraria, &  
 docta obstetrice habente manus, & digitos longos, & graci-  
 les, vel à pastore prudenti, & sene reducatur in primam fi-  
 guram naturalem & omnium optimam, vel in secundam ei  
 proximam, si figura non naturalis sit ei propinquior. Deinde *Admoni-*  
 expectabis partum naturalem, & verbis blādis bonam spem *tio.*  
 fœlicis partus, & masculi, quo omnes ferè mulieres gau-  
 dent, dabis: & si opus fuerit, vterū & vias omni arte aperies,  
 partūque facilem reddes. Inter alia tamen excitanda est  
 sternutatio parienti. Multa sunt præterea, quæ partum faci-  
 lem reddunt præter superius dicta, quorum aliqua à multis  
 experta, & laudata in præsentia adducam. Si ob fœtus im-  
 becillitatem fiat difficilis partus, corroborandus est per re-  
 stauracionem matris, de qua superius dictum est, & præter  
 illa pariens hoc puluere cum optimo iure corroboranda est: *Pulvis.*  
 ℞. cinnamomi electi, cassiæ lignæ, & croci an. ʒ. j. ossium de  
 corde cerui, & spicæ an. ʒ. ss. ambræ, & musci an. g. x. sacchari  
 optimi ad pondus omniū, misce, & fiat pulvis: Dosis scrupu- *Fœtus mor-*  
 lus vnus. Si fœtus fuerit mortuus, quod cognosces frigidita- *tui signa.*



*Expellen- te ventris inferioris, motu rei grauis ad motū matris, & fœ-*  
*tia mortuū tore narium, & oris matris, hoc potu expelletur: ℥. pulueris*  
*fœtum. afflæ fœtidæ, & castorei an. ʒ. j. aque fauinæ ʒ. ij. syrapi capil-*

*li veneris ʒ. j. ʒ. misce, & fiat potus. Hoc quoque medicamē-*  
*tum valenter educit fœtum viuū, & mortuum: in viuo ta-*  
*men educendo mitiora sunt necessaria: ℥. myrrhæ, castorei,*  
*storacis an. ʒ. j. ʒ. cinnamomi, seminis, vel foliorum fauinæ*  
*an. ʒ. j. mellis. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis ʒ. ij. cum vino*  
*albo, vel aqua quinque radicum diureticarum, vel alia simi-*  
*li. Hoc medicamentum fœtum expellit, clementius tamen*  
*quam duo superiora: ℥. afflæ fœtidæ ʒ. ʒ. rutæ siccæ ʒ. ij. myr-*

*rhæ ʒ. ij. misce. Dosis ʒ. j. ʒ. cū generoso vino. Lac humanum,*  
*si bibatur, expellit fœtum autore Arnaldo de Villanoua: est*

*Dictamus enim tutissimum auxilium, & clementissimum. Drachmæ*

*Euphor- duæ succi dictami, vel pulueris eius cum vino vel aqua cali-*  
*bium. da expellit fœtum sine violentia. Drachma vna euphorbij*

*Suffitus. abortum inducit, & fœtum violenter extrahit. Suffitus hu-*  
*ius medicamenti frequens, & instrumento conueniente im-*  
*missus educit fœtū viuū, & mortuum: ℥. timiamat. ameos,*  
*opopanacis, galbani, sulphuris viui an. ʒ. ij. cum felle vaccæ*  
*fiant formulæ cicerales, vel ad formam lupinorum: Suffitus*

*Vngula, vngulæ asini, vel stercoris eiusdem fœtum educit. Suffitus*

*Et stercus spoliij serpentis similiter fœtum educit. Hi pessi molam vte-*

*asini, spo- ri dissipant, & expellunt valenter, & fœtum quoque. ℥. ar-*

*lium ser- moniaci, opopanacis, hellebori nigri, saxifragiæ aristolo-*

*pentis. chiæ longæ, & rotundæ, pulpæ coloquintidæ an. ʒ. j. succi ru-*

*Pessi. tæ, cucumeris syluestris, & fellis vaccini an. partes æquales,*

*terebinthinæ parum misce, & cum lana, vel gossypio fiant*  
*pessi longi. Pessus ex succo rutæ, & scammonio educit fœ-*

*Succus cal- tum, sed minus valenter quam superiores. Succus gallitrici*

*litrici. iniectus in vterum sanguinis profluuium illius prohibet,*

*quod partum laboriosum præcipue post acria medicamen-*

*ta, sequi sæpe solet. Si ob secundarum crassitiem partus sit*

*Obstetrix. difficilis, quia nō auelluntur, neque abrumpuntur, obstetrix*

*prudens digitis propriis, vel forcipibus eas scindat, vt fœtus*

*egredi possit. Si verò ob earū tenuitatem ante debitum tem-*

*pus rumpantur, & humor collectus in vtero fluat, & tandem*

*vulua, & viæ sicciore factæ partum difficilem efficiant, o-*

*portebit pudendum, & partes iuxta vterum vnguentis, foti-*

*bus, incessibus, & balneis iam dictis humectare, & vias a-*

*Ad secun- perire.*

*dina expel- Si à partu in vtero secundina derenta sit, summo studio e-*

*lendam. ducenda est, non tamen subito & violentè, vt multi impe-*

*riti*



riti faciunt: enixa enim fatigata labore partus benignè tractanda est, ne simul anima, & secundina educantur, vel prius anima agatur, multis enim diebus viuunt enixæ non expul-  
 sis secūdis, quas potest natura sensim, & multo tempore expellere. Quiescat ergo enixa, & mente cōfirmetur, & statim *Oleum.*  
 a parte bibat libram semis olei communis, cum drachma vna croci puluerizati, pōst, vomitu, tussi, sternutatione, & *Vomitus,*  
 anhelitus compressione excitetur expultrix facultas ad ex-  
 pellendam secundinam. Si tamen his non educatur, enixa *nutatio,*  
 nutriatur iure optimo caponum, vel gallinarum, aqua car-  
 nis, ouis recentibus, vino optimo, & auibus montanis. Vteri *anhelitus*  
 locus in sessibus, vnctionibus, & fotibus renum mollientium  
 est parandus, vt dictum est superius in partu difficili. Post,  
 quæ fœtum mortuum expellunt, conferunt, qualia sunt su-  
 perius dicta, & præter illa, in sessus ex decocto foliorū, & gra-  
 norum, alliorum, foliorum vsnē (est herba similis vermicu-  
 lari sapore salso, ex qua fit sal) camomillæ, & foliorum ebuli  
 educit secundinam. Pessus, & vnguentum ex leporis coagu-  
 lo, & croco pudendo admotum secundinam educit. Suffitus *Pessus.*  
 spoliij serpentis idem præstat, & cataplasma ex eodem spo-  
 lio serpentis cū ruta, artemisia, & absinthio coxæ admotum, *Vnguentis*  
 & vuluæ secundinam educit. Suffitus vngulæ asinæ, & capræ, *spolium*  
 stercoris bubuli, columbini, seminis porri, allij corticis, mi-  
 noris pini, hellebori, aristolochiæ longæ, nigellæ, & similium  
 educit valenter secundinam. Inseffus, vel suffitus, seu euapo-  
 ratio ex decocto rutæ, prassij, abrotani cum oleo de lilio ex-  
 trahit secundinam. Pessi, & clysteres ex allio, aspalto, assa fœ-  
 tida, balsamo, stercore accipitris, galbano, gentiana, serapi-  
 no, scammonio, vite alba, ireos, & succo dictami: omnibus  
 simul vel aliquo ex his secundinam educunt. Vnciæ duæ suc-  
 ci ex aliquo horum medicamentorum valenter educunt se-  
 cundinam dictami scilicet, artemisiæ, polilitrichi, petroseli-  
 ni prassij, mercurialis, verbenæ, porri, rutæ, pulegij, hyperi-  
 conis, & similium. Drachma vna pulueris huius cum vino  
 optimo, vel aqua diuretica valenter educit secundinam: ʒ. ʒ.  
 myrrhæ, castorei, seminis dauci, dictami, seminis porri, pul-  
 ueris lumbricorum terrestrium an. ʒ. ij. misce, & fiat puluis, *Clysteres.*  
 qui obtinet principatū in hoc morbo. Balsamum sumptum  
 secundinam expellit, & efficit fœminam sterilem, vt quo-  
 rundam fert opinio. *Puluis po-  
terissimus.*  
*Balsamū.*

De partu laborioso, & secundis detentis.

CAPVT LIX.

x 3

Schol



## Scholium.

**H** Vius rei copiosam.) Ex Gal. 3. de nat. fac. cap. nouem men-  
 sibus plerisque mulieribus perficitur in utero fetus. Vbi nomi-  
 ne perfectionis fetus, non generationem, sed eius augmentum intell-  
 git, quod est finis retentionis uteri. Fetus absolutus, cum iam per  
 Quomodo git, quod est finis retentionis uteri. Fetus absolutus, cum iam per  
 fiat par- nutrirī possit 15. de usu par. cap. 7. molleque sua molestius sit utero, ma-  
 tus, nibus & pedibus motis membranam primò internam (quæ ei conti-  
 gua est) rumpit, & deinde alias: quo tempore postulante usu, os uteri  
 dilatatur, à vinculisque absolutus foras procedit suo pondere, & ni-  
 xu, expulsus etiam ab utero, & matre adiuvante contrahendo muscu-  
 los abdominis. Unde ad optimum & facilem partem hæc omnia con-  
 Partus fa- currant opus est. Primò orificium uteri expeditum, Secundò motus fa-  
 cilis causa, tus, quo rumpat membranas: figura eius accommodata, ita ut prius  
 caput, & deinde totum corpus, manibus ad latera adherentibus egre-  
 diatur, aut prius pedes, manibus sursum eleuatis: numerus etiam fæ-  
 tus, si unus egrediatur: & ultimo magnitudo mediocris, ut possit per o-  
 ruteri egredi. Tertiò necessum est ut membranae fætum obuoluentes, ne-  
 sint nimis duræ, nec molles. Quarto uteri robur: ultimo robur matris  
 ad tollerandos dolores, & comprimendū abdominis musculos. Hinc par-  
 tus difficilis varias causas colliges. Prima in uteri ore consistit, quan-  
 Difficilis tus difficilis  
 partus va- do angustum est, distortum, tumore affectum, aut aliquam contraxi-  
 riæ cause, dritiem. Secunda, in fætus traua figura, qualis est omnis alia à su-  
 pradietis: in amisso, aut languido eius motu, cum mortuus est aut im-  
 becillus: in magnitudine modum excedente: & in numero cum multi fæ-  
 tus in utero continentur: vixit enim adhuc hoc anno qui est 1579. mu-  
 Historia lier Salustra nomine, obesa, & stature humilis, quæ nouem vno partu  
 mira, enixa est, quod non nullis semel, sed bis ei euenisse certissimè scio. Ter-  
 tia causa est, membranarum durities, quæ difficulter rumpuntur, aut  
 mollieties, ob quam eis ante tempus ruptis egressæque vrina, tempore  
 partus via non est lubrica, simulque deficit utero humor ipsum ad ex-  
 pulsionem etiam irritans. Quarta imbecillitas expultricis uteri, quæ  
 ab intemperie oriri solet. Vltima verò causa, in femina patiente con-  
 sistit, cum languida est, aut male tollerat labores.

**Amnios** Si à partu in utero secundina detenta sit.) Tribus membra-  
 mebrana, nis tenuibus obuoluitur fetus, dum est in utero.

Prima quæ eius adhæret cuti. Amnion appellatur, à mollietie. Hæc  
 veluti sudorem fetus excipit, in quo veluti innatans rebitur, ita ut mi-  
 Allantoi- nus grauis utero sit. Altera subsequitur tenuissima, quæ allantoidem  
 des mem- nuncupant, à similitudine farciminis quod allas dicitur. Hæc ad res-  
 brana, cam est peruia, & ideo facta, ut vrinâ pueri coaceruet. Tertia & ex-  
 Chorion terna tenuis, sed fortis, reliquas duas & fætū ambit. Hanc Græci cho-  
 mebranz. rion (quod est radicatio) appellat, quia in ipsam innumera ræne radi-



atur: Latini secundam, aut secundas, quia videntur esse secundū domicilium fœtus ab utero. Hæc fulcrum est venarum, & arteriarum, quæ tandè in venam umbilici degenerant, & respondet venis, & arteriis uteri, ita ut ora oris adhæreant, quibus fœtus utero alligatur. In huius membranæ historia, Vesalius duplici nomine reprehendit Galen. Primò quod putarit Galenus hæc membranam ex semine fieri, cum fiat potius ex sanguine, & eius substantia nō sit membranosa, sed carnosæ, carni lienis simillima. Secundò, quod dixerit hanc membranam totum fœtum obuoluerè, cum tantum à mucronata cartilagine, usque ad os pubis fœtus obducatur. Malè tamen reprehenditur Galenus à Vesa- Vesalius lio, quia chorion membrana ex semine ortum habet, & totum obuoluit reprehendit fœtum. Deceptus autem fuit Vessalius, existimans membranam hanc Gal. non esse rem distinctam à substantia carnosæ ei adhærente, quam dicitur Defendistinctam esse ex primo de semine, & 4. de usu par. colliges. Hæc ergo est tur Gal. membrana, quæ fœtu uterum iam egresso, aliquando interius remanet, quam oportet extrahere ea ratione, qua docet auctor.

## De ramice, seu hernia. CAP. LX.

**Q**uum peritonæum (quam Arabes membranā sifach *Descriptio.* nominant) qua parte vasis seminariis peruium est, aut laxatur, aut etiam rumpitur, ita ut aliquid vel in inguina, vel in scrotum descendat, ægritudo sit, quæ Græcis cele, Latinis tum ramex, tum hernia dicitur, barbaris ruptura. Porro cum variè hæc affectio contingat: plures enim *Differentiæ variæ.* eius numerantur differentiæ pro corporū, & substantiarum ad scrotum, aut ad inguina deuolutarū natura, iis omnibus nomina imponuntur: nam si intestinum descendit, enterocele, hoc est intestini ramex: si omentum, epiplocele. i. omenti ramex: si aqua, hydrocele, hoc est aquosus ramex: si melancholicus sanguis in vasorum anfractibus colligitur, circocele, id est, varicosus ramex: si spiritus, pneumatocèle, hoc est, flatuosus ramex: denique si caro dura intra testium tunicas increfcit, sarcocele, hoc est, ramex carnosus dicitur.

Fit hoc morbi genus multis de causis: nam quod in ingui- *Causæ.* na, aut in scrotum, tum intestina, tum etiam omentum descendant, perinde ac in enterocele, & bubonocèle contingit, occasione præbere solèt multa: cuiusmodi sunt ictus, saltus, clamor, immensæ alicuius molis sublatio, & quicquid huiusmodi corpori, aut extrinsecus, aut intrinsecus potest accidere: ab his enim causis facillè peritonæum aut extenditur, aut laceratur. Communes autem notæ utriq; intestinorum *Notæ.* inquam, & inguinis ramici hæc sunt. Tumor in inguine, vel scroto conspicuus cernitur, & in exercitationibus, itine-



re, spiritus retentione, & aliis occasionebus maior quàm arte apparens, qui si comprimatur, tardè quidam recurrit, colleriter autè rursus deuoluitur. Cæterum quò diiudices, num propter peritonæi extentionem ramex sit factus, an propter eiusdem ruptionem animaduertere oportebit, quoties o extentionem peritonæi ramex obortus sit, intestinum non vniuersim, sed particulatim temporis spatio, & ob causas quaslibet deuolui, tumoremque æquabilem, ac profundum apparere intestino, quod deuolutum est, peritonæo constricto, secus sit, quum vniuersim deuoluitur, idque ob causas violentas duntaxat. Tumor præterea immensæ magnitudinis, inæqualisque in cute protinus eminet, quod scilicet intestina extra peritonæum elabuntur. Aquosi ramicis causas simul ac notæ, & differentia apud Aetium lib. 14. & 22. hunc in modum leguntur. Hernia aquosa quandoque ex occulta, quandoque ex manifesta causa contingit, ex occulta quidem quum aquosus humor circa partes corpusculorū, quæ scrotum contexunt, ac implicant sanguini admixtus collectus fuerit. Ex manifesta verò, quum ex plaga collisis aut fractis vasis sanguis affluens ad aquosam substantiam transmutatur. Vbi igitur sponte cōstiterit aquosus humor collectus, subflauus, aut suppallidus inuenitur. Vbi verò ex plaga, cruentam, ac fœculētā materiam reperies. Humor autem vel intra rubicundam testiculi pelliculam consistit, vel extra ipsam inter eam & pelliculas adiacentes, vel in propria pellicula velut vesica quædam continetur, atque hoc genus herniam in tunica superagnata vocamus. Aliquando verò duplex hernia oboritur, cum collectio & in rubicunda tunica, & in superagnata consistit: si quidem igitur in pellicula rubicūda humor collectus fuerit, tumor vnus coloris apparet sine dolore, in principio dū adhuc parua est collectio ad contactum cedens: postea verò aucta collectione testiculus humore vndique circūdatus occultatur: at tumor in ambitu extentus ac renitens ad tactum herniæ carnosæ suspicionem imperitis exhibet, possunt tamē tactu discerni: nam hernia carnosa omnino renititur, sed aquosa digitis cedit. Si verò in superagnata tunica humor colligatur, tumor ipse siue magnus, siue paruus fuerit omnino circumscribetur: at si simul quoque in rubicunda tunica collectus fuerit, duo tumores deprehenduntur, alter in superagnata, alter in rubicunda pellicula.

Quod si extra rubicundam pelliculam collectio fiat, testiculus tactui occurrit. Cæterum ab hernia aquosa differt hernia



hernia intestinorum, quoniam in aquosa tumor eiusdem per-  
nitus magnitudinis semper, & quolibet corporis situ perfi-  
stet: neque enim humores velut intestina transferuntur. In-  
guen præterea in hernia aquosa secundum naturam se ha-  
bet, qua nota vel maxime aquosa ab omenti hernia distin-  
guitur: nam in hernia omenti semper in scroto omentum  
persistit, neque vnquam transfertur, id quod etiam in aquo-  
sa contingit. Verum in omenti hernia inguen rarefactum  
deprehenditur. Atque hæc de ramice sunt satis: nam quæ  
de aliis speciebus dici poterant, cum vix ex iis, quæ supradic-  
ta sunt patere possint, superuacaneum esset hic scribere:  
qui plenior tamen disputationem desiderant, adeant Aetij  
librum 14. & Galeni medendi methodum.

Flatua hernia curatur primò, victu calfaciente ægri, & *Curatio*  
nutricis si fuerit infans: secundò dissipantibus flatum inter- *flatuosa.*  
nis, & externis, qualia sunt rosata nouella, armoniacum, ro-  
satum, diacyminum, diagalanga, dianthos, electuarium de *Infans.*  
baccis lauri. Infans, qui non potest omnia medicamenta ne-  
cessaria sumere, cum lacte sumat semen fœniculi, vel anisum  
mansum, vel parum aquæ nasæ, & parti affectæ admoueat  
carica assata cum puluere cymini, vel carui, vel arancium  
assatum cum eodem puluere, vel mel parum decoctum cum  
stercore bubulo. Si æger fuerit puer, iuuenis, vel senex va-  
lentioribus eget, de quibus cap. 31. de curatione inbecillita-  
tis ventriculi.

Aquosa hernia curatur primò victu calido & exiccante, *Aquosa.*  
de quo diximus cap. 44. de curatione hydropis.

Secundò, apparantibus humorem aquosum, vt rhodo-  
melle, oxymelle simp. syrupo de duabus radicibus, & aliis dic-  
tis cap. 1. & multis aliis locis.

Tertiò, phlegmagogis: vt agarico, puluere hieræ simp.  
turbis, diaphanicon, & aliis, de quibus eodem 1. capit. sed  
frequenter oportet purgare pilulis elephanginis, & de hiera  
simp. & agarico trochiscato: quia euacuant sine molestia.

Quartò, dissipantibus flatum medicamentis internis &  
externis dictis cap. 44. de curatione ascitæ. Vitimò verò o-  
mnis aqua euacuanda est filo transfixo in scroto, qua emissa  
vlcera exiccantibus, & glutinantibus sunt curanda, adhiben-  
do tamen medicamenta partibus primò affectis, vt hepatis,  
lienii, & aliis.

Carnosa hernia, si antiqua non fuerit, & minus dura, cu- *Carnosa.*  
ratur rebus emollientibus, & dissipantibus carnem, vt hoc  
præcedenti tamen debita victus ratione & corporis purga-  
tione



# DE CVRAND. MORB.

tionem: Ț. igitur oleorum camomillæ, anethi, sesamini, & amygdalarum dulcium an. Ț. j. mucilaginis seminis lini, & fœnugræci, an. Ț. j. pulueris rosatæ nouellæ, camomillæ, & croci an. Ț. j. Ț. empastri de meliloto, quod sufficit, misce, & fiat vnguentum. Vtrumque diachylon cum armoniaco hanc herniam longo amen tempore dissoluit.

*Varicosa.* Varicosa hernia non sine magna difficultate curatur. Primò, victu dicto cap. 9. de melancholia. Secundò, apparantibus atrum humorem conuenientibus medicamentis, de quibus eodem cap. 9. Tertiò, vacuantibus, vt confectione diasenæ, cõfectione medicaminis hamæ sero caprino, epithymo, pilulis de fumo terre, Indis, & de lapide laxuli. Quartò, mollificantibus, & dissipantibus, vt medicamentis dictis superius in curatione carnosæ herniæ.

*Aliarum specierum curatio difficilis.* Vltimò verò varices eximantur more cancrorum ferro candenti, quamuis hoc opus non ab omnibus ferri possit. Alij omnes nodi, & differentiæ earum, quæ fiunt ex laxato dydimo, aut rupto peritonæo, siue omētum decidat, siue intestinum in infantibus, & pueris sunt faciliores curatu, præsertim si recentes fuerint: antiquæ enim sine opere manuum non possunt curari.

*Intestina- lis.* Hernia, quæ curatur primò victu adstringente, & glutinoso, de quo cap. 28. de curatione sputi sanguinis, & somno, & quiete, siquæque cibi flatuosi, vehementis, saltus, & clamoris. Postea si intestinum fuerit extra peritonæum ægro resupinato, sublati cruribus sensim reducatur intestinum ad locum proprium, nisi stercus, vel flatus hoc impediatur, quo tempore flatus est dissipandus iam dictis, & stercus mollius factum fotibus, vnguentis suppositoriis, & balneis ex butyro, muscilagne fœnugræci, seminis lini, oleo sisamino, & amygdalarum dulcium est euacuandum: intestino tamen in scro-

*Clyster periculosus habentibus intestinum extra.* tum lapsa, vel extra peritonæum iniectio clysteris est suspecta, & maximè timenda: quum multi nostris temporibus sine voce subito perierint excepto clystere post motum intestinum à proprio loco, ad quem reduci non potest plenum postea substantia clysteris.

Intestino ad locum suum reducto à chirurgo docto, & prudenti, conserua ipsum idoneis instrumentis, & ligaturis. Scissuram quoque astringe, id tamen fiet à viris in hoc in lapidibus à vesica extrahendis exercitatis, & probatis. Et incisioni impone medicamenta glutinantia, & constringentia, vt emplastrum contra rupturam in omni regione satis cognitum, & ab omnibus pharmacopolis confectum. Hoc quoque est



Quando



# DE CURAND. MORB.

*Opus per* Quando supradictis auxiliis hernia non curatur, oportet  
*instrumē-* ad opus chirurgicum aggredi. Aliqui partem, per quam de-  
*ta.* scendit intestinum, contrahunt ferro candenti: alij caustici  
potentia admouēt: ab aliis acu perforatur, & meatus astrin-  
gitur, ne intestinum vel omentum descendat. Sed quia ad  
modum difficile est laxationem, vel peritonæi incisionem  
antiquam curare sine testis extractione, ab erudito, & in hoc  
exercitato diu viro testis, vel testes cum dyndimo abscin-  
dantur, & extrahantur, cuius modum & formam Paulus li-  
bro 6. cap. 62. & Albumasis scripserunt.

## De Hernia. CAP. LX.

### Scholium.

**Q**UOD VUM peritonæum.) Ramicis differentiæ, quædam à lo-  
co, & quædam à materia tumorem efficiente desumuntur.  
A loco cum humor est in inguine, qui dicitur bubynocoele, au-  
scroto, & appellatur ocheocoele. A materia, si sit aqua, dicitur hydro-  
cele. Qui sua tentione carnosam herniam repræsentat, quod ex testis  
*Varie her* pelluciditate (quæ in aquosa apparet) in loco obscuro accensa cerea-  
*niarum* candela, distingues. Si sit flatus, appellatur pneumatocoele, in quo ra-  
*Species cõ-* mices et si testis lumine appposito sit perlucidus, est tamen testis lenior,  
*numera-* quàm in supradicto. Si sit caro, sarcocoele nominatur, qui tumor est du-  
*tur.* rus, & longus formam habens testiculi, & qui longo tempore sensim  
increuit. Fit à carne duriori, in aliqua scroti parte nata, aut ut voluit  
Gal. ab schirro, per schirrum non eum, qui ab humore, sed carnem du-  
ram intelligens. Si sit varix, cirsocele nominatur, qui ramex à tumore  
venarum nutriendum testiculum fit. Quem cognoscimus ex inæqua-  
litate, quæ tactu sentitur in multis exiguis extuberantiis apparenti-  
*Enterocoe* bus. Si intestinum enterocoele dicitur. Vbi per intestinum non intelli-  
*ab ileo* gitur rectum, quod cum relaxatur, in anum delabitur, neque colon,  
*fit.* quia hoc renibus adhæret, neque ieiunum aut duodenū, quia hæc sub-  
limiora sunt, sed ileon, ut rectè docuit Paulus. Hic ramex cognoscetur  
ex tumore molli repente nato, augetur clamore, & multo cibo, & in eo  
tactu sæpe deprehenduntur indurata excrementa. Si tandem ramex  
fiat ab omento tanquam ex materia, appellatur epiplocele. Quem co-  
gnoscet ex tumore pæruo, eodem modo semper apparente tactuque mol-  
liusculam senties substantiam. Hunc ramicem non admittit Vallesius  
2. epy. sec. 1. comm. 19. deceptus à Vessallio, qui omentum usque ad pu-  
bem non posse descendere scribit. Iacotius duas hernias, quæ veræ non  
sunt, sed apparentes tantum describit. Quarum una est, cum transla-  
tus est testis ad inguen: Altera cum ex vehementi imaginatione in li-  
bidinosis colligitur semē inter tunicas testiculi. Difficile tamē videtur,  
imò



est impossibile, testem pisse in regione inguinis sibi cavitatem parere: sicut & alterum quod de semine scribit, cum nulla pateat semina, per quam intra membranas possit colligi. In ramice intestinali, omentali, morbus est in situ. In aliis morbus est intemperies cum fluxu humoris, hoc est tumor præter naturam. Reliqua ex auctore.

## De Arthritide. CAP. LXI.

**A**rthritis tunc fit, cum in vniuersum omnes corporis articuli propter alienum à natura humorem confluentem dolor occupat. Latini hunc morbum articulare appellat, barbari arthriticam passionem: verum animaduertere oportet arthritidem, podagram, & ischiadem affectiones esse genere easdem loco tantum differre, cum alioqui vna sit communis omnium origo: est enim arthritis, cum in omnibus articulis dolor insidet, podagra cum in pedibus tantum, quemadmodum chiragra cum manus obsederit dolor. Ischias autem cum eam iuncturam, quam Græci ischiam, Latini coxam nominant. Quare non breuiter fuerit, nobis præsertim, qui breuitati studemus, harum omnium affectionum curationem hoc cap. comprehendere: amethi de arthritide caput tantum inscribatur. Fit autem arthritis multis de causis, quarum quædam internæ sunt, quædam externæ. Externæ sunt casus, percussio, corporis immodica exercitatio, vt lucta, cursus, aliæque id genus, præsertim si statim à cibo fiant, articulorum præterea luxationes, & quicquid extra incidens articulos ita potest debilitare, vt ad recipiendos deriuatos aliunde humores idonei sint: inter quæ veneris immoderatus vsus, & solitæ exercitationis intermissio numerantur. Mœrores præterea, curæ & vigiliæ, cæteræque animi perturbationes ex eorū genere sunt, quæ arthritidem, podagram, & cæteras articulares affectiones possunt efficere, nõ modò quod corpus imbecillius redant, sed quòd noxios quoque humores procreent. Inter alia quoque, quæ maxime hæc affectionem inducunt, sunt assidue cruditates, crapulæ, & eorū alimentorum vsus, quæ & difficilia coctu sunt, & pituitosos insuper humores generant. Docet hoc Galen. comm. 28. lib. 6. aphor. dicens, ætate quidem Hippo. pauci podagra laborabant propter vitæ moderantiam, nostris verò temporibus vsque adeò auctis eduliis, vt nihil addi posse videatur, infinita est podagrarum copia, cum nonnulli sint, qui non exercentur, & cruditatibus atque ebrietate obruuntur, & ante cibum assumptum bibunt.

Descriptio.

Species.

Causæ.

Quare tē

pore Hip-

pocratis

pauci la-

borabant

arthritide.



bunt vina generosa, ac venere vtuntur immoderata: nonnulli verò etsi non in his omnibus, in aliquibus saltem eorum, quæ dicta sunt, delinquant, sed cum peccatum fuerit magnum, sæpius in vno eorum, quæ diximus deliquisse satis erit. Ob hanc igitur causam etiam eunuchi podagra corripuntur, quamvis non vtantur venere: talis enim est eorum desidia, insatiabilitas ebrietasque, vt etiam sine venereorum vsu podagra possint corripi. Confirmans hanc sententiam Gal. com. 30. eiusdem libri, eunuchos, inquit, itaque videmus quosdam podagra laborantes, pueros verò non vidimus: quia illis venus non nocet, nec vitæ immoderantia in cibis ob caloris copiam: sed ego vidi, quod Hippo. & Galen. non viderunt, nobilem videlicet puerum septem, aut octo annos natum Vallesium laborantem non tantum podagra, sed arthritide vere & autumno, cui non fuit hæreditarius morbus articularis, & satis ille biliosus erat. Vfus etiam vreticorum præsertim a cibo multo, & difficili concoctu hanc generat affectionem. Compertum quoque est vini meracioris præsertim vetusti, assiduum vsum huius affectionis causam quam maximam esse: ac proinde medicorum omnium decreto huic malo obnoxius vini vsu quamprimum interdicatur. Sed neque silendum erit, quod sæpe à parentibus hoc vitium in posteros dimanarit, vnde hæreditarij morbi esse consueuerunt arthritidis, & podagra, quod nec diffitetur Gale. 6. apho. com. iam dicto 28. multos dicens laborare podagra, quod auos & patres podagricos habuerint. Porro internæ causæ sunt humorum multitudo, aliquando sanguineorum, biliosorum nonnunquam, atque melancholicorum: frequentius tamen crudorum, atque pituitosorum: qui articularum cavitates replentes tumores & dolores, quales in inflammationibus reperiuntur, excitant: quam rem plurimum iuuat tum articularum ad recipiendum propter imbecillitatem aptitudo, tum cæterorum membrorum ad expellendum fortitudo, quo fit, vt qui in vniuersum causas colligere vellet, in tria genera partiretur, humorum, inquam, copiam, articularum imbecillitatem, & cæterorum membrorum robur: hoc tamen admonere vellem prius quam ad signorum enarrationem, & curationem deueniatur, frigidos, crassos, & pituitosos humores ad ipsos articulos facile deferri non posse, & neruorum compactæ substantiæ insinuari, nisi ab aliquo humore, cuiusmodi est bilis, deducantur, cuius beneficio fit, vt tametsi crassi consistentia sint, angustissimos tamen meatus permeent tenuissimo scilicet humore

viam

*Galen. videtur eunuchos laborantes podagra & non pueros: nostro tempore visus est puer podagra laborans.*

*Morbus hæreditarius. Causæ interne. Tria sunt causarum genera huius morbi.*

*Bilis vis.*



iam aperiente. Vnde veræ curandi methodi præceptum est  
 medicamentis, quæ ad hos humores vacuandos propinatur,  
 liquid misceri debere, quod bilem educat. Signis, quibus *Nota*,  
 morbus cognoscitur, non est opus, cum vel dolor ipse arti-  
 culis innitens morbi speciem statim exprimat. Cause verò  
 humores scilicet abundantes, quicunque sint, siue biliosi, san-  
 guinei, melancholici, aut pituitosi: nam procatartica cau-  
 sæ ex ægrotantis sermonibus sunt petendæ, & per traditas  
 superius methodos, maxime cap. de cephalalgia dignoscen-  
 tur. Cum Paulo verò Aegineta hunc in modum inuestiga-  
 bis, libet autè verba eius hic subscribere. Variæ itaque sunt *Paulus*  
 affectionis huius, ceu dictum est, causæ: humorum tamen *Aeginetæ*  
 negotium facientium differentia haud difficulter locis qui-  
 bus impacti sunt perspicua redduntur, tum coloribus, tum  
 cæteris accidentibus prodita. Biliosus namque fluxus colo-  
 re sublurido, & rufo deprehenditur. Idem caloris insuper  
 sensum ingerit, cruciatumque acerbiorum efficit, & protin-  
 us ad supremam cutem circa amplum tumorem erumpit,  
 calidarum rerum impositu magis exacerbat, quemadmo-  
 dum è diuerso dolorificis placatur: quod quidem cæteris fe-  
 re omnibus magna ex parte, peculiariter verò aliis biliosis  
 euenit. Febris item sepe numero in accessionum summis vi-  
 goribus accedit, valdeque sitibundi redduntur. Consimili  
 modo, & in melancholicis atrioris coloris corpus deprehē-  
 das, sicut in pituitosis album & aquosum corpus cernitur,  
 vnde minus cruciantur, & seriùs tument particula: perin-  
 de atque si sanguineus humor in corpore abundat, cruen-  
 tum colorem membra præferunt. Sed ad exactiorem iudi-  
 cationem iuuabit te superior victus ratio, &c.

Dolor iuncturarum a causa calida cum humore curatur *Curatio*  
 sex remediõrum generibus. Primò, victu tenui, & refrigerā- *calida.*  
 te, & calidorum abstinencia, præsertim vini & veneris: hæc  
 enim in causa etiam frigida nocent.

Secundò, phlebotomia partis opposita: vt in arthritide  
 dextræ manus, venam cubiti sinistri secamus, & in podagra  
 dextri pedis venam cubiti dextri incidimus: quamuis aliqui  
 cum Galeno venam poplitis sinistris secandam esse volunt.  
 In dolore tamen iuncturæ dextræ coxæ (a Græcis dicitur is-  
 chias) vena poplitis dextri est secanda, vt Galen. ostendit in  
 libello de curandi ratione per sanguinis missionem, & in  
 plerisque aliis locis. Multi initio, & corpore pleno existente  
 venam cubiti eiusdem partis secant, quod Galenus visus est  
 docere 10. de cõpositione medicamentorum secundum locos.

Tertiò



## DE CVRAND. MORB.

Tertiò, remittentibus sanguinis feruorem frigidis & astringentibus, v. syrupis rosarum, granatorum, myrtillorum, cydoniorum cum dupla aqua portulacæ, plantaginis, aceto-

*Quando va* sæ, & solacri per tres, aut quatuor dies: in dolore tamen maciendus est gno absque syrupis, & concoctione euacuanda est bilis: quâuis non sit turgida proprie, nam quemadmodum in vehemens absque cō merrissimo colore narcotica sunt necessaria, quæ dolorem concoctione in non auferendo causam curant, ita coactè vacuandus est humor dolor pariens vehementem sine concoctione, quia hoc sym- maius est auxilium nocumento.

Quartò vacuantibus bilem, vt pilulis hermodactylorum minorum à drachma vna ad scrupulos quatuor, vel drachmis quatuor electuarij de succo rosarum, aut diaprunis solutiui.

*Adina.* Quintò, anodynis, à quibus incipiendum aliquando est, & repellentibus, vt cassia fistulari dissoluta in oleo rosato, farina hordei, mucilagine psyllij, vel cydoniorum extracta aqua rosarum, & pauco aceto ad penetrandum magis, vel succo, aut aqua solani, plantaginis, vel portulacæ. Prodest quoque panis medulla, lacte macerata, & parum cocta addendo vitellos duos ouorum, & oleum rosatum, cum quo

*Admoni-* vermes terreni sint cocti, frigidum applicetur. Hæc omnia dum calescunt, sunt mutanda, & sæpe. Si dolor est intolerabilis, prædictis addes opij drachmam vnâ, croci ad pene-

*Cataplas-* trationem parum. Hoc cataplasma est optimum in doloribus iuncturarum intolerabilibus à causa calida: ℞. farinæ hordei sine furfure, & medullæ panis. an. p. ij. foliorum iustiquiami, maluarum, & violarum an. m. j. florum camomillæ & corticis papaueris albi. an. p. j. Ex his decoctis fiat cataplasma addendo oleorum lumbricorum, & papaueris. an. 3. j. opij, & croci. an. 3. ss.

Sextò, dissipantibus id, quod fluxum est, vt oleo camomillæ, de lilio, anethi, decocto camomillæ, radicis althææ scœnogræci, & meliloti, vino austero facto, vel aqua marina stercore vaccino, vel hoc, aut simili vnguento: ℞. olei camomillæ 3. ij. olei de lilio & de semine lini an. 3. j. mucilaginis scœnogræci, & seminis althææ an. 3. ij. pul. rosatæ nouellæ, & stercoris bubuli an. 3. j. ss. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum.

*Frigida.* Arthritis à causa frigida pituitosa curatur primò victu parum calido cum astrictione, quare vinum in ea nocet, quia crudos humores ad iuncturas trahit, in quibus, vt & in nervis facile in acetum cōuertitur. Bibat ergo laborans ex hoc dolore aquam cinnamomi, vel decoctum seminis fœniculi, vel



el anisi. Quòd si vinum valenter appetat, sit rubrum, & aringens, vt Saguntinum, & aqua multa dilutum.

Secundo, apparantibus pituitam, vt rhodomelle cum a- *Admonitio*  
uis, aut decocto fœniculi, melissæ, & similibus, dummodò  
alentia diuretica non sumantur, præcipue ante purgatio-  
nem, quia humores ad iuncturas ducuntur, & ideò calculo  
enum, aut vesicæ affecti ex vsu longo diureticorum in ar-  
triti dem incidunt.

Tertiò, vacuantibus pituitam à iuncturis, vt drachma v-  
a pilularum hermodactylorum maiorū ad scrupulos qua-  
tor, vel drachmis quinque diacarthami ad drachmas sex. *Frequens*  
in hac causa, quia est diurnus dolor, bis, vel ter in mense *Purgatio*  
at vacuatio per has pilulas: ℞. pilularū artheticarū maio- *Pilula.*  
rum, & agarici trochiscati an. 3. j. turbit electi ʒ. ij. diagridij  
primi ʒ. j. cum aqua viæ arthetica fiant pilulæ triginta: *Confectio.*  
oro dosi tres. Vel si non potest transglutire pilulas, hæc mix-  
tura fiet: ℞. diacatholiconis ʒ. j. ʒ. diacarthami ʒ. j. agarici  
trochiscati, & turbit electi an. 3. ij. conseruæ buglossæ ʒ. iij.  
pulueris rosatæ nouellæ ʒ. j. ʒ. rhodomellis q. s. misce, & fiat  
onfectio. Dosis, cochlearium vnum qualibet hebdomada. *Admonitio*  
in hac, & in omni materia arthritidis utilis, & necessaria est in præser-  
uacuo in vere per sanguinis missionem, & per medica- *uatiōe.*  
nenta purgantia, etiam si non acta dolore efficiantur, vt do-  
et Hippocrates aphoris. quadragesimoseptimo lib. 6. & Ga-  
enus in comment.

Quartò, dolorem sedantibus statim principio adhiben-  
tis, vt oleo camomillæ, oleo lumbricorum, de terebinthina,  
le semine lini, de lilio, de vulpe, & similibus. Cataplasma ex *Quæ hunc*  
arina camomillæ, meliloti, fœnugræco, semine lini, & pul- *tollunt do-*  
nere stercoris vaccini cum oleis supradictis valde sedat do- *lorem.*  
orem. Cataplasma ex mucilagine seminis fœnugræci extra-  
cta cum aceto, & aqua cum melle est probatum, & efficax  
auxilium, si per tres dies hæreat loco dolenti.

Quintò, dissipantibus, corroborantibus, & resoluentibus *Dissipatiō*  
moderate, ne tenui dissoluto crassum duritiem lapideam sus-  
cipiat. Hæc omnia quoque dolorem mitigant, qualia sunt  
dicta in quarto genere auxiliorum, & hoc vnguentum: ℞. o-  
eorum camomillæ, vulpini, & de lilio an. 3. j. vnguenti Ara-  
gon, & marciaton an. 3. ʒ. mucilaginis seminis fœnugræci, &  
seminis lini, an. 3. iij. pulueris mastichis, & rosarum an. 3. ʒ.  
teræ q. s. misce, & fiat vnguentum. Præstantissimum quoque *Præstati-*  
est partes dolentes ab hac frigida materia oblinere sæpe adipe *tissimum.*  
anseris pinguis exenterati & farti lumbricis terrestribus, fœ- *auxilium.*



nugræco, croco, terebinthina, confuti & tosti. Secundus a  
 deys, qui defluit in vas aceto albo plenum est melior fotus  
 & balneum ex decocto camomillæ, meliloti, fœnugræci, y  
 uæ arthetica, roris marini, seminis lini cum aqua falsa, ve  
 qua chalybs, aut ferrum candens extinguitur, est efficax re  
 Terebin- medium. Longus vsus pilularum terebinthinæ abietis de  
 thinae laus cies lotæ cum aqua yuæ arthetica curat hanc arthritiden  
 antiquam, si curabilis est, quia soluere nodosam nescit me  
 Lignum dicina podagram. Dosis tertio quoque die tres magnitudi  
 guaiacum ne ciceris. Potus aquæ ligni guaiaci per triginta, vel qua  
 draginta dies euacuato corpore solet curare hanc antiquam  
 arthritidem: muta tamen eius facultatem secundum varian  
 Ischias va naturam ægri & morbi. Dolor iuncturæ coxæ, quæ a Græci  
 lentioribus dicitur ischias, & a barbaris sciatica, valentioribus indige  
 curatur. remediis propter huius iuncturæ magnitudinē, qualia sunt  
 pyrethrum, costum, nasturtium, sinapis, nitrum, stercus bu  
 bulum, ciconiæ, & leporis. Cataplasma ex his omnibus, ve  
 aliquibus cum oleo scorpionum, vulpino, & foliis lauri, ru  
 tæ, cyclamini, & squillæ est optimum, vel vnguentum. Ca  
 taplasma ex pice, sulphure admotum huic magnæ iuncturæ  
 antiquam ischiadem curat. Aliquando sunt necessaria maxi  
 mē attrahentia, & quæ vesicas efficiunt & adurunt, vt et  
 Vrtica. cataplasma ex foliis vrticæ bis in die loco dolēti admotū, po  
 lauetur locus decocto saluiæ, & roris marini cum aqua falsa  
 Cataplas- Cataplasma ex ruta viridi, & scordeon cum pinguedine  
 ma. porci, & aceto valet multum sua facultate in hoc morbo  
 Cucumer Maioris vis est cataplasma ex radice cucumeris syluestris ci  
 syluestris. pinguedine suilla, vel ex alio. Hoc etiam est optimum & ex  
 Aliud va- pertum: ℞. absynthij, radice ebuli, furfuris ana. p. j. stercori  
 lentius. colubini ℥. j. & β. salis cōmunis ℥. j. omnia in aceto decoquā  
 Canthari- tur, & fiat cataplasma, vel fiat ex sinapi, & ficis. Omnium qu  
 des. diximus est potissimum cataplasma ex cantharidibus & fer  
 mento, & staphisagria factum, a quo fiant vesicæ, quæ aper  
 tæ per dies aliquot conseruentur foliis brassicæ, vel ferment  
 Mel ana- to, & pinguedine porci. Cataplasma ex melle anacardonum  
 cardorum. est valens causticum in hoc probatum a quodam doctissimo  
 medico, fit hoc modo. Anacardi pisti infundantur in aceto  
 per septem dies, postea sensim, & igne paucō decoquantur  
 donec tertia pars consumatur. Post caloris absentiam, quoc  
 supernatat, collige, quia illud est mel anacardonum anti  
 Experitum quorum.  
 & potens Sapiētissimus quidam medicus multos suo tempore la  
 auxilium. borantes coxendico dolore curauit, & vnum affectum eo  
 per



er annos decem & octo caustico facto ex capitello vini cal-  
is, & aluminis, cuius crusta butyro, vel axungia porci non  
ilita est amouenda: deinde locus apertus a docto chirurgo  
st conseruandus falsa carne, vel ligno busti per sex menses,  
t possit materia per vlcus euacuari.

Aliqui medici satis eruditi igne actu aperiunt locum su- *Ignis.*  
ra iuncturam, primo, & secundo supra coxam, & tertio sub  
enu: semper tamen particularia auxilia sequantur vacua- *Admoni-*  
ones totius corporis: quamuis tutius esset, si sex digitos *tio.*  
infra iuncturam dolentem aperiretur locus igne, & apertus  
per aliquot menses conseruaretur. Sed si de his auxiliis o-  
mnibus pyroticis perfectam, & integram doctrinam accipe-  
re cupis, lege caput quintum libri tertij Iacobi Hollerij de *Hollerij.*  
materia chirurgica.

## De Arthritide. CAP. LXI.

## Scholium.

**A** Rthritis tunc fit. ) *Ut quæ in hoc scholio dicenda sunt,*  
recte intelligantur, supponere oportet. Primò articulum esse  
naturalem ossium compositionem, ad motum voluntarium *Quid arti-*  
factam. Secundò, in articulis cum caput vnus ossis, ingrediatur cavi- *culus.*  
tatem alterius, maximam esse in hac re varietatem, quia aliquando  
caput ossis magnum est, & cavitatis profunda vt in coxæ articulatione  
videmus: aliquando verò caput in superficiariam cavitatem recipitur,  
vt in articulationibus digitorum. Tertiò ex articulis, aliquos habere  
multas partes suprapositas, vt est supradictus coxæ articulus, qui ha-  
bet musculos tibiæ & femoris, membranam carnosam, cutem, nervos, &  
tendones, aliquos nudos esse, quales sunt illi, qui in manibus & pedi-  
bus sunt. His suppositis ad arthritim descendamus, quæ nomen assu-  
psit à symptomate, & loco affecto. Est enim dolor articulorum, non *Quid arti-*  
quolibet, sed factus à fluxione humoris. Cum diximus arthritim *thritis:*  
esse articulorum dolorem, intelligimus aut omnium, aut multorum.  
Quare si in vno articulo est dolor, etsi à fluxione humoris fiat, non  
arthritim, sed articuli dolorem appellamus: nisi in manu, pede, &  
ischio, vbi dolor hic proprio nomine dicitur chiragra, podagra, & is-  
chias. Arthritis est symptoma sensus tactus, actio scilicet eius de-  
prauata. Morbus, ad quem sequitur, est tumor præter naturam ar-  
ticulorum, distendens partes in eis contentas. Aduerte tamen hunc  
torem factum à fluxione humoris, esse distinctum à veris tumori-  
bus: non enim tumor continetur in poris partium similarium (nam  
sequeretur ad arthritim conuulsio nervo aut tendone distento) sed  
in cavitare articuli, aut iuxta articulum, à quo supra posita corpora,



quæ vim habent sentiendi, distenduntur, & ita dolent. Unde morbus hic erit referendus ad tumorem præter naturam, ut ex 6. aphor. com-  
 Causa pri- men. 49. colliges. Hic autem tumor fit à duabus causis. Prima est im-  
 ma arthri becillitas articuli, quæ in etsi à natura habeat, imbecillior tamen se-  
 tidis. pso reddi potest, aut in prima conformatione, cum à semine languido  
 formatur: & ideo aliquando arthritidis videtur morbus hæreditarius:  
 aut secundò, extra uterum, cum intemperiem aliquam validam con-  
 traxit. Secunda causa est fluxio humoris ad articulos. Fluxio duas  
 causa. habet causas. Una est plethora, siue sit ad vires, siue ad vasa: altera est  
 Iacotius cachochymia: ab his enim solet natura aggrauari & irritari. Neque  
 labitur. Iacotius rectè sentit, cum scribit, arthritim fieri sensim in articulo con-  
 gesto humore ob malam partis nutritionem: hæc enim non erit arthri-  
 tis, cum neque à sanguine, neque ab alio humore naturali fiat. Hu-  
 mor enim, qui sensim coaceruatur, sensim etiam mutat naturam, ut in  
 atheromate & meliceride videmus. Neque in morbo gallico fit ar-  
 thritis ex congestione sine tumore, ut voluit Rondoletius. Quia si hu-  
 mor in articulo inclusus non facit tumorem, neque distentionem effi-  
 ciet, ac proinde non erit arthritidis, in qua ob distentionem excitatur do-  
 lor in articulo. Dices, in arthritide cuius partis distentio excitat do-  
 lorem? Rondoletius respondet, ligamentum esse duplex, unum quod ab  
 osse ortum habet, & hoc non sentire, alterum à periostio, & hoc sen-  
 sum habere, & ideo huius ligamenti distentionem in arthritide dolo-  
 ris esse causam. Decipitur tamen, quia ligamentum ex periostio or-  
 tum in nulla corporis parte reperitur. Verum quidem est, aliquando  
 tendonem vicem habere ligamenti, ut in lato tendone in genu ap-  
 paret.

Quæ pars Dicendum ergo est supra articulos transire nervos & tendones  
 doleat in musculorum, qui dolent à tumore distenti, ut constat ex 6. aphor. com.  
 arthritide. 49. hæc enim partes acutè sentiunt, nervus, quia defert vim sentien-  
 A melan- di, tendo verò, quia fit ex fibris nervorum. Humorem facientem arthri-  
 cholia ra- tim ex multis cognoscet, ex natura ægri, ex colore articuli, doloris sen-  
 rò fit ar- su, iuvantibus & nocentibus. Arthritidis à melancholia raro fit, & i-  
 thritis. deo non describimus eius notas, ut in plurimum tamen fit à pituita,  
 quia articuli pituitoso sanguine nutriuntur, quæ etsi non fluat, & do-  
 lorem non efficiat sua frigiditate sensum auferens articuli, tamen  
 mixtam cum sanguine aut bile fluere ad articulos experimur, frigi-  
 ditatèque eius retusa tensione dolorem efficere. Cognoscemus arthriti-  
 Quibus signis ar- dem ortum habere ex pituita ex natura pituitosa, colore articuli albi-  
 thritidis cante, dolore obtuso & persuerante, & quòd lædatur à frigidis, &  
 causæ co- quòd talem habuerit victus rationem qua multam pituitam genera-  
 gnoscatur. rit, & ultimò quia singulis diebus habet accessionem. Cognoscemus ar-  
 thritim fieri ex sanguine, ex natura ægri, si sanguinea sit, ex rubore  
 articuli simul cum gravi dolore, addo simul, quia signum ex rubore  
 artic



articuli in principio arthritidis non habet magnam vim: ex antea cō-  
 ita, si multum sanguinem generauit. Si arthritidis fiat ex bile, cogno-  
 scetur ex natura agri biliosa, ex colore articuli ad flauum tendente,  
 ex dolore acuto rei pungenti simili, præcessit ratio victus bilem gene-  
 rans, & exacerbationes doloris fiunt de tertio in tertium. Arthritidis  
 quo plures afficiet articulos, aut maiores, maiorem arguet causam,  
 quò pauciores, minorem.

Dolor iuncturarum à causa calida.) Etiam si à bilioso humore  
 oriatur arthritidis, non tamen solus est, sed permixtus cum pituita, &  
 idèò vide, ne nimius sis in frigidis alimentis.

Secundò, phlebotomia.) In dolore Arthritico semper secanda In arthri-  
 est vena, idque non semel, nec bis solum, sed aliquando ter, quater, & tunc sem-  
 decies, & amplius, si opus fuerit, inspecto virium robore, quod consen- per san-  
 tit: & fluxione quæ est affectus postulans euacuationem omnium guis mit-  
 humorum, quoniam hi fluunt ad locum tumore affectum, ac proinde tendus.  
 reuellendi sunt. Ex loco autem affecto collige vtendi modum in san- Locus affe-  
 guinis missione. Si enim omnes articuli afficiantur, secabis basilicam Etus locum  
 dextram, aut sinistram. Si articuli dextri brachii affecti sint, ex sini- sanguinis  
 stro euacuabis, & contrà. Si sit podagra dextri pedis, seca venam bra- mittendi  
 chii dextri, aut pedis sinistri, quia hæ partes eandem habent vasorum demōstrat.  
 rectitudinem cum loco affecto. Si dolor sit in coxendice, distinguendum  
 est: nam in principio, quia scopus reuulsionis magis vrget, ex brachio  
 eodem secabimus venam, aut ex altero crure, potissimum in mulieri-  
 bus, in quibus suppressi sunt menses: tunc enim reuellemus, & eua-  
 cuabimus ex parte, magis tamen reuellemus. Quòd si in principio, ex  
 eodem pede venam secare ausi fuerimus, magis attrahemus humore, (deorsum  
 impetum habentem) ad partem affectam. Facta reuulsione victus  
 quando iam humor ex parte euacuandus est, quod indicat affectus fa-  
 qualis. Etus, tum ex eodem pede secanda est vena.

Tertiò, remittentibus sanguinis feruorem.) Non est quod  
 his frigidis & adstringentibus vtaris, quia hæc neque fluxionem si-  
 stent, & causam arthritidis augebunt, quoniam plures humores cru- Purgatiua,  
 dos generabunt, qui semper solent esse arthritidis causa.

Quartò, euacuantibus bilem.) Non est euacuanda sola bilis,  
 sed opus est permiscere Agaricum, aut diaphænicum ob pituitam.

Quintò, Anodynus.) Dolor aliquando vrget, quando scilicet  
 deicit vires, aut auget affectum, & tunc trahit ad se curationem 12.  
 metho. cap. 1. Quòd si aliquando Gal. dicit symptoma indicare curatio-  
 nem, cum affectui officit: per affectum tunc non morbum, sed sanita- Quando  
 tem intelligit, quæ continetur etiam in genere affectus, vt patet ex anodinis  
 Galen. 1. de diff. morb. Si ergo in arthritide ex dolore sequatur noxa vtendum,  
 in viribus, eum sedabimus anodinis medicamentis, quæ nec multum  
 & alida sunt, quoniam hæc reddunt humorem coctum difficilem. Vteris



# DE CVRAND. MORB.

ergo cataplasmate ex lacte cum croco & pane constructo, aut ex fure & sapa addito rosaceo, aut oleo de lateribus, aut alio tenuium partium quod r. m. sternat anodyna facultati. Quod si vehementissimis sit dolor, solent medici ad philonium persicum, & alia narcotica, quæ anodyna improprie dicuntur, descendere. Existimo autem ego melius esse abstinere ab his, quia si ingentissimus est dolor, signum est fieri a sanguine bilioso, is autem, cum tenuis sit, citò feretur ad cutem, tendones & nervos sine tensione relinquens. At opium & alia narcotica bilem impingendo, & impediendo eius motum ad externa longiorem dolorem efficient, etsi ad tempus ipsum sedent.

Arthritis a causa frigida.) Etsi pituita sit arthritidis causa, semper tamen cum ea permixta est aliqua portio humoris biliosi, ut supra docuimus. Hoc loco autor exhibet alimenta aliquantum adstringentia, alii non solum alimenta adstringentia perscribunt, sed cum medicamentis attenuantibus adstringentia miscent, ne attenuantia humorem ducant ad locum affectum, qui videntur ignorare occasionem exhibendi attenuantia, nam non est utendum eis, nisi sedata fluxione.

Purgans Tertiò, euacuantibus pituitam.) Cum medicamentis pituitam purgantibus misce quæ euacuent bilem hoc modo: ℞. Syrupi rosarum Alexandrinarum ex nouem infusionibus. ℥. iiii. Electuarii de succo rosarum, & diaphaniconis an. ℥. iiii. cum decocto communi fiat potio. Possumus purgare pilulis de fumo terræ, aggregatiuis, & artheticis: neque in hoc affectu sufficit semel purgare, & sic per intervalla possumus purgare pilulis, aut confectione aliqua, aut sumentes ℥. ss. terebentine prout purgauerit aucta aut diminuta quantitate.

Curatio ar Quintò dissipantibus.) Cum arthritis ad tumorem præter naturam referatur, eadem ratione curabitur, qua tumor in principio, & qualis tentes repellentibus medicamentis, quod potissimum præstabimus in morâ præ-arthritis a bilioso humore facta perfundentes articulum aqua frigida s. aphor. sen. 25. ubi Gal. in commentario duplici nomine aquam dolorem sedare scribit. Primò quia doloris causam remouet repellendo. Secundò, quia sua frigiditate sensum torpidum efficit, quod idem scribit Galenus decimo de comp. secundum locos.

Neque existimes in In ischia- arthritis semper repellendum esse, quia si dolor sit in ischiade, non li- de cur non cet repellentibus uti, quia cum hic articulus tegatur a multis muscu- utendum lis, repellentium medicamentorum vis ad articulum non perueniet, & repelli- augebimus affectum, quia ex venis per partes suprapositas dissemina- bus. tis repellimus humorem ad articulum. Neque utendum est repellen-

In critica ribus in arthritis critica, quia in febre melius est humorem ad arti- arthritis, culum fluere, quam ad partem principem. Neque repellendum est cum & in ea in ex parte principe sit fluxio, nisi fiat ad partem, quæ habeat insignem quæ partem sum, qualis est oculus, tunc enim repellentibus utemur: quod non fa- princeps ciemus, si fluxit humor ad articulos, quia magnum incommodum est ferri hum



humores ad partem principem. At si ex venis ad articulos fluat humor, humorem  
 facta reuulsione repellentibus utemur, nullum enim sequetur incom- transmi-  
 odum, imò humor ad venas repulsus concoquetur. Hoc loco Galenus tit, ne re-  
 bi videtur contrarius, quia vt diximus ex IO. de comp. secundum lo- pellas.  
 is, & 5. aph. in arthritide repellere licet: at libro secundo de hominis  
 natura commentario II. in fine contrarium videtur sentire. Iam (in-  
 uit) non raro cum in morbo articulari & podagra artus humores pe- Galenus  
 erent, & illinc repulsi in principem aliquam partem inuasissent, ab iniuria  
 morte conspeximus hominem affectum esse, vnâque restare spem sa- vindica-  
 utis, si ad artus retrahere eos valeamus: Hæc Galenus. Vbi videtur tur.  
 sentire ex articulis non esse repellendos humores. Respondeo repellere  
 & corroborare esse res distinctas: corroboramus enim in sanitate,  
 robur addentes parti, ne recipiat: repellimus verò in morbis hu-  
 morem fluentem ad partem, & eum, qui iam fluxit. Iam nobis non  
 licet articulos roborare, ne recipiant, quoniam sunt partes langui-  
 dæ, ad quas melius est humorem fluere, quàm ad aliquâ, quæ necessa-  
 ria est: possumus tamen repellere ex articulis facta prius reuul-  
 sione, eo modo quo supra diximus, quod idem in cute etiam  
 effcimus. Ex his facile liberatur Galenus à contra-  
 dictione, quia in libro de hominis natura de re-  
 pulsione, quæ medicamentis robo-  
 rantibus articulus fit,  
 loquitur.

FINIS PRIMI LIBRI.

Y 4





PETRI PAVLI PEREDÆ

SETABENSIS,

Doctoris Medici: & apud Valentinus  
publici medicinæ professoris, in ij.

lib. Michaëlis Ioan. Paschalij

de curatione Febrium,

Scholia.

*De Febre sanguinea, seu continentia, quam syno-  
chum cum putredine appellant.*

CAPVT I.

Definitio.

Diuisio.



Ynochos Græcis continens Latini-  
nis, est febris, in qua vna accessio ab  
initio ad finem perpetuò manens in  
multos dies porrigitur. Hæc duplex  
est, altera sine putredine, quæ simi-  
lis est diariæ, de qua in præsentia  
non agimus, cum rarò medicus ad  
curandas diarias vocetur: quomodo  
autem solus sanguis non putris fe-  
brim efficere possit, quando calidus, & humidus existens  
putredini magis expositus videtur, non est hoc loco & tem-  
pore explicandum. Altera est synochus cum putredine,  
de qua nunc agimus, cuius tres sunt differentiæ. Nam quæ-  
dam à principio ad finem æquali magnitudine perdurant,  
has Græci omotonas vocant, in eodem vigore permanen-  
tes: alia enim tria tempora occulta sunt: quædam verò sem-  
per augentur, eas Græci acmasticas, id est, incrementū su-  
scipientes, aut inualescentes nominant, principium, vigor,  
& declinatio in his occulta sunt, quemadmodum in vlti-  
mis tria tempora priora. Aliæ paulatim diminuuntur, & de-  
cresc



rescunt, paracmafticas, hoc est decrefccentes appellant: de  
 s fufius Galen. 9. method. & lib. 2. de differentiis febrium,  
 p. 2. lib. 2. de crifibus cap. 7. agit. Quare fallitur Auicennas, *Error A-*  
 credens Galenum negaffe dari febrem fanguineam putri- *uicennæ.*  
 tum, Fit fynochus ex putredine ciborum multorum, & fan- *Caufa.*

ineorum, multa exercitatione, præfertim a cibo & vere,  
 iuvene carnofo: otium immodicum auget fanguinem, &  
 umores omnes, a quibus in vafis maximis potiffimum (quæ  
 circa alas & inguina exiftunt) putrefcentibus fynochus hæc  
 eri folet, præcipue fi obftructiones adfint, quas Venus gi-  
 nit a cibo, & ebrietas. Signa huius febris ponuntur a Ga- *Nota.*  
 leno 9. methodi, quæ multa funt, rubor fcilicet faciei ma-  
 gnus, & totius corporis fomnus immodicus, calor magnus,  
 qui acrior eft eo, qui fequitur fynochum fine putredine, mi-  
 nus tamen mordax, quam in ardenti. Pulsus iis maximus, ve-  
 memens, celer, creber, & inæqualis, tamen fi cum aliis febri-  
 bus putridis comparetur: Vrina rubra & craffa.

Curatur hæc fex remediorum generibus. Primò, victu fri *Curatio.*  
 gido & humido, minus tamen humido, quam biliofæ febres,  
 tenui, vt fucco malorum granatorum, cremore hordei, la- *Victus.*

te amygdalarum dulcium, cichorea, lactuca cocta, fi ventri-  
 culus eft imbecillus, vel cruda cum aceto & faccharo, fi eft  
 validus, carne cydoniorum faccharo condita, radice buglof-  
 e faccharo condita, pyris, & malis cotoneis aflatis, pane lo-  
 to. Si facultas fit imbecilla, vel poft fanguinis miffionem, &  
 alias vacuationes, nutriatur iure, & carne pulli gallinacei  
 refrigeratis agreffa, acetofa, hordeo decorticato, femper ta-  
 men confideranda eft natura agri, ætas, regio, confuetudo,  
 ætatis annus, & anni tempus in quantitate, qualitate, & numero cibi fu-  
 mendi, vt Hippocrates docet 17. aphorifmo primi libri. Po-  
 tus fit aqua hordei, & in declinatione vinum album bene di-  
 lutum, præfertim fi ventriculus fuerit imbecillus.

Secundo, fecta basilica dextra, & miffo fanguine vfque ad *Sectio ve-*  
 nini deliquium, fi vires adfint: ego femper noftris tempo- *næ.*  
 ribus extraho fanguinem non femel, fed bis aut ter, & quan- *Obferua-*  
 toque quæter vno, vel duobus diebus: numerus tamen die- *tio.*  
 um non eft femper infpiciendus. In hac tamen febre a prin-  
 cipio oportet mittere fanguinem, ita tamen vt refpondeat  
 lenitudini, & robori virium. Ante tamen fanguinis miffio-  
 nem fi non times fubitam fuffocationem, & femel in ipfo  
 quoque febris die hoc aut fimili clyftere alius lenienda eft, *Clyfter.*  
 & inteltina purganda: ℥. foliorum maluarum, violarum, &  
 mercurialis an. m. j. furfuris, & hordei fine cortice, an. p. j. fiat  
 decoct



# DE CVRAND. MORB.

decoctum, de quo percolato accipe lb. j. & ʒ. iij. cui adde cassiæ fistulæ præparatæ, & diacatholiconis. an. ʒ. ij. misce, & fiat clyster.

*Potus aquæ frigida.* Tertiò, potu magno aquæ frigida, qui Galeno autore method. post sanguinis missionem in hac febre maximum est præsidium, nisi quæ illum impedian, æger habeat, vt sunt tumor, partis principis obstructio, magna inflammatio, & imbecillitas alicuius visceris, defectus caloris innati, & natura contraria potui aquæ frigida: solet enim potus multus aquæ frigida hanc febrem præsertim non putrem & putrem quoque post sanguinis missionem, & humoris bilioconcoctionem curare sudore, vel ventris profluuiio, vel alio modo quando febrem hanc & ardētem in pituitosam mutare: quod autem modo id fiat, non est præsentis instituti, nec sanguinis nec bilis possunt in pituitam verti, cum coctum non possit fieri crudum.

*Impedientia potum aquæ frigida.* Tertiò, concoquentibus, refrigerantibus, & bilis, quæ fiunt ex sanguine tenuiori, acrimoniam reuertentibus, vt syrapius granatorum, acetosæ. S. violarum, rosarum, & endiuia S. & comp. & similia cum aquis, vel decocto duplo endiuia, cichoreæ, acetosæ, scariolæ, & similia sumptis per duos vel tres dies.

*Concoctio.* Quintò, vacuantibus bilem, vt cassia fistulari, tamarindis, rhabarbaro, myrobalanis citrinis, manna, diaprunis solut. & electuario de succo rosarum. vt ʒ. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. ss. infusionis rhabarbari in aqua endiuia per noctem factæ ʒ. j. squinanti ʒ. iij. diaprunis solut. ʒ. iij. syrapi violarum ʒ. j. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus: vel si est diuresis, ʒ. mannæ electæ ʒ. j. ss. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia, deinde eiecta substantia ʒ. iij. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus. Si tamen abhorret liquida medicamenta purgantia: ʒ. pilularum de rhabarbaro ʒ. j. cum aqua cichoreæ fiant pilulæ septem, & aurentur. Sed ego in hac, & in aliis biliosis, non laudo pilulas: quia præterquam quod omne medicamentum purgans (autore Galeno comm. 24. primi aphoris.) per se calfacit vehementer, forma pilularum magis calfaciet propter siccitatem coniunctam, quæ simul cum caliditate non potest minui, quemadmodum in mixta cum syrupo, & decocto, & cassia, & tamarindis in potibus fieri solet. Quare post potionem magis laudo bolos, seu bucellas: vt ʒ. rhabarbari electi puluerizati, & pauca aqua endiuia madefacti ʒ. vj. faciantur.

*Purgatio.* Quintò, vacuantibus bilem, vt cassia fistulari, tamarindis, rhabarbaro, myrobalanis citrinis, manna, diaprunis solut. & electuario de succo rosarum. vt ʒ. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. ss. infusionis rhabarbari in aqua endiuia per noctem factæ ʒ. j. squinanti ʒ. iij. diaprunis solut. ʒ. iij. syrapi violarum ʒ. j. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus: vel si est diuresis, ʒ. mannæ electæ ʒ. j. ss. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia, deinde eiecta substantia ʒ. iij. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus. Si tamen abhorret liquida medicamenta purgantia: ʒ. pilularum de rhabarbaro ʒ. j. cum aqua cichoreæ fiant pilulæ septem, & aurentur. Sed ego in hac, & in aliis biliosis, non laudo pilulas: quia præterquam quod omne medicamentum purgans (autore Galeno comm. 24. primi aphoris.) per se calfacit vehementer, forma pilularum magis calfaciet propter siccitatem coniunctam, quæ simul cum caliditate non potest minui, quemadmodum in mixta cum syrupo, & decocto, & cassia, & tamarindis in potibus fieri solet. Quare post potionem magis laudo bolos, seu bucellas: vt ʒ. rhabarbari electi puluerizati, & pauca aqua endiuia madefacti ʒ. vj. faciantur.

*Purgatio.* Quintò, vacuantibus bilem, vt cassia fistulari, tamarindis, rhabarbaro, myrobalanis citrinis, manna, diaprunis solut. & electuario de succo rosarum. vt ʒ. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. ss. infusionis rhabarbari in aqua endiuia per noctem factæ ʒ. j. squinanti ʒ. iij. diaprunis solut. ʒ. iij. syrapi violarum ʒ. j. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus: vel si est diuresis, ʒ. mannæ electæ ʒ. j. ss. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia, deinde eiecta substantia ʒ. iij. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus. Si tamen abhorret liquida medicamenta purgantia: ʒ. pilularum de rhabarbaro ʒ. j. cum aqua cichoreæ fiant pilulæ septem, & aurentur. Sed ego in hac, & in aliis biliosis, non laudo pilulas: quia præterquam quod omne medicamentum purgans (autore Galeno comm. 24. primi aphoris.) per se calfacit vehementer, forma pilularum magis calfaciet propter siccitatem coniunctam, quæ simul cum caliditate non potest minui, quemadmodum in mixta cum syrupo, & decocto, & cassia, & tamarindis in potibus fieri solet. Quare post potionem magis laudo bolos, seu bucellas: vt ʒ. rhabarbari electi puluerizati, & pauca aqua endiuia madefacti ʒ. vj. faciantur.

*Præscriptio diuini accommo-* data. ʒ. mannæ electæ ʒ. j. ss. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia, deinde eiecta substantia ʒ. iij. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus. Si tamen abhorret liquida medicamenta purgantia: ʒ. pilularum de rhabarbaro ʒ. j. cum aqua cichoreæ fiant pilulæ septem, & aurentur. Sed ego in hac, & in aliis biliosis, non laudo pilulas: quia præterquam quod omne medicamentum purgans (autore Galeno comm. 24. primi aphoris.) per se calfacit vehementer, forma pilularum magis calfaciet propter siccitatem coniunctam, quæ simul cum caliditate non potest minui, quemadmodum in mixta cum syrupo, & decocto, & cassia, & tamarindis in potibus fieri solet. Quare post potionem magis laudo bolos, seu bucellas: vt ʒ. rhabarbari electi puluerizati, & pauca aqua endiuia madefacti ʒ. vj. faciantur.

*Pilule.* horret liquida medicamenta purgantia: ʒ. pilularum de rhabarbaro ʒ. j. cum aqua cichoreæ fiant pilulæ septem, & aurentur. Sed ego in hac, & in aliis biliosis, non laudo pilulas: quia præterquam quod omne medicamentum purgans (autore Galeno comm. 24. primi aphoris.) per se calfacit vehementer, forma pilularum magis calfaciet propter siccitatem coniunctam, quæ simul cum caliditate non potest minui, quemadmodum in mixta cum syrupo, & decocto, & cassia, & tamarindis in potibus fieri solet. Quare post potionem magis laudo bolos, seu bucellas: vt ʒ. rhabarbari electi puluerizati, & pauca aqua endiuia madefacti ʒ. vj. faciantur.

*Ufus pilularum dam-* natur in morbis biliosis. horret liquida medicamenta purgantia: ʒ. pilularum de rhabarbaro ʒ. j. cum aqua cichoreæ fiant pilulæ septem, & aurentur. Sed ego in hac, & in aliis biliosis, non laudo pilulas: quia præterquam quod omne medicamentum purgans (autore Galeno comm. 24. primi aphoris.) per se calfacit vehementer, forma pilularum magis calfaciet propter siccitatem coniunctam, quæ simul cum caliditate non potest minui, quemadmodum in mixta cum syrupo, & decocto, & cassia, & tamarindis in potibus fieri solet. Quare post potionem magis laudo bolos, seu bucellas: vt ʒ. rhabarbari electi puluerizati, & pauca aqua endiuia madefacti ʒ. vj. faciantur.

*Boli laudantur.* horret liquida medicamenta purgantia: ʒ. pilularum de rhabarbaro ʒ. j. cum aqua cichoreæ fiant pilulæ septem, & aurentur. Sed ego in hac, & in aliis biliosis, non laudo pilulas: quia præterquam quod omne medicamentum purgans (autore Galeno comm. 24. primi aphoris.) per se calfacit vehementer, forma pilularum magis calfaciet propter siccitatem coniunctam, quæ simul cum caliditate non potest minui, quemadmodum in mixta cum syrupo, & decocto, & cassia, & tamarindis in potibus fieri solet. Quare post potionem magis laudo bolos, seu bucellas: vt ʒ. rhabarbari electi puluerizati, & pauca aqua endiuia madefacti ʒ. vj. faciantur.



ari. q. s. misce, & fiant boli quinque vel septem: & ideo in  
s, & biliosis febribus medicamenta purgantia valenter, &  
salubria etiam castigata nocent, vt est scammonium, co- *Quæ no-*  
cynthis, helleborus, & similia: solebat dicere eruditissimus *ceant.*  
ornamira, medicos eis in his febribus videntes non esse cu- *Dictum*  
tores, sed interfectores. *Tornami-*

Sexto, refrigerantibus, & corroborantibus cor, iecur, & *ra.*  
totum corpus internis & externis, vt electuario diatrium *Alteratio*  
santalorum, diarhodonis Abbatis, diamargaritonis frigidi, *et corrobo-*  
conserua rosarum, conserua violarum: vel hoc electuario: *ratio.*

℞. pulueris diatrium santalorum ʒ. iij. pulueris diamargari-  
tonis frigidi ʒ. j. conseruæ acetosæ ʒ. iij. sacchari dissoluti in  
qua rosarum q. s. misce, & fiat electuarium in tabellis pon- *Sumenda*  
ere ʒ. iij. Dosis quolibet mane ʒ. iij. cum ʒ. iij. aquæ cicho- *electuarii*  
eæ, vel acetosæ, vel endiuæ, vel decocti hordei sine cortice, *cum aquis.*  
vel cum vino albo bene aqua diluto. Cordi sæpe admouea- *Admonē-*  
ur hoc epithema tepidum, vel actu frigidum in ætate, & *da cordi.*

egro iuvene: ℞. aquæ rosarum ʒ. iij. aquæ acetosæ, & bu-  
glossæ. an. ʒ. iij. aquæ melissæ ʒ. iij. pulueris diamargaritonis  
frigidi, & trochiscorum de camphora. an. ʒ. j. misce, & fiat e-  
pithema cordi admouendum omni tempore ante & post va-  
cuationes, quia cor non potest obstructione affici. Hoc vn- *Epithemæ*  
guentum bis admoueat cordi, quod in omnibus febribus *Unguenti*  
biliosis, & pestilentibus est optimum, eoque Carperani me- *biliosis, &*  
dici vtuntur, & est Gainerij: ℞. olei nenupharis ʒ. iij. pulue- *pestilenti-*  
ris nenupharis ʒ. iij. santalorum rubrorum, seminis acetosæ, *bus febr-*  
coralli rubri præparati. an. ʒ. j. margaritarum electarum, of- *bris.*

sis ex corde cerui. an. ʒ. s. camphoræ. ʒ. iij. misce, & fiat vn-  
guentum. Hepati bis in die ventriculo vacuo admoueat *Hepatie-*  
vnguentum santalatum, vel cerotum santalatum & hoc e- *pithema.*  
pithema tepidum: ℞. aquæ endiuæ, & cichoreæ, an. ʒ. iij. a-  
quæ rosarum, & absinthij, an. ʒ. iij. santalorum rubrorum ʒ.  
iij. spodij ʒ. j. aceti rosati cochlearium vnum, misce, & fiat e-  
pithema. Balneum aquæ tepidæ in hoc genere auxiliorum *Balneum*  
est optimum huic, & aliis febribus, præsertim hæcticæ, vt di-  
cemus capite octauo huius libri. Totum enim corpus refri-  
gerat, & reliquias materiæ resoluit.

## De febre Diaria, & Synocho.

### CAPVT I.

#### Scholium.

Synoch



Quid fe-  
bris.

**S**Ynochos Græcis, continēs Latinis.) Febris est inten-  
peries calida, in toto corpore, aut saltem pluribus, aut pra-  
cipuis partibus existens, & actionem lādens. In hac defi-  
nitione, intemperies est genus, quo communicat febris cum aliis intem-  
periebus. Reliqua, quæ in definitione continentur, differentię sunt. Cū  
dicimus hanc intemperiem esse calidam, separamus eam ab aliis tri-  
bus intemperiebus frigida, sicca & humida, cū eam collocamus i  
toto corpore, separamus febrem ab intemperie calida vnius partis. Vlti-  
mò definitionis membro, febris distinguitur ab aliis intemperiebus  
quæ includuntur intra limites sanitatis. Singulæ partes istius defini-  
tionis breuiter explicandæ veniunt. In primis febris est intemperies ca-  
lida, vt Gal. lib. de causis morborum, & 6. aph. com. 16. & aliis locis

An febris docet. Qua in re videtur contrarius sibi, & Hippocrati. Sibi contra-  
fit intempe- rius est, quia 2. acutorum com. 24. calorem febrilem siccum, et 1. aph-  
ries sicca. com. 16. febrem passionem calidam siccam nominat. Vnde febris non  
in solo calore, sed simul cum siccitate consistet. Hippocrati contraria-  
tur, quia hic supradicto aphorismo victum humidum febricitanti-  
Controuer- bus consulit, sentiens febrem esse affectum siccum. Respondeo febrem  
sia solutio. solum esse positum in calore præter naturam, neque coniunctam ha-  
bere siccitatem. Quod vltimum confirmat Vallesius, quia si aliquis  
vtatur victu humido, ita vt factus sit humidior quàm pro natura,  
& febricitet, tunc febris sine siccitate erit. Non tamen est, quod his  
& similibus vtamur argumentis, cū facillimū habeamus, & quod  
multum vrget. Argumentum huiusmodi est, si febris essentia in siccita-  
tate etiam est posita, ergo omnis febris coniunctum habebit maras-  
mum, sed hoc est falsum, ergo & primum. Maior nota est, quia ma-  
rasmus nihil aliud est, quàm intemperies sicca morbofa totius. Assum-  
ptionem falsam esse, experientia docet. Ad argumenta facile erit sa-  
tisfacere. Ad Gal. qui febrem appellat passionem siccam, & calorem  
siccum: Respondeo, in febre semper esse siccitatem, quia immoderata  
caliditas ex accidenti consumendo humidum eam sibi adsciscit, hæc  
tamen non est morbofa, sicut neque ea quæ est in homine bilioso. Quid  
Vallesius ad Hippocratem? Vallesius sentit Hippocratem in febribus victum  
taxatur. humidum imperare, præcautionis gratia: Quod nobis non placet, quia  
in febribus solent phrenitis, lethargus, & alia symptomata frequen-  
Cur Hipp. ter euenire, quæ à nobis non præuidentur, quia nō contingunt neces-  
febricitā- sario: cur ergo marasimum, qui rarissimè in febribus euenit, præcaue-  
ribus impe- bit Hippocrates? Dicendum ergo est Hippocr. victum humidum impe-  
rar victu rare febricitantibus, propter calorem, quia humiditas eum obtundit,  
humidum. sicut siccitas acuit. Secundo febrem dicimus esse in toto corpore, quia  
Febris in quum intemperies calida sit in corde, quod fons est caloris, & à quo  
toto corpo- calidum partium fouetur, non est mirum, si affecto principio omnes  
re. partes afficiantur. Hoc autem intelligendum est, si nihil impediatur,  
quod



od propter typhiam & epialam dicimus. Hoc considerans Gal. 6. e-  
 .part. 1. com. 29. in febribus calorem in toto corpore, aut saltem præ-  
 nis, aut pluribus partibus collocat. Ultima definitionis pars calorem  
 rilem morbosum & præter naturam esse demonstrat. Huius enim Calor fe-  
 oris proprium est omnia corrumpere, & naturalium actionum or-  
 brilis mor-  
 em perturbare. Vbi per actiones naturales, eas quæ secundum na-  
 bosus.  
 am sunt, intelligimus, quæ animales et naturales comprehendunt, Quæ actio  
 tamē, ut in febribus actiones naturales potissimum lædantur, & inter nes lædan-  
 illa, quæ cōcoctrix appellatur. Dices, nōne in febribus saltem dia-  
 tur in fe-  
 s, imaginatio, ratio, & memoria sæpe illesæ seruantur? Respondeo bribus.  
 nper lædi, quia non ita rectē, neque tanto tēpore exercentur actiones  
 edictæ, ac in sanitate. Neque hoc mirandum est, quia in febribus Obiectio.  
 trumentum commune læsum est, nempe calidum innatum. Tum e-  
 m, quia febris morbus est omnium partium.

## Differētiæ

His positis, differentie febrium tradendæ sunt: quarum quædam febrium.  
 nt essentielles, quædam accidentales. Essentiales illæ sunt, quæ ex es-  
 Essentiales  
 tia febris (qui calor est) desumuntur. Quæ tres sunt: Prima desu-  
 febrium  
 itur ex qualitate caloris: Secunda ex motu: & tertia ex eius subie-  
 differētiæ  
 . Ex qualitate caloris, febres appellantur magnæ, aut parvæ: siue tres.  
 opriè loquentes intensæ, & remissæ. De his loquitur Hipp. 6. epyd. Prima.  
 nt. 29. cum scribit febres quasdam esse statim ardentes, & quasdam Secunda.  
 biles. Ex motu pendent illæ febres, quas Hip. eodem loco, primò mi-  
 Tertia.  
 s, deinde incrementales, & alias è conuerso statuit. Ex materia diuidi-  
 Ex quali-  
 r febris, in diariam, putridam, & hecticam. Diaria dicitur illa, in tate caloris  
 ta calor factus est in spiritibus. Putrida, in qua in humoribus, ita differentie  
 ex eorum putredine ortus sit. Hæctica verò in qua in partibus soli-  
 ex motu.  
 s (hoc est quæ consistentiam habent) calor factus est, at in humoribus Differ. ex  
 r spiritibus inferi. Differentie febrium ex qualitate & motu calo-  
 materia.  
 s desumptæ à materia pendent, quia calor in materia sicca intensus Diaria.  
 oparet, at in humida remissus: in materia tenui celeriter mouetur, in Putrida.  
 assa tardè. Et ideo has omittimus differentias, & eas, quæ ex mate-  
 Hæctica.  
 a sumuntur, appellamus essentielles, quia variam postulant curatio-  
 Omnes fe-  
 em, & cum finis sit ratio formalis artis, variam finem istius partis brium dif-  
 ratiuæ in medicina, qui est curare morbos. Differentie febrium, quæ ferentiæ re-  
 accidentales appellari solent, sumuntur ex accidenti proximo, aut re-  
 uocantur  
 toto. Ex accidenti proximo, cum ex colore febrem diuidimus, quia ta-  
 ad differē.  
 s in cute efflorescit color, qualis est humor, qui redundat. Hac ratione ex mater.  
 Hippocr. supradicto loco, 6. epyd. febris prærubra, præpallida, & liui-  
 cur differ.  
 æ meminit, ubi in rubris & pallidis utimur dictione præ, quia illi co-  
 ex mat. di-  
 res, nisi sint valde intensi, non sunt mali, contra quàm accadat in liui-  
 cūtur essen-  
 o colore, qui malus semper est, etsi non sit valde intensus. Ex acciden-  
 tiales.  
 remoto variæ etiam febrium differentie sumi solent: Quæ sunt, fe-  
 Differ. ac-  
 ris longa, & brevis, nocturna, & diurna: continua, & intermittens, cide-  
 tales.



*Differētiæ & aliæ similes.* Ex his omnibus febrium differentiis, eas, quæ ex acci-  
februm ex dēti ortū habent, omittimus, tum etiam quæ ex motu, & qualitate ca-  
accidenti- loris desumuntur, solūque disputare institui-  
remoto. febris, quæ à materia pendent, de putridis, scilicet & hec-  
capitibus, præsentī autē loco de diaria, de qua autor non disputauit  
agere nos institui-  
mus.

*Febris dia-* Febris diaria aut est exquisita, aut non exquisita. Febris diaria ex  
ria exqui- quisi- ta illa est, quæ ex calefactis spiritibus ortū habens, per spatium  
sita. vnus diei (hoc est vigintiquatuor horarum) perdurat, siue ortum ha-  
Non ex- beat à causa externa affectum in corpore relin-  
quisita dia quente affectū. Quod dico propter Menam & alios, qui eam febre  
ria. diariam, quæ ex causa externa, affectum aliquem in corpore relin-  
quente ortum habet, diariam minus exactam appellant. Non exqui-  
sita diaria est illa, quæ ex vaporibus ab humoribus calidis eleuatis fit.  
Quæ media est inter diariam, & putridam: Communicat enim cum  
diaria, quia non fit ex putredine humorum, neque ex caliditate facta  
in partibus solidis: cum putrida verò communicat, quia ex calefactis  
humoribus ortum habet. Ex his diariis, quædam appellantur Synochi  
non putres, in quibus feruet sanguis in vasis ab iræ exercitatione, aut  
alia causa, à cuius vaporibus cor calefit. De his febribus agi Gale-  
nus nono method. capite 1. & 2. Aliæ sunt diariæ ortæ ex leui obstru-  
ctione cutis, in his hominibus, in quibus acres sunt humores 9. meth.  
cap. 4. In eis enim calidi vapores eleuati cor calefaciunt, & inde fit fe-  
bris diaria. Hæ febres facile mutantur in putridas, aucta obstruc-  
tione, nisi præcautione vitamur, sanguinis missione reuellentur humores.

*An detur* Solent medici hoc in loco querere, An detur febris diaria ex putredi-  
diaria ex ne spiritus. Hæc controuersia ex hac altera pendit: An possint spiritus  
putredine putrefieri. Vallesius cōstanter affirmat spiritus posse putrefieri. Quod  
spirituum probat primò autoritate Aristotelis 4. lib. metheo. cap. 1. ubi scribit o-  
Vallesii mnia putrefieri præter ignem. At spiritus non est ignis, ergo putrescet.  
sententia. Secundò, aer potest putrefieri, ergo & spiritus. Antecedens experien-  
Pri. Val- tia docet, in pestilenti constitutione. Consequentiam probat ex Galeno,  
lesii. qui in libro, An sang. in art. contineatur, spiritum esse aere crassiorem  
scribit, ac proinde oculis videri. Quod autem crassior sit, ostendit, quia  
Propria fit concoctione ex ipso aere, at coctio incrassat. Ego tamen constantis-  
sententia sinè assero, spiritum non posse putrefieri. Quod cōfirmo ex natura rei,  
cōtra Val quia ad putredinem obstructio requiritur, quam nunquam faciet spi-  
lesium. ritus, tenuissimus cum sit, & facile diffletur. Quod consideras Gal. 1.  
de diff. feb. cap. 7. febrem diariam exemplo lapidum, & aliorum, quæ  
alterari possunt, & non putrefieri, demonstrant. Præterea, ad putre-  
dinem requiritur quies, quam spiritus nō habet. Adde materiam pu-  
tredinis esse humiditatem excrementitiā, quæ in spiritibus non repe-  
Solutio ritur, cum ad igneam accedant naturam. Rationes Vallesii nil conclu-  
dunt.



ant. Prima enim ostendit, ipsum non recte aduertisse ea, quæ docet primæ ra-  
 Aristot. 4. metheo. cap. 1. Eo enim in loco non sentit omnia alia corpo- tionis Val  
 ab igne putrescere: non enim ignorat Arist. ferrum, lapidem, elemen- lesi.  
 um terreum, quod summè siccum est, non putrescere, sicut nec alia si-  
 ilia corpora, quæ multum sicca sunt. Non ergo erit hæc bona con-  
 sequentia, ex Aristotele omnia putrescere possunt præter ignem, ergo  
 ritus putrescent. Ad Aristotelem ex serie contextus respondendum  
 est, in eo enim cap. 1. agit de generatione, quam dicit fieri à calido &  
 rigido, quia calidum frigido temperatū (quod est calidum innatum)  
 generationem efficit, permiscendo humidum cum sicco. Et ita igneum  
 elementum est agens, quod permiscet, at alia elementa sunt materia  
 ignis, quia cum miscentur, ab eo patiuntur: & ideo possunt putresce-  
 re, cum ignis victus non potest gubernare mixtionem, cum autem vin-  
 cit, non fit putredo: unde ignis non potest putrescere, quia est agens,  
 bene alia, quæ sunt materia ipsius. Videat ergo Vallesius, quàm lon-  
 gè à mente Aristotelis proponat propositionem, quæ simpliciter pro-  
 lata falsa est, nisi contextus antecedentia & consequentia aduertamus.  
 Ad secundam rationem respondeo, negando consequentiam. In  
 cuius confirmatione duo affirmat Vallesius. Primum est, ex Galeno  
 spiritum esse crassiores aere: Secundum, spiritum videri: Quæ duo Solutio  
 falsa sunt. Primum, quia spiritus est crassior, non aere, ut vult Val- secundæ  
 lesius, sed æthere (ut eo loco ait Galenus) hoc est aere purissimo, ex rationis.  
 quo fit: nam ex tenuissima aeris parte, & vaporis sanguinis etiam Spiritus  
 tenui parte, spiritus generationem obtinet in corde, concoctione quæ, non est cras-  
 sius, etiam si incrasset, non proinde dicendum est spiritum esse crassiores aere, sed fieri aere.  
 tenuissima aeris parte, ex qua generatur. Unde hæc consequentia non  
 valet, aer putrescit, ergo & spiritus: Quia aer quietus potest esse in  
 uno loco, habetque continuitatem, & humiditatem, & sic potest pu-  
 trescere: quæ omnia deficiunt spiritui, ut diximus. Secundum, quod Spiritus  
 Vallesius scribit, nempe ex Galeno spiritum videri, quod & omnes non vident  
 affirmare video: ostendit ipsos per transennam legisse illum libellum, tur.  
 cui titulus est, An sanguis in arteriis contineatur, in quo Galenus  
 contra Erasistratum disputans probat, spiritum solum, non contineri  
 in arteriis hac prima ratione. Si spiritus solus in arteriis continere-  
 tur, videremus eum exire, ergo solus non continetur. Propositionem  
 confirmamus, quia si videremus eum exire, id colligeremus ex coinci-  
 dentia arteriarum. Quod similitudine possumus ostendere in vire, in  
 cuius compressione solemus dicere, nos videre aerem ex eo egredi. Re-  
 spondebant sectatores Erasistrati Galeno, non est necessarium nos  
 videre exire spiritum ex arteriis, quia tenuis, & levis est spiritus, &  
 sic facile expirat. Contra hos disputat, ea ratione, qua diximus ex cõ-  
 pressionem desumpta. Videant ergo, qui spiritum videri ex Galeno af-  
 firmant, quantum à veritate aberrant: aliud enim est dicere videri  
 spiritum



spiritum, & aliud videre spiritum exire, hoc enim vltimum signo p  
dicto possumus intelligere. Iam si tam acutè vident, vt eis non latet  
spiritus, dicant mihi eius colorem, aut ipsum ostendant mihi, hoc eni  
sensu, non ratione debet probari.

**Differetie** Febrem diariam aliqui in varias differentias diuidunt, pro var  
tate spirituum, qui aut sunt vitales, aut animales. Non considerant  
spiritum vitale solum in corde calefactum efficere diariam. Dicendum  
diariarum. ergo est, febrem diariam vnicam esse, neque posse in varias differen

tias partiri, cum spiritus vitalis vnicus tantum sit: at cum pro caus  
rum varietate, curatio diariæ varietur, differentia diariæ ex causis  
ris desumenda erunt. Diaria semper sit a causis externis, in quibus  
pus est considerare, an sint presentes, an non, tum an febrem efficiant

**Causæ præ** affectum aliquem in corpore generando, vel sine affectu. Si causæ præ  
sentes in- sistentes sunt curationem indicant, non autem, si sunt absentes. Si caus  
dicant. affectum aliquem efficiunt, vt frigus, & balneum aluminosum densi

tatem curis, ablatiis causis non ad febrem, sed ad curationem affectu  
veniendum erit. Si verò nullus sit affectus, diariam curabimus, vt ma  
nifestum est in illa, quæ fit ex ira, & exercitatione. Et ita cum Gal. 8  
method. in fine, diariam conuenire cum hectica scribit, intelligit de dia  
ria, cuius causa nullum affectum in corpore generauit, hæc enim cu  
ratur alteratione, sicut & hectica.

**Signa com** Signa febrium diariarum quædam sunt communia, quædam verò  
munia dia propria. Communia omnibus diariis conueniunt, quæ traduntur à Ga  
liarum. leno primo de differen. febr. cap. 8. Propria signa sunt illa, quæ causas

**Signa pro-** particulares febrium diariarum rationem, refrigerationem, crudita  
pria. tem, iram, tristitiam, bubonem, vini potum, & alias similes demon  
strant: de quibus agit Galen. 1. de arte curat. ad Glauconem, & 2. Cri  
seon cap. vltimo. Ex quibus locis hæc omnia pete, neque enim animus  
est transcribendi ea, quæ rectè à Galeno sunt explicata, vt multi face  
re solent, eo solum nomine, vt chartas impleant, & aucti voluminis  
auctores videantur.

**Methodus** De febribus putridis iam cum auctore agendum est, sed antequàm  
ad curan- particularem earum curationem agrediamur, æquum erit breuiter  
das febres methodum generalem proponere, qua id præstare possimus. Primò er  
putres. go aduertendum est, in omnibus febribus putridis, hos septem affectus  
7. affectus reperiri. Primus est febris, 2. putredo, 3. prohibita transpiratio, 4. obstru  
febris pu- ctio, 5. humoris multitudo, 6. humoris crassities, 7. humoris glutinosi  
tride. tas. Vnde febris varias habet causas antecedentes, quarum quædam  
solum sunt causæ, vt putredo, & fluxio humoris multi, crassi, aut glu  
tinosi. Prohibita transpiratio est symptoma, & causa putredinis. Ob  
structio est morbus, & causa putredinis. Hæ febrium causæ aliquan  
do omnes sunt presentes, aliquando non omnes. Præsentis sunt omnes,  
cum febris est in principio, tunc enim est fluxio humoris, obstructio,  
proh



prohibita transpiratio, & putredo. Nō autem sunt omnes causæ præ-  
 sentes, cum febris est in aliis temporibus: nam in augmento febrium  
 deficit fluxio, sicut in statu fluxio & obstructio non sunt, in de-  
 natione verò sola est putredo (sicut in statu) sed iam euacuatur. Se-  
 cundo aduertendum est, omnes febres putres conuenire in putredine,  
 differre autem pro varia putredinis differentia ex loco, seu foco putre-  
 nis desumpta. Putredo enim vel est in toto corpore, aut maximis putredinis  
 asis, ut in febre syncho, vel est in vna tantum parte. Rursus hæc pu-  
 tredo, quæ in vna consistit parte, vel est cum Phlegmone, vel citra eam in cu-  
 phlegmonem: si est sine phlegmone, pars illa, quæ obstructionem ha-  
 bet, in qua putrescit humor, dicitur focus putredinis. Si humor pu-  
 ret in toto corpore, febris ex eo orta caret accessionibus. Si verò in v-  
 na tantum parte putreat, particulares circuitus efficit: simulque fe-  
 brem continuam, aut intermittentem: continuam, si humor putrefa-  
 ctus in foco, ob eius multitudinem, aut facultatis expultricis imbecil-  
 litatem, intra vasa continetur: intermittentem verò si propter causas  
 contrarias, per habitum corporis expellatur. Hæc omnia considera-  
 mus, propter curationem, quia cum in syncho, non sint circuitus, ho-  
 ra consueta cibabimus ægrotum, non sic in aliis febribus, quæ circui-  
 tum habent, in quibus in hora accessionis abstinerendum est ab alimen-  
 to, nisi urgeat aliqua occasio: ut si vires concidant, qua ratione 8. me-  
 tho. biliosi aliquando in hora accessionis cibantur. Tum in syncho, &  
 continuis, dummodò adsint vires, quocunque tempore licet sanguinem  
 mittere, at in intermittentibus solum in hora intermissionis. His posi-  
 tis methodo rationali ex indicationibus desumpta, febrem putrem hac  
 ratione curabis. Febris putris est morbus fiens, hoc est, qui habet cau-  
 sam ipsam fouentem. Habet ergo aliquid factum, & aliquid quod curandi fe-  
 sit. Id quod factum est, debet curari, quia est morbus: id quod fit, de-  
 bet prohiberi, ne fiat, quod præstabimus auferentes causam, quæ est res.  
 putredo. Hæc etiam habet quid factum, quod curationem etiam postu-  
 lat, & quid fiens, quod prohibebitur, auferentes prohibitam transpi-  
 rationem, quæ est eius causa. Prohibita transpiratio non habet quid  
 factum, & quid fiens, ut malè voluit Alomarivius, quia hæc suam es-  
 sentiam habet in fieri, & perpetuò ab alio dependentem. Debet ergo  
 auferri quod præstabimus, prospicientes obstructioni, quæ est eius cau-  
 sa continens. Obstructio etiam habet aliquid factum, indicans cura-  
 tionem: & aliquid quod fit præuisione egens: quam præstabimus,  
 auferentes eius causam, quæ est fluxio humoris multi, crassi, aut glu-  
 tinosi. Vnde in hac resolutione principium à febre sumimus, & tan-  
 dem ad fluxionem gradatim descendimus, ita ut id quod in resolutione  
 vltimum est, sit primum in curatione: quia affectus non potest tolli ma-  
 nente causa, vnde ortus est. His si addamus indicationes, quæ à viri-  
 bus, & natura sumuntur, integram habebimus methodum. Indicationem



Non agi- nem à natura tunc addemus, cū in quotidiana rationē habuerim  
mus de fe- ventriculi, in tertiana iecoris, in quartana verò lienis. Aduertenti  
bre sym- præterea est, nos in hoc libro nō agere de febribus, quæ inflāmati  
ptoma. nes sequuntur, quoniā hæ sunt symptomata, et curata inflāmati  
cessant: sed de aliis febribus putridis, quæ citra inflāmatōnē fiunt  
et in quibus septē illos affectus cōsideramus. Quid autē vnusquis  
ex illis indicet, propriis capitibus explicabimus incipiētes à synoch

Nomina Febres quotidianæ, tertianæ, & quartanæ dicuntur, non quia  
februm beant accessiōnem, singulis diebus, tertio, aut quarto euenienter  
putridarū. quia hac ratione duplex tertiana diceretur quotidiana: sed quia  
de synoch. tali fuit humore, quotidiana, quia fit à pituita, tertiana à bile, qua  
Duplex sy tana ab humore melancholico. Ex his manifestē patebit, febrem s  
nochos. nochon (hoc est continentem) appellari eam quæ ex sanguine ortu  
Synochum habet: quæ caret circuitibus, & vna continua clauditur accessiōne  
ex sangui quia non habet vnū certum locum affectum sed multos. Hæc dupli  
ne oriri est, non putris, & putris. Synochum non putrem ex vaporibus san  
probat, ex gruinis calefactis generari, & ad diariam referri supra, cu de dia  
eius causa rius erat sermo, explicauimus. De qua in presentia non disputamus  
primo. sed de altera synoch. putri, quæ habet orūm ex putredine succorū  
vel sanguinis (quod idem est) in omnibus vasis, vel maximis, & ca  
lidis, qualia sunt illa, quæ inter alas, et inguina clauduntur: ibi enim  
caudices venæ, & arteriæ existere anatomes docet. Hanc autem pu  
tredinē in omnibus vasis, aut magnis inclusam solus sanguis (hoc est  
massa sanguinaria) efficere potest. Quia eius putredinis causa est  
plenitudo (vt ex 9. metho. c. 5. & prima historia c. 4. colligimus) nō ea  
quæ est ad vires, sed ad vasa. Vtraque autem à solo sanguine fit, nul  
lus enim humor solus tantum augeri potest, vt venas distendat, quocir  
ca

Obiectio. in morbo regio experieris, & aliis similibus affectibus. Dices, non mi  
dantur plethora biliosa, melancholica, atque etiam pituitosa, quam  
nos plethoram secundum quid appellamus? poterit ergo ex hac fieri

Solutio. etiam synochos. Respondeo concedendo consequentiā, cum enim in  
hac plethora humor non sit separatus à sanguine, si in eo breue ha  
buerit augmentum, poterit facere synochon: sin verò magnum, cū iam  
tunc sanguis sit multum pituitosus, melancholicus, aut biliosus, ne  
que poterit facere plethoram ad vasa, et febris quæ sequetur habe  
bit circuitus illius humoris aucti. Quod synochos febris fiat ex solo  
sanguine per præpollentiam dicto, (quia sanguis humor quartus so  
lus nunquam extat) præter rationem dictam, aliis etiam cōfirmabi  
mus, ita vt hæc sit secunda ratio, desumpta ex 9. metho. c. 3. vbi scribit  
Secunda Gal. febrem synochon fieri, cum humor equaliter, & cito, in omnibus  
ratio. vasis, aut magnis putrescit. Vbi illa duo verba equaliter, & cito con  
sideranda sunt: equaliter enim in omnibus vasis solus sanguis, qui in  
eis potest redundare, putrescere poterit, sicut & cito, cum non diffila



quia est calidus, & sic facile intemperiem calidam concipiet, & humidus: & ideo multi calidi et humidi vapores ab eo eleuati neque te gubernati cito putredinis erunt auctores, sicut & ipsemet san- is cito etiam facile putredinem concipiet. Tertia ratio ex eodem lo- Galeni synochos febris neque in frigida etate, vt senectute, neque tio. frigido corporis temperamento, quale est hominis melancholici & tuirosi, quia melancholia, & pituita cito non possunt putrefieri, ne- in hominibus gracilibus, hoc est biliosis, quia multum distancur, ri potest. Ergo fiet in solis sanguineis. Quarta ratio ex eodem capite Quarta ra- aleni, synochos carnosos & multo sanguine affluentes afficit, ergo tio. lum fiet ex sanguine. Quinta in syncho pulsus est maximus ex eo- Quinta ra- m loco Galeni, ergo ex solo sanguine fiet, quia homines sanguinei tio. & carnosus, cum habeant maximum pulsum, & alia natura & sive Sexta ra- d magnum tantum possunt peruenire. Sexta ex curatione colligit in- tio. iutum, quia solum in synochis mittimus sanguinem & sive ad animi Septima reliquium, vt inferius videbimus, propter plethoram, quae a solo san- ratio. guine fit. Septima ex 9. method. cap. 5. desumpta aperte id monstrat, eo- nim in loco Gal. plenitudinem ad vires synochon non efficere scribit, quia ea nec obstruit venarum ora, ita vt prohibeat refrigerationem, nec tunicas earum distendit, nec ruborem, nec tumorem inuehit. Iam a contrario sola illa causa, illa causa faciet synochon, quae distendit ve- nas, ita vt in eis tumorem efficiat, qui est signum non plenitudinis, sed magnae plenitudinis, quae ruborem inducit in cute. Certissimum er- go erit homini vel medicis iudicii, haec omnia a solo sanguine summe iusto fieri, & ita hunc solum synochon generare posse. Ex his colliges male Altomarium a bile, pituita & melancholia syncera synochon Altomarii eum fieri scripsisse. Probat autem etiam a bile fieri his rationibus. sententia. Prima desumitur ex Gal. lib. 2. diff. febrium cap. 7. vbi continuam ex Pr. ma ra- bile febrem diuidit in synochon, & continuam. Secunda etiam vim ha- tio. bet ex lib. 2. Criseon cap. 6. vbi Gal. postquam synochon febrem conti- marii prae- nuam esse, & acutam scripsit, consequenter de ipsa loquens haec ad- bans sync- dit, sufficit enim genus agnoscere, quod biliosa sit, atque deurens, haec chon fieri Gal. si synochos est biliosa, ergo bilis synochon efficiet. Tertia ratio ex bile. Hippocr. 4. de ratione victus sic habet: Cum venae totius corporis exic- Secunda. catae, attraxerint acres, ac biliosas humiditates, ex carnibus, febres Tertia ra- ardentes fiunt. Iam si hoc ita est, si bilis a venis omnibus attrahatur, tio. ex carnosus partibus faciet synochon. Quarta ratio, si synochos febris Quarta. fit ex sanguine putrescente, ergo & ex bile, consequentiam probat, ratio. quia sanguis cum admodum putrescit, eius tenuior portio in bilem mutatur.

Probat p

Quod ex pituita etiam generare possit, probat ex lib. 4. acutorum, tuitam ge- ubi Hippocrates fatetur, pituitam falsam a totius corporis venis at- tractam, aliud causi genus efficere: ergo cum haec pituita erit putre- noehon.

L 2

facta



# DE CVRAND. MORB.

facta in omnibus venis, vnam habebit accessionē, & sic erit synochon. Hæc Altomarius. Cuius rationes soluendæ sunt, cum iam paulo super probauerim solum sanguinem ex quatuor humoribus constitutum, synochon generare posse. Prima ratio desumpta ex Galeni loco non recte

**Solutio** considerato: ibi enim hoc est 2. de differe. feb. totum quæ ex flaua bilis  
**primæ ra-** fiunt additum est, & superfluum imò repugnans Galeni doctrina  
**tionis Al-** ut disputationis series persuadet. Postquam enim Gal. egit de inter  
**tomarii.** mittentibus febribus, illo cap. 7. incipit agere de continuis, eas diui  
dens hoc modo: Continuae febres, aut sunt continentes, aut nome  
generis seruantes, continuæ dicuntur. Rursus continentes tres habent

**Solutio se-** differentias, sicut & continuæ, quæ eo loco enumerantur. Et ita ex  
**cundæ ra-** plicatio huius loci, ostendet etiam locum, qui habetur 2. criseon, ex qu  
**tionis.** secunda ratio habet vim, corruptum esse: ibi enim totum illud, quod  
biliosa sit, delendum est, ut ex contextu colligo. In eo enim incipien  
agere Galenus de continentibus febribus, eas ait esse continuas, &  
ardentes, nullam faciens mentionem, quod sint biliosæ, ac proinde cum

**Solutio ter** concludit, sic legendum est, Sufficit enim genus agnoscere, quod  
**tiæ ratio-** continua sit, & adurens. Tertia ratio ridiculam habet consequen  
**nis.** tiam. Imprimis cum Hippo. dicit venas exiccatas attrahere bilem ex  
carnibus, intelligendum est, venas eo modo affectas attrahere ex car  
nibus ichores sanguinis. Non tamen intelligendum est, hos semper vbi  
attrahuntur, facere febrem: hoc enim falsum est, sed tantum, quando  
in aliqua vena à crasso humore obstructio incepta est, tunc enim icho

**Quartæ** res ibi detenti augent obstructionem, & sic fit putredo tanta, quæ po  
**rationis so** test generare febrem, secundo, etsi venæ attrahant bilem ex carnibus,  
**lutio.** & hæc perficiendo obstructionem febrem generet, habebit circuitus  
tertianos. Tum bilis flaua non potest obstruere, quomodo ergo effi  
ciet synochon? Quartæ facillimum erit satisfacere, si enim sanguis  
iam habet tenuem portionem in bilem mutatam, febrem efficiet ha  
bentem tertianos circuitus, & tunc Galenus eam appellat febrem  
biliosam, nos autem non loquimur, nisi de sanguine non mutato adhuc  
in bilem, aut melancholiam, & putrefacto, hic enim est, qui facit  
synochon. Vltima ratio quæ probat pituitam salsam generare syno  
chon duo habet absurda, quæ sunt, pituitā salsam posse in toto corpore

**Differen-** putrere, & secundo posse facere vnam accessionē. De differentiis syn  
**tiæ syno-** cochæ febris disputemus, quæ tres sunt. Prima appellatur à Græcis  
**chæ febris** acmaistica, à Latinis augescens: quia à principio suæ generationis sem  
**tres sunt.** per habet accessionē incrementem: causa huius rei est, quia in ea plus  
**Prima.** putrescit sanguinis, quàm dissipetur de putrefacto. Secunda dicitur à  
**Secunda** Græcis omotonos, cuius accessio semper eundem seruat tenorē: hoc est,  
**differētia.** quæ neque diminuitur, saltem sensibiliter: quod prouenit ex eo, quod  
**Tertia** distatūm dissipatur humoris putrefacti, quantum de nouo putrescit. Ter  
**ferentia.** tia differentia synochos, à Græcis paracmaistica, à Latinis decrescens

dis



itur, in qua accessio semper decrefcit, quia plus diffipatur ex pu- Obiectio.  
 re factio sanguine, quam putrefcat de nouo. Dices, si vnaquæque syno- Solutio me-  
 os vnam habet accessionē, ergo habebit etiam vnum tempus solū: dicorum.  
 respondēt omnes medici, verum esse synochon solū habere vnum Refutatio  
 tempus morbi sensibile, & tria insensibilia. Qui quantum errēt, hac solutionis.  
 ratione probamus. Sanguinis missio non est exercēda in statu, aut mor-  
 declinatione: sed si synocha febres habent vnum tantū tempus,  
 tunc in eis sanguinem mittimus in statu, & declinatione: ergo hæ fe-  
 res non habent vnum tantū tempus, sed multa. Maiorē probamus,  
 quia tempore status non est fluxio humoris, & est coctio perfecta. At  
 in declinatione, cum humor peccans iam a natura euacuetur, non est  
 quod eius motū perturbemus sanguinis missione. Assumptio nota est, Propria sq  
 quia in omotono (si tantum habet statū) cum sanguinē mittimus in sta- lutio &  
 tu exercemus euacuationem, sicut in paracraftica in declinatione. vera.  
 Ergo autē (vnā cum Ludonico Collado præceptore doctissimo) sentio, has  
 res synochæ febris differentias, habere quatuor tempora vniuersalia  
 insensibilia. Cognoscuntur autē ex cruditate & coctione: principium e- Obiectio.  
 im est, quando est signū cruditatis in calore, pulsu, & vrina. Augmē  
 um, quando incipit coctio. Status, quādo perfecta est, declinatio verò,  
 cum febris iam mīescit. Dices, si hoc ita est, quā ratione vnā appella-  
 nus augescētē, aliam in eodē statu permanentē, & aliam decrescē- Solutio.  
 em? Respondeo, quia hæc est propria constitutio huius febris, vt in  
 declinatē erit manifestum, in hac enim in principio humor multus fa-  
 cit obstructionē, ita tamē fluit ad eam, vt minus fluat, quā dissipe-  
 tur, hoc tamen, non tollit febrem esse in principio, idem dicendū in alijs  
 temporibus. Quod autem hoc sit verum, colliges ex 9. metho. cap. 4. in  
 secunda historia serui cuiusdam, qui synochon putrē patiebatur. Quē  
 Gal. post secundā noctē vidit putrescentium humorū præbētē notas,  
 vnde quāso Gal. desumit notas humorū putrescentium, nisi, vt iam dixi-  
 mus, ex calore, pulsu, & vrinis? Tum nūne quando humor putrescit,  
 est cruditas? Adde in eadē historia inferiūs hæc scribere Galenum,  
 itaq; ad portionē minuentis se febris, vrinæ quoq; cōcoctio  
 præcesserat, eratq; haud obscurū septimo finiendā. Sensim er-  
 go procedebat concoctio, in hac synocha post cruditatē, & ideo, quando  
 in synochis sanguinem mittimus, in principio sensibili id præstamus.

Secundò facta basilica dextra.) Synochos febris non potest cu- Sectio re-  
 rari, nisi prius causæ eam generantes auferantur, quæ sunt putredo, nā.  
 prohibita transpiratio, obstructio, & multitudo humoris. Ex his cau-  
 sis cum sit prima multitudo, ab hac incipiēda est curatio. Hæc indicat  
 sui ablationē, quæ sit per contrariū nēpe euacuationē lib. 2. apho. sent.  
 22. Cum autē euacuatio possit fieri inedia, balneo, frictione, exercita-  
 tione, purgatione & sanguinis missione, de remedio euacuante in hoc  
 affectu, hoc modo deliberabis. Plethora in synocha est magnus affe-



# DE CVRAND. MORB.

Stus, postulat ergo magnum remedium, qualia sunt inedia, exercitatio, balneum, frictio, & similia, quæ ideo omittuntur. Remanent ergo duo remedia magna, purgatio, & sanguinis missio. Purgatio caret occasione, quia non est affectus eam indicans, remanet ergo sola sanguinis missio, quæ cito, et multum omnes humores potest ex toto corpore euacuare.

Hæc autem exercetur à Galeno aliquando, usque ad animi deliquium usque, liquium 9. meth. cap. 4. sic & 6. epy. par. 1. com. 29. & aliis locis deliquium ad animi berans de ipsa ex affectu postulante talem euacuationem & præsentia virtutis. Affectus postulans est maxima plenitudo, quæ maxima postulat euacuationem. Vires autem summæ sunt, quia homo est calidus, & iuuenis, & ideo habet maximum pulsum: inde colliges, in febribus synochis (cum ratione maioris & minoris differant) non esse necessario mittendum sanguinem, usque ad animi deliquium, sed ad animi deliquium, esse terminum istius euacuationis, ita ut in summa plenitudine, non liceat ulterius euacuare, nisi voluerimus ægrum interficere.

In biliosis cere. Vnde videat Vallesius, quæ ratione possit constare sua sententia febribus qua lib. 7. controuersiarum nititur probare, in febribus biliosis continui probat nuius, etiam sanguinem mittendum esse, usque ad animi deliquium. Prima ratio, Gal. 2. aph. com. 29. in ardentissimis febribus sanguinem mittendum usque ad animi deliquium: sed febris tertiana continua est febris esse mittenda ardentissima, ergo in ea licebit talem euacuationem exercere. Secundum usque Gal. sanguinem mittit in hac febre, ut refrigeret, ergo & id licebit in ad animi tertiana continua, in qua intensior est caliditas, quam in syncho. Tertia ratio, in synochis Gal. copiose euacuat, ne humor propter feruorem Prima ratio in partem principem feratur: sed in tertiana continua magis feruet calor quam in syncho, ergo licebit in ea propter eandem causam euacuare copiose, hoc est usque ad animi deliquium. Et cum possit aliquando ei obicere, in tertiana continua deficere virium robur. Respondet se loqui non de ea tertiana, quæ exquisita est, sed de notha, in qua vires possunt constare. Certe ego multum miror virum doctissimum nunquam aduertisse, has rationes nil concludere, neque ex quo affectu deliberemus in syncho, de sanguinis missione. Nos enim, ut Gal. & rei naturæ docent, in ea usque ad animi deliquium euacuamus, indicatione & tertiæ sumpta ex causa obstructionis, quæ plethora est, non ergo mittimus rationes sanguinem, ut refrigeremus, ut secunda ratio docet. Quod si ex tali euacuatione sequatur corporis refrigeratio, & inde delectatio, id ex accidenti provenit, non quod nos id instituamus efficere. Neque etiam sanguinem mittimus, ne sanguis decumbat ad partem principem, ut tertia ratio docet, verum est, ex hac sanguinis missione id aliquando prohiberi. Prima ratio nil concludit, quia et si Gal. scribat lib. 2. aph. in ardentissimis febribus, sanguinem esse mittendum usque ad animi deliquium. Quid intelligat per febres ardentissimas ipsemet explicat lib. 6. epy. & lib. decur. 1. ut per sang. miss. cap. 11. & 9. methodi: in quibus locis



is agit de hac copiosa euacuatione, & solum meminit ardentissimi-  
arum, quæ ex sanguine sunt, & quamuis id non scripsisset, nos ex  
ura rei debemus id colligere. Si enim hæc tam copiosa & summa e-  
uacuatione, postulat magnam plethoram et summum virium robur, quæ  
considerantur in tertiana qualibet, quomodo licebit in ea summe eua-  
care? Quod si in tertiana notha sunt vires, ut vult Vallesius, non ta-  
men summe, sed tales, quæ poterunt ferre euacuationem, propter re-  
ulsionem factam.

Tertiò, potu magno.) Post sufficientem sanguinis missionem,  
nam cognosces ex coctione, quæ in urina apparere incipit, cum iam  
urata sit causa obstructionis ad hanc veniendum est. Curabitur ob-  
structio suo contrario, quod est aperiens. Hoc varium est, decoctum ca-  
pillorum veneris, cichoreæ, aut alterius similis cum oxymelle. Eligen-  
ta enim sunt aperientia minus calida, quia quæ calidiora sunt, augen-  
lo calorem humorum putrium, augebunt & putredinem. Aduerte ta-  
men aperientia medicamenta obstructionem curare, sanguinem flu-  
xilem efficiendo, & motum ei tribuendo. Iam obstructione curata, ut  
possit putredo per convenientes regiones expelli, vtiliter exhibetur aque  
frigida potus. Qui refrigerans partes ab intemperie calida langui-  
das, eis robur addit, temperiem generando: hæc autem roborata, pu-  
tredinem expellere solent, per sudorem, urinam, vomitum aut deiectionem:  
aut simul multis ex his euacuationibus. Quod si æger iuuenis  
fuerit, et carnosus, æstate media, natatio in aqua frigida comoda erit,  
quæ corrigendo partium intemperiem, sudorem mouebit. Neque frigi-  
ditas densando poros cutis eam prohibebit, quia potius ab ea, ad me-  
dicritatem reducuntur, nimis dilatati à calore febrili, et æstatis. Quod  
si Hippocr. lib. 3. acutorum natationem in aqua frigida vitet in ægro-  
tis, intellige cum Gal. in illis ægrotis, qui virium habet imbecillitatem.  
Dices, cur putredinem nos non euacuamus? Respondeo ad auferendam  
putredinem in viuentibus, nos expectare actiones facultatum natura-  
lium, qua ratione in syncho separata parte putri à nō putri, eam quæ  
putris est, facultas expultrix euacuat, quæ sollicita est de animalium  
salute, & proinde recte dicebat Hipp. natura medicus, nos enim mini-  
stri tantum sumus. Iterum obiicies, diminutè tradidisti curationem,  
quia prohibitam transpirationem, quæ etiam debet auferri, omisisti.  
Respondeo, consultò id esse factum, quia, ut iam supradixi, prohibita  
transpiratio habet essentiam in fieri, et ideo curata obstructione cessare.

Quartò, concoquenti bilem.) neque bilis eget præparatione,  
neque hic affectus pendet ex bile, cur ergo præparet bilem, nescio.

Quintò vacuantibus bilem.) Febris synochos, ex sanguine oritur Auctor  
habet, et nō ex bile, proinde nō est quod eā euacuemus. Verū est, si hæc taxatur.  
febris perseveret, sanguinis tenuiorē portionem mutari in bilem: et hac  
febrē iā esse biliosam, quæ curabitur ea ratione, qua inferius videbis.



*Descriptio.* **A**rdens febris Latinis, causos Græcis, est febris biliosa de genere continuarum: errant igitur qui cum Arabibus volunt a falsa pituita posse procreari: errant quoque qui cum iisdem ponunt discrimen inter ardentem febrem & tertianam continuam: quia neque a bile flava putrescente in venis, quæ a corde distant, fit, neque illa a eadem bile putrescente in venis cordi propinquis tantum sed (Gal. authore in variis locis, præsertim comm. 59. lib. 4. aphorif. febris ardens eiusdem est generis cum tertiana exquisita intermittente, eò quòd ab eodẽ humore bilioso ambæ procreentur. Differt tamen ardens a tertiana exquisita quòd in hac flava bilis per totum corpus fertur, in ardente autẽ febre ipsa bilis in venis vna cum sanguine continetur.

*Causæ.* Omnia quæ bilem flavam procreant, efficere possunt febrem hanc, Aer scilicet nimis calidus, alimenta acris & admodum calida, vt piper, sinapi, cape, allia, vinum vetus, & similia, & animi & corporis labores. Ex his enim flava bilis gignitur omni tempore, & ætate, præsertim ætate, & iuuetute: a qua in venis putrescente fit ardens febris. His notis cognoscitur, lingua eorum, qui hac febre laborent, arida fit, aspera & nigra, ventriculi erosio, sitis intolerabilis, vigiliæ, capitis dolor, nonnunquam etiam delirium, mouentur ferme semper ab vna parte in aliam, vt animalia turgida & venere capta, & tumores turgidi, a quibus sæpe fit hæc febris. Quare deiectiones alui eis liquidæ, & pallidæ sunt, quamuis sæpe aluius dura sit. Pulsus celerrimus, vrina flava, & aliquando alba, quæ delirium futurum significat: fiunt aliquando surdi hi, & nonnunquã muti. Septem remediorum generibus curatur.

*Victus.* Primò, victu tenui refrigerante satis & humectante, vt aere in ætate parato, aqua rosata inspersa sæpe per totã habitationem, foliis etiam lactucæ, myrti, salicis, floribus violarum, nuphariis, & rosarum, fuga anhelitus multorum, iræ, & aliorum, quæ calfaciunt. Nutriatur cremore hordei, succo granatorum, lactuca, præcipue cum aceto & saccharo, cichorea, cucurbita, lacte amygdalarum dulcium, & quatuor seminum frigidorum, cucurbita saccharo codita, radice buglossæ saccharo codita, scapo lactucæ condito saccharo, dicitur a Valentinis gorga daniel. Si sit æger imbecillus, nutriatur iure pulli cum lactuca in eo elixa, vel hordeo sine cortice: semper tamen habenda ratio eorum, quæ diximus capite præcedentium cum Hippocrate 17. aphorismo primi libri, & etiam eo-



um, quæ 8. & 10. Aphorismo eiusdem lib. docuit Hippocrates, in quibus habetur, in vigore morborum, & iuxta vigorem non esse cibum exhibendum, neque in his, in quibus vigor est omnis morbus, vt in apoplexia, vel maxima febre: At in aliis plus cibi esse dandum in initiis, & semper versus vigorem minuendum, cuius contrarium consilium nostræ febrinae quotidie sequuntur, dant semper in morborum initiis parum cibi, & augent ipsum cōtinuò vsque ad vigorem, & ipsum sæpe augent, vel multum saltem præbent, quo errore non pauci ægri pereunt. Potus sit aqua hordei sine cortice solum. In prandio & cœna, & cum julep violarum, & rosarum, & syrupo acetositis citri quacunque alia hora.

Secundo, secta basilica dextra, si fuerint signa sanguinis, rubedo scilicet totius, venæ magnæ & plenæ, vrina rubra & ætas florida, & robur virium. Cum verò in hac febre non apparent signa sanguinis, non est necessaria sanguinis missio: sed purgatio bilis, neque in omni putrida febre est secanda vena, vt multi recentiores medici cum Gal. II. meth. volunt. Nam non deprauato sanguine, primo vel secundo loco per mixtionem vel corruptionē potius noceret, & ideo ipse Galenus libro primo de arte curatiua ad Glauconem cap. de curatione tertianæ exquisitæ, nihil de sanguine mittēdo dicit: & post eodem lib. capite de tertiana notha: quod si inquit, sanguinem mittere oporteat, neque hoc quoque omittendum, sed ab initio statim adhibita earum rerum quas scis distinctione tantum mittendum, quātum præsens exigit status: & capite de curatione quartanæ eodem libro, deinceps de quartanis dicemus, quas etiam ab initio mediocriter ac leniter tractare oportet, nullum acre medicamentum, aut euacuationem exhibentes, nisi sanguis forte vehementer superabundans appareat, & si vena incisa is qui fluit niger videatur ac crassus, præcipuè verò in iis, qui liene laborāt, huiusmodi cernitur, audaciùs mittendus est: quod si tenuis, aut flauus extiterit, statim suppressendus: & postremo eodem libro cap. de curatione cōtinuarum, Sanguinem verò, inquit, mittere oportet, & ob morbi magnitudinem, & quibus multo plus ruboris insit, quàm naturæ cōueniat, & maior quàm pro consuetudine corporis tumor, & venæ eminentiores atque magis extensæ, his omnibus est auferendus, nisi vires, aut ætas, aut aliquid eorum, quæ supra commemorauimus, prohibuerit. Concludamus cum Gal. his in locis, sanguinem non esse mittendum in omni febre, quæ dependet ex putredine humorum. Huic libro est maxima fides adhibēda, quia

scrip



# DE CVRAND. MORB.

scripsit in eo de febribus ex professo, & propriam disputationem de his tantum instituit, in methodo vero generali omnia persequitur. Deinde librum hunc ad Glauconem scripsit, qui in philosophia & medicina diu multumque versatus erat.

- Cur magna fides* Neque Galeni autoritas vndecimo methodi repugnans (vt diximus) huic nostræ, vel potius Galeni sententiæ & veritati, neque etiam commetarius 23. primi libri aphorismorum, vt aliqui recentiores medici censent, est contrarius non ad bis, in quo non docet Galenus omnem febrem ardentem indigere sanguinis missione vsq; ad animi deliquium, nam non verum id est, nisi quando sanguis peccat cum bile. Cum enim sola bilis putrescit, sanguis nullo modo mittendus est: quia eius vacuatio simul cum spiritu & nativo calore vel mortem, vel maximum periculum induceret. Bilis ergo putrescens in hac febre ardenti si sit turgida absque cōcoctione, & sine sanguinis missione vacuanda est hac, aut simili potione: ℞. medullæ tamarindorum, & medullæ cassiæ fistularis recens extractæ. an. ʒ. ss. infusionis. ℞. iij. rhabarbari in aqua endiuia per noctem factæ, diaprunis solutiui ʒ. ij. ss. syrupi violarum ʒ. j. decocti florum cordialium. q. s. misce, & fiat potus. Vel si est diues: ℞. mannę electæ ʒ. j. ss. infusionis ʒ. ij. rhabarbari in aqua endiuia factæ, iuris pulli gallinacei, decoctionis florum cordialium, quod satis est, misce, & fiat potus. Si fuerit pauper, fiat vacuatio per priorē potionē sine rhabarbaro, die sequenti, & omnibus diebus, dempto die euacuationis, per clyster.
- Clyster.* medicamenta purgantia hoc, vel simili clystere alius lubricetur, ℞. foliorum maluarum, violarum, lactucæ, cichoreæ, & mercurialis an. m. j. furfuris, hordei sine cortice, quatuor feminum. f. m. conquassatorum. an. p. ss. fiat decoctum, de quo percolato accipe ʒ. xv. olei violarum ʒ. iij. sacchari rubri, & cassiæ fistulæ præparatæ. an. ʒ. j. misce, & fiat clyster. Si maxima fuerit caliditas febrilis, adde trochiscorum de camphora ʒ. j. mucilaginis seminis psyllij, & cydoniorum. an. ʒ. iij. olei papaueris ʒ. ij. Cordi a primo die omni hora admoueat
- Epithema cordi admouendum.* tur epithema aut simile: ℞. aquarum rosarum, & acetosę. an. ʒ. iij. aquæ buglossæ ʒ. ij. aquæ melissæ, & aceti rosati. an. ʒ. ss. pulueris diamargaritonis frigidi, & trochiscorum de camphora. an. ʒ. ss. misce, & fiat epithema pro corde. Vnguentum cardiacum Gainerij, cuius descriptio continetur cap. præcedenti, sæpe cordi admoueat tepidum.
- Præparatio bilis non turgentis.* Tertiò, si materia biliosa non turgeat, apparatus syrupo endiuia. S. violarum, granatorum, endiuia compos. acetosifatis



atis citri, acetositatis limonum, nenupharis, de papauere  
um duplo aquæ, vel decocti endiuæ, cichoreæ, acetosæ, sca-  
ciolæ, lactucæ & similium concocta hac bile.

Quarto, vacuantibus bilem, vt cassia fistulari, tamarin- *Purgatio.*  
dis, rhabarbaro, & aliis dictis primo cap. lib. i. ex quibus sim-  
plicibus & compositis variæ & multæ sunt formulæ, vt *℥. Potio.*  
medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ, & medullæ tamarin-  
dorum an. *℥. ss.* infusionis. *℥. j.* rhabarbari electi in aqua endi-  
uæ per noctem factæ, diaprunis solutiui *℥. iij. ss.* syrupi vio-  
larum *℥. j.* decocti florum cordialium. *q. s.* misce, & fiat potus. *Decoctum*  
Die sequenti aluus leniatur, & lauentur intestina clystere de- *hordei lo-*  
scripto cap. præcedenti, aut simili, vel bibat *℥. iij.* decocti co *clyste-*  
hordei cum cortice cum vnciâ vna sacchari. Si omnino æ- *ris.*  
ger non possit bibere potum purgantem, vel eius ventricu-  
lus statim ipsum expellat, fiant boli, aut buccellæ, vt dixi-  
mus capite superiori.

Quinto, refrigerantibus cor, iecur, & totum corpus in- *Alteratio.*  
ternis & externis, vt potu aquæ frigidæ in magna quantita-  
te, obseruatis omnibus, quæ diximus cap. præcedenti, tertio  
genere remediorum. Nam in hac feбри ardenti vtilior est & *Sumenda.*  
magis necessarius, & hac mixtura: *℥.* conferuæ violarum, *Potus a-*  
nenupharis, acetosæ, & rosarum. an. *℥. j.* conferuæ borragi- *quæ frigi-*  
nis *℥. ss.* pulueris diamargaritonis frigidi, & diarrhodonis *de hic v-*  
Abbatis an. *℥. j.* sacchari. *q. s.* misce, & fiat conditum auro *tilissimus.*  
coopertum, quo sæpe vtatur, præcipue tempore sitis cum a- *Conditum.*  
qua hordei: vel *℥.* julep rosati, & violati, an. *℥. iij.* syrupi a- *Mixtura*  
cetositatis citri *℥. ij.* misce, & vtetur cum eadem, vel simili *ad biben-*  
aqua tempore sitis. Summo mane per aliquot dies accipiat *dum.*  
drachmas quatuor electuarij diatrion santalorum, vel diar- *Electua-*  
rhodonis Abbatis, vel diamargaritonis frigidi, cum pauca *ria, &c.*  
aqua acetosæ, vel cichoreæ, vel hordei, vel pauco vino albo  
benè diluto. Syrupus ex aqua, vel succo cucurbitæ valenter  
extinguit sitim & calorem febrilem. Hoc electuarium cor- *Electua-*  
roborat, refrigerat, & est suaue gustanti: *℥.* sacchari dissolu- *rium suæ*  
ti in aqua rosata *℥. iij.* fiat electuarium in tabulis ponderan- *ne.*  
tibus *℥. iij.* si adderes pulueris margaritarum electarum, &  
ossis de corde cerui. an. *℥. j.* esset magis cardiacum, quod om-  
ni tempore est vtile. Hæc enim confectio est bona, præfer-  
rim si cor afficiatur palpitatione, vel alio affectu, animi sci-  
licet deliquio & simili: *℥.* theriacæ de citro *℥. j.* conferuæ a-  
cetosæ, & nenupharis ana. *℥. ss.* confectiois de Hyacintho *Confectio*  
*℥. ij.* pulueris diamargaritonis frigidi, & coralli rubri præ- *cardiaca.*  
parati ana. *℥. j.* foliorum auri numero *ij.* syrupi acetositatis  
citr



# DE CVRAND. MORB.

citri, q. s. misce, & fiat confectio. Dosis omni hora cochlearium vnum cum pauca aqua acetosæ, vel buglossæ. Admoueatursæpe in die & omni tempore cordi epithema descriptum in fine secundi generis remediorum huius capitis, in æstate actu frigidum, & in hyeme tepidum: & bis in die admoueatursinguentum cardiacum Gainerij, de quo capitopræcedenti, aut simile. Hepati quoque bis in die admoueaturscerotum santalatum, vel singuentum tepidum, & sæpe in die hoc, aut simile epithema: ℞. aquarum endiuivæ, cichoreæ & schariolæ. an. ʒ. iiij. aquæ absinthij ʒ. ij. aceti albi cochlearium vnum, pulueris santalorum omnium, & pulueris diarrhodon. Abbatis an. ʒ. j. misce, & fiat epithema pro hepate. Hæc non sunt admouenda hepati, nisi post vacuationes. Renibus, & spinæ admoueatursbis in die singuentum, vel cerotum santalatum, quod habet vim refrigerandi.

**Correctio** Sexto, corrigentibus symptomata videlicet oris, & linguæ  
**symptoma** siccitatem, & nigrorem, capitis dolorem, & vigilias immo-  
**tum siccitatis & nigroris.** dicas. Siccitas linguæ & oris, & nigror curantur continua ablutione facta aqua rosata cum paucō acetō rosatō, vino albo, bene aqua diluto, lacte amygdalarum non decocto, & sine saccharo: humectantibus quoque, vt mucagine seminis psyllij & cydoniorum aqua rosarum extracta: & hac mixtura seu loch, quæ sitim quoque extinguit, sæpe & parum ex ea transglutiendo: ℞. mucilaginis seminis psyllij, & cydoniorum. an. ʒ. ss. sacchari candi violati puluerizati ʒ. j. syrupi violarum. q. s. misce, & fiat confectio. Capitis doloris curatio tradita est cap. 3. primi libri, quamuis curata febre, illius causa curetur. Symptoma hoc, dolor scilicet, aliquando trahit ad se curationem ob sui magnitudinem. Vigiliæ immodicæ curantur, vt diximus cap. quarto prioris libri, emulsione scilicet seminis papaueris, syrupo papaueris, singuento populeonis fronti admoto, & foru seu lotionē tibiārum ex decocto foliorum arundinis, lactucæ, salicis, myrtillorum, corticum papaueris albi, & similium: & hoc potu sumpto hora nona, vel decima post solis occasum: ℞. confectiois Alkermes ʒ. ss. syrupi papaueris ʒ. j. ss. aquæ nenupharis ʒ. j. misce, & fiat potus.

## De febre ardente. CAP. II.

### Scholium.

Febris ardens conditio est febris.



(Ardens febris Latinis.) Febris causas, aut ardens, non est differentia febris, sed conditio. Illa enim febris dicitur ardens, quæ habet magnum ardorem, & inexhaustam sitim;

4. cent.



acut. sent. 17. & I. epyd. com. 1. Et ideo synochos, tertiana continua, tertiana intermittens, & quartana continua, ardentes sunt. Dices, nonne Omnes continuæ ar-  
 ippocr. 4. acut. quendam causam ex pituita salsa describit? Respon-  
 10 verum esse, illum tamen ad eum, qui ex bile fit reuocari: quia ex dentes.  
 b. de morbo & symp. omnis humor calidus biliosus est. Hoc cap. au-  
 tor de tertiana continua disputat. Quæ (sicut & omnes aliæ conti-  
 nuæ) cum synocho conuenit in hoc, quod continua est, tum in calore, pu-  
 tredine, & obstructione. Differt verò ab ea, quia in synocho, obstru-  
 tio fit à plethora: at tertiana continua ab humore crasso, aut glutino-  
 20. Tum synochos caret accessionibus, non autem continua. Febres ar-  
 dentes curantur ea ratione, qua synochos: primò mittentes sanguinem:  
 secundo auferendo obstructionem: tertio putredinem: & quarto fe-  
 30 rem refrigerantes. Curationem tertianæ continuæ, de qua hic agit au-  
 40 tor, ex sequenti capite (ubi agit de tertiana exquisita) etiam intelli-  
 ges: quoniam ambæ sunt eiusdem generis, fiunt enim à bile, cum hoc chos.  
 tamen discrimine, quòd in febre ardente humor faciens febrem intra  
 50 afa manet, at in intermittente fertur per carnes, aut habitum corpo-  
 ris. Solum duo hoc in loco explicare volo breuiter. Primum, An in fe-  
 60 bribus continuis, sanguinis missio, in sola declinatione exerceri possit.  
 Secundum, An febris lenticularis appellata, propter symptoma, po-  
 70 tulet particularem curationem. Ut ergo à primo exordiar, respondeo, tinuis san-  
 80 in febribus continuis quocunque tempore accessionis, posse nos utiliter quis sit  
 sanguinem mittere, dummodò sit in principio morbi. Id confirmo hac mittendus  
 90 ratione. De sanguinis missione deliberamus, ex affectu postulante e- in accessio-  
 uacuationem omnium humorum, & absentia impediendum. Sed in fe-  
 100 brium continuarum accessionibus, quocunque tempore illa duo repe-  
 riuntur, ergo licebit in quocunque tempore sanguinem mittere. Assum-  
 110 ptionem probo, quia in quocunque tempore accessionis prædictæ, est flu-  
 xio humorum ad focus, & robur virium. Imò melius est tempore quo  
 120 viget accessio, sanguinem mittere: quia tunc solent fluere humores ad  
 focus, in quo viget magis calor II. method. Neque est par ratio in in-  
 130 termittentibus, quia cum in his tempore accessionis, humor à natura  
 expulsus extra venas, sit in habitu corporis, sanguinis missione poterit  
 remigrare ad venas, & ita ex intermittenti fieri continua. Vnde cum  
 140 in his habeamus prohibens, nempe motum naturæ contrarium, sangui-  
 nem mittimus tempore intermissionis. Dices, Galenus lib. de cur. rat.  
 per sang. miss. cap. 20. scribit, in ipso die, in quo sanguinem mittimus,  
 150 obseruadam esse inclinationem febris (ut statim addit) particularium  
 circuituum declinationem. Respondeo, loqui Galenum de illis febribus, An febris  
 160 in quibus sanguinis missio in hora circuitus propriam habet indicatio-  
 lenticula-  
 nem. Secundum explicemus, de febre lenticulari (quam Tauardillo ca-  
 170 stellani, & nos Valenini vulgò appellamus, ob maculas in cute ap-  
 propriam  
 parente similes pulicum moribus) aliqui integros libros scripserunt, et curatione.



# DE CVRAND. MORB.

*Varia* sentia postulabat integrum librum hæc disputatio, in quo nil aliud faciendum erat, nisi errores in illis contentos refutare. Quidam enim *essentia.* hanc febrem semipestilentem efficiunt, hoc est oriam ex putredine, & venenato humore: & ideo esse contagiosam, & habentem periculosa accidentia. Alii hanc febrem non pestilentem, sed quæ induxit naturam pestis appellant: et quod fiat à putredine, habente pravam qualitatem.

*Varia* sententia. Unde omnes hi concedunt habere propriam curationem, tum propter maculas, tum quia sine alexipharmacis non cessat. Et ita quidam *ratione.* sanguinem mittunt ob plethoram, alii non ob virum imbecillitatem.

Quidam purgant in principio, & alii non purgant. Quidam vtuntur cucurbitulis, frictionibus, et sudorem mouentibus: alii bene vtuntur cucurbitulis cum scarificatione, quia attrahunt ad cutem, & evacuant, non tamen sudorem mouentibus, neque urinam, quia hæc cum sint calida, augent feruorem humorum. Omnes in principio vtuntur alimentis frigidis & adstringentibus, quidam ob putredinem, quidam ob venenum, & alii ob seminarium, hoc est pravam qualitatem. Multi etiam in principio vtuntur alexipharmacis ex margaritis, & aliis adstringentibus constructis. Non vtuntur alimento tenui, quoniam inquirunt à prauitate humoris statim vires debilitantur. Hanc, & multam aliam varietatem videbis, quæ ostendit eos ignorare morbum, & veram eius curationem. Breuiter ergo veritatem sic accipe.

*Propria* Hæc febris continua est, quia à principio vsque ad finem nunquam cessat. & putrida, vt ex calore, pulsus & urina conspiciamus. In eius principio solent apparere maculae, in cute, quæ symptoma sunt in excretis. Non sunt autem exanthemata, quia non sunt tumores: vnde reuocare eas poteris ad vitiliginem. Hæ maculae non fiunt ob feruorem, vt *sententia.* Vallesius & alii sentiunt, nescio enim vnde in hac febre feruor contingat, potissimum cum ipsimet ab humore crasso pendere scribant, sed fiunt ab humore vi facultatis expultricis ad cutem delato, quia cum putredo sit in humore crasso, sua acrimonia irritat. Præterea hoc symptoma, cum non deiciat vires, neque augeat affectum, non trahit ad se curationem, ac proinde contemnendum. Solum enim ex eo colligimus, morbum esse mali moris, hoc est qui sit ex inequali humore, qui non ita facile coquitur. Non autem est signum putredinis venenatæ, quia tunc

*Non est* morbus venenatus. hæc febris multos interficeret: & excretionem veneni in cute videre-mus, quod non contingit, imò nulla sunt veneni signa. Dices, non est pestilens, sed semipestilens. Quid mea, dicere febrem esse semipestilentem, est somnium & res ad libitum scripta: si enim putredo, quæ facit febrem, habet venenum, nonne erit pestilens? huius febris putredinem appellat Mercado putredinem sordidam, quasi putredo sit vlcus. Neque in cute apparentes maculae, significant pravam qualitatem humoris nobis incognitam, quia hæc febris sine alexipharmacis vllis cessat. Iam si lenticulae sunt symptoma, quod ad se non trahit curationem, cucurbit



orbitula, sudorifica medicamenta, frictiones & alia nonne erunt inu-  
 lia? In principio enim morbi si applicentur, aut adhibeantur augen-  
 obstructionem, putredinem etiam augebunt 8. method. Si in princi-  
 pio, quando apparent, his non utantur, quid proderunt? Curanda ex-  
 o erit febris hæc lenticularis, sicut aliæ febres continuæ. Primò vi-  
 tum in ea instituentes, habita ratione virtutis, & status morbi, ab-  
 bris.  
 ordumque est, & præter experientiam affirmare, vires in hac febre  
 latim in principio, à prauitate humoris debilitari, cum nos innume-  
 os quos curauimus, decies aliquando, & plus in principio sanguinis  
 nissione euacuerimus. Alimenta etiam adstringentia, quæ exhibent,  
 dispersa pulueribus ex margaritis & aliis lapidibus, & medica-  
 mentis adstringentibus maxime lædunt, obstructionem augendo. Iam  
 latim in principio sanguis mittendus est, non ob plenitudinem, ut hi  
 sentiunt, sed ut reuellamus humores fluentes ad focum. Sanguine mis-  
 sione, & curata fluxione, ad obstructionem veniendum est, eam aperien-  
 tes attenuantibus medicamentis, constructis ex decocto borraginis, ci-  
 corei cum radicibus, capillorum veneris, cum syrupis capillorum ve-  
 neris, borraginis, oximelle, & similibus. Aperta obstructione, si na-  
 tura rectè euacuat, nil est efficiendum: si verò non euacuat, aut dimi-  
 nutiù euacuat, tunc oportet purgare. Et tandem potu aquæ frigida  
 febris curanda. Vsus Alexipharmacorum nullus est, imò hæc quocun-  
 que tempore nocent, quia sunt crassa, & obstruentia, neque habent in  
 hac febre qualitatem contrariam. Hac ratione curamus in hac valenti-  
 na ciuitate contemnentes lenticulas, ac si non essent, cum felici succes-  
 su: quia exercemus ea, quæ rei natura docet, & experientia (quæ in  
 ciuitate multa est) confirmat. Neque mirandum est multos in Bethica  
 regione mori, cum prauè curetur, imò tota medicorum curatio ex insti-  
 tuto videtur excogitata ad hominum perniciem. Quid de symptomati-  
 sis in hac febre apparentibus? Hæc febris cum sit continua pro varia  
 corporis dispositione, modò phrenitim, modò lethargum, modò alia sym-  
 ptomata inducit, quæ non solum in hac, sed & in aliis continuis febribus  
 etiam euenire solent.

### De tertiana exquisita. CAP. III.

**E**xquisita tertiana, febris intermittens est, à sola bile *Definitio.*  
 flaua: proueniens extra venas putrefacta, quare pe-  
 riculo caret, ut docent Hippocrates & Galenus A-  
 phorismo 43. libri quarti, etiam si sit acutus morbus autore  
 Galeno comment. 20. lib. 3. cuius contrarium tradere vide-  
 tur comm. 30. lib. v. aphor. in initio. Duplex est tertiana syn-  
 cera, prima vnica, altera duplex: vnica verò est, cum tertio  
 quoque die semel accessio fit. Altera duplex, scilicet ea cum  
 bis



# DE CVRAND. MORB.

bis accessio exquisitę bilis fit, vel quolibet die solius bilis accessio apparet.

**Causę ex-** Externę causę sunt similes causis febris ardentis, quam  
**quisitę ter-** uis minores, Galeno autore comment. 59. lib. 4. aph. Vtraque  
**tiana.** a flaua bile fit, interna est bilis flaua mota per corpus totum  
**Signa ter-** & extra venas putrescens, autore Galeno eodem commen-  
**tiana ex-** tario. Hęc tertiana exquisita statim ab initio in singulis ac-  
**quisitę.** cessionibus affert rigorem vehementem, pungentem, ac vul-  
nerantem: quia mouetur acris humor per partes sentientes  
& in hoc differt ab ardenti febre, in qua non accedit rigor  
nisi ante crism bonam, vel malam: bilis quoque vomitu ex-  
pellitur. Est in hac tertiana syncera ordo exactus, & æquali-  
tas pulsuum, qui in augmento accessionū ad vehementiam  
ac magnitudinem, atque frequentiam excitantur. In vigore  
fitim inuehit magnam, post calor æqualiter per totum cor-  
pus diffunditur, & primo cōtactu sentitur plurimus, ac mor-  
dax, & statim a manu tangente vincitur. Et ferme semper de-  
finit cum sudore accessio, quę intra duodecim horas termi-  
natur: si verò diurnior, ac longior fuerit accessio, non est  
exquisita tertiana. Vrina eius similis est vrinę eius, qui febre  
ardente corripitur.

**Curatio.** Curatur quatuor remediorum generibus. Primò, victu si-  
**Victus.** mili ardentis febris, per omnia fere: quamuis hęc tertiana  
**Aduerte** remissioribus egeat, & in ipsa accessione æger nullo modo  
**quando in** sit nutriendus, Hippocr. autore aphor. 11. primi libri, nisi fa-  
**accesione** cultas esset imbecilla, aut natura ægri biliosissima parata ad  
**cibandus sit** hecticam, qua in re non solum est cibus dandus in ipsa ac-  
**æger.** cessione, sed in eius tempore deteriori, in statu scilicet. Præ-  
ter hęc ante ipsam accessionem, saltem per septem horas est  
nutriendus, & post ipsam: semper tamē sequi oportet, quod  
docet Hippocr. aph. 17. lib. in vigore tamen accessionis æger  
bibat copiosę aquam frigidam hordei cum syrupo violatō,  
vel saccharo, præsertim si bilis sit concocta: sudore enim su-  
perueniente statim finietur accessio, & etiam totus morbus.

**Signum le-** Somnus maximē nocet in principio accessionum, & in aug-  
**thale.** mento minus, & in vigore forsan, nocet, in declinatione  
maximē iuuat, in qua si noceat, est signum lethale, cum Ga-  
leno com. 1. lib. 2. aph.

**Prępara-** Secundò, apparantibus bilem, de quibus dictum est cap.  
**tio.** superiori tertio genere remediorum, & i. c. primi libri.

**Purgatio.** Tertio, vacuantibus bilem in die post accessionem quar-  
tam, quę solet esse status huius morbi, præsertim quando fi-  
nitur in septem circuitibus, aliquādo vnico, vel duobus cir-  
cuit



nitibus terminatur: intellige de vacuatione, quæ fit per in- *Aduerse*  
 priora. Nam in ipsa accessione non est faciendâ vacuatio ab  
 te, ne addamus laborem labori: per vomitum verò initio,  
 per sudorem in fine accessionum sæpe natura, & ars ipsam  
 quens solent euacuare. De medicamentis, quæ bilem pur-  
 ant, simplicibus, & compositis dictû est cap. superiori quar-  
 genere remediorum, & primo cap. 1. lib. & in multis aliis  
 cis, præcipuè 1. 3. & 4. cap. primi libri.

Quartò, refrigerantibus, & corroborantibus cor, iecur, *Alteratio*  
 nes, & totum corpus, internis, & externis dictis quinto ge- *& corro-*  
 nere auxiliorum, cap. præcedenti: quamuis hîc paulò mitio- *boratio.*  
 conueniant.

## De tertiana exquisita. CAP. III.

## Scholium.

**E**Xquisita.) Terciana intermittens, ex bile putrescente in  
 loco obstructionis fit. Dico in loco obstructionis, quia bilis flava  
 flava tenuis cum sit, obstruere non potest: omnis enim ob- non ob-  
 structio ex Galeno fit à tribus causis, ab humore multo, crasso, aut leni struit.  
 : At bilis non potest esse multa, quia per multum Galenus 10. meth.  
 p. 2. plethoram intelligit, quam bilis sola efficere non potest. Bilis e-  
 am neque crassa est, neque glutinosa. Fit autem febris ex bile hac  
 tione, quando ab humore crasso aut lento obstructio est in aliqua ve-  
 , bilis adueniens perficit obstructionem, & cum ipsa abundet, pu-  
 refit nò difflata, et hac ratione generat febrē. Est autē hæc intermit-  
 ns, quia quando incipit putrescere bilis in foco putredinis, expellitur  
 tra rassa per sentientia membra: ubi putrescit omnino, et facit accesi-  
 onē, quæ ut in plurimum sudore finiatur. Dices, nōne bilis vitellina, Obiectio,  
 porracea, possunt obstruere? Respondeo id concedendo, quia cras- Solutio  
 sunt. Neque cum Gal. 1. de arte curatiua ad Glauc. scribit hanc fe-  
 rem fieri ex concitata bile flava, per concitatum bilem intelligit tur-  
 rentem, sed bilem per habitum corporis motam. Signa febrium pu-  
 rium in genere habes, lib. 1. de diff. feb. cap. 7. Signa verò tertianæ ex-  
 quisitæ, lib. 2. cap. 3. & 1. de arte curatiua ad Glauconem.

Curatur quatuor remediorum generibus.) Si vires consent *Victus.*  
 que ad statum, tenui victu utere, ut ptisana. Quod si vires langui-  
 ores fuerint, victum augentes exhibebimus gallinæ pullum, aut gal-  
 nam. Post concoctionem crassiori victu utemur, (cerebellis suum, pe-  
 bus, carne porcelli & aliis) ut probè hominis substantia, (quæ mul-  
 um dissipata est) resarciatur. Tum quia hæc alimenta facile corrumpi  
 non possunt, imò qualitatem bilis retundunt. Quod si vires sint lan-  
 guide, misce cum eis quæ obstructiones aperiunt, malua utitur etiam  
 Galenus, lactuca, & arriptide, quæ frigida sunt. Omis utemur etiam

A

ante



## DE CVRAND. MORB.

ante coctionem decoctis cum paucis petroselino. Ex fructibus pira cocta cum paucis cinnamomo & saccharo optima sunt: pira enim refrigerant, cinnamomum adstrictionem corrigit, & saccharum aperit. Pruna etiam, & cerasa ceduntur, ex piscibus saxatiles: turdus, in lis, phichis, sparus. Vinum ante coctionem ob consuetudinem, aut sit aquae vehiculum concedatur, ac proinde debet esse paucum. Post coctionem liberalius dandum, quia urinam & sudorem mouet.

Secundo, apparantibus bilem.) In tertiana hi sunt affectus: calor, putredo, prohibita transpiratio, obstructio ab humore crasso & fluxio humoris ad obstructionem: unde curatio debet incipere In tertia sanguinis missione. Multi imò omnes affirmant, Galenum in libro a na Galen. tis curatiue omisisse sanguinis missionem, & incepisse à refrigeranti sanguinem bus, propter febrem, quae magna est. Decipiuntur tamen, quia ibi mittit. tiam consiliu sanguinis missionem, ut qui indicationes intelligit, videre poterit. Ibi enim postquam scripsit: contrariorum contraria esse remedia, quae quod superat reprimant, quod autem deest, sarciant. Fluuae autem bilis humor, omnium qui in corpore sunt humorum, calidissimus ac siccissimus est, itaque exinanendus est: haec Galenus. Si bilis est exaniniada qua alia ratione quaso, nisi in principio sanguinis missione: & post coctionem purgatione? dices in hac febre non sunt vires. Respondeo verum esse vires deficere ad euacuandum, non autem ad reuellendum. Quod si adeò imbecilles sint, ut sanguinis missionem non ferant, multum refrigerantibus uti. Quae acrimoniam bilis temperabunt, & sic retardabunt eius impetum. Ex Galeno enim 3. de san tu. bilis cum impetu fluens perficere potest obstructionem, quae si sensim moueatur, eam exterget.

Secundo, apparantibus bilem.) Sedata fluxione humoris biliofi ad focum putredinis, quod ex coctione incipiente deprehendes: quod tempore iam incipit augmentum. Tunc non ad preparandam bilem Obstructio ut dicit auctor, sed ad curandam obstructionem veniendum est. Quae curatur. curabitur syrupis refrigerantibus ob febrem, & aperientibus propter obstructionem, qualia sunt syrupus endiuiae, borraginis, acetosae. Obiectio. tatis citri cum decocto hordei, cichorei, borraginis, & endiuiae. Dices, i augmento non licet sanguinem mittere: Respondeo bene licere, qui tunc adhuc est fluxio, neque multum diuertimus naturam.

Purgatio. Tertiò, euacuantibus bilem.) Aperta obstructione si natura non expurgat bilem, tunc eam purgabimus extra accessionem tamen ne impediamus naturae motum, qui ad externa fit. Considerare autem oportet motum humoris, qui si lateat, quia natura nullam tentauit euacuationem, tunc per intestina, per quae solet communiter natura euacuare bilem, purgabimus. Per deiectionem purgat Galenus absinthio, quod deiectione, & per urinas optime euacuat, obstructions aperit, ventriculi que os roborat. Per urinas purgat decoctum apii. Per sudorem



sudorem autem balneum dulcis aquæ, quod humectat corpus, & excrementa, per habitum corporis euacuat: refrigerat etiam ex accidenti, euacuatis calidis excrementis.

Quartò, refrigerantibus.) Si putredine euacuata intemperies Refrigerat aliqua calida remaneat in iecore, corrigenda est ea ratione, qua doctus iecoris cet auctor in fine capitis superioris: omitte tamē descriptionem cardiacam ibi descriptam, quia continet aurum & alia inutilia.

## De Tertianā notha, seu spuria.

### CAPVT IIII.



Tertiana notha, seu spuria, est febris intermittēs, *Descriptio.* quæ fit ex flauâ bile vincēte, & pituita pauciore: & hæc dicitur a barbaris maioris famæ: quia sæpius accidit: vel a bile flaua domināte, & atra bile pauciori, putridis extra venas, & per totum corpus: & hæc dicitur a barbaris minoris famæ, qui rarò accidit. *Externæ Causæ.* Causæ sunt omnes, quæ bilem simul, & pituitā gignunt, vt de ipsa agamus, quæ magis accidit. Sed vincētibus causis bilem generantibus vide, quæ diximus capite 2. huius libri, & capite sequenti de quotidiana, & ex iis compara tecum causas: notæ enim mixtæ sunt, non simplices, vt in syncera, & *Notæ.* exquisita tertiana, aut in quotidiana pura: & ideo incipit accessio cum rigore mitiori, & leuiori, quam in exquisita tertiana: licet sit longior horror, sentiatūrque frigus actu, a frigidis enim humoribus humor syncerus, & vehemens fieri nequit. Longius etiam principium est accessionis, quemadmodum omnia tempora accessionis & etiam totius morbi: nam excedit duodecim horas, & quantò maior est accessio, tanto magis ex pituita gignitur: & quantò longior accessio, tanto totus morbus longior: aliquando enim incipit tertiana notha initio autumnus, & finitur vere: exquisita verò longissima septem circuitibus iudicatur. Sitis in hac est minor, & sudor: quamuis aliquando ægroti sudent copiose, quòd si frigidus sudor fuerit, maximam indicabit longitudinem. In ventre apparent obstructiones, aliquando in hepate, & aliquando in splene. Quod si in membris drities aliqua fiat, hydropem indicat imminētem. *Curatio.* Curatur sex re- *Victus.* amediorum generibus. Primò, victu refrigerante, & hume- ante magis, quàm calfaciente & exiccante, habita ratione multitudinis vtriusque humoris, quæ per signa cognosci potest: ideoque Galen. primo artis curatiuæ ad Glauconem optimè miscet parum piperis cum cremore hordei non nimis tenui, quia morbus hic diuturnus est, duratque multos

A 2 men



# DE CVRAND. MORB.

- menes, aliquando sex: semper tamen nutriendus est æger extra ipsam accessionem vel in declinatione ipsius, nisi æger fuerit imbecillus, vt diximus capite præcedenti. Nutriatur ergo iure gallinæ teneræ, & carnibus arietinis cum hordeo excorticato, & paucis ciceribus nigris, vel radice petroselin. Nutriatur quoque carnibus ipsius gallinæ non solum elixæ, sed etiam assatæ, & pullo gallinaceo, coturnice, perdice, & hædo, & frusto aliquo cuniculi. In initio cœnæ comedat cappares sine sale, & cum saccharo, vel senationes cum melle, & aceto, vel folia raphani, & similia. In fine verò cortices citri saccharo conditos, vel nucleos pini conditos etiam saccharo, & similia. Potus sit aqua cinnamomi, vel aqua ceterach, seu scolopendriæ Græcorum, non officinarum, quia est lingua ceruina, & phyllitis Dioscoridis, quæ astringit. Quod si appetitior vini sit, debet album parari, vel rubrum tenuis substantiæ. Somnus in primis tribus temporibus accessionis magis nocet, quam in exquisita tertiana. Motus & exercitatio extra ipsam accessionem moderata est utilis, & necessaria, saltem frictio totius corporis.
- Cibus.**
- Potus.**
- De scolopendria.**
- Horroris & frigoris ablatio.**
- Potus vi- ni sedat rigorem.**
- Hepata ranarum.**
- Sectio venæ.**
- Clyster ante sectio- nem venæ.**
- Prepara- tio humo- rum.**
- Secundò, tollentibus horrorem, & rigorem, qui sua longitudine, & vehementia solet ægrum cruciare: vt pannis lini actu calidis partibus extremis admotis, & parti ei, quæ inter testes, & anum interiacet. Oleo ex camomilla, vel lilio, vel rutæ bene calido illis partibus admoto mederi possumus. Paucum vinum, si bibatur, curat hunc rigorem cum horrore: & si sit cum infusione trium radicum plantaginis erit efficacius remedium. Aliqui in hoc genere remediorum laudant tria hæpata ranarum cum paucò vino. Quæ si in initiis trium accessionum sumantur, solent curare hos vehementes horrores, & rigores.
- Tertiò, secta vena cubiti dextra, si fuerint signa sanguinis (de quibus cap. 2. huius libri de febre ardenti diximus) sanguinisque copia extrahatur respondens plenitudini, naturæque ægri, inanito tamen ventriculo, & intestinis per hunc vel similem clysterem: ℞. foliorum maluarum, & folio violarum nigrarum an. m. j. fursuris & camomillæ. an. p. j. seminis carthami ʒ. ij. fiat decoctum, de quo percolato accipe ʒ. xv. in quo dissolue diacatholiconis ʒ. j. benedictæ ʒ. ss. olei violarum ʒ. ij. olei camomillæ ʒ. j. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster.
- Quartò, apparantibus bilem cum pituita, quamuis habitata ratione pituitæ quantitatis, vel qualitatis sint vel augenda, vel multis diebus sumenda calida hac, vel simili forma, vt ℞. syrapi de bizantiis, & endiuix compositi. an. ʒ. ij. rhodom



domellis ʒ.vj. misce. Item ʒ. aquarum capilli veneris, cichoreæ, fœniculi, & endiuia. an. ʒ. vj. misce, vel earundem rerum lb. ij. Hæc sumatur per sex dies, vel si opus fuerit plures his, donec paratus sit humor: quamuis ob sui diuersitatem non vnica sed pluribus vacuationibus indigeat, semper præcedentibus concoctionibus multis.

Quintò, vacuantibus materiam mistam ex bile vincente, *Purgatio*  
& pituita pauciori, vt ʒ. diacatholiconis ʒ. vj. diaprunis so- *Potio*  
lutiui ʒ. iij. diaphœniconis ʒ. ij. rhodomellis ʒ. j. decoctionis  
communis. q. s. misce, & fiat potus. Vel ʒ. pilularum aggre- *Pilulae*  
gatiuarũ ʒ. j. optimi diagridij ʒ. iij. cum aqua buglossæ fiant  
pilulæ septem, & aurentur. Vel ʒ. pilularum de rhabarbaro *Aliæ pilu-*  
ʒ. ij. agarici trochiscati ʒ. j. optimi diagridij ʒ. iij. cum aqua *læ.*  
borraginis fiant pilulæ septem, & aurentur. Aliqui hac notha *Vomit*  
tertiana affecti solo vomitu sunt liberati, vt vult Gal. primo *excitatio.*  
de arte curatiua ad Glauconem, qui si sponte satis non exci-  
gatur, potest arte moueri, syrup. acetoso simp. cum decocto  
seminis raphani, & aliis similibus. Si tamen prior, & vnica  
euacuatio non suffecerit, quemadmodum raro in his nothis  
tertianis sufficit, iterum corroboratis ventriculo, hepate, &  
corde, & refrigeratis per ea, quæ dicemus sexto sequenti ge- *Iteranda*  
nere remediorum, est humor concoquendus syrupis, & me- *euacuatio.*  
dicamentis iam dictis genere quarto præcedenti, vel hoc, aut *Præpara-*  
simili medicamento: ʒ. quinque radicum diureticarum, li- *tio secūda.*  
quiritiæ ana. ʒ. j. capilli veneris, ceterac, cichoreæ, endiuia,  
scabiosæ, absinthij, borraginis an. m. j. fiat decoctum, de quo  
percolato accipe lb. iij. sacchari lb. j. syrupi de bizantiis, & en-  
diuia compositi an. ʒ. iij. trochiscorum de rhabarbaro ʒ. ss.  
pulueris diarrhodonis Abbatis ʒ. ij. pulueris, cinnamomi ʒ.  
j. misce, & fiat syrupus non perfecte decoctus: Dosis vnciæ  
sex quolibet die. Et qualibet hebdomada semel, vel bis fiat *Pilulae.*  
vacuatio per has pilulas: ʒ. pilularum de rhabarbaro, & ag-  
gregatiuarũ ana. ʒ. j. fiant pilulæ xv. & aurentur, si non est pau-  
per, Dosis tres. Si opus fuerit, adde cuilibet earum ʒ. j. opti- *Confectio.*  
mi diagridij, vel si nō amat pilulas, vel nō potest ipsas trans-  
glutire, ʒ. diacatholiconis ʒ. ij. diaprunis solutiui ʒ. j. dia-  
phœniconis ʒ. ss. agarici trochiscati, & conseruæ borraginis  
an. ʒ. ij. rhodomellis quod sufficit, misce, & fiat confectio:  
Dosis cochlearium vnum cum aqua absinthij, vel buglossæ.

Sextò, refrigerantibus iecur, & totum corpus internis, & *Refrigerā*  
externis, & aperientibus obstructions venarum meseraica- *tia et ape-*  
rum, hepatis, & lienis, si fuerint quæ in hac notha tertiana *rientia.*  
saepè reperiuntur, præsertim quando est longa: quamuis ob-



## DE CVRAND. MORB.

**Obstructio** structio curanda prius sit, quàm vacuanda materia, imò sine  
 prius cu- eius curatione nunquam curabitur febris: apparente ergo  
 randa, obstructione fiat totus in ipsa & toto ventre inferiori ex de-  
 quàm va- cocto quinque radicum diurericarum, camomillæ, feminis  
 cuanda lini, fœnugræci, absinthij, præcedenti fotu hoc, vel irrigatio-  
 materia. ne facta spongia bis in die vacuo ventriculo vngatur venter  
 versus splenem hoc vnguento: ℞. olei de capparibus, & a-

**Vnguentū** mygdalarum amararū an. ʒ. j. β. vtriusq; dialthææ, vnguenti  
**spleni ad-** Aragon ana. ʒ. β. armoniaci dissoluti in aceto ʒ. ii. j. ceræ q. s.  
**mouendū,** misce, & fiat vnguentum: adde pulueris trochiscorū de myr-  
 rha ʒ. j.

**Hepati** Hepati laboranti obstructione admoueat hoc, aut simi-  
 le vnguentum: ℞. olei amygdalarum amararum vnciam j.  
 olei nardini ʒ. β. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum.  
 Et si opus fuerit vti non solum externis dictis, sed aliis, & in-  
 ternis ad has obstructions necessariis, vide quæ diximus ca-  
 pitibus 42. & 45. primi libri. Curatis his obstructionibus, at-  
 que euacuata iam materia, refrigeratio, & corroboratio per  
 electuarium diarrhodon. Abbatis facta per aliquot dies erit  
 utilis, & necessaria, sumptis quolibet die drachmis quatuor

**Refrigera** cū pauco vino albo aqua diluto. Et hepati admoueat hoc,  
**zio & cor-** vel simile vnguentum, ℞. vnguenti santalati ʒ. j. β. olei nar-  
**roboratio.** dini ʒ. β. pulueris diarrhodonis ʒ. j. misce. Si ventriculus la-  
**Hepati.** borauit aliqua imbecillitate, ei admoueat hoc, aut simile  
**Ventricu-** vnguentum: ℞. olei de absinthio ʒ. j. olei laurini ʒ. β. pulueris  
**lo,** gariophyllorum, cinnamomi, & rosatæ nouellæ an. ʒ. β. ceræ,  
 q. s. misce, & fiat vnguentum. Et si opus fuerit, vide alia scri-  
 pta cap. 31. de imbecillitate ventriculi libri primi.

## De tertiana notha. CAP. IIII.

### Scholium.

*Que sit  
 tertiana  
 notha.*



**T**ertiana notha.) Tertiana notha, aut spuria, potest fieri  
 à bile vitellina, quæ crassa est, & hæc raro contingit: aut  
 à permixtione humorum crassorum cum bile. Frequenter  
 autem solet accidere ex permixtione pituitæ cum bile. Et  
 ideo symptomata habet non bilis sincere sed confusa & mixta, ut re-  
 ctè docet auctor.

*Victus in  
 morbis.*

**Primò,** victu refrigerante.) Galenus in lib. 1. de art. cur. in mor-  
 bis, inquit, victus ex morbi longitudine, & virium robore, virium ro-  
 bur ex pulsu, cognoscimus: Morbi verò longitudinem, & breuitatem,  
 ex humoris morbum facientis natura, & aliis symptomatis. Nam si  
 humor sit pituitosus, longior erit morbus, quàm si sit biliosus. Tum si  
 singulis accessionibus nulla fiat vacuatio, rigor sit exiguus, accessio-

que



ne perduret, signum est morbum esse longum: si contra res eueniat, reuiorem. Si ergo vires sunt robustæ, & morbus coctū difficilis, inedia conducet. Quia hoc victu nec morbus augebitur, nec vires concient, quæ ob robur sufficient, & sive ad morbi coctionem; quem vincent um non impediuntur ab alimento. Quod si vires sint languidæ, & morbus facilis coctionis, vtendum erit victu crassiori, quia etsi alimentum humorem augeat, cum facile coquatur, à viribus robustis vincetur. Hos duos modos solum adducit Galenus, quia ex his facile est tertium inuenire victum, qui in morbo contumaci, & viribus languidis imperandus est. Hic victus tertius mediocris esse debet, nec tam tenuis, ac in virtute robusta, nec tam crassus, vt in his, qui vires habent languidas, cum morbo facili coctu coniunctas. Corroborabimus ergo vires, sed non adeò vt malum augeamus, quod contumax est. Hinc colligemus *Victus in quo victu sit vtendum in hac tertiana, quem ex longitudine morbi, & tertiana, viribus debemus instituere.* Quod difficile est, posse exacte præstare, cum sint contrariæ indicationes, quæ ex morbo, & virtute sumuntur. Consulentes enim vni, alteri officimus. Quantum enim inedia morbo est utilis, tantum deicit vires, quas in hoc morbo oportet seruare, cum debeant longiori tempore laborare.

Secundo, tollentibus horrorem, & rigorem.) Radicem plantaginis proprietate valere contra rigorem, & horrorem, sentiunt multum. Quod ridiculum est, magis autem quod scribit auctor, de tribus herpatibus ranarum, quasi duo, aut quatuor non possent prodesse, si verum esset facultate occulta agere, ita vt ex ipsis utilitas sequeretur. *Aliqua med. camē- ta contra horrorem irridetur.*

Tertio, secta vena.) In hac febre sicut in aliis putridis, supradicti. Sectio venæ. Et affectus sunt considerandi. Et cum indicatio à febre non vrgeat: na. sicut in supradicta, proinde Galenus nullam mentionem fecit refrigerantium, & humectantium, incipienda ergo erit curatio ab obstructione fiente, siue ab humore, qui eius est causa. Hunc reuellemus mittentes sanguinem (etsi non sint signa sanguinis) si tamen vires consent. Dices, hæc febris non est magnus morbus, ergo non licebit in ea sanguinem mittere, cum ex morbi magnitudine, & virium robore de hoc remedio deliberemus: Respondeo, verum esse, nos non mittere sanguinem propter magnum morbum præsentem, sed propter alios morbos graues imminentes.


Quarto, apparantibus bilem.) Sanguine misso diuretica medicamenta propinabimus. Non quod velimus, urinam ante coctionem in medicamentum mouere, hoc enim non est faciendum: sed quia diuretica aperientia sunt. Et ita propter obstructiones ea propinamus, dummodo non sint multum calida & secca, ne febre augeamus. Vtemur ergo syrupis his oxymelle simplici, syrupo endiuie compositio, borraginis, fumiterre, & aliis cum aquis quinque radicum, cichorei, borraginis. Si hæc non sufficiunt potissimum hyeme & aliis temporibus, in quibus humor con-



# DE CVRAND. MORB.

- Apozema-** tumax est, vii poteris *Apozematis*: quæ sunt syrupi longi ex syrupi  
**ta.** aquis, trochiscis et aliis compositi. Licet etiam vii syrupo de absinthio  
**Absin-** aut decocto, non ante septimum diem: Quia ante septimum diem cru-  
**thium,** ditates multæ sunt in ventriculo, quæ ab absinthio impinguntur ex  
 de san. tu. At cum post septimum diem tenui victus ratione, humore  
 sint cocti, vtiliter tunc absinthio utemur, quod roborat interna viscera  
 & deobstruit. Coctionem humoris iuuabimus quiete, quia in hac calor  
 non mouetur ad externa, vt in exercitio. Fomentis etiam externis, vi-  
 gentes iecur, ventriculum & lienem oleo de absinthio vt calefiant, &  
**Balnea.** roborentur. Balnea ante coctionem inutilia sunt, tum quia in hac febre  
 non est necessaria corporis humectatio: Tum quia augent obstructio-  
 nes: Tum quia humores crassi à balneo non poterunt euacuari. Post co-  
 ctionem non adeò audacter eo utemur ac in tertiana exquisita, pro-  
 pter dictas causas: semel tamē & bis ipsum concedemus, vt melius hu-  
 mores coquantur. Clysteribus fortioribus vii oportet ex chamemelo, ru-  
 ta & aliis cum agarico, aut diaphenicone, & hiers.  
**Purgatio.** Quinto, euacuantibus.) Recte purgat auctor. Aduerte tamen,  
 quod si materia impetum fecerit ad vrinæ meatus, tunc vtendum esse  
 diureticis. Vomitus vtilissimus est, hic tamen non est ciendus, nisi na-  
**Vomitus.** sea præcedat. Facilius autem est post cibum vomere, quia permiscen-  
 tur excrementa cum alimentis.

## De Quotidiana. CAP. V.

- Diuisio.**  uotidiana febris duplex est, altera intermittens,  
**Causæ.** quæ fit à pituita extra venas, & per totum corpus  
 putrida, singulis diebus accidens: altera sine inter-  
 missione, quæ fit à pituita putrida in venis. Vtriusque febris  
**Signa.** causæ sunt alimenta pituitosa, vt pisces, herbæ frigida, le-  
 gumina, & otium. Quotidiana intermittens haud qua-  
 quam cum rigore primo statim die inuadit, sed temporis  
 progressu, refrigeratio potius, quam rigor occupat: & quan-  
 to pituita est frigidior, tanto maior est refrigeratio. Quare  
 in ea, quæ ex acida, vel vitrea contingit pituita, erit maior,  
**Pulsus.** quam in ea, quæ ex dulci generatur. Pulsus, cum primū  
 accessio fit, inordinatus est, & inæqualis, tardus, paruus, ac  
 debilis. Neque in augmento magnitudo, velocitas motus,  
**Calor.** & frequentia quotidianæ accidunt: Calor illi non tam a-  
 cris, ac in tertiana, neque multum, ac crebro spirare compel-  
 lit, sed anhelitus expirationes humida, fumosa, & multum  
 vaporosa sunt. Tardē ac aggre acceditur, ac tempus longum  
 consumit, dum ad summum inualecendo peruenit. Non fi-  
 tiunt ii; vrinæ albæ, aquosæ, tenues, vel crassæ, aut turbulen-  
**Vrina.** te. Nullus sudor in primis diebus erumpit, neq; exacta quies  
 apparet



oparet donec ad finem totius morbi deuentum sit. *Spatium* *Spatium*  
 accessionum est decem & octo horarum, & quietis falsę sex.  
 las omnes notas, & plures alias scribit Gal. primo de arte  
 curatiua ad Glauconem, & secundo de differentiis febrium, *Febris quo*  
 secundo de crisi-*bus*. Sed quia Hispani, & qui habitant ca-*ridiana* *ra*  
 das regiones rarissime his febribus exquisitis laborant his *risima a-*  
 rætermis ad curationem ipsam accedo. *pud nos.*

Curatur quinque remediorum generibus. Primò, victu *Curatio.*  
 incidente, & extenuante, de quo capitibus septimo, & octa-  
 o, & aliis locis prioris libri dictum est, dummodo non nu-  
 triatur nisi in fine accessionis, & extra ipsam, nisi deficerent *Victus:*  
 ires. Victus quoque non sit tenuis propter morbi longitu-  
 dinem: Nutriatur ergo iure columbi cum ciceribus, & radi-*Cibus.*  
 e petroselin, vel iure gallinæ cum eadem radice, & foliis  
 raphani, vel perdice, vel turture & similibus cum pipere,  
 cinnamomo, croco, & aliis aromatis.

Potus sit aqua cinnamomi, vel radicis petroselin. *Potus.*  
 Secundò, corridentibus rigorem, vel potius frigus oleis *Frigoris*  
 calidis spinæ toti admotis, vt rutę, lauri, de lilio, de castoreo, *correctio.*  
 & extremis apponantur panni bene calidi. Drachma vna  
 heriacæ magnæ, vel mithridati, vel rubeæ trochiscatæ cum  
 pauco vino, decoctionis rutæ, saluiæ & abrotani est opti-  
 mum remedium, in hoc præcipue post 14. diem, & parum  
 purgato corpore.

Tertiò, concoquentibus pituitam medicamentis dictis *Concoctio.*  
 primò c. & aliis de morbis pituitosis prioris lib. per 8. vel 10.  
 dies.

Quartò, vacuantibus pituitam exhibitis tempore falsæ *Purgatio.*  
 quietis: de quibus dictum est cap. i. & aliis prioris libri. Ali-  
 quando est utilis vomitus in hac febre, præcipue si natura  
 indicauerit, quem decocto seminis raphani, & anethi cum  
 oxymelle simp. poterimus prouocare.

Quintò, corroborantibus ventriculū, & hepar: vt electua- *Vomito-*  
 rio rosatę nouellæ, aromatico rosato Gabrielis, theriaca ma-*rium.*  
 gna, mithridato, conserua acori, sticados. Dosis horum est 3. *Corrobo-*  
 vna vsque ad 3. ij. cum vnciis duabus, vel tribus aquæ vel ratio.  
 decocti foeniculi, anisi, petroselin, melissæ, & similitum.

## De Quotidiana. CAP. V.

## Scholium.




Quotidiana febris duplex est. ) Quotidiana febris à pi- Quotidia-  
 mita putrescente ortum habet. Cuius signa lege apud Gal. na.  
 lib. 2. de diff. feb. c. 4. In hac febre (putrida cum sit) affectus  
 super



## DE CVRAND. MORB.

**Signa.** Superius cap. I. explicata, considerare oportet, ut recte curetur. Debe-  
**Curatio.** mus enim incipere à causa obstructionis, quæ est humoris fluxio. A-  
 An in quo autem eam debeamus sanguinis missione auferre, nec ne, distinctione  
 tidiana fit est opus. Si enim succi crudi in hac febre abundant, multi sint, et pau-  
 sanguis cus sanguis cum ipsis permixtus, tunc non licet sanguinem mittere  
 mittendas. quia non constant vires. Quod si sanguis plurimus sit, & humores  
 Curatio ob crudi plurimum non excedant, sanguinem mittemus: quia est robu-  
 structionis. virium. Sanguine misso, cum obstructio fiat ab humore crasso, & glu-  
 Interpretatio inoso, inscindentibus, & urinam mouentibus, (quæ vim habent ape-  
 tio loci Ga riendi) vtendum erit, in primis diebus (vt ait Gal. ar. cu. ad Glau-  
 leni. aut vt vertit Leonicens, post primos dies. Acachia, Mena et alii pri-  
 mam lectionem sequuntur; nos secundam. Quamuis enim vtraque le-  
 Etio tollerari possit, secundam tamen elegimus, quia melius est primi-  
 diebus uti inedia, sic enim coquantur humores in ventriculo contenti  
 Ventriculi & hac ratione post primos dies melius attenuabuntur. Extenuantia  
 ratio ha- quibus vtendum est, sunt oxymel, syrupus de stechade, rhodomel me-  
 benda. licratum cum decocto feniculi cichorei et similium. Circa statum opus  
 Quies. est ventriculi (vbi pituita generatur) rationem habere, ita vt in ipso  
 Vntio. recte humores coquantur. Quietem ergo imperabimus, & exterius  
 vngemus ventriculum corroborantibus, oleo irino, mastichino, de ab-  
 sinthio, nardino, & similibus: quæ calorem ventriculi augment, & ip-  
 sum confringunt: quod post coctionem faciendum est, sicut & romi-  
 tus post coctionem mouendus, decoquentes semen radicula, & oxyme-  
 permiscentes. Post humoris coctionem, eum purgabimus, diaphanico-  
 ne, hiera & allis. Viñtum ex cap. superiori institues. Aduerte tamen  
 in hac febre non esse multum calidis medicamentis vtendum, quia ex  
 4. de san. tu. in his, qui cruditatibus laborant, eas ad venas deducunt  
 maiores.

## De Quartana. CAP. VI.

**Diuisio.** uartana duplex est, quædam continua, quæ fit, ex  
 atra bile putrescente in venis: altera intermittens,  
 quæ fit ex atra bile extra venas, & per totum corpus  
 putrescente. Et hæc duplex est, vna intermittens quartana,  
 cuius accessio accidit quarto quoque die, vel duplex, cuius  
 Causa. duo circuitus sunt in quinque diebus. Accessio primi re-  
 spondet quarti diei accessioni, & secundi accessio quinti diei  
 accessioni, tertius verò est dies quietis tantum. Cuius causæ  
 sunt alimenta melancholica vt falsa omnia, carnes hircinæ,  
 bubulæ, leporinæ, ceruinæ, cochleæ, legumina, animi & cor-  
 poris labores immodici, & aliarum febrium longitudo, præ-  
 Nothæ. cipue si fuerint sine ordine, & autumno. Hæc febris non sta-  
 tim, & primo die cum rigore vehementi, inuadit, sed talis  
 est



qualis iis, qui frigesunt gelu vehementi, progrediente  
 adaueta febre vna cū rigore augetur, inualefcitque quo-  
 ie vsque ad totius morbi augmentum. Sensus rigoris non  
 pungentis, & stimulantis cutem, sicut in exquisita ter-  
 na, sed inducentis algorem vehementem, & tanquam of-  
 frangentis. De differentia rigoris, tertianæ, & quartanæ  
 de Galenum 2. de differentiis febrium cap. 5. & 2. de crisi-  
 s cap. 3. Et si vis scire, an frigidi humores rigorem efficere  
 leant, vide commentarium doctissimi Valleriolæ cap. 5.  
 ri de symptomatum causis. Pulsus in ea sunt satis tardi,  
 in principio accessionum rari, & duri, in augmento, & vi-  
 re fiunt veloces, & frequentes: quamuis si conferantur  
 m pulsibus febrium biliosarum, & sanguinearum, sint tar-  
 iores, & rariores: in hac enim paulatim humor veluti la-  
 s, aut testa, aut os succenditur, & semel incensus diu con-  
 ruatur. Quare longiores sunt accessiones, & morbus lon-  
 ssimus eit, fere semper durat vnum annum, aliquando  
 uos, & quandoque duodecim annos scimus durauisse: atra  
 nim bilis vehementer resistit, & tardè mouetur: ægri cutis  
 ra est, & densa, & tempus, in quo fit frequentius est inæ-  
 uale, autumnus videlicet, vrinæ ægrotantium sunt tenues,  
 bæ, & aquosæ.

Curatur sex remediorum generibus. Primò, victu humi- *Curatio.*  
 o, & parum calfaciente, vt iure arietis & gallinæ cum bu- *Victus.*  
 lossa, & borragine, & aliis omnibus dictis capite nono prio *Qui cibi*  
 s libri dummodo æger sumat alimentum extra accessio- *vitandi.*  
 em, nisi vires deficerent. Cauendum est, ne sint alimenta *Potus.*  
 atuosa, & melancholica, vt legumina salsa, & alia similia  
 is. Potus sit vinum rubrum mediocris substantiæ, & ætatis  
 mediæ, dilutum aqua decoctionis radicis buglossæ. Utatur  
 quiete corporis, & animi, & somno. Bis saltem in hebdoma- *Clyster.*  
 a venter hoc, aut simili clystere leniatur, & lubricetur: ʒ.  
 oliorum maluarum, mercurialis, borraginis & buglossæ, an.  
 n. j. epytimi ʒ. ss. furfuris p. prunorum damascenorum paria  
 ex, fiat decoctum, de quo percolato accipe libram vnā se-  
 nis, cui adde diacatholiconis ʒ. j. confectionis medicaminis  
 Hamec, ʒ. ss. oleorum sesamini, & camomillæ, an. ʒ. ij. butyri  
 recentis ʒ. i. misce, & fiat clyster.

Secundò, si omnia ferme sanguinis signa adsint secta ve-  *Sectio ve-*  
 na interna cubiti, dextri, & misso sanguine, qui plenitudi- *ne.*  
 ni, & viribus respondeat autore Galeno primo de arte cu-  
 ratiua ad Glauconem: quamuis in hac longissima febre  
 sanguis parçè est mittendus. Aliqui lienis venam secant in  
 hac



# DE CVRAND. MORB.

*An secunda* hac febre. Sauanarola vir doctissimus in ipsa coniunctione  
*da sit re-*secat iecorariam sinistram, & se multos laborantes quartana  
*na iecora-*na pristinae saluti restituisse dicit.

*ria sinistra* Tertio, post tres menses ab initio febris concoquentibus  
*Concoctio* & apparantibus atram bilem, de quibus cap. 1. & 9. prior  
*Syrupi.* libri dictum est: Sed propter tyrones: ℞. syripi borragini  
*Aqua vel* & buglossae. an. 3. viij. syripi de fumo terrae simp. & de epithymi  
*decoctum.* mo. an. 3. iij. syripi de scolopendria. 3. iij. misce: & ℞. aquarum  
buglossae, borraginis, scolopendriae, & capilli veneris ana vncias decem, vel decocti horum libras tres semissem.

*Purgatio.* Quarto, materia aliquo modo appaata vacuanda est  
*Potio.* hoc, vel simili medicamento: ℞. diasenae, & medullae cassiae  
fistularis recens extractae. an. 3. ℞. pulueris epythimi, 3. ij. si  
decocti florum cordialium quod, s. misce, & fiat potus, quem  
in secundo die quietis accipiat, si vnica sit quartana: si du-

*Pilula.* plex, in die quietis, si verò continua, in die minoris laboris  
Qui non possunt purgans liquidum bibere, vel statim ipsum  
euomunt, has, aut similes pilulas hora consueta sumant  
℞. pilularum Indarum, & de fumo terrae an. 3. ℞. optimi dia-  
gridij grana quinque, cum aqua buglossae fiant pilulae se-  
ptem, & aurentur. Post debitam vacationem propter siccita-  
tatem à pilulis relictam loco iuris sine sale, bibat vncias sex  
decocti fructuum & florum cordialium vncias duabus sac-  
chari.

*Admoni-* Sed quia haec materia est eterogenea, & terrestis, non fa-  
*tio.* tis est vna preparatio, & purgatio, sed pluribus eget, dum-  
modò inter eas corpus, & partes corroborentur medicamen-  
tis, quae dicemus in quinto remediorum genere: hic tamen  
syrupus est optimus, & probatus in huius materiae prepara-  
tione: ℞. pimpinellae buglossae, borraginis, lupulorum, an.  
m. ij. capilli veneris, scolopendriae, absinthij, an. m. j. fiat de-  
coctum: de quo percolato accipe ℞. ij. cui adde succorum si-

*Syrupus* ne residentia borraginis, endiuiae, & foeniculi. an. ℞. j. succi  
*preparans* pomorum redolentium. ℞. iij. sacchari, quod, s. misce, & fiat  
*materiam* syrupus. Dosis vnciae tres cum aqua, vel decocto scolopen-  
*secundo* driae, & borraginis. Post cuius vsum fiat vacuatio hoc, aut si-  
*loco.* mili medicamento, ℞. cassiae fistularis recens extractae. 3. vj.  
diasenae, & confectionis medicaminis Hamec, an. 3. iij. deco-  
cti florum cordialium facti in sero caprino addendo parum  
epithymi quod s. misce, & fiat potus. In hebdomada semel  
fiat vacuatio per hanc mixturam: ℞. diacatholiconis, diasenae,  
an. 3. j. ℞. confectionis medicaminis Hamec, 3. j. pulueris  
epithymi 3. iij. conseruae buglossae. 3. vj. syripi borraginis,  
quod



Modo f. misce, & fiat confectio: Dosis cochlearia duo. Ali- *Confectio.*  
 ando tamen initiis accessionum est conueniens vomitus *Vomitus*  
 arte factus, & a natura: quamvis hæc materia suo ponde- *laudatur.*  
 aptius per inferiora expellatur, vt autor est Hippocr. 4.  
 hor. propter causas nobis occultas graue ascendit, & leue  
 scendit. Prius natura tentante bibat in initio accessionis  
 cias quatuor decocti seminis raphani, & anethi cum vn-  
 vna oxymellis, vel infusionem, vel decoctum raphani  
 in virtute hellebori in oxymelle simpl. factum.

Quinto, corroborantibus ventriculum, hepar, splenem, *Corroborat.*  
 totum corpus, vt conserua buglossæ, borraginis, cortice *tio.*  
 tri condito, electuario rosatæ nouellæ, electuario diamar-  
 ritonis frigido: Dosis drachmæ duæ cum aqua aut deco-  
 o, vel syrupo absinthij, vel de scolopendria. Hæc confectio *Confectio*  
 in hoc genere optima: ℞. confectiois Gentilis contra *corroborat.*  
 elancholiam, & conseruæ buglossæ an. 3. j. conseruæ borra- *tio.*  
 nis, & corticis citri cum saccharo conditæ an. 3. ℞. pulue-  
 ritia Gal. & latificantis Rhasis, & rosatæ nouellæ an.  
 j. syrupi de pomis. q. s. misce, & fiat confectio: Dosis est o-  
 ni hora cochlearium vnum cum aquis melissæ, & buglos-  
 Si splen laborat obstructione, vel menses, vel hæmorrhoi-  
 es suppressæ sint, considera, quæ diximus cap. 45. 52. & 56.

Sexto, rigorem & frigus curantibus, quamuis hoc sym- *Curatio*  
 ptoma ob sui vehementiam aliquando post secundum ge- *horroris.*  
 nus auxiliorum sit admouendum, præcipue mitioribus re-  
 mediis, vt pannis bepe calidis in initiis accessionum parti-  
 us extremis sæpe admotis, & spinæ similiter, madefactis o- *Vis theria-*  
 is de lilio, de ruta, laurino, & de castoreo. Drachma vna *ca magnæ*  
 theriacæ magnæ, vel mithridati cum paucio vino optimo *& mithri-*  
 urat rigorem, & frigus, & quandoque ipsam quartanam, *dati.*  
 maxime post debitam purgationem. Curat similiter hoc  
 symptoma, & ipsam quartanam drachma vna pulueris se-  
 ualis hypericonis, vel pulueris millefolij cum paucio vino  
 primo. Eandem vim habet drachma vna assæ fœtidæ. Hæc *Confectio.*  
 ixtura est optima in hoc: ℞. pulueris assæ fœtidæ, piperis  
 ongi, rutæ sicce an. 3. ij. mellis quod. s. misce, & fiat confectio: *Puluis.*  
 Dosis drachmæ duæ cum vino optimo, vel aqua roris mari-  
 i, vel saluæ. Hic puluis est in hoc genere optimus: ℞. bac-  
 rum lauri 3. j. zinziberis, & radicis gentianæ an. 3. ij. mis-  
 ce, & fiat puluis: Dosis scrupulus vnus cum vino albo opti- *Vnguen-*  
 to. Rigor, frigus, & alia cum quartana curantur, præsertim *tum.*  
 extrema pannis, regulis, & lateribus ignitis calefiant, &  
 orsum hoc vnguento bene calido vngatur, ℞. theriacæ ma-  
 gne



## DE CVRAND. MORB.

*Curatio* gnæ 3.ij. gatiophyllorum, spice nardi an. 3. j. s. olei antiqui  
*varia.* & optimi vini an. 3. ij. s. omnia prunis imposita vase aliquo

ferueant. Vnguentum Aragon in hoc genere laudatur: Quidam in hoc genere laudant drachmam vnam pulueris cinnei humani cum vino optimo. Alij experientia longa curabant simul rigores, & quartanas succo plantaginis, & aqua. Multi liberati sunt à rigore, frigore & quartana hoc medicamento: ℥. mithridati. ʒ. iij. succi plantaginis 3. ij. misce. Hoc auxilium ter in principiis accessionis exhibitum curat rigorem, frigus, & quartanam: ℥. succi radice thapsi barbatæ, & vini albi odoriferi an. 3. ij. misce. Expertum medicamentum in hoc genere est vnum os de corde cerui redactum in puluerem cum paucis decocto dictami, saluæ, camedreos & camepitos, Pulvis ossis leonis curat rigorem, & frigus quartanæ, vt quibusdam placet. Granum vnum musci cum vino est in hoc genere optimum, præsertim si naribus & oculis admoueat oleum rutæ. Hoc vnguentum est valentissimum in hoc genere: ℥. pulueris castorei, theriacæ magnæ an. ʒ. v. myrrhæ, olei laurini an. ʒ. iij. mellis despumati. lib. s. misce, & fiat ad modum vnguenti, quo initio accessionis vngantur plantæ pedum, volæ manuum, tempora, frons, & pulsus, & nares: sit bene calidum, & bibat drachmam vnā ruberæ tinctorum cum vino optimo. Succus calamenti, si bibatur ante accessionem, curat quartanam: animaduerte tamen, ne hæc nimis calida ante euacuationem exhibeantur, ne ex vna fiat duplex, vel ex intermittente continua. Timor magnus ab inimicis incussus curauit quartanam vnus anni. Quidam initio accessionis in flumen deiectus curatus fuit: quidam etiam subito, & præter spem audiens tonitru artificiale à quartana liberatus est, hoc tamen prudenter fieri debet: nam etiam si gaudium magis possit interficere quam timor, tamen ipse timor magis, quam ira, quæ nullo modo potest occidere hominem, autore Galeno.

*Vnguentum* ti, & vini albi odoriferi an. 3. ij. misce. Expertum medicamentum in hoc genere est vnum os de corde cerui redactum in puluerem cum paucis decocto dictami, saluæ, camedreos & camepitos, Pulvis ossis leonis curat rigorem, & frigus quartanæ, vt quibusdam placet. Granum vnum musci cum vino est in hoc genere optimum, præsertim si naribus & oculis admoueat oleum rutæ. Hoc vnguentum est valentissimum in hoc genere: ℥. pulueris castorei, theriacæ magnæ an. ʒ. v. myrrhæ, olei laurini an. ʒ. iij. mellis despumati. lib. s. misce, & fiat ad modum vnguenti, quo initio accessionis vngantur plantæ pedum, volæ manuum, tempora, frons, & pulsus, & nares: sit bene calidum, & bibat drachmam vnā ruberæ tinctorum cum vino optimo. Succus calamenti, si bibatur ante accessionem, curat quartanam: animaduerte tamen, ne hæc nimis calida ante euacuationem exhibeantur, ne ex vna fiat duplex, vel ex intermittente continua. Timor magnus ab inimicis incussus curauit quartanam vnus anni. Quidam initio accessionis in flumen deiectus curatus fuit: quidam etiam subito, & præter spem audiens tonitru artificiale à quartana liberatus est, hoc tamen prudenter fieri debet: nam etiam si gaudium magis possit interficere quam timor, tamen ipse timor magis, quam ira, quæ nullo modo potest occidere hominem, autore Galeno.

*Alimonia.* vngantur plantæ pedum, volæ manuum, tempora, frons, & pulsus, & nares: sit bene calidum, & bibat drachmam vnā ruberæ tinctorum cum vino optimo. Succus calamenti, si bibatur ante accessionem, curat quartanam: animaduerte tamen, ne hæc nimis calida ante euacuationem exhibeantur, ne ex vna fiat duplex, vel ex intermittente continua. Timor magnus ab inimicis incussus curauit quartanam vnus anni. Quidam initio accessionis in flumen deiectus curatus fuit: quidam etiam subito, & præter spem audiens tonitru artificiale à quartana liberatus est, hoc tamen prudenter fieri debet: nam etiam si gaudium magis possit interficere quam timor, tamen ipse timor magis, quam ira, quæ nullo modo potest occidere hominem, autore Galeno.

*Vis timoris.* batur ante accessionem, curat quartanam: animaduerte tamen, ne hæc nimis calida ante euacuationem exhibeantur, ne ex vna fiat duplex, vel ex intermittente continua. Timor magnus ab inimicis incussus curauit quartanam vnus anni. Quidam initio accessionis in flumen deiectus curatus fuit: quidam etiam subito, & præter spem audiens tonitru artificiale à quartana liberatus est, hoc tamen prudenter fieri debet: nam etiam si gaudium magis possit interficere quam timor, tamen ipse timor magis, quam ira, quæ nullo modo potest occidere hominem, autore Galeno.

### De Quartana. CAP. VI.

#### Scholium.

*Focus in quartana.* Quartana duplex est. Cum lien humore melancholico nutritur, ipsum ex iecore attrahens, non est mirum, si quartana (quæ ex humore melancholico generatur) in venter lienis habeat focum, & principium. Signa quartanæ intermittentiæ de qua hic agimus, pete ex lib. 2. de diff. feb. cap. 5.

Secundo si omnia ferme sanguinis. Ex Galen. lib. 1. de art. curatua ad Glan. quartanas aut per initia esse blandè tractandas.

N



Nullum enim medicamentum vehemens exhibendum est, quia hoc Interpretatur  
 nue humoris rapit, & reliquum incrassat. Neque vacuandum est, tur locus  
 si sanguis admodum exuperet. Vbi per exuperantiam sanguinis non Galeni.  
 t, quod intelligamus plethoram, quæ in his, qui quartana laborant,  
 non reperitur, sed in hominibus carnosiss, & multo optimo sanguine Sanguinis  
 buriantibus: intelligimus ergo per abundantiam sanguinis, mul- misio.  
 um sanguinem melancholicum in venis contentum. Quando enim ta-  
 is extat, sanguinem mittimus in principio propter causam sæpius di-  
 tam, quæ est fluxio humorum ad focum putredinis. Quod si sanguis  
 ecta vena egrediens flavus sit, tunc non est mittendus sanguis, imò  
 tendus: quia cum is, qui in venis continetur, non sit melancholicus,  
 gnum est, ipsum non augere obstructionem, neque eius fuisse cau-  
 am: Imò ipsum oportet servare, ut inuet humoris frigidi, & crassi Sanguinis  
 concoctionem. Sanguinis misio exercenda est ex brachio sinistro sem- misio ex  
 der, & ex basilica, si apparet propter rectitudinē venarum, et naturæ, qua vena.

Tertiò post tres menses.) Gal. in quartana vitur medicamen- Medicamē  
 20, quod diaurion pipereon appellant, & diaspolitico appellato. Hæc ad ta quibus  
 extenuandos crassos humores exhibentur, compositiones eorum 4. de Gal. atte-  
 san. tu. scribit. Vbi diaspolitici medicamenti duas tradit compositiones: nuabat mo  
 Vnam, quæ magis movet alvum, in qua par est portio nitri et aliorum Lancholiæ.  
 medicamentorum: Alteram verò ad magis attenuandum, quæ mino- Prepara-  
 rem habet nitri portionem. Nos non solemus his medicamentis atte- tio melan-  
 nuare melancholicum succum, sed syrupis de fumo terræ, borraginis, choliæ.  
 endiniæ compositi, de bizantiis & aliis. Cum decocto fumi terræ, radi-  
 cis capparis, borraginis, hamarisci & similibus.

Quartò, materia.) Coctione absoluta quando iam non est obstru- Purgatio.  
 Etio, purgandū est ea ratione, qua docet autor. Vomitu possumus etiam Vomitus  
 purgare post cibum, & sic si nil obstat vti possumus helleboro albo cum helle-  
 cum Gal. decoquentes ipsum cum raphano, et præbere raphanum: hac boro.  
 enim ratione ipsum propinabant antiqui, facta prius totius corporis  
 præparatione, humectantes ipsum cibo, potu, quiete, & balneo. Nam  
 qui ipsum aliter propinant, ex instituto interficiunt. Iam si vomitio-  
 nibus non sit assuetus æger, potius oportebit per inferna purgare Theriaca  
 quam helleboro. Andromachi theriaca rectè purgat hunc humorem. Androma  
 Vtitur etiam Gal. medicamento ex succo cyrenaico: Cuius compositio- chi.  
 nem tradit libro de rigore, sit enim ex succo cyrenaico et castoreo. Quo Medica-  
 medicamento vtemur perfecta coctione, & facta purgatione, quando mentū ex  
 aliquid humoris remanet, repetuntque paroxysmi, neque liberatus est succo cyre-  
 homo à febre. Ab hoc enim medicamento quod relinquitur humoris naico.  
 attenuatur & expurgatur.

Quintò corroborantibus.) Antè coctionem frictionibus, vitur Gal. Quibus  
 exercitationibus, & balneis vitur Galen. Frictiones non debent esse ante coctio  
 fortes, sed pingues. Exercitationes non vehementes, balnea pauca, nem.



## DE CVRAND. MORB.

aut quod melius erit, nulla. Salsamentis etiam vitur, quæ sunt re-  
sale conditæ, multa enim sale condiebant veteres, vt asparagus, & a-  
liæ arborum germina. His ergo vitendum ob tenuandi vim quam ha-  
bent: nam aliter sal crassarum est paruum, & ideo probatur in quan-  
tum condimentum est. In morbi vigore, quies imperanda, & viscera  
fouenda, vngentes lienem oleo de absinthio, de capparibus radicibus  
thamarisci, & similibus, vnguento etiam marciaton, & de agrippa  
vel decocto radicis brionie, quæ maximè attenuat, vel oleo, in quo ra-  
dices capparidis, aut thamarisci sint decoctæ: His humor melancholicus,  
maximè attenuabitur.

*Medicamē* Sexto, rigorem.) Hæc symptomata, si sunt refrigerato corpore  
a quædam ab humore, & a retractione sanguinis & spiritus ad interna, quid  
damnatur. faciet cranium humanum, succus plantaginis, os de corde cerui, aut os  
leonis?

## De febribus compositis. CAP. VII.

**D**ifficilis est descriptio febrium compositarum, diffi-  
cilior earum tantum cognitio, quod docet Gal. i. de  
arte curatiua ad Glauconem, dicens: Paucae febres  
sunt, quæ ad sui dignotionem exquisitam die quarta indi-  
geant: difficillima curatio, sua enim contraria natura, & lon-  
gitudine hydropem, vel hecticam efficere solent. Sed ante-  
quam de iis verba faciam, prius oportet scire tertianam no-  
tam non esse adnumerandam inter has compositas febres,  
quamuis ex bile, & pituita constet: quia seruat motum bilis  
vincentis, siue sit vnica forma simplex actu, & potentia duæ,  
siue non. In aliis autem compositis, vt in hæmitritæo sunt  
duæ, vel plures formæ humorum actu, vel saltem hæ non ser-  
uant motum vnus humoris proprium. Harum composita-  
rum febrium infinitæ ferme sunt species, quàm in primis o-  
mnia earum genera possint componi, & omnes etiam ex hu-  
moribus genitæ cum aliis, vt hectica cum putrida, & biliosa  
cum pituitosa, & melancholica: sed quia omnium complica-  
tio, confusio, & compositio in præsentia non est tradenda,  
ne noster sermo proluxior fiat, tantum agam de febris tertia-  
næ, & quotidianæ compositione, cuius quatuor sunt com-  
plicationes autore Gal. cap. 7. lib. 2. de differentiis febrium,  
& cap. 9. lib. 2. de crisi- bus. Vna, quum tertiana, & quotidia-  
na commiscetur, altera, quando tertiana intermittens quo-  
tidianæ continuæ coniungitur, & hæc propriè semitertiana  
dicitur, & hæmitritæus: tertia, quando quotidiana inter-  
mittens tertianæ continuæ miscetur: quarta, vbi quotidiana  
continua tertianæ continuæ coniungitur: semitertiana (au-  
tore

*Disinso.*



re Galeno commentario de typis) alia est exigua, alia me-  
 a, alia magna: prima spatio, 24. horarum vertitur, secunda  
 6. magna verò 48. quæ & continuæ febrî propinqua est.  
 Quidam volunt tres esse differentias, seu species hæmitri-  
 ei, maiorem scilicet, minorem, & medium ponentes, apud  
 quos maior est, quàm continua biliosa, intermittenti me-  
 lancholicæ coniungitur, minor, quando biliosa continua  
 quotidianæ intermittenti, medius, quando biliosa intermit-  
 tens quotidianæ continuæ. Harum febrium causæ, & signa *Causæ, si-*  
 notitia simplicium febrium cognoscuntur, similiter & cu *gnæ, et cu-*  
 ratio. Considera itaque dicta capite de tertiana notha: nam *ratio unde*  
 ordine & ratione, qua cognoscitur & curatur illa, co- *petenda.*  
 noscetur, & curabitur quæcunque alia febris composita:  
 tamen tamen formidandus est exitus harum febrium tan-  
 quam suspectus, & maxime periculosus, præcipue quando  
 febris melancholica aliis coniungitur. Multos tamen labo- *Quibus re-*  
 ntes hæmitritæo siue semitertiana sanaui post vacuatio- *mediis cu-*  
 nes factas pilulis de rhabarbaro, pilulis aggregatiuis, vel con- *rauerit an-*  
 fectione diaphœnicon. præcedenti longa concoctione, & post *tor febres.*  
 iuxilia interna & externa obstructionibus hepatis & splenis  
 cilibus remediis, nimirum confectioe ex testudine & sy-  
 upo, quorum hæ sunt descriptiones: ℞. carnem vnius testu-  
 inis benè coctam cum aqua hordei, pulueris electuarij re-  
 umptiui. ʒ. ss. cinnamomi electi ʒ. j. medullæ passularum, gra-  
 orum pini, in aqua rosarum calida prius infusorum, & a-  
 nygdalarum dulcium sine cortice an. ʒ. ss. sacchari dissoluti  
 n aqua buglossæ. q. s. misce, & fiat electuarium ad formam  
 manus Christi: Dosis quolibet die summo mane vncia semis *Syrupus.*  
 cum vnciis quinque huius syrup. ℞. melissæ, borraginis, ci-  
 choreæ, absinthij, ceterach, capilli vene. rostri porcini, sca-  
 iolæ an. m. j. quinque radicum diureticarum, radices buglos-  
 æ, liquiritiæ an. ʒ. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe  
 libras octo, sacchari libras quatuor, trochiscorum de rha-  
 barbaro vnciam semis, diarrhodon. Abbatis ʒ. ij. misce, &  
 fiat syrupus non perfectè decoctus.

## De febribus compositis. CAP. VII.

## Scholium.

**D**ifficilis descriptio.) Qui rectè cognoscit febres simplices,  
 & methodum eas curandi, non ignorat, neque ignorabit  
 compositarum febrium curationem.

## De Hæctica. CAP. VIII.

B

Hæct



Descriptio



Hæctica febris est, quando calor præter naturam non solum in spiritibus & humoribus, sed in partibus etiam solidis consistit, neque pendet ab humorum putredine, neque a calore spirituum, estque fixus ac confirmatus difficultèrque soluitur, quemadmodum habitus. Fit serme semper sensum, & longo tempore, ideoque non sentitur, ut inæqualis intemperies: raro tamen ob patientis affectionem, & agentis vehementiam fit subito, & rarius non præcedentibus diaria & humerali febre, ut contingit in fulmine consumente ferrum intacto corio, & lana. Mœror ergo, ira, lassitudo, ieiunia, febres ardentes, & omnes diuturnæ febres hæcticam generant. Initio difficultèr cognoscitur, quæ in marasmum incidit, cognitu facillima est. Quare hæctica quum cognoscitur, curari non potest. Quando verò est sanabilis, est incognita, ideoque non esse tres hæcticæ species affirmo, ut Arabes, & alij non pauci voluerunt: neque etiam quatuor humiditates cum Auicenna pono, nempe nomen non habentem, rorem, cambium, & gluten, ob quarum consumptionem tres species constituuntur. Gal. tamen

Signa.

Error A-7. Methodi. rabum.

Methodi quatuor siccitatis differentias recenset, à quibus forsàn Arabes, & alij multi iuniores occasionem arripuerunt diuidendi hæcticam in tres species: nos tamen cum Gal. duplicem esse tantum credimus, primam fixam in hærentem partibus solidis, quæ omnes corporis humores calfacit, alteram, quæ hæctica marasmodes, aut simpliciter marasmus nominatur. Hæc omnes corporis partes colliquat, & consumit, omnemque curationem respuit, ut diximus, cuius signa notissima sunt: alterius verò notæ deprehenduntur ex calore tantum percepto à cibo, & potu per duas horas, nā quemadmodum aqua calci infusa calorem excitat, ita cibi & potus humiditas à partibus solidis calorem occultum mouet, & elicit. Totius corporis siccitas, & ariditas & sordes in ipsis arida apparent, pinguedo in excrementis quoque videtur, & totius corporis extenuatio: non illa maxima, quæ in marasmo spectatur. Pulsus tenuis, durus, debilis, & frequens, & velocior est, qui augetur adhibito cibo, calorq; ut diximus, incenditur. Caliditas cum primū manus admouetur, debilis est, paulò post acris, & rodens erūpit: acriorque sentitur, quum diutius arteriā tetigeris. Si verò his præsentibus notis ventris profluuiū superueniat, & pili defluant, mors propinqua est. ¶ Hæctica febris priusquam ad tabem deueniat, omni conatu curatur refrigerantibus, & humectantibus. Primò aere arte parato (si naturalis reperiri nō possit) violis, nenuphar

Curatio.

Victus.

Aer.



re, rosas, aqua rosata, foliis salicis, lactuca & similibus. Cibus *Cibus*  
boni succi & facilibus concoctu, & paucis, præcipue glutin-  
antibus, qui substantiam difficilè dissolutu generant, qua-  
les sunt pedes animantium, præcipue suilli vnius anni, &  
ranae, testudines, cancri fluuiatiles, & limaces: hi tamen egêt  
præparatione: quamuis limaces inter alimenta, quæ atram-  
bilem generant, a Galen. numerantur, ideòque a multis eo-  
rum aqua, & ius magis laudatur. Modus præparandi trade-  
tur. Nutriatur ergo iure gallinæ, & cremore hordei, & iure  
arietis. Nutriatur etiam pullo gallinaceo, gallina tenera,  
perdice, attagene, coturnice, turture, cuniculo paruo, vitulo  
allatis & elixis: ouis recentibus sordilibus, piscibus paruis &  
faxatilibus, & anguilla, quæ in salubri aqua vixerit, si benè  
coquatur, eius tamen aqua est tutior. Lac laudatissimum &  
optimum alimentum est, nisi adsint, quæ eius vsum impe-  
diant, de quibus cap. 29. præcedentis libri de tabe: & hoc  
etiam cap. de his copiosius agetur. Et quia ob morbi longi-  
tudinem omnes ferè hectici carent appetitu cibi, oportet  
aliqua auxilia cap. 34. superioris libri in medium adducere,  
præsertim quæ huic feбри non nocent, quales sunt succus  
malorum granatorum acidulcium cum saccharo, & paucò  
cinnamomo, succus agrestæ, succus acetosæ. Alimentum *Leucophæa*  
etiam, quod fit ex oriza, pectore gallinæ, lacte caprino, (di-  
citur maniar blanco) vtile est. Aliquando in iis, atque aliis *gum.*  
grauissimis morbis cum Hippocrate lib. 2. aphorismorum  
cibi mali præponuntur bonis, & ideo senex Rhases 10. ad  
Almanforem cap. de hectica præbet infirmis huiusmodi ci-  
bum ex hepatibus auium, ouis, croco & aceto simul frixis:  
laudat etiam intestina quadrupedum plena carnibus, quæ  
lucanica dicuntur, à nostris longanizas. Fructus, qui huic *Lucanica.*  
feбри conferunt, sunt pruna damascena, vna præsertim per  
aliquot dies suspensæ, acida cerasa, quæ dicuntur guindas,  
mora parū matura, mala punica acidulcia, & melones aliqui  
molliores, scilicet qui pepones dicuntur, & à barbaris bathe-  
cæ, refrigerant, humectant, & prosunt satis, nisi humida cum  
hectica coniungatur. Herbæ & olera bona sunt, vt lactuca,  
portulaca, cucurbita, borrago, spinachia & similia. Si æger *Si æger sit*  
sit multum imbecillus, nutriatur rebus liquidis, vt iure opti *multum im-*  
mo gallinæ & testudinis cum cremore hordei, vel emulsi- *becillus.*  
ne quatuor seminum frigidorum maiorum, vel succo aceto-  
sæ, vel agrestæ. Succus carniū refrigeratus aliqua ex rebus  
supradictis, & mixtus iuri optimus est, & maximè nutritia-  
qua tamē carniū est concoctu faciliior, maximè citissimè-



# DE CVRAND. MORB.

que nutrit : sed eget hæc aqua carniū refrigeratione , facta per ius, & alia superius dicta, ne calor febrilis augeatur.

Fit aqua carniū hac ratione : ℥. pectus vnius gallinæ iuuenis, & pectus vnius capi, diuide in partes minutas, deinde laua eas aqua rosata & buglossæ, vel malorum cydoniorum, si sit ventris profluuium, & filo suspende omnes has partes in vase vitreo paruo, cuius os bene occludatur massa, post imponatur prædictum vas vitreum ollæ semiplenæ aqua feruēti, donec aqua exprimatur a carnibus supradictis. Obseruandum tamen est, ne carnes admodum siccate (a quibus omnis aqua per resudationem extracta fuit) ad se ipsam trahant. Huius aquæ quinque vel septem cochlearia præbenda sunt cum iuris pari quantitate, sexta quaque hora. Aliqui Medici satis eruditi & probati in maxima viriū resolutione laudant aquam destillatitiā ex sanguine hominis iuuenis, & perfecte sani, dummodo extrahatur, cum primum fluit a vena secta & instrumento vitreo, & paucō igne. Quia superius diximus alimentum frigidum & humidum, glutinosum esse vtile, & necessarium hecicis, vt ex testudinibus, cancris fluuiatilibus, limacibus, & anguillis de his omnibus, & horum præparatione verba facienda sunt. Nam anguilla genita ex putredine, vel per coniunctionem serpentis cum anguilla, est pessima, & si sequenti præparetur forma iuuabit multū. Diuisa ergo anguilla prius semota eius pelle, & bene lota aqua rosata salita imple eius carne præparata ventrem gallinæ iuuenis, & post cum sufficienti quantitate

*Præparatio aquæ ex anguilla.* aquæ, & paucō hordeo excorticato concoquatur aqua, & anguilla, fiat aqua per distillationem instrumento vitreo, & igne paucō : Dosis vnciæ duæ cum paucō saccharo. Multi medici eruditi ex testudinibus, limacibus, & ranis parū decoctis cum herbis frigidis & humidis aquā per distillationem extractam non minus, quam factam ex anguilla, & anguillam laudant in hac febre. Cancris fluuiatiles ex bona aqua electi vehementi lotionē egent cum sale, fursure, & cineribus: deinde si aqua dulci lauentur & ex hordeo excorticato, sufficientique aquæ parte decoquantur perfecte, sunt optimi alimenti hecicis, & faciles concoctu. Testudines ne morales pauca egent præparatione, quamuis earum ius est facilius concoctu: limaces montani sunt meliores, & optimè nutriunt, si per aliquot dies non pascantur: post tamen saccharo, & farina nutriantur duobus tribusve diebus, dummodo prius decoquantur aqua & paucō sale, postremò iure optimò gallinæ, vel arietis. Hac ratione præparati refrigerant

*Ex cancris fluuiatilibus.* catō, sufficientique aquæ parte decoquantur perfecte, sunt optimi alimenti hecicis, & faciles concoctu. Testudines ne morales pauca egent præparatione, quamuis earum ius est facilius concoctu: limaces montani sunt meliores, & optimè nutriunt, si per aliquot dies non pascantur: post tamen saccharo, & farina nutriantur duobus tribusve diebus, dummodo prius decoquantur aqua & paucō sale, postremò iure optimò gallinæ, vel arietis. Hac ratione præparati refrigerant



rant, humectant, & bonum sanguinem generant, nec difficiles sunt concoctu: quamuis aqua ex ipsis solis per distillationem expressa sit concoctu facilior, & eandem facultatem ex limacibus habeat, qua curatus fuit illustrissimus Marchio Zeneranus ab egregio doctore medico Dolesa Valentino. Inter omnia, quæ hanc febrem solent & possunt perfectius, & citius curare est lac, quia valenter nutrit, humectat, parum refrigerat, & facillime concoquitur, humanum tamen est omnibus perfectius, atque vtilius ob similitudinē, huic bonitati proximum est asininum, deinde verò caprinum, & mox vaccinum, a quo butyrum extractum sit. Eligatur ergo iuuenis perfecte sana, optima prædita natura, vel sanguinea, a partu distans per duos, vel tres menses: si tamen abhorret a lacte humano, vel si haberi non possit, eligetur lac asinæ nigræ iuuenis a partu distantis per duos, aut tres vel quatuor menses nutritæ hordeo, & herbis frigidis & humidis, aut lactuca, endiuia, cichorea & similibus: ante tamen lactis usum alia sunt obseruanda prius, ea scilicet, quæ ipsum dari prohibent, vt sunt primū catarrhus, & distillatio, & capitis dolor, secundum febris putrida, tertium quibus hypochondria suspensa murmurant, quartum ventris profluuium. Quod vero lac quodcūque prædictis morbis maximè aduersetur, docuit Hipp. lib. 5. aphor. 3ph. 64. lac inquit dare caput dolentibus malum, malum verò & febricitantibus, & quibus illa suspensa murmurant, & siticulosis, malum autem & quibus in febribus acutis biliosæ sunt deiectiones, & quibus sanguinis effusio multa accidit. Conuenit autem & tabidis dare, qui non valde febricitant, & in febribus longis, & paruis, si nullum ex supradictis signis affuerit, & præter rationē absumptis: quod confirmat Gal. variis locis, præsertim commentario huius aphor. in quo demonstrat lac ab omnibus causis calidis celerrimè in nidore fuliginosum verti: quamuis per se probum gignat succum aliquid habens flatulentum: si tamen asininum sit lac, nullam habet acrimoniam, eum omnibus sit humidius Gal. autore lib. 4. de ratione victus in morbis acutis aph. 7. ideoque ventrem solum magis soluit, etiam si inter purgantia omnia medicamenta mitissimum tranquillissimumque existat, & omni lacte sit humidius, ac proinde magis ventrem subducit, vt idē Gal. censet aph. 109. eiusdem lib. 4. de ratione victus in morbis acutis. A Iacobi Syluius Galen. locis & aliis, sumpsit Iacobus Syluius anam nū sententia purgandi affectos vero causo lacte asinæ cocto, quod, pace tanti viri, repugnat Hippocr. Gal. rationi, & experientia: batur.



quamuis lac sua humiditate, & facultate mitissima, & acrimonię experte minimè febris ardentibus noceat, quia illius substantia facillimo negotio alteratur & corrumpitur, maximèque his & similibus morbis aduersatur, si per os sumitur, sed coctum minus: tempore namque Græcorum ferum tutius aliis medicamentis acribus, & calidis purgabat: *Felicitas nostrorum temporum.* nostro tamen felicissimo tempore manna, rhabarbarū, cassia fistularis, tamarindi, & myrobalani saluberrimè purgāt, & his, aliisque, & siccis morbis minimè nocent. Quādo igitur nihil est, quod lactis vsum impediat, sugat æger ipsum ab uberibus fœminæ nutritæ rebus frigidis, & humidis, vel ter in die ventriculo vacuo, vel bibat primò lac caprinū, vel asininum ab ʒ. ij. vsque ad ʒ. vj. dummodò ne alteretur ab aere, quia facillimè corrumpitur, cui semper adde parum sacchari, ne coaguletur in ventriculo, quod etiam valentiùs prohibetur a sale, vel melle, si æger non possit fugere ab uberibus lac, extrahatur in vas actu calidum, vt conseruetur naturalis calor. Quod si sumpto lacte sentiat acidus ructus, vel putredinem aliquam, abstineat ab eius vsum & nutriatur cremore hordei, & iure pulli gallinacei, vel gallinæ, & confectione ex testudine, de qua statim loquemur. Quamuis c. 29. de tabe descripta sit a nobis cōfectio ex testudine tamen in præsentia maioris doctrinæ gratia, duas proponam conficiendi formas, quarum prima est minoris pretij vt ℥. carnis testudinis aquaticæ optimæ aquæ decoctæ cum hordeo excorticato ʒ. ij. medullæ vuarum passarum, & amygdalarū dulcium sine cortice. an. ʒ. j. granorum pini aqua rosata calida prius infusorum ʒ. ʒ. pulueris electuarij resumptiui ʒ. ʒ. seminis papaueris & cinnamomi electi an. ʒ. j. conseruæ borraginis ʒ. ij. sacchari dissoluti in aqua borraginis q. s. misce, & fiat electuarium ad formam manus Christi. Altera confectio est maioris pretij ad diuites: ℥. carnis testudinis nemoralis decoctæ cum iure hordei sine cortice ʒ. ij. carnis pectoris gallinæ iuuenis, & capi. ana. ʒ. j. pulueris electuarij resumptiui ʒ. ʒ. pulueris diarrhodon. Abbatis, pulueris diamargaritonis frigidi an. ʒ. ij. gummi dragaganti, gummi Arabici, seminis papaueris albi, & seminis portulacæ, seminis lactucæ, quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum, seminis bombacis an. ʒ. j. amygdalarum dulcium sine cortice, medullæ vuarum passarum an. ʒ. j. nucleorum pini in aqua rosarum prius calida infusorum ʒ. ʒ. interioris cinnamomi ʒ. j. ʒ. sacchari dissoluti in aqua buglossæ. q. s. misce, & fiat electuarium, ad formā manus Christi deauratū. Dosis hu



ius cōfectionis vicia semis cum vñciis sex cremoris hor-  
 dei, & iure gallinæ, vel gallinacei cum testudine, & ranis. So *Electua-*  
 um electuarium resumptiuum recens est satis vtile hec- *riū resum-*  
 tis: Dosis ʒ. ss. cum iure prædicto, vel aliqua aqua ex superius *ptium.*  
 dictis. Inter prandium, & cœnam vel quacunque hora ven- *Potus.*  
 triculo vacuo bibat aquam hordeaceam, qua semper in po-  
 tu vtatur, nisi ventriculus admodū sit imbecillus, quia tunc  
 rinum bene aqua dilutum, vel aqua cinnamomi esset potus  
 conuenientior. Extra igitur mensam bibat aquam hordei *Conditiū.*  
 cum hac mixtura: ʒ. conferuæ violarum, rosarum, nenu-  
 pharis & borraginis an. ʒ. ij. corticis citri saccharo conditi.  
 ʒ. ss. quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum,  
 seminis papaueris. an. ʒ. j. pulueris electuarij resumptiui ʒ.  
 ss. sacchari q. s. misce, & fiat conditum auro coopertum. Do- *Extinguen-*  
 sis cochlearia duo, vel tria. Iulep violarum, vel rosarū, syru- *tia sitim.*  
 pus de nenuphare, & de cucurbita extinguit sitim & totum *Clysterum*  
 corpus humectat, & exiccat. Refrigerant, & humectant he- *utilitas.*  
 par, & totum corpus clysteres ex solo lacte caprino, vel ouino:  
 aut ex oleis, violaceo, nenupharis, & papaueris, aut ex  
 hordei cremore, & si opus fuerit adde cassiam fistularem, vel  
 butyrum recens. Hic clyster, vel similis est optimus: ʒ. juris *Clyster.*  
 pulli gallinacei, decoctionis hordei sine cortice, foliorum  
 violarum & lactucæ ʒ. x. cassiæ fistulæ præparatæ ʒ. iiij. mu-  
 cilaginis seminis cydoniorum ʒ. iiij. vitellos ouorum ij. sac-  
 chari optimi ʒ. ij. misce, & fiat clyster, si tamen adsit ventris  
 profluuium, abstine ab iis. Vnguenta ex oleis, & rebus hu-  
 mectantibus & refrigerantibus spinæ, seu dorso, hepatis, &  
 pectori admoda bis vt minimum in die ventriculo vacuo  
 sunt vtilissima, & necessaria huic febrī, inter quæ hoc vel si-  
 mile est optimum: ʒ. oleorum violarum, nenupharis, rosa- *Vnguento*  
 rum & papaueris lotorum bene aqua rosata. an. ʒ. j. mucila- *rum vsus.*  
 ginis seminis psilij, cydoniorum & althææ aqua rosata ex-  
 tractæ, ʒ. ij. butyri recentis, axungie gallinæ, medullæ cru- *Vnguentū*  
 rum vituli. an. ʒ. iiij. pulueris electuarij resumptiui, & pulue- *Balnei com-*  
 ris diamargaritonis frigidi. an. ʒ. j. ss. ceræ q. s. misce, & fiat vn *moditas.*  
 guentum. Balneū est huic morbo præsentissimum auxilium,  
 præsertim si non coniungatur hec- tice catarrhus, febris pu- *Balneum*  
 trida, obstructio & similes affectus, quibus multū nocet bal- *ex aqua*  
 neum, siue sit ex sola aqua frigida, siue ex tepida. Primum *frigida cur*  
 quamuis a Gal. laudatur 10. methodi cōtra Herophilum est *noceat.*  
 suspectum, & aptum ad extinguendū calorem imbecillum  
 hec- tiorum, & præter hoc sua intensa, & actuali frigiditate  
 per accidens calfacit, & exsiccat internas partes, ideoque pi-  
 tuit



## DE CVRAND. MORB.

ruitosos & crassos humores (a quibus fit tetanus) resolu-  
 autore Hipp. & Gal. 5. lib. aph. 21. aph. nam si laborans tetanus  
 carnosus, iuuenis, in ætate, & regione calida potest curari  
 balneo aquæ frigida, hecticus cum non possit esse carnosus  
 non poterit sine periculo tollerare balneum aquæ frigida  
 Aliqui post balneum aquæ tepida, laudant balneum aquæ  
 frigida, præcipue si æger fuerit iuuenis: non multum imbecilis

*Quod bal-* lus, & assuetus balneo aquæ frigida. Alij sensim hecticos  
*neum* fit balneis parum calidis ad minus calida, & tandem ad frigida  
*probandu.* transferunt, ne ab vno extremo in aliud fiat transmutatio  
*Ante bal-* Balneum aquæ tepida solius, vel ex decocto lactuca, folio  
*neum ser-* rum & florum violarum, salicis, nenupharis, capitum & pe-  
*uanda.* dum arietinorum, vel vitulinorum est tutius, & a me sæpe

expertum, aliqua tamen prius oportet animaduvertere (ante  
 balneum necessaria, & in balneo, & a balneo. Ante balneum  
 per quatuor, vel quinque horas nutriatur æger solo lacte a-  
 sinino cum saccharo, vel optimo iure ex gallina, & testudi-  
 ne, & hordei cremore, vel duobus recentibus ouis, & sorbi-  
 libus, & parum ante balneum sint vacua intestina. In vere  
*Hora bal-* hora balneum ingrediendi sit octaua ante meridiem, in æ-  
*nei.* state septima, in autumnno & hyeme quinta, vel sexta a me-  
 ridie. Habitatio sit moderatè calida quemadmodum & aqua,  
 ne sudore & fatigatione afficiatur æger: tempus ergo balnei  
 respondeat voluntati, & delectationi ægroti. Numerus bal-  
 nei sit pro ratione morbi, & ægri: quauis semel in vno quoq;  
 die sit satis aliquando bis, & ter in hebdomada. A balneo a-  
 missio actu humore externo per pannos lini non calidos, sed  
 per frictionem moderatam & blandam vngatur dorsum,  
 pectus, & hepar vnguento superius scripto, vel simili, aut lac-  
 te humano, & asinino, vel caprino vel bubulo tepidis, dein-  
 de quiescat in lecto, & nutriatur cremore hordei facto iure  
 gallinæ, & ranis, & testudine, vel confectioe ex testudine,  
 & iure, vel aqua ex limacibus, & aliis superius dictis.

## De Hectica. CAP. VIII.

### Scholium.

*Hectica*  
*quid.*  
*Inæqualis*  
*intemperies.*



Hectica febris est. Hectica febris, est calor præter natu-  
 ra habitum corporis occupans. In hac est æqualis intemperies  
 in omnibus partibus corporis, quoniam in calore mutatae sunt,  
 quæ habent ac si esset propria natura, et ideo ab ipso non do-  
 lent, nec molestantur, hoc autem quo ad sensum intelligere oportet. Non  
 enim sunt omnino partes mutatae, à calore præter naturam, quia nec  
 moriuntur, nec tumores, qui in hecticis oriuntur, unquam ad suppuratio-  
 nem



em venirent, nec calorem febris puride (quæ hectica superuenit) sentiremus. Hectica duobus modis fit: Primo sequendo alios morbos, fe- Duobus  
res scilicet ardentes, diarias, & inflammationes internas. Secundo in- modis fit  
cipiendo, & statim à principio. Quæ similem habet cum diaria genera- Hectica.  
tionem, ex causa aliqua procat. rita, ira, tristitia, exercitatione, aut Primus.  
assitudine cum vitione. hoc secundo modo raro contingit: hectica homi Secundus  
nes calidissimos, & siccissimos tantum innuens. Hectica duplex est, v- Hectica  
na simplex, & altera composita. Simplex illa dicitur, in qua calor fa- duplex.  
ctus est in partibus sine humiditatis alicuius consumptione. Composita  
verò, quæ siccitatem aliquam morbosam habet coniunctam, quam he-  
cticam marasmodem nominamus. Absoluta harum hecticarum cogni-  
tio ex lib. I. de diff. feb. habenda est, hoc in loco de curatione febris he-  
cticæ simplicis agere instituiamus vna cum auctore, hæc enim febris  
difficile cognoscitur, quamvis facilius curatur.

Hectica febris priusquam ad tabem.) Febris hectica cum sit Curatio a  
calor simplex, vnam habebit & simplicem curatoriam indicationem ab teratione  
eo assumptam. Calor enim per contraria refrigerantia scilicet est aufe- fit.  
rendus. Debent autem refrigerantia, humectantia etiam esse, quia hu- Refrige-  
miditas obtundit caloris vim. Tum quia, cum calor sit in partibus so- rantia.  
lulis factus, oportebit præuidere, ne siccitas introducatur. Huius hecti-  
cæ curatio quamvis 10. method. à Galeno tradatur, breuiter tamen  
hoc in loco eam transferemus. Remedia ergo, quibus hectica curatur,  
aut foris applicantur, aut interius assumuntur. Foris applicanda sunt Sex reme-  
aer, medicamenta cuti admota, & balneum. Interius verò assumuntur diis cura-  
cibus, potus, & aer inspiratus. De quibus agendum est incipientes à ci tur hecti-  
bo vna cum auctore. Alimentum qualitas, huic febre accommodata, de- ca.  
bet esse frigida & humida, quia affectus est calidus, & qui exicat Alimentum  
corpus. Vnde prisana accommodata est, alimenta etiam temperata al-  
terata tamen rebus frigidis lactuca, succo aggreſta, & similibus. Et  
cum in hac febre laborantibus magna fiat substantiæ dissipatio, &  
calor sit fixus in partibus, alimenta debent habere aliquam glutinosi-  
tatem, ne dissipentur facile à calore febrili, qua ratione vna cum gal-  
lina testudinis partem coques, comedens ius & gallinam, non autem  
testudinem, quam nullus antiquorum commendauit, & difficile co- Damna-  
quitur. Inde colliges multo minus esse exhibenda illa alimenta, quæ s- tur aliqua  
lebant exhiberi, appellata electuaria in forma manus christi, quia in alimenta.  
his carnes testudinis, & frigida, & corrupta iam sunt. Poteris etiam  
extremities animalium, cum carnibus facilis coctionis elixare, cum Quantitas  
paucis petroselinis: & hæc sufficiant de qualitate alimentum. Quantita-  
tem ex robore facultatis concoctricis ventriculi habebis. Cum enim in Lactis.  
hectica languida sit facultas, oportebit parum, & sape cibare. Inter Impedien-  
alimenta lac commendatur. Quale autem esse debet & qua ratione tria assam-  
assumendum recte docet auctor. Quæ impediunt lactis assumptionem priorem.  
hæc



**Primum.** hæc sunt. Primò, corruptio eius in ventriculo, quam deprehendimus ex pulsu, & ructu. Ex pulsu, si inæqualis fiat, & parvus, à lactis assumptione, hic enim pulsus solet fieri affecto orificio ventriculi. Ex ructu hoc modo. Si ructus sit acidus, & a frigidityte ventriculi, corruptum erit lac, si nidorulentus & fumosus a calore. Secundò impeditur lactis assumptionem febris putrida, quia ab eius calore corrumpitur, & in vapores mutatur. Tertiò dolor capitis, quia vapores multi, qui à lacte, dum coquitur, in ventriculo eleuantur, caput implēt, ac grauant. Quartum. Quarto hypochondria eleuata, ab aliqua inflammatione: vapores enim multi, qui à lacte consurgunt, comprimunt tumorem. Quintò murmurantia hypochondria, quia cum murmur, seu rugitus fiat à flatu, augebitur à vaporibus lactis. Sextò, sitis, siticulosi enim calidum habent ventriculum, à quo lac corrumpetur. Septimò deiectiones biliosæ: quia hæc calorem arguunt, à quo similiter lac corrumpetur. Vltimò impeditur lactis exhibitio à profluvio aliquo sanguinis, qui præcessit. Hic enim refrigeravit corpus, ventriculus autem refrigeratus non poterit rectè concoquere lac. Potus sit cremor ptisanæ, aut decoctum hordei. Aer inspiratus sit frigidus, dummodò cutim nō attingat. Sanguinis missionis, aut purgationis, nullam fecimus mentionem: quia in hæctica nullus est affectus euacuationem postulans.

De remediis, quæ exterius applicantur, modò agendū est, incipientes ab aere ambiente. Aer, etsi sit materia remedii, cum sit materia nobis connata, proinde indicat, aut sui conseruationem, quando qualitatem habet morbo contrariam, aut sui ablationem ob alterationem contrariam, quando eius qualitas morbum fouet. In hæctica ergo aer aut est temperatus, aut calidus, aut frigidus. Si temperatus est, non leuiter si sit calidus fugiendus est, quia calorem auget febrilem, aut alterandus aqua cum aceto mixta irrigantes cubiculum, in quo decumbit ægrotus, aut aqua per curipos cadente, aut aspergendo frigidæ herbas, & flores, ut folia salicis, arundines, rosas, mirrhos, & similia: si aer frigidus sit pro gratia est habendus, habens naturam morbo contrariam. Quod si sit frigidissimus inspiratus remedium est, quia per trachæam arteriam, & pulmones cor petit, at per cutem nō poterit ingredi sibi ipsi viam præcludens, frigiditate condensans cutem, & prohibens calidorum vaporū exhalationem. Ac proinde permittendum est, ut inspiretur: corpus autem vestitus operiatur, ne aer hic cutē suo tactu alteret. Epithemata, aut medicamenta, quæ cuti applicantur, debent esse frigida & humida, non autem astringentia, qualia sunt, quæ crassas habent partes, hæc enim non possunt penetrare. Difficile autem erit inuenire medicamenta refrigerantia sine adstrictione, pauca enim sunt. Inter omnia tamen vti debemus medicamentum à Gal. 10. meth. descriptum, quod officinæ unguentum refrigerans Galeni appellare solent. Hoc sic potest parari, ut ex eo loco colligimus. ℞. olei rosati omphacini



iii. cera albæ & lotæ 3. j. liquentur in duplici vase, deinde refrige-  
 rantur. Et ultimo loco agitando illa in vase addatur tantum aque fin-  
 leni. na, quantum imbibere possit: sed si tibi placet, inde parum aceti. Hoc me-  
 dicamento vititur Gal. ad Erysipelata, & ad ulcera pudendorum, ma-  
 gis enim refrigerat, ut simplicia, quæ ipsum componunt, ostendunt. In  
 his oleum rosatum omphacinum duplici nomine est frigidum, &  
 quia habet rosas permixtas, & quia factum est ex oliuis immaturis.  
 quamuis cera solum adhibeatur tanquam materia, lauatur tamen  
 amittat acrimoniam, & calorem, quem ex melle contraxit. Liqua-  
 tur autem cera cum oleo in duplici vase, ne ab igne aliquem concipiat  
 calorem. Tandem additur aqua, ut magis refrigeret, & humectet. Di-  
 citur posse addere parum aceti, propter penetrationem. Aduerte tamen, Aduerte.  
 officinis seruari medicamentum refrigerans Galeni à Mesue tra-  
 ctatum: quod, ut distinguas à primo, opus erit, ut hoc modo schedulam  
 describas: *Unguenti refrigerantis Galeni ex 10. method. &c.* Hoc  
 unguento debemus inungere regionem eam pectoris, quæ est supra  
 sternum, & totam spinam: ita tamen, ut cum manifestè iam calefa-  
 ctum est, à corpore abstergamus ipsum, & de nouo fiat inunctio. Ter-  
 tio huic feбри solet applicari balneum: hoc quatuor habet partes, pri-  
 ma solum continet aerem calidum, in quo vestes deponimus, in quo æ-  
 ter parum immorari debet, ne calore fiat substantiæ dissipatio: secun-  
 da est, ubi lauatur æger, ut meatus aperiantur: tertia est lauacrum Secunda.  
 quæ frigida: debet autem hæctica laborans aqua tepida lauari ut Tertia.  
 aliditas balnei simul cum calore egrotantis sit nutrimentum parti-  
 us solidis, quæ carnis tegumeto destituuntur: ad hoc, ut cū lauantur  
 frigida non ledantur consumpto paucio calore, qui in eis est. Lotio in-  
 tem frigida est febris remedium. Sic dicebat Gal. hæctici nihil balneo frigida.  
 uantur, nisi in frigida immergantur. Nec mirum, nam in lauacra  
 tepido calor augetur, & vapor humidus, qui in corpore paucus est,  
 multum augetur, qui mala frigida corrigit, fluxum coercens, & calo-  
 rem extinguens. Dices, Hipp. 2. de rat. vic. in acut. sent. 59. balneum in-  
 quit, non conuenire his, quibus vires languent, non ergo hæctici sunt Solutio.  
 lauandi, languidi cum sint. Respondeo, Hippocratem loqui de balneo  
 euacuatorio, quod multos sudores mouet, quale hæcticis non conuenit:  
 bene tamen illud, quod ad refrigerandum calorem excedentem exhibe-  
 tur. Iterum obiciēs, hæctici exiguum habent calorem, poterit ergo fa-  
 cile extingui ab aquæ friguitate.

Respondeo, verum hoc esse, sed propter metum non est omittendum Obiectio.  
 remedium, melius enim est cū periculo aliquid agere, quam sinere cer-  
 uo hominem mori. Et quamuis Gal. lib. 3. acut. scribit languidos nō pos-  
 se ad frigidam peruenire sine læsione: non proinde eam omittent hæcti-  
 ci, quia ibi, loquitur de morbis acutis, exercetque methodū in pleuri-  
 tide. Quarta pars balnei est, in qua sudores abstergantur, hæc hæcticis pars.

inut



- Noftra** inutilis est. Nos heclicos adhuc balnea non ducimus, sed eos in prop  
**loio.** cubiculis lauamus. Primum aqua tepida, & secundo perfundimus  
 aqua frigida, non actu, sed mixtione aquae calidae temperata, quae co  
 paratione alterius aquae frigida est. Sic Hipp. lib. 3. acutorum sent.  
 multas aquae mixturas paratas habet. Praeterea oportet maxime  
 prima cauſiderare, balneum multis cauſis omitti, Prima est interna inflamm  
 ſa balneum tio, quia humores à balneo liquati ad ipſam confluent. Quod ſi Hi  
 impediens. lib. 3. de ratione victus in fine, balneum concedit pleuriticis, & pe  
 pneumonicis, id intelligendum eſt, poſt totius corporis euacuatione  
 quo tempore iam nil fluit ad partem affectam: imò tunc ſpiritus fa  
 Secunda. litatur, imminuitur inflammatio, & dolor miſceſcit. Secunda eſt alio  
 ius partis principis imbecillitas, propter quam facile recipiet humo  
 fluentes in balneo. Quod ſi pars languida non ſit princeps, tunc be  
 poterimus balneo vti, quia ad articulos & cutem ſolet natura cū con  
 Tertia. modo animalis expellere. Tertia eſt plenitudo ad vires, vel ad va  
 Quia in plenitudine ad vires humores fuſi magis grauabunt, in pl  
 Quarta. nitudine verò ad vaſa rumpent aliquam venam. Quarta eſt febris p  
 rrida. Quia haec obſtructionem habet, quae augebitur fuſis humo  
 Quinta. bus. Quinta cruditas, haec enim à calore balnei ad venas attrahit  
 Sexta. Sexta eſt alui fluor. Quae duabus de cauſis balneum impedit, Prim  
 eſt: quia cū balneum ad cutem attrahat, impedit motum naturae p  
 aluum expellentis. Secunda eſt, quia balneum cum humectandi vi  
 habeat, fluxiliorem reddet aluum, & ideo heclicis diarrhea laborat  
 Septima. tibus interdicitur. Septima eſt alui denſitas & conſtructio: Quia à c  
 lore balnei, teniores ſaecum portiones ſurſum ad hepar & alias par  
 Octaua. tes aſcendunt. Vltima cauſa uſum balnei impediens, eſt cibus & potus  
 ſi parum ante aſſumpta ſint, balneum enim ea cruda ad venas rapie  
 Et ideo ſtatim à balneo nil eſt ſorbendum, priuſquam balnei pertur  
 batio ſit ſedata.

De febre peſtilenti. CAP. IX.

- Deſcriptio.** **P**eſtilens febris eſt febris epidemialis, pernicioſa, &  
 venenofa, qua multi afficiuntur & pereunt vno tē  
 pore, & vna regione, vel ciuitate aeris ratione, ve  
 (vt autor eſt Gal. lib. de theriaca ad Piſonem) peſtis quaedam  
 bellua exiſtit non paucos interimens, ciuitates quoque to  
 tas depaſcens male conficit: quippe praua quaedam aeris ac  
 corruptionem prompta mutatio efficitur, & homines cum  
 reſpirationis neceſſitate periculū euitare nequeant, ipſum  
 aerem veluti venenum quoddam ad ſe per os attrahunt. Di  
 ſcrimen inter peſtem epidemiam, & eudemum, ſiue endem  
 mium demonſtrat Gal. com. 9. lib. 1. de ra. victus in morbis a  
 cutis, in quo docet Hippocratem in lib. de aere, aqua, & lo  
 ci



egisse de endemio morbo, & de epidemio in lib. epide. sed peste nullum peculiarē librum confecit, quia vnum morbum ex epidemiis esse pestē, per libros epidemiorum monauit, & hac de causa 3. epidemiorum lib. pestilentes quāquam tempestates descripsit, vnde infert ex genere esse vulnrem morbum. Quāquam sunt multæ causæ pestis, tamen *Causa.* tantum, quæ medico sunt necessaria, recensebo. Fit itaque omnis pestilentia a putredine aeris, autore Gal. 2. de differentiis febrium cap. 5. In pestilenti aeris constitutione *Externa.* iratio potissimum est causa, cur homines corripiantur pe: aer enim nos circumstans a putrescente euaporatione vitur, ab aquis videlicet putribus vt lacubus, paludibus, à multitudine cadauerum. A vi etiam cœlesti sæpe fieri solet *Interna.* aliquando, aliquando ira Dei mittitur nostris peccatis innsi. Semper tamen dispositio humorum, qui sunt in nostro corpore est interna causa satis potens, & ideo in eadem citate, vel domo aliqui afficiuntur peste, aliqui non, & affecti non omnes ab æquali causa moriuntur. Hinc etiam accidit, rarò tamen, vnum aere nondum infecto peste laborare, quamuis pestis proprie non sit, sed peculiaris morbus venarus & perniciosus. Lapsus magnus aeris ad calidū, & humidū est causa satis magna pestis, & ideo Gal. 1. de temperamentis cap. 4. scribit, temperamentum aeris pessimum esse calidum & humidum. Qui etiam pleni sunt malis succis, & raua victus ratione vtuntur, facile in febres pestilentes inidunt. Inter omnia anni tempora exitum estatis & initium autumnū videmus maximè febribus pestilentibus conuenire. Indicia futuræ pestis sunt aer minus calidus, & humidus, *Signa.* multitudo exanthematum, & papularum, quæ à nostris Barbaris variolæ & morbilli dicuntur, multitudo etiam phremitidis venenosæ, copia carbunculorum, multitudo etiam murium, & animalium quæ fiunt ex putredine. Si verò volucris aerem proprium fugiant, & in ipso pereant, præsentem constitutionem pestilentem ostendunt, & quum pisces fugiunt aquam & in ipsa moriuntur, ab aqua esse ortam pestem dices. Notæ, quæ hominem pestilentia iam correptum demonstrant, plurimæ sunt, febris scilicet ab initio maxima, quamuis sæpe exteriora frigeant, & interiora ardeant, capitis grauitas, oris siccitas, vehemens sitis, & vehemens angustia, difficultas spiritus, vomitus creber, oculorum aspectus toruus, ac varius, vigilæ, & deliria, & aliquando propensio magna in somnum: inter ignotas est, si post aures, aut sub alis, aut circa inguina potissimum bubones cum febre parua,

&amp;



# DE CURANDA MORB.

& magna oriantur, in aliis etiam partibus internis ad exte-  
nas: si enim in collo appareat tumor præter naturam, ce-  
brum potissime male affici ostendit, si in alis, cor: si verò  
inguinibus, iecur, quod Hippocr. 6. epidemiorum parte 2.  
phor. 4. voluit dicēs, abscessus veluti bubones signa sunt  
eorum partium, vnde exuberant. Sed quum non semper appa-

*Præcautio* reant bubones, alias notas bene considera. Priusquam cum  
*pestis.* tionem præsentis pestis demonstremus, quo modo præ-  
*Fuga.* uenda sit ostēdere conabimur, quod certissimo fiet, si ad lo-

ginquas & salubres regiones fugiamus, neque reditum la-  
dabo, nisi post perfectam & integram aeris alterationem,

*Animæ* commutationem: semper tamen ad Dei iram placandam  
*curatio.* cura animam tuam: sæpe enim corporis morbi ab animæ  
morbis fieri solent, dicente Domino languido, quem san-  
uerat, vade, & noli amplius peccare, ne deterius aliquid ti-  
contingat. Et alibi si oculus tuus, id est, anima tua simpli-  
fuerit, totum corpus lucidum erit: nam propter peccata no-  
stra iratus Deus pestē, & sua fulmina in nos mittit, vt in li-  
ge veteri scriptū est, & etiam in noua ante iudicij aduētū  
Seruatore nostro docente. Quare ieiuniis, precibus, & ele-

mosynis Dei iustitia placanda est. Anima igitur curata præ-  
*Victus.* cautio fiet victu conuenienti. Primò, aere non montano, non

*Aer.* propinquo aquis, aliisque rebus putridis, cadaueribus scilicet,  
stercoribus, coriis, brassicis euulsis, & aliis prauis arbori-  
bus. Eligatur ventus septentrionalis, vel orientalis, meridi-  
nalis enim est omnibus deterior, medius verò occidentalis.

Habitatio quoq; admodum propinqua centro, & cauernosa  
*Sol.* est pessima. Radij solares optimi sunt, lunæ verò noxij, qui

*Luna.* putredinem efficiunt autore Galen. 3. de diebus decretoriis.

*Aer.* Aeris alteratio & emendatio summe necessaria est nõ solum  
in curanda peste, sed præcauenda, quod maxime vi soliu  
ignis fieri solet, præsertim ex quercu, & aliis arboribus salu-  
lubribus: habemus enim exemplum luis illius, quæ ex Ae-

*Historia.* thiopia ad Græcos peruasit, quam Hipp. multis modis ad-  
mirandus curauit igne per totam ciuitatem incenso, vt G-  
lenus eius fidissimus interpres lib. de theriaca ad Pisonē scri-  
bit. Quāquam igitur ignis maximā habet facultatē in aere  
alterando, & puriore reddēdo, multa tamē sunt calida, & fr-

*Aerem sa* gida & temperata cardiaca, quæ aerem efficiunt salubrem  
*lubrem ef-* & illius qualitates prauas & contrarias tollunt. Calida am-

*ficientia.* bra, moschus, thus, mastix, sandaracha Arabū, lignum aloes  
*Calida sim* myrrha, aloë, resina pini, resina cupressi, laudanum, iunipe-

*plicia.* rus, aristolochia, nux muscata, gariophylli, gummi iuniperi  
eber-



benus, acorus, enula campana, squinantum, bdellium, vi-  
 um aromaticum, cortex citri, storax liquida, laurus, ocy-  
 num, been, cinnamomū, crocus, calamentum, cassia lignea,  
 edoaria, liliū album, doricum, melissa, mēta, ros mari-  
 us & similia. Frigida, quæ aerem calidum alterant, & pur- *Frigida.*  
 ant sunt acetum, Karabe, rosa, labruscus, poma, pyra, cydo-  
 nia, corallus, fantali, acetosa, viola, cichorea, endiuia, nenu-  
 phar, balaustia, coriandrum, bolus armenius, terra sigillata,  
 argentum, myrtus, malū granatū, citrāgulus, arancia, limo-  
 nes, agresta, & similia. Temperata cardiaca, quæ aerem pu- *Temperata.*  
 iorem reddunt, & pestilentem discutiunt, numerantur bor-  
 ago, buglossa, margarita, carbunculus, hyacinthus, zaphy-  
 rus, & similia. Ex his & aliis cardiacis medicamentis multa *Composita.*  
 cardiaca cōponūtur, vt theriaca magna, mithridatum, con-  
 fectio Gentilis cordialis contra melancholiam, confectio de  
 hyacintho, confectio ex granis tinctorum, quam alkermes *Laus con-*  
 nominant, hæc efficacissima multorum regum ac reginarum *sectionis*  
 testimonio est probata, & a Valentinis omnibus maxime *alhermes.*  
 cognita, & frequenter probata, præsertim in quibus natura  
 languet ob longum, vel valde acutum morbum spiritum vi-  
 tale dissipantem: quamuis Valentini ob magnam corpo-  
 rum raritatem, & aptitudinem ad caloris & spiritus dissolu-  
 tionem hoc, & simili cardiaco medicamēto magis egeant, &  
 ideo ægri omnes illa semper amant, & postulat. Quare non  
 sunt taxandi Medici, qui in hac regione sæpe iis vtūtur, ne-  
 que quorundam, & Manardi ratio demonstrat coccū baphi- *Manar-*  
 cam solum astringere, & suo rubro colore sanguinem, & spi- *dus.*  
 ritū ratione similitudinis ad se magis distrahere, & dissipare,  
 quam cogendo firmare: quia rubra visa mouent sanguinem,  
 & imaginatio per visum ad externas partes etiam sangui-  
 nem euocat, sed interiūs sumpta cardiaca sunt, corroborant  
 cor, quod meliorem generabit spiritum. Neque multorum  
 recentiorum ratio probat lapidem cyaneum, seu stellatū vo-  
 mitu & deiectione purgare, & naturam turbare, humorēsq;  
 melācholicos exagitare, nullius enim momēti est ratio: nam  
 etiam si rhabbarum, & lapis cyaneus largiūs sumpta pur- *De lapide*  
 gantia sint, tamē si parcius sumātur, alia substātia astringen- *cyaneo.*  
 te & cardiaca corroborāt, & purgatoria imbecilla nō mouēt  
 corpus, præsertim si bene præparentur, vt in hac confectio-  
 ne alkermes lapis cyaneus sæpe lotus, & in electuario ex  
 gemmis rhabbarum pauca quantitatē. Neque vera est *Error re-*  
 multorum recentiorum etiam opinio dicentium, cardiaca *centiorum.*  
 omnia esse odora, licet quodcunque odorum sit cardiacum,  
 ideoq;



# DE CVRAND. MORB.

*Species cardiaco-  
rum Med.* ideoque apud hos margarita non est cardiaca, neque lapide  
prætioli, & sericū, aut similia: variæ enim sunt medicamen-  
torum cardiacorum differentiæ & species. Prima eorum est  
*Prima.* quæ temperatam obtinent naturam, quamvis Auerrois ve-  
lit parum calida medicamenta temperatis magis corrobo-  
*Secunda.* rare. Secunda est illorum, quæ qualitates habent secundas  
corroborationi aptas, quales sunt stipticitas, odor bonus,  
*Tertia.* vt in rosis, & moscho & similibus experimur. Tertia eorum,  
quæ à proprietate agunt, siue sint coniuncta qualitati ma-  
nifestæ cardiacæ, vt in spica & croco reperitur proprietas  
cardiaca cum bono odore & stipticitate, siue per solam oc-  
cultam vim agant, vt hyacinthus, margarita, & similes. Est  
tamen inter hæc cardiaca tertij modi discrimen: egent enim  
quæ à proprietate coniuncta manifestæ qualitati agunt, re-  
ductione de potentia ad actum, hoc est quod natiuus noster  
calor agat in ipsa, & cum in actum redacta sunt per euapo-  
rationem eorum vis, (quæ à quibusdam tertia vis dicitur)  
ad cor mouetur, ipsūque corroborat: quæ verò sola pro-  
prietate, & occulta vi agunt, nō egent reductione de poten-  
tia ad actum, sed tantum eorum vis ad cor deferretur, quæ à  
nonnullis medicis quarta facultas nominatur. Præter supe-  
riores modos medicamentorū, quæ per se & primò cor cor-  
roborant, sunt etiam alij modi medicamentorum cardiacorum  
per accidens & secundariò, quæ remouent nocumenta,  
& qualitates veneficas à corde vacuando, vt lapis stellatus,  
& mirobalani: quæ facultate propria tertia à corde magis e-  
nuacuant, aut in contrarium alterando per primas qualita-  
tes, aut corroborando simul, & prohibèdo vaporum elatio-  
nem, vt terra sigillata, & bolus armenus: aut incidendo, vt fa-  
cit aqua raphani contra fungos, & acrimoniam auferendo  
vt butyro facimus. Sunt etiam alia medicamenta cardiaca  
non per se, sed mediata, & magis per accidens, quam supe-  
rius dicta, nempe quæ aliorum medicamentorum vires ad  
cor deferunt, vt pulegium, stechas & similia: & quæ prohi-  
*Deferentia  
ad cor.* bent aliorum medicamentorum solutionem, vt opium. Ex  
his igitur & aliis cardiacis compone medicamentum ad for-  
mam spheræ, quod dicitur pomum, vel trochiscos, qui supra  
ignem positi, aut dissoluti in aqua & aceto aerem putridum  
& foetidum salubrem efficiunt: gumosa tamen magis amant  
ignem, & alia humida, & liquida per habitationem inspersa  
conferant. Hoc pomum est optimum in pestilenti constituti-  
one, quæ sit frigida: nempe ℞. beizoin ʒ. ss. storacis calami-  
tæ ʒ. j. gariophyllorū, laudani optimi, ligni aloes, cinnamo-  
mi,



mi, rofarum an. 3. ij. fantalorum citrinorum, corticum citri, *Pomum in*  
 anthos an. 3. ʒ. thymiami, storacis liquidæ an. 3. j. mentæ sic- *causa fri-*  
 tæ, calami aromatici, macis, nucis muscatæ an. 3. ʒ. musci, *gida.*  
 ambra, an. ʒ. x. si fuerit diues, adde quantitatē ambra, & mu-  
 sci: omnia misceantur, & cum mucilagine gummi dragaganti  
 pauca fiat pomum, vel duo poma perforata positis moscho  
 & ambra in superficie. Hoc pomum aerem calidū pestilen- *Pomum in*  
 tem reddet salubrem, vel saltem puriorem: ʒ. florū viola- *causa ca-*  
 rum, nenupharis, buglossæ, rofarum, citranguli, & spodij an. *lida.*  
 3. iij. corticum citri, macis, nucis muscatæ, storacis, calami-  
 tæ, cardamomi, masticis splendidi, ligni aloes, cubebarum a-  
 na. 3. j. laudani 3. j. S. musci & ambra an. ʒ. x. cum mucilagi-  
 ne dragaganti dissoluta in aqua rofarum fiat pomum, vel duo  
 poma perforata. Aere bene alterato præsertim igne ex lau-  
 ro, rore marino, calendula, iunipero, & similibus.

Secundò, cibus facilibus concoctu, boni sanguinis & pau- *Cibi.*  
 corum excrementorū: semper tamen iis sunt miscenda, quæ *Putredinē*  
 resistunt putredini, cuiusmodi sunt acetū, succus limonum, *resistētia.*  
 succus citri, succus granatorū, succus agrestæ, & acetosæ, &  
 fructus acidi. Alij omnes præsertim humidi nocent: Nocet *Quæ no-*  
 quoq; lac, & quæ ex lacte fiunt, & magis si cibus comedatur. *cent.*  
 Nocent similiter alimenta, quæ pinguedine superabundant.  
 Denique nocet ciborū multa quantitas, & varietas, & inor-  
 dinatus sumēdi modus, vt si cibus crassus præcedat tenuem,  
 & prandio minimè concocto cœnet homo. Cibus igitur vti-  
 lis iis est panis boni tritici, carnes arietinæ Hispanæ, hœdi-  
 næ, vitulinæ, aues montanæ, pullus gallinaceus, gallina te-  
 nera, cuniculus paruus, lepus paruus, oua recentia & forbi-  
 lia, pisces parui, & saxatiles, & alij boni succi, vt lucium. *Potus.*  
 Potus sit aqua optima fluuiialis, vel fontana, & vinum album,  
 aut rubrum mediocris substantiæ, & ætatis mediæ bene di-  
 lutum aqua. Aliqui in hac præcautione pro potu & cura lau-  
 dant acetum, & succum granatorū acidulcium: sed ego his  
 non pro potu, sed pro medicamento in parua quantitate ad  
 futuram putredinem præcauendam vtor. Somnus diurnus *Somnus.*  
 nocet, & magis inassuetis, sit brevis in die, & per duas horas  
 à cibo, & in loco obscuro. Nocturnus sit pro hominis natura  
 sex aut septem horarum: nam ex aphorismo quarto libri se-  
 cundi, somnus, & vigilia si modum excesserint, utrūque ma-  
 lum. Inanitio & repletio immodica nocent, fames ergo & si- *Quinque*  
 tis magna mala sunt, & calidis natura pessima, quemadmo- *nocent, &*  
 dum plenitudo frigidis. Quare in hac præcautione & cura- *totidē pro-*  
 tione quinque maximè nocent, fames, fatigatio, fructus, fœ- *sunt.*



- Deiectio.** mina, flatus, & alia quinque maxime iuuat phlebotomia, focus, fuga, frixio, fluxus, ideoque singulis diebus saltem semel ab intercoribus intestina sunt purganda clystere, aut supposito-  
**Animi per-**torio, si natura hoc non faciat. Animi perturbationes, calfa-  
**turbatio-**ciunt, & spiritus motu impetuoso mouet, ac resoluunt, mul-  
**nes.** tum nocent, vt ira, tristitia, odium, & coitus, praesertim im-  
**Seclio ve-**modicus, & magis a cibo. Praeter hac debitam victus rationem  
**nae.** ad praecauendam pestem necessaria est sanguinis missio, si vi-  
**Purgatio** tium sit in sanguine. Saepe etiam purgatio est utilis, & neces-  
**per pilu-**saria in hac praecautioe, praecipue si fiat per pilulas Ruffi  
**las.** quas multi Rhazis appellant, constant enim duabus parti-  
bus aloes, vna myrrhae, & medietate croci, & vino albo: Do-  
sis est drachma semis ad drachmam vnam. Semel in hebdo-  
mada purgant sine violentia, & putredinem impediunt. Aloes,  
& myrrha mortua corpora nulla putredine, & foetore affecta  
**Pilula a-**conferuant, nedum vna. Haec pilulae sunt valentiores, & me-  
**liae praest-**liores multo, & a multis maxime probatae, & expertae: ℞. a-  
**uiores.** loes hepaticae. 3. iij. myrrhae. 3. ij. croci. 3. j. rhabbarbari electi. 3.  
j. s. agarici 3. ij. gariophyllorum. 3. j. spicae. 3. j. s. corticum citri  
3. j. seminis citri. 3. ij. tormetillae. 3. s. santalorum rubrorum,  
& granorum ribes, vel seminis acerosae. 3. s. corallorum rubro-  
rum 3. s. boli armenici praeparati 3. iij. prius agarico inciso,  
& per sex horas in oximelle simp. infuso, & aliis omnibus in  
puluerem redactis cum syrupo acetoso simplici fiant pilulae  
septem pro drachma: Dosis drachma semis ad drachmam v-  
**Boli arme-**nam. Bolus armenus solus habet vim magnam in hac pra-  
**ni laus.**cautione: Dosis est eius drachma semis ad drachmam vnam  
cum vino albo & aqua rosata. Hoc medicamento vsus fuit  
**Historia.** quidam Dux Mediolanensis, & omnes eius familiares, quo-  
**Theriaca**rum nullus fuit peste affectus. Theriaca magna non solum  
**magna.**curat praesentem pestem, sed & generari prohibet. Dosis scrup-  
ulus vnus ad drachmam vnam cum aqua acetosae, vel rosae  
rum per horas quinque ante cibum, & per sex vel septem post  
**Refutatio**cibum: nonnulli tamen credunt hanc theriacam afficere ve-  
**quorundam.**neno sanos, & veneno affectos curare, quorum opinio mihi  
displicet: sed Gal. verba lib. de theriaca ad Pisonem, & auream  
de eius laudibus sententiam audi: in summa theriaca & ex-  
trinsecus apposita, & epota rabiosorum moribus praesenta-  
**Theriace**nei medicaminis cuiusdam instar exacte opitulatur. Cate-  
**commenda-**rum nobis etiam in pestifera lue solum hoc antidotum ma-  
**tio.**lo correptis prodesse adeo visum est, vt nullum aliud praesi-  
**Tormen-**dium ad resistendum huic malo fuerit idoneum. Radix tor-  
**tilla.**mentillae (quae est species pentaphylli, dicitur vincens toxi-  
cum



cum) est optima in hoc genere. Dosis cum vino, vel aqua rosarum, vel acetosæ est ʒ. j. Radix dictami est etiam optima. *Dictami.* Eandem habet vim scabiosa sola, vel cum aceto & pimpinel *Pilula.* la. Hæ pilulæ conducunt in hoc genere, ʒ. xyloaloes ʒ. ʒ. tormentillæ ʒ. ij. dictami ʒ. j. zedoariæ ʒ. ʒ. croci ʒ. j. ʒ. berbenæ ʒ. j. cornu cerui ʒ. ij. santalorum rubrorum ʒ. j. corallorum rubrorum, seminis acetosæ an. ʒ. ʒ. margaritarum electarum ʒ. j. boli armenici ʒ. iij. gemmarum, electuarij de gemmis an. *Scabiosa.* ʒ. ʒ. cornu vnicorni ʒ. j. cum syrup. de acetositate citri fiant pilulæ in æstate, vel in hyeme cum syrupo de mentha. Dosis drachma semis vsque ad drachmam vnam bis vel ter in hebdomada. Ex his, & similibus fieri possunt sacculi ad cor apti *Sacculi.* ad præcautionem, & ad curationem aptiores. Sola tractatio hyacinthi, smaragdi, zaphyri & carbunculi habet non paruum vim ad præcauendam pestem.

Ephimera pestilens periculosior est aliis, vt aliqui viri e- *Curatio* ruditi tradūt, quoniam venenum vitæ spiritui aduersatur, *diariæ.* vt hellebori succus sanguini, & cerebrum felis humano cerebro, & cantharides vesicæ: ideoque si spiritus animæ feruens veneno afficiatur per se, & subito peribit, neque hoc repugnat aphorismo 55. lib. 4. ex inguinum videlicet tumoribus febres omnes malæ, præter diarias. Hæc igitur febris curatur statim, & summa cum festinatione medicamentis cardiacis internis & externis, & iis quæ spirituum calorem *Spiritibus* præter naturam extinguunt, & qualitati venenosæ resistunt, *utilia.* & tandē spirituum dissolutionē prohibet, & ipsos gignunt, qualia sunt primo ius gallinæ, & arietis, vel succus eius, vel aqua carnis cum succo agrestæ, vel acetosæ, vel succo limonium, vel citri etiam, si morbus acutissimus sit, egeatque per se victu tenuissimo. Aliquando tamen in robustis & Castellanis solus succus granatorum cum saccharo, & pauco pane loto est satis idoneum alimentum, vel succus limonū, & citri cum saccharo, & pauco pane, vel pyra tosta, aut mala cydonia. Potus sit aqua hordei cū pauco vino albo optimo, vel a- *Potus.* qua rosarū, vel acetosæ, vel buglossæ. Inter prandium & cœnam bibat aquā hordei cum julep rosato, & syrupo de citro, vel de limonibus, vel cum hoc condito: ʒ. conferuæ acetosæ ʒ. ij. cōferuæ rosarum, & nenupharis an. ʒ. j. coralli rubri præparati, margaritarum electarum, pulueris radices dictami, & boli armenici præparati. ana. ʒ. ʒ. sacchari. quod s. misce, & fiat conditum deauratum. Si diues sit, adde fragmento- *Conditum.* rum lapidum smaragdi, hyacinthi, Zaphiri. ʒ. ʒ. Omni quoque hora iuuat multum hæc confectio: ʒ. confectio de



# DE CVRAND. MORB.

- Confectio.* hyacintho. ʒ. j. ʒ. confectionis Gentilis cordialis contra melancholiam, & conferuæ acetosæ. an. ʒ. vj. theriacæ magnæ. ʒ. ij. coralli rubri præparati, margaritarum electarum, boli armenici præparati, pulueris radices dictami, tormentillæ, & seminis acetosæ. an. ʒ. j. rasuræ cornu vnicorni, ossium de corde cerui. ana. ʒ. j. ʒ. syrupi acetositatis citri, q. s. misce, & fiat confectio, adde lapidum prætiosorum. ʒ. ʒ. folia auri tria. Lapidēs hi, & alia multa vñ sericum, os de corde cerui, & similia cardiaca cor corroborant, & spiritus puriores, & lucidiores reddunt à tota substantia, vel proprietate, vt nos cōtra quosdā iuniores superius docuimus, neque ratio quorundam valida est. Græci hæc, & similia inter cardiaca non scribunt, igitur non sunt cardiaca, quemadmodum neque hæc ratio valet, cassia fistula, manna, rhabarbarum, mirobalani non scribuntur inter medicamenta purgantia a Græcis, ergo non purgant: si magnes attrahit ferrum, & Karabe paleas, & pæonia collo appensa prohibet morbum comitalem fieri a tota substantia, & non a manifesta qualitate, poterunt quoque multa medicamenta non odora esse cardiaca. Admouenda sunt cordi sæpe, imò semper quæ calorem febris extinguunt, veneno resistunt, & ipsum cor corroborant in forma sacculi, vel vnguenti, vel liquida: vt ℥. aquæ rosarū, acetosæ, & buglossæ. an. ʒ. iij. aquæ melissæ, & ocymi. ana. ʒ. j. aquæ florum aranciorum ʒ. ʒ. pulueris diamargaritonis frigidi. ʒ. ij. trochischorum de camphora ʒ. j. misce, & fiat epithema ad cor. Putrida pestis, quæ ferme semper fit, curatur primò, victu diariæ pestis: Secundò sanguinis missione, si virium robur adsit, per sectionem vtriusque basilicæ simul, ne sanguis venenosæ qualitatis particeps a parte dextera in sinistram fluat, extrahaturq; sanguinis copia plenitudini respondens. In aliis etiam morbis, vt in apoplexia sanguinea, in articulari & in phlegmone amborum testium fieri solet sanguinis missio ab utroque brachio simul. Sed si tumor, vel carbunculus in hac febre sit post aurem, cephalica eiusdem partis est secanda: si verò sub ala, basilica eiusdem partis: si tumor sit in inguine, vena tibiæ, aut pedis interna eiusdem partis: si autem in ambabus auribus simul, vtraque cephalica est incindenda, & si sub duabus quoque, vtraque basilica simul etiam scindenda: si verò in vnoquoque sit inguine, venæ vtriusque pedis, aut tibiæ. Pari modo faciendum est, si simul sit bubo sub ala dextra, & inguine dextro, simul secabis basilicam dextram, & venam tibiæ, aut pedis dextri. Quando vires, & ætas prohibent in hac febre venæ sectionem, sang
- Defensio lapillorū.*
- Epithima cordi.*
- Curatio putridæ.*
- Victus.*
- Sectio venæ.*
- Quæ vena secanda.*
- Scarificatio.*



sanguis est mittendus per cucurbitulas cum scarificatione seruata semper rectitudine.

Tertio, purgatione sine concoctione, quia materia vene- *Purgatio*  
nosa semper est turgida proprie & per se, vel ob eius læsio- *sine conco-*  
nem: statim enim subito cor lædit, quod doctissimus Manar- *ctione.*  
dus vult lib. 13. epist. 1. Male igitur contrarium contra verita-  
tem docuit Aloisius Mundella epistola decimasexta. sed quia *Aloisius*  
huius febris materia ferme semper est biliosa, hoc aut simi- *Mundella.*  
li medicamento vacuari poterit: ℞. medullæ tamarindo-  
dorum, & medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ana. ʒ. ʒ. Potio.  
rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia. ʒ. iij.  
electuarij de succo rosarum. ʒ. iij. syrupi acetositis citri ʒ. j.  
aquæ acetosæ quod sufficit, misce, & fiat potus. Vel ℞. pilu- *Pilula.*  
larum de rhabarbaro ʒ. j. fiant pilulæ 7. Ab hac purgatione *Clyster.*  
quotidie & ante ipsam excrementa sunt depellenda saltem  
clystere leniente.

Quarto, corroborantibus & alterantibus, vt syrupis con- *Corrobo-*  
fectionibusque, ac conditis, & electuariis cardiacis, de qui- *ratio &*  
bus dictum superius in præcautione & curatione diariæ pe- *alteratio.*  
stilentis. Drachma vna theriacæ magnæ vsque ad duas est  
nobilissimum medicamentum, si detur cum vino, aut li-  
quore cardiaco, ægroto mox lecto imposito, vestibus & stra-  
gulis operto, quo sudor erumpens sanitatis nuntius fuit sæ-  
pissime. Multi quoque antidotum celebre ad eundem vsum  
experti sunt, cuius variæ sunt descriptiones: sed ego magis  
eam laudo, qua doctissimi medici Germani sunt vti, præci-  
puè Simon Riquinus Treuir summus philosophus, & medi- *Antidotū*  
cus Coloniz in stupenda illa febre sudatoria prius Britan- *nobile.*  
nica, deinde Germanica dicta, quæ sic habet: ℞. ouum, &  
reieto eius albumine per foramen angustum adimpleatur  
croco, & igne lentissime torreatur, donec cortex croceum  
præbeat colorem, postea ouum in pyla contundatur minu-  
tissime, & corticis reliquiæ non appareant: huic pulueri ad-  
de medietatem oui, seminis erucæ, radicis tormentillæ, di-  
ctami albi ana. ʒ. ij. seminis cardui benedicti, seminis aceto-  
sæ. ana. ʒ. ʒ. nucis vomicæ ʒ. j. rasuræ cornu monoceruini,  
vel cerui (si primum comparari non possit) ʒ. ʒ. theriacæ ma-  
gnæ ad pondus omnium, deinde in mortario simul miscean-  
tur, & confundantur, vt formari possint trochisci, quorū do-  
sis est drachma vna semis cum paucō aceto. Omnes ferè, qui  
hoc antidoto diu vti sunt, liberi à peste euaserunt. Hoc quo-  
que medicamentum est præstantissimum in præcautione &  
curatione pestis, & expertum à multis principibus Germa-



# DE CVRAND. MORB.

- Confectio* niæ consilio doctissimorum medicorum: ℞. rasuræ vnicorni  
*laudatissi-* rasuræ eboris. ana. 3. j. xyloaloes, myrrhæ an. 3. j. β. been albi  
*ma.* & rubri, doronici Romani an. 3. β. agarici optimi per octo  
horas in aqua buglossæ macerati. 3. ij. zinziberis. 3. j. gentia-  
næ. 3. j. β. carpobalsami ḡ. xxv. rhabbari electi. 3. j. β. corti-  
cum citri 3. j. santalorum alborum, & citrinorum, ana. 3. j. β.  
ossis de corde cerui 3. β. seminis citri. 3. ij. fragmentorū qua-  
tuor lapidum prætioforum. a. 3. j. limaturæ auri optimi 3. β.  
pulueris liquiritiæ. 3. ij. coriandri præparati 3. iiij. confervæ  
enulæ, confervæ rosarum an. 3. iiij. mellis. q. s. misce, & fiat  
confectio, adde syrupi acetositis citri lb. β. conseruetur in  
vasē argenteo, vel vitreo, & tanquam thesaurus habeatur:  
aduersatur enim non solum pesti, sed vniuersis fere venenis.  
Dosis in aurora drachma vna semis: hæc confectio est non  
minoris momenti, laudata & probata a multis sapientissi-  
mis medicis, eaque non pauci peste correpti, & fere mortui  
ad sanitatem optimam sunt reuocati: in præcautione quo-  
*Confectio* que est optima: ℞. sanguinis anatis maris & foeminæ, anse-  
*præclaris-* ris, hœdi, rutæ syluestris, seminis fœniculi, cymini, anethi,  
*sima.* rapæ syluestris an. 3. iiij. piperis albi, & longi, costi, anisi, cin-  
namomi ana. 3. ij. radices gentianæ, trifolij, squinantij, thu-  
ris, rosarum siccarum ana. 3. iiij. agarici maris 3. ij. myrrhæ,  
spicæ nardi, an. 3. vj. benzois, azari, ammoniaci an. 3. ij. carpo-  
balsami grana xxx. ireos, croci, reupontici, zinziberis, ma-  
sticis ana. 3. j. sticados 3. β. fiat puluis ex his tenuissimus, &  
cum quadruplo melle fiat confectio, quæ conseruetur vase  
argenteo, vel vitreo tanquam res summa & fere diuina ad  
*Commoda.* pestem, & venena alia, & præter hoc languentem ventricu-  
lum corroborat, flatūsque omnes valenter discutit. Dosis  
drachma vna vsque ad duas drachmas superioris medica-  
menti. Sed quia supradicta tria medicamenta calida satis  
sunt, ideoque febri nocent, necessaria præter illa erunt alia  
cardiaca frigida interna, & externa, de quibus superius di-  
ctum, & etiam cap. de febre ardenti, & cap. 30. superioris lib.  
*Carbuncu-* de palpitatione, & syncope. Si carbunculus huic febri super-  
*li curatio.* uenerit, præter vacationem per sectionem venæ eiusdem  
partis, purgationem debitam, cordis cōfirmationem, febris,  
*Admonē-* & venenosa qualitatis curationē iam dictam, chirurgus do-  
*da.* ctus omni arte trahat exterius venenum admouendo car-  
bunculo animalia viua gallum videlicet gallinaceum, vel  
gallinam, cucurbitulas, & sanguisugas, vt aliqui volunt, vel  
*Mixtura.* ignem actu, aut potentia vt Angli faciunt. Mixtura ex luteo  
oui & sale præcedenti incisione, habet facultatem mitem  
attrah



attrahendi & abstergendi. Panis si actu calidus, dum à fur- *Panis.*  
 no educitur, carbunculo admouetur, attrahit exterius ve- *Extrahen-*  
 nenum. Mixtura ex ficis siccis, & puluere salis, ireos, & aloes *tia vene-*  
 habet magnam in hoc facultatem; fermentum cum oleo, & *num.*  
 sale est eiusdem facultatis. Idem efficit mixtura ex opopona-  
 co, fermento, & sale. Cataplasma ex scabiosa, fermēto & sale  
 laudatur in hoc. Aliquando oportet ad valentiora procede-  
 re: postea tamen crusta inducta sensim, & non violenter est  
 euellenda solo butyro, aut pinguedine suilla, non salita ad-  
 huc, vel cataplasmate ex radice althææ, butyro & pinguedi-  
 ne suilla nondum salsa: post crustam euulsam necessaria est *Crustæ eu-*  
 vlceris purgatio, & carnis instauratio per medicamēta pro- *uulsio.*  
 bata, cuiusmodi est mixtio ex sarcocolla & melle, vel diachy *Carnis in-*  
 lon, sine gummis, vel foliis ocymi, vel consolida maiori. Si *staurano.*  
 fuerit cum hac febre tumor post aures, vel sub alis, vel in in-  
 guine, aut in alia parte, habita prius debita, & iam superius  
 dicta victus ratione, factisq; necessariis vacuationibus, corde  
 corroborato per ea, quæ superius dicta sunt, tumori sunt ad-  
 mouenda, quæ venenū exterius attrahunt: vt cucurbitule, &  
 theriaca magna, quæ (Gal. autore libello de theriaca ad Pi-  
 sonem) non solum interius sumpta, sed exterius admota est  
 optimum remedium. Quidam medicus doctissimus & senex *Medici cu-*  
 mixturam ex cantharidibus, butyro & fermēto his veneno- *iusdam ca-*  
 sis tumoribus admouere solebat. Factæ post bullæ scindan- *randi ra-*  
 tur, extrahaturque humor venenosus, & crusta, & tandem *tio.*  
 facta debita absterfione, & incarnatione vlcerum multos af-  
 fectos pestilentibus bubonibus Deo auspice curauit.

## De febre pestilenti. CAP. IX.

## Scholium.

**P**estilens febris.) Morbi aut sunt epydemii, aut sporades: Epyde-  
 Epydemii à Latinis, populariter grassantes, vulgares, & minus mor-  
 communes appellari solent. Dicitur autem epydemius mor-  
 bus ille, qui vnus existens multos afficit. Qui causam habet omnibus  
 communem. Sporades morbi (à Latinis vocati sparsi) dicuntur, cum mul-  
 ti morbi multos homines sparsim afficiunt, vt quando eodem tempore morbi.  
 pleuritis, angina, dyssenteria, & simul alii distincti morbi infestare so-  
 lent. Hi causam habet particularem nempe victus rationem. Rursus  
 morbus epydemius aut est eudemus, aut seruans nomen generis epyde-  
 mius dicitur. Eudemus qui à Latinis dicitur patrius, regionalis, aut ver *Eudemus*  
 naculus, nil aliud est, quam vnus morbus plures afficiens in vna regio-  
 ne: vt Ianuēsis sit tussis, et catarrhus: Neapolitanis podagra, et aliis  
 tumores in collo. Epydemius morb⁹ diuiditur in simpliciter epydemii



# DE CVRAND. MORB.

**Simplici-** & pestem. Morbus epydemicus simpliciter est vnus morbus multos af-  
**ter epyde-** ficiens, sed non interficiens multos: hac ratione pleuritis, dyssenteria,  
**mius.** exanthemata, & alii huiusmodi populariter vagari solent: pestis verò  
**Pestis.** est epydimia perniciofa: epydimia, quia multos afficit, perniciofa verò,  
quia multos e medio tollit. Hi morbi pestilentes varii esse solent, car-  
bunculus, febris, & alii similes. De morbis simpliciter epydimiis egit  
Hippocr. in libris epydemion, in quibus etiam de peste egit, ac proinde  
ei particularem non dicauit librum. Cum pestis sit communis morbus,  
aliquando vnā solam regionem, aliquando plures inuadens: qualis  
fuit illa, quæ tempore Marci Antonii totam Babyloniam, Græciam,  
**Causa pe-** & Romam inuasit. Habebit ergo causam comunem ex lib. 2. de homi-  
**stis,** nis natura sen. 3. & 1. epyd. in proæmio. Hæc causa communis est aer  
ambiens, quo omnes perpetuò vimur. Proinde dicebat Galenus 1. de  
differen. febr. 5. pestilentem febrem inspiratione potius contrahi. Aer  
autem dicitur habere pestilentem conditionem duobus modis: primo,  
cūm habet prauam qualitatē, hoc est, putredinem, toto tempera-  
**Primus** mento nobis contrariam, quam venenatam dicimus. Hanc putredi-  
**modus,** quo nem aer vel à se ipso contraxit, vel aliunde. A se ipso, quum ex vapo-  
aer dicitur ribus cum eo permixtis, & non putrefactis, aliqua eius pars ob pro-  
habere pe hibitam transpirationem putrescit praua putredine. Aliunde eam con-  
stilentem trahit, quum vapores à terra, aqua lacustri, leguminibus, holeribus,  
conditionē, fetidis cloacis, aut à mortuis hominibus, putredinem habentibus ve-  
**Quorun-** nenatam, cum eo permiscuntur. Aliqui, ex corporum celestium coniun-  
**dam resu-** ctione hanc in aere infectionem provenire affirmant. Cūm scilicet Sa-  
**tatio.** turnus, Iupiter, & Mars: aut cum Iupiter & Mars congregiuntur in  
humana domo & signo. Qui omittendi sunt tanquam architecti, in  
cælo fabricantes domos sola intellectus operatione. Neque enim in cæli  
corporibus vis nobis contraria est, quæ creata sunt vt nobis seruirent,  
verum tamen est hanc contagionem tam lethalem à cælo provenire,  
hoc est à Deo, vt peccata puniat. Quod tēporibus David regis euenisse  
**Secundus** in sacris bibliis legimus. Secundo modo dicitur aer habere pestilen-  
**modus.** tem conditionem, quum calidus & humidus est: qua ratione 1. de tem-  
pe. Gal. calidam & humidam constitutionem aeris pestilentibus mor-  
bis obnoxiam scribit: & Hippocr. 2. epyd. par. 1. sen. 1. in Cranone ex ea-  
dem constitutione carbunculos pestilentes factos testatur, erat enim  
**Obiectio,** æstas cum pluuiarum multitudine. Dices, nonne pestis habet putredi-  
**Solutio.** nē prauam, qua ergo ratione aer calidus et humidus dicitur pestilens?  
Respondeo, aerē calidum & humidum corpora nostra reddere calida  
& humida, in eisque humiditates augere, & hac ratione in plerisque  
**Triticum** corporibus prauam generari putredinem, ex qua vapores eleuatos, &  
**nec aqua** cum aere permixtos similem in eo generare perniciem, et tunc iam esse  
**faciant pe** causam pestis. Si aer causa pestis est, errant ergo, qui triticum putre-  
**stem.** factum, aut aquam pestem efficere sentiunt, Nam etiam si in tritico,



ut aqua possit esse putredo venenata, interficiet ea ratione, qua pestis, non tamen dicetur pestis, quia cum non sit causa communis, non inficiet multos. Quæres, si aer est infectus, cur non afficit omnes, cum o- Obiectio. mnes eum inspirent? Respondeo ad actionem non solum requiri causæ Solutio. efficientis præsentiam, sed passi dispositionem: & cum non omnia corpora sint disposita ad pestem, non omnia, eam concipient. Corpora ad disposita sunt illa, quæ habent aliquas obstructions, aut excrementa pestem di- ad putredinem parata, qualia in corporibus calidis & humidis repe- disposita. riri solent, quæ contactu aeris putris faciliè putrent.

Prius quam curationem præsentis pestis.) Præcautio cor- In duobus poris à peste in duobus consistit: primò in status aeris cōsideratione: se- consistit cundò in corporis natura. Si aer caliditate, & humiditate pestem fa- præcautio, ciat, ipsum alterabimus refrigerantibus, & exiccantibus. Si aer iam à peste, habeat putredinem, in ciuitate, & domo ignem accendes ex tymo, pu- Primo in legio, iunipero, cupressu, & aliis odoratis: quæ caliditate rarefaciunt aere. acrem, et siccitate humiditatem absument. Secundò considera corpus, Secundo in nam si aer sit calidus, & humidus, & corpus similiter, hoc refrigeran- corpore. dum, & exsiccandum erit. Si corpus habeat dispositionem contrariam, frigidam scilicet & siccam, conserua ipsam. Si aer habeat prauam qualitatem, considera an corpus habeat firmam sanitatem, an lubri- cam: si habet firmam & integram sanitatem, tota præcautio consistet in expurgatione excrementorum, quæ secundum naturam colliguntur. Sic quotidie alui excrementa ducentur (si spontè non fluant) pilulis Rhasis, thamarindis, & cassia. Excrementa secundæ coctionis, bilis, et melancholia cum facibus expurgantur. Urina reddenda est, quia de- tenta acres emittit vapores. Vt excrementa tertiæ coctionis liberè euacuentur, oportet ab aere frigido, aquis, & aliis astringentibus cauere, ne ab his cutis densetur. Si corpora habent sanitatem lubricam (est autem hæc in corporibus plethoricis, & cacochimis) oportebit plethoram ipsam euacuare atque cacochimiam expurgare. Quòd si plethora coniuncta reperiatur in corpore cum aliqua cacochimia, tunc temporis vtrunque erit præstandum, primò igitur secabimus venam basilicam, & deinde corpus purgabimus à cacochimia. Si praua in corpore excrementa reperiuntur, per conuenientes, & ad id à natura destinatas corporis regiones sunt educenda. Si sit in aliqua vena obstructio, eam aperire curabis. Si corpus non transpiret, & diffletur, balneo aquæ tepidæ cutis spiramenta rarefacies. Præter hæc omnia dicta opus etiam erit in rebus non naturalibus seruare mediocritatem. Cibi sint fami- Cibi. liares, parum habentes excrementi, & extenuantes. Quòd si ex natura tales non sint, arte eos tales reddemus mixtis condimentis: Vinum sit tenue: Aqua pura: Animi pathemata fugienda. Exercitatio, & venus modum seruent. Tandem vtendum est rebus putredini contrariis, Potus. qualia sunt aromata. Quòd si aliquis consuevit uti theriaca, aut alio

alex



# DE CVRAND. MORB.

alexipharmaco, bene poterit eo uti præcautionis gratia: si verò non habuerit illud consuetum, omittendum erit. Quàm falsa sint, quæ hoc loco docet autor de cardiacis medicamentis, intelliges ex capite de syncope.

**Nō datur** Epimera pestilens.) Omnis febris pestilens ex Gal. lib. I. de diff. diaria pe- feb. cap. 7. ex putredine est orta: ac proinde diaria pestilens non restilens. peritur, quia, ut cap. I. huius lib. probauimus, spiritus non possunt putredine transferri. Aliqui existimant, bene dari pestilentem diariam, & respon- ratio pro- dent rationi supra dictæ: non omnem pestilentem febrem esse putridam, bant non quia ex Gal. li. 3. de præsigno ex pulsibus c. 4. datur pestilens hectica, omnem pe at hectica non fit ex putredine. Respondeo aliud esse febrem oriri ex stilentem putredine, & aliud esse putridam. Nam febris putrida est illa, quæ esse putredine. ortum habet ex putredine existente in humoribus cauitatis cordis.

**Solutio.** At febris ex putredine orta illa est, quæ ortum habet ex putredine, siue sit in cordis cauitate, siue in eius corpore. Et hac ratione hectica febris non est putrida, ortum tamen habet ex putredine, quam ex fa- tore anhelitus colligimus. Putret autem in ea substantia per corpus cordis dissipata, quæ ros dicitur, à cuius calore corpus cordis dispositum suscipit factam alterationem. Cum autem hæc putredo sit vene- nata, & dispersa per corpus cordis, non est mirum, si hectica pesti- lens ita citò hominem interficiat, corrumpendo temperamentum cor- dis, ut nullum medico aut remediis locum relinquat.

Putrida pestis quæ.) Febrem putridam pestilentem hac ratione curabis. Cum sit putrida, habebit affectus, quos I. scholio diximus pu- tridas febres habere. Et ita curatio est incipienda ab humore, qui fluit ad locum affectum. Vnde in principio sanguinem mittemus ex cuius- **Sanguinis** **missio.** libet brachii basilica: neque enim ambæ basilicæ simul sunt inscinden- dæ, ut autor voluit: præsertim cum eius ratio friuola sit: sectio enim venæ, ex quacunque parte fiat, per ipsam euacuat sanguinem, non au- tem eo replet partes vicinas.

**Purgatio.** Tertiò, purgatione.) Nunquam in principio licet purgare in fe- bre pestilenti: quia ferè omnes, qui purgantur, moriuntur, & merito: natura enim eo tēpore aut expulsi humorem ad cutem, vel non, si ex- pulsi, iam inuanda est, neque impediendus est eius motus, qui ad ex- terna fit, præsertim cum humor hic venenatus sit, & in motu ad inte- riora possit maximè ledere aliquid ex visceribus. Si natura non ex- pulsi humorem, cum crudus sit, non poterit purgari: neque enim tur- get humor, cum sit firmatus in loco obstructionis. Dices, quando ergo

**Obiectio.**

**Solutio.**

**Obiectio.**

**Solutio.**

erit purgandum? Facilis est responsio, cum purgati, post coctionem uti- liter fiat, si natura non euacuat. Dices, in hoc morbo, cum humor sit venenatus, nunquam alterabitur à natura. Respondeo, verum esse non alterari ob nutritionem, sed ut ad excretionem aptus reddatur ea ra- tione, qua atram bilem (quæ etiam non potest nutrire) vincit. Hoc ex Gal. lib. 5. metho. c. 12. possumus probare: ubi describit quandam con-

stitit



stitutionem pestilentem, in qua expurgato corpore vomitionibus et alui deiectionibus: tandem omnibus, qui euadebant, apparebant nigra exanthemata, octauo, & nono die: quæ erant reliquæ sanguinis, qui in febre putruerat: quas veluti cinerem natura ad cutem truxit, sicut solet alia etiam superuacua expellere. Iam expurgationem corporis vomitionibus, & alui deiectionibus factam, post coctionem sequutam fuisse, intelliges ex eo, quod utilis fuit. Si hoc ita est, poterit ergo humor venenatus coqui, & à natura utiliter expelli.

Quartò corroborantibus.) quando humor venenatus (obstru- Quando  
ctionis causa) in hac febre expellitur à natura ad cutem, & facit car- apparet  
bonem: tunc opus est uti medicamentis interius assumptis, quæ sudo- carbo.  
rem moueant, & exterius attrahentibus. Sudorifica sunt, primò hæc Sudorifica  
confectio: ℞. confectionis de hyacintho & theriacæ magnæ an. ʒ. j. medica-  
pulue. scordii ʒ. ss. decocti scordii, aut carlinæ, quæ est chamæleon al- menta.  
bus, aut cori herbæ quantum sufficit, misce, & fiat potio. Hæc cōfectio  
habet compositionem ex hyacintho, quæ roborat interna, ut expellant  
ad cutem, habet theriacam & scordium, quæ venenis contrariantur,  
& tenues habent partes, quibus, cum decoctione dictarum herbarum  
mouetur humor ad exteriora: debet tamen æger vestibus & stragulis  
operiri. Aut possimus etiam uti confectione ad modum opiata, ℞. the Opiata.  
riacæ magnæ ʒ. iiii. confectionis de hiacintho ʒ. ii. antidoti de sangui-  
nibus Gal. ʒ. ss. pulueris scordii ʒ. iiii. conseruæ capillorū veneris & a-  
cetositis citri an. ʒ. ss. cum syrupo acetositis citri, fiat confectionis, ex  
qua accipiat vsque ad ʒ. iiii. cum decocto scordii, & cooperiatur. Confe-  
ctio scordei à Præcastoreo descripta optima etiam est cū dictis decoctis. Applica  
Exterius supra carbonem, ut attrahant venenum, animalia viua, lu- da supra  
teum oui cū sale, panem actū calidum, & alia, quæ tanquā imbecilla carbonem.  
omittantur. Oportet ergo scarificare carbunculum: deinde ipsum lauare  
aqua salita: & teriō apponendū causticum medicamentum: siue tale  
sit actū, ut est ignis, siue potentia, ut argentum, et vnguentū ægyptia-  
cum. Vltimò crusta sensim amoueat, & vltus ad cicatricē perduca- Bubo.  
tur. Et cum in transitu humoris ad carbūculum detineatur humor in  
glandulis ex sua natura languidis, proinde fiunt bubones. Quibus o-  
pus est applicare etiā medicamenta, quæ attrahunt, qualia sunt cucur-  
bitulæ. Emplastrū ex quatuor gūmis oppoponaco, serapino, ammoni-  
co, & euphorbio utile est: debent enim hæc misceri, & subigi cū oleo ru-  
taceo, aut camemeli, aut irino, et fieri emplastrū buboni applicandum.

## De Exanthematis. CAP. X.

**E**Xanthemata Græcis, Plinio, & Latinis papulæ, Descriptio.  
sunt tumores, & affectus cutis spontè florentes,  
ut Manardus de re medica optimè meritis libro  
septimo epistolarum suarum epistola secunda est autor, qua  
morb



morborum omnium nomina à nostris recentioribus medicis recepta, & ab antiquis prodita explicantur, quem hac in parte Fuchsius de omnibus bonis disciplinis non secus meritis lib. 5. cap. 8. de curandis morbis sequutus est: quamvis eruditissimus Franciscus Valleriola lib. 1. enarrationum suarum enarratione octava demonstret variolas & morbillos, qui in pestilentibus febribus sæpe (vt præsentī hoc anno, qui est 1555.) apparere per modum quendam iudicij solent, non dici à Gal. exanthemata, neque esse herpes, vt idem Manardus loco superius citato vult: sed missa nominū questione cum Valleriola herpes morbillos non esse (pace quod Manardi dixerim) affirmamus: quod optimè probat omnium bonorum autorum sententia. Sunt ergo duplicia hæc exanthemata, quædam sublimia, & cum tumore satis perspicuo, & apparente, præsertim circa augmentum & vigorem ipsorum, quæ dicuntur à barbaris medicis variolæ, & ab Hispanis vulgari nomine dicuntur viruelas. Alia exanthemata sunt lata & sine sensili tumore, quæ barbaris medicis sunt morbilli, & Hispanis sarampion. Qua in re fallitur Leonarthus Fuchsius loco superius citato, & sensibus omnino repugnat, dicens, variolas latas esse, & morbillos sublimes: neque enim illud docet Gal. comm. 9. lib. vj. aphor. dicens pustulas, & tubercula, quæ fiunt ab humoribus calidis in acumen tendere, & altum petere, quæ verò à frigidiori, latæ sunt, & non admodum pruriunt, quia fiunt ab humore non acri, aut minus acri, ideoque variolæ sanguineæ magis pruriunt, & sublimiores sunt iis, quæ à sanguine pituitoso fiunt. Morbilli tamen à biliosissimo fiunt sanguine, & ob id minimè petunt altum, nullumque habent sensilem tumorem, quemadmodum erysipelas: sanguis enim maximè biliosus in hac cutis affectione maculas, & pustulas pulicum morsibus similes procreat latas, & non sublimes, maiores tamen, latiores, & rubicundiores iis, quæ fiunt in pestilentibus, & maximis febribus ab Hispanis dicitur pulgon. Hi morbilli spontè in cute erumpentes breui tempore euanescent, nulla relicta vlceratione. Quare nulla, postquam perfectè eruperunt, egent curatione.

*Diuisio.*

*Lata.*

*Error.*

*Fuchsi.*

*Causæ.*

Fiunt papulæ sanguineæ, seu variolæ à menstruo sanguine materno saltē aliqua ex parte, si Arabibus credimus, qui (vt inquit Valleriola nostræ ætatis eruditissimus) plenus de his, & quantum ad substantiæ rationem, & curationem, quam græci tractauerūt. Auicenna præcipue, qui Fen, prima quarti post febris pestilentis tractationem eximiam egit



egit de variolis, & morbillis, indicans & à sanguinis, & humorum feruore hæc papularum genera nasci, & per modum cuiusdam crisis fieri transmittente scilicet, quæ nostrum corpus regit, facultate in eximias corporis partes vitiatos succos: vbi etiam ostendit quibus temporibus, ætatibus, anni constitutionibus, eueniant potissimum, & qua ratione perferari possint, idque profectò non minus copiose, quàm doctè. Atque hæc ipsa in præsentia de Auicenna, vt ostendam non omninò, vt plerique nunc volunt, tanti viri dogma abiciendum esse, sed sæpius amplectendum atque imitandum, vbi præsertim quid exacto iudicio illius methodum examinantibus rectè tractasse videatur, & vbi etiam apud Græcos & Latinos accuratam doctrinam non inueniamus. Morbilli verò à sanguine biliosissimo gignuntur, menstruo tamen a-

*Morbillo-  
rum origo.*

liqua ex parte & venenoso adiuuante in his, & variolis procreandis, aere venenoso & praua victus ratione. Quare inter morbos epidemiales numerantur, & futuram pestem indicant, quando iis multi eodem tempore, eadem regione corripuntur. Si quis dubitat, cur hoc papularum genere omnes, modò ad legitimam peruenerint ætatem, semel afficiantur, quamuis aliquando bis, vt ego vidi, & nonnunquam ter aliqui corripiantur, illi satisfaciet opinio quorundam Arabum, & aliorum, apud quos, vt diximus, menstruus sanguis est causa saltem aliqua ex parte huius mali: cum omnes in utero generentur ipso sanguine, ac nutriantur: nulla enim externa causa potest esse tam communis omnibus: sæpius tamen pueri, & aliquando iuuenes, rarissimè senes hoc morbo corripuntur: natura enim corpus profundum expurgans senibus est imbecillior, pueris valentior, & illorum corpus magis rarum, paratùmque ad plures morbos ob intemperan-

*Signa.*

tiam victus, & natura non potest diu sanguinem prauum

*Dolor dor-*

ferre. Deprehenditur hoc malum fiens, & factum vno ex viginti signis. Primum variolarum signum est dorsi dolor, ob sanguinis feruorem: vena enim magna ascendens admodum plena est, partesque ei proximæ, & musculos compressione,

*Pruritus*

pondere & calore dolere afficit, vt in plethora experimur.

*nasi.*

Secundum est nasi pruritus, ascendunt namque à sanguine

*Timor in*

effervescente vapores acres. Tertium est timor in somno, hoc

*somno.*

est insomnia illis sunt multa, & ipsos terrent, à toto enim

*Punctio.*

corpore ascendunt vapores, & fumi imaginationem, cogitationem, memoriàmque corrumpentes: quo fit vt dormientes sæpe clament. Quartum est partium sentientium vehemens punctio, præsertim earum, quæ cuti subiacent: sanguis

enim



*Tensio.*

*Rubor.*

*Fervor hu-*

*morum.*

*Pandicu-*

*tatio.*

*Fuchsius.*

enim ardens, eiusque fuliginosi, & ignei vapores cutem distendunt, dolorémque pungentem efficiunt. Quintum, totius corporis pondus, & tensio a toto sanguine feruente, partisque omnes corporis extendente. Sextum, faciei rubor, praefertim oculorum & maxillarum, quemadmodum in peripneumonia videmus. Septimum, lachrymae ob vapores a sanguine ascendentes calidos, & acres, a quibus & humoribus aliis destillant lachrymae. Octauum, sanguinis, & humorum feruor, & calefactio per vniuersum corpus, qualis reperitur in synochis. Nonum, est frequens pandiculatio, quam halicem medici barbari ex Graecis, qui halin & halicin vocant, nominarunt: de qua Hip. aph. 57. lib. 7. & Gal. in comm. egerunt, quo in loco de pandiculatione & oscitatione fit sermo: quamuis Fuchsius dicat eos errare, qui pandiculationem vertunt halicin, cum anxietudinem significet, quam si habuerint sani, Gal. autore, semper praesentibus molestantur, & ab vno negotio, & actione ad aliam transeunt: eodem modo & aegros illos anxios esse, qui accubitus non ferentes iacendi figuram euariant, quia semper praesens aggrauat eos. Hoc verò praecipue illis euenire consuevit, quibus in ore ventriculi, (quem nos abutentes vocabulo saepe solemus stomachum nominare) certa quaedam humoris qualitas continetur ventriculo molesta, quae neque plurima est, neque in ventriculi fluitat cavitatem, sed eam ipsam imbibere tunicam: sed meo quidem iudicio, licet illud sentiat Fuchsius, Gal. in com. non solum de oscitatione, quae chasma dicitur graece, sed etiam de pandiculatione, quae Graecis est halicin, agit dicens: sed & oscitari, sicut pandiculari contenta aliqua in musculis, per quos tales fiunt motus, quos pandiculationes & oscitationes nominamus, vel humiditate flatuosa, vel spiritu vaporoso fieri, est a nobis demonstratum, sed & pandiculationem vocat Theodorus, & Marius Nizolius vir doctissimus: & teste Sebastiano Corrado in literis omnibus, sed maxime Tullianis versatus couertens Gal. expositionem linguarum Hip. halysmon, & halicin hesitationem, & agitationem vocauit. Quin & Petrus Iacobus Steue linguarum omnium & rei medicae peritus lib. 2. epyd. sect. 6. aph. 29. contra sententiam Fuchsi halicin pandiculationem interpretatus est, ac ut Fuchsi non impedimus, quo minus anxietudinem conuertat, ita nos autoritate horum virorum pandiculationem verè appellabimus. Hic aphorismus secundi epidimion similis est aph. 57. lib. 7. aph. praeterquam quod in calce aphorismi epydimion additur, aut lac, quod pandiculationi, seu anxiet



anxietudini, & oscitationi multum nocet, quum hæc symptomata à flatu, & frigidis humoribus fiant, & propterea vinum aqua temperatum ea curat, non lac. Quare adiectitiam esse illam partem fatemur: autore enim Gal. com. 34. lib. 6. aphor. quando in libris sapientis alicuius sermo inuenitur aliquis manifestò falsus, non sine ratione contingit legentes dubitare, & primò quidem sibi ipsis diffidere, quasi neque illa, quæ sint, manifestè noscentibus, deinde suspicari, quod mendum fuerit interiectum. Sed his prætermiſſis redeamus ad signum nonum papularum. Tam igitur pandiculatio, quæ est, vt diximus, symptoma omnium musculorum, quàm oscitatio, quæ est eorum tantum, quæ sunt iuxta maxillas (hæc symptomata à somno fiunt) quam etiam anxietudo ægrorum, de qua diximus, indicant exanthemata ob vapores calidos acres, & multos à sanguine efferuescente musculos omnes acriter ferientes, imò etiam totum corpus. Decimum est palpitatio, seu concussio, quam barbari saltū *Palpitatio* appellant. Hæc differt maximè à conuulsione, tremore, & ri- *Anhelitus* gore, vt docet Gal. lib. 5. cap. 2. de symptomatum causis. Vn- *compressio* decimum est anhelitus compressio, à copia sanguinis, & va- *Raucedo* poris, & fumi crassi thoracem comprimentis. Duodecimum *Crassities* est vox rauca. Decimum tertium sputum crassum à nimio *sputi.* calore. Decimum quartum est capitis pondus, & grauitas. *Capitis* Decimum quintum dolor capitis, nò solum cum grauitate, *grauitas.* sed etiam pungēs. Decimū sextum est cordis palpitatio, quā *Dolor ca-* Arabes caphan, & barbari tremorem cordis nominant. Fit à *pitis pun-* febre ardenti & ferme pestilenti. Decimum septimum est o- *gēs simul.* ris exsiccatio, & ariditas, quæ semper solet febres ardentes *Palpitatio* cōsequi. Decimum octauum est animi perturbationes, con- *cordis.* uulsio, & syncope ob materiam venenosam cerebrū, neruos, *Oris sicci-* & cor lædentem. Decimū nonum est dolor thoracis, & gut- *tas.* turis. Vigessimum est tremor pedum, præsertim si supra dor- *Animi per-* sum iaceat æger, nerui in tali accubitu sanguine & vaporibus *turbatio.* impleti non libere animalem spiritum suscipiunt: Vnde *Dolor tho-* tremor pedum fit, & non solum pedū, sed & aliarū partium, *racis et la-* & aliquando totius corporis, vt ego vidi. Vigestimū primum *ryngis.* est febris synochus putrida, & ardens, præsertim in morbil- *Tremor* lis, Cuius febris principium, & augmentum occulta sunt: vi- *pedum.* gor tamē statim apparet, cum sit tempus iudicij. Rhases ta- *Febris sy-* men breuitati studens paucioribus notis demonstrat ortū va- *nochus.* riolarum, & morbillorū lib. 10. ad Almanforem cū inquit: fe-bris acuta, & cōclusa pueris præcipue, & iuuenibus euenire cœperit, & cū ea costarū dolor, nasi pruritus, & in somno ti-  
mor



## D E C V R A N D. M O R B.

mor, & capitis grauitas, & oculorum rubor, & in corpore  
*Renouatio* sentitur punctio, argumētum est agro vel variolas, vel morbo  
*ad signa* billos citò superuenturos: & libro diuisionum, hoc est aphor.  
*pauciora.* ris morum, signum, inquit, generationis variolarum est fe-  
 bris acuta, caliditas conclusa, & vehementia doloris dorfi, &  
*Discrimen.* pruritus nasi, & timor in somno. Differt morbillus à vario-  
 la, vt superius diximus, quia nō habet sensibilem tumorem,  
 lachrymæ etiam in origine morbillorum sunt plures, & ma-  
 iores, maior calor, maior respirandi difficultas, & dolor dor-  
 fi minor. Salutaria maxime omnium signa sunt febris, o-  
 mnium symptomatum remissio, facilis egressus, denique o-  
 mnia boni iudicij signa: mala & saepe lethalia signa sunt du-  
 rities, color viridis, violaceus, difficilis & tarda eruptio, tar-  
 da suppuratio variolarum, frequens syncopa, & animi de-  
 fectio, & si post illarum eruptionem subito euanescent, ma-  
 lum indicant, & si contigua sibi sunt omnia variolarum tu-  
 bercula, & ferme vnum efficiant, vel si vna variola supra a-  
 liam exoriatur est signum noxium, & ostendit materiæ vi-  
 tiosæ copiam. Peius etiam signum in hoc morbo erit, & le-  
 thalius, si colori viridi, violaceo, vel nigro tingantur, & si co-  
 piofius in thorace, & ventre, quam in cruribus & extremis  
 partibus efflorescant, sunt noxiæ. Signum etiam in his le-  
 thale est vrina sanguinea, & deinde nigra, præsertim si fa-  
 cultatis defectus comiteretur: omnes tamen, qui hoc laborant  
 morbo, angina præfocati ferme semper pereunt, & aliquan-  
 do ventris profluuiò dysenterico, vt inferius de puero dice-  
 mus.

*Curatio.* Duplex est curatio exanthematum ante eruptionem, &  
 ab eruptione, prior vtrisque est necessaria, altera verò tan-  
 tum variolis, quæ ex sanguine non bilioso fiunt. Ante eru-  
 ptionem curatur quatuor remediorum generibus.

*Ante eru-* Primò, victu tenui parum refrigerante, & humorum mo-  
*ptionem vi-* tum prohibente, vt aere parum frigido natura, vel arte para-  
*etus.* to, floribus, herbis, & aquis frigidis. Cibis frigidis, & pauci

*Cibus.* sanguinis, vt hordei cremore, lacte amygdalarum dulcium,  
 cucurbita saccharo condita, succo malorum granatorum a-  
 cidulcium, lentibus, pyris, pomis, & cotoneis assatis, & absti-

*Potus.* nentia carniū, ouorum & vini. Potus sit aqua lentium bis-  
 coctarum. Omnia calida nocent, quare alimenta multum  
 dulcia, & salsa, vt cete salsum, & similia malè à nostris fœ-  
 minis Valentinis exhibentur, quod demonstrat senex A-  
 uenzoar: ipse enim puer cum esset, absente patre medico la-  
 borans exanthematis ob esos pisces salsos, & sumptum mel

consil



onfiliū foeminarum in pernicioſa ſymptomata incidit.

Secundo, auertentibus, vt ſanguinis miſſione per venæ *Aueſſio*  
 ectionem in ætate florentibus, & robore virium vel per cu- *per ſectio*  
 urbitulas cum ſcarificatione ſcapulis, aut natibus affixas, *nein veng*  
 & per clementem & ſalubrem purgationem, quæ fiet caſſia *Purgatio*  
 iſtulari, tamarindis, manna, prunis damasceſis, rhabarba- *ſit elemēs*  
 o, & mirobalanis, & non per vehementiora medicamenta,  
 quæ dyſenteriam concitare valeant, hoc enim ſymptoma *Dyſente*  
 pernicioſum ſæpe hūc morbū ſequitur, quo multi pereunt, *ria timen*  
 t ego ſæpe vidi præſertim hoc anno 1555. Inter alios Valen- *das*  
 tia obiit nobilis & magnificus Iacobus de Sylua puer, ſex  
 aut ſeptem annos natus, qui cum a variolis magnis & mul-  
 tis leuatus eſſet, & poſtea affectus morbillis ventris proflu-  
 uio correptus periit, & patiebatur anhelitus, & respirandi  
 difficultatem. Optimus quoque eſt hic clyſter in hoc genere *Clyſters*  
 remediorum: ℞. foliorum maluarum, violarum, & mercu-  
 rialis an. ꝑ. j. hordei ſine cortice, & furfuris an. ꝑ. j. fiat deco-  
 ctum, de quo percolato accipe ꝑ. xv. diacatholiconis ꝑ. j. olei  
 roſarum ꝑ. iij. ſacchari rubri ꝑ. ſ. miſce, & fiat clyſter. Suppo- *Suppoſitio*  
 ſitoria, ſeu glandes ex melle, ſale, & oleo auxilia ſunt, & ne- *ria*  
 ceſſaria etiā infantibus ante primum annum, & ſi opor-  
 tuerit, addē parum pulueris hieræ ſimplicis. Clyſterem quo- *Obſeruat*  
 que pauca quantitatē, & viſ exhibere pueris, & infantibus  
 ſolemus: auertentia tamen per ſanguinis miſſionem, & pur-  
 gationem nutriti, & non infanti conueniunt.

Tertiō, refrigerantibus cardiacis, vt ſyrupo grānatorum, *Refrige*  
 ſyrupo roſarum, de agreſta, cydoniorum, myrtilloſum, de ratio per  
 acetofitate limonum, de acetofitate citri ſolis, vel cum de- *cardiacæ*  
 cocto lentium bis decoctarum ſæpe, & omni hora exhibitis  
 infantibus quantitatē vnius cochlearij, grandioribus verò  
 maiori: conſerua etiā roſarum, violarum nenupharis, cy- *Conſerua*  
 doniorum, & acetofæ, vel hac aut ſimili mixtura: ℞. theria-  
 cæ de citro, & limonatæ ſmaragdorum an. ꝑ. j. confectionis *Confectio*  
 de hyacintho ꝑ. iij. coralli rubri præparati ꝑ. ij. coſerua ace-  
 toſæ, & roſarum an. ꝑ. iij. ſyrupi acer- *atis citri* q. ſ. miſce;  
 & fiat confeſtio. Si æger fuerit paupe- *Pauperis*  
 & limonatæ ſmaragdorum an. ꝑ. j. ſucci citrangulorum, &  
 malorum grānatorum acidulcium an. ꝑ. ſ. miſce igne pauco:

Quartō, corroborantibus partes aliquas, ne offendantur, *Corrobo*  
 affectasque curantibus, inter quas ſæpius, & magis oculi, *ratio*  
 pulmones & inteſtina lædūtur: ſtatim ergo initio febris an- *Initio febr*  
 te eruptionem exanthematum ſæpe oculis inſtillerut hic,  
 aut ſimilis liquor frigidus actu: ℞. aquæ roſatæ ꝑ. iij. ſemi-

D

nis



# DE CVRAND. FEBRIB.

nis cydoniorum, sumac. an. 3. j. misce. Zaphirus lapis oculi  
*Visum cor* suo tactu corroborat. Si incipiant eruptiones exanthema-  
*roborans.* tum, adde parum croci medicamentis repellentibus & p  
*Quando* rum aquæ fœniculi: si tamen oculi laborarint exanthema  
*oculi labo* bus, summo studio prohibenda est eorum maturatio p  
*rant va-* exiccationem factam mixtura ex sale, camomilla, & fursu  
*riolis.* actu calidis, aut ex semine fœniculi, milio & ruta. Oculo  
 albugo, & cicatrix, ne visio pereat, curatur aqua corticu  
 fabarum, syrupo rosarū, rhodomelle, pulvere sacchari can  
*Quibus* di, pulvere ossis sepia, & aliis, de quibus capite 18. & 19. si  
*curatur* perioris lib. Thorax, & pulmones corroborantur ab initio  
*albugo.* & semper loch ex lentibus, cuius duæ sunt præcipue desc  
 ptiones, prior hæc: ℞. farina, vel pulueris lentium. 3. iij. l  
 minis papaueris, 3. j. confervæ rosarum 3. ij. iulep rosati 3.  
*Corrobo-* misce, & fiat loch: altera est in vsu apud Valentinus: ℞. len  
*rantia tho* tium p. ij. vuarum passerum sine granis. p. j. seminis papau  
*racem.* ris. 3. ij. rosarum 3. j. fiat decoctum ad pondus lib. j. cui pe  
 Loch len- colato adde sacchari candi lib. j. Pulueris diagraphanti frig  
*tiū, cuius* di 3. ij. misce, & igne paucio fiat loch, de quo accipiat sensu  
*duæ sunt* transglutiendo, vt ab vna via in aliam permeet. Intestin  
*descriptio.* corroborantur clystere ex solo lacte, in quo lapides igni  
*Intestino-* extincti sint, vel calybs. Si vêtis profluuium adsit, adde pul  
*rum corro* ueris diagraphati, masticeis, sanguinis draconis. an. 3. j. & si ho  
*boratio* non satis fuerit, illa necessaria erunt, quæ cap. 36. 37. & 38. si  
*Narium* perioris libri diximus. Naribus quoque ne impediatur ca  
*auxilia.* pitis purgatio, & refrigeratio, sunt admoenda oleum vio  
*Post erup* laceum, amygdalarum dulcium, sesaminum, vnguētum ro  
*tionem.* satum, & ad maiorem purgationem succus betæ, vel maio  
 ranæ cum aqua rosarum est bonus. Vlcerà narium curantur  
 tersione per mulsam, rhodomel, oxymel simplex, & post per  
 vnguentum lithargyrii cum paucio pulvere tuthiæ præpa  
 rata, vel consule doctum chirurgum. Apparentibus exan  
 thematis, si natura probe illa excreuerit, nullam oportet fa  
 cere medicinam iuxta aphorismū vigesimum primum Hip  
 pocratis libri primi, quæ iudicantur, aut iudicata sunt inte  
 grè neque mouere, neque nouare siue medicamentis, siue  
*Victus.* aliter irritando, sed sinere oportet, victus tamen est permu  
*Aer.* tandus, nam omnia, quæ non impediunt eruptionē, & ipsam  
*Cibus.* facilem reddat, sunt necessaria, vt aer calidus, victus tenuis,  
*Potus.* aperiens, & mouēs ad cutē humores, vt est ius ex ciceribus,  
*Inspectio* foliis raphani, petroselini, & croco, & similibus. Potus sic  
*rerum ru-* aqua hordei, & caricarum. Inspecere res rubras, & punicas  
*brarum.* summe necessarium, propter imaginationem enim feruntur  
 ad



LIBER SECVNDVS. 218

ad cutem humores. Aliqui inuoluunt infantes pannis puniceis, quod non damno, sed primum magis laudo. Quod si natura in expellendis humoribus tardior, aut imbecillior sit, ipsaque exanthemata difficulter egrediantur, & modo emineant, modò aspectum fugiant, est signum perniciosum: si id ob magnam plenitudinem aduenit, sanguinis missio fiat selecta vena iecoraria, vel ab scapulis sanguis mittatur per cucurbitulas cum scarificatione: hæc enim vacuatio non im- *Quando*  
pedit opus naturæ, quemadmodum ea, quæ fit selecta vena, *sanguis*  
Deinde, etiam, si non præcesserit sanguinis missio, plenitudo *cuandus*,  
non est, & robur virium, hoc, aut simili medicamento vtere, *Optimum*  
quod tollit obstructions clementer, humoresque ad sum- *auxiliu*  
mam cutem ducit: ℞. caricas xv. seminis fœniculi, api j, lac- *cum natu*  
cæ, an. 3. ij. lentium sine corticibus 3. j. β. gummi dragaganti, ra *tarda*  
rosarum, santalorū, seminis cydoniorum an. 3. ij. decoquan- *est in edu*  
tur in libris viij. aquæ ad medietatem, cui percolato adde- *cendo ad*  
croci in puluerem redacti, 3. ij. Dosis bis in die vncia vna. *cutem.*  
Hoc medicamentum est etiam expertum, & optimum huic  
generi: ℞. laccæ ablutæ 3. vj. lētium sine cortice 3. viij. gum-  
mi dragaganti 3. iij. decoquantur in 3. viij. aquæ ad medietatem: Dosis omni hora est cochlearium vnū præsertim ventriculo vacuo. Si ei adderes syrupi de duabus radicibus, &  
cap. Ve. an. 3. ij. melius saperet, & valeret. Suffitus rerum re- *Suffitus*  
dolētium calidarum trahit quoque humores ad cutem. In-  
uoluere etiam totum corpus pannis calidis suffitu rerum  
calidarum ducit ad cutem humores. Post integram exanthematum eruptionem, & maturationem est necessaria puris  
euacuatio, & exsiccatio: ruptis igitur exanthematibus acu *Euacuatio*  
aurea, vel argentea perfectius, & citius exsiccabuntur, & in *tio, & ex*  
futurum parvæ remanebunt cicatrices: pus enim, si diutius *siccatio*  
permanserit, magnam efficiet cauitatem, maioresque cicatrices apparebunt. Hoc medicamento desiccantur exanthemata: ℞. salis, farinæ fabarum, & lentium an. p. j. farinæ orobi, lithargirij, cerusæ an. p. β. misce. Exsiccantur similiter foliis salis, quo auxilio vtuntur nostræ fœminæ in desiccandis exanthematibus, etiā non facta arte incisione: quam *Laudatur*  
uis si, vt dixi, fiat, multo minores cicatrices, & vestigia appa- *incisio.*  
rebūt. Sed si cupis exanthematum vestigia tollere, & faciem *Ad resti-*  
pristino nitori restituere, lege, quæ diximus cap. 22. Inter grā tollere  
alia oleum roris marini (optimū fit in oppido de Oëtinent, da-  
& aliis Valētinæ ditionis oppidis) & balsamum in hoc sunt  
sæpè probata. Mixture ex optimo melle, ex puluere ossis sæ- *Mixture*  
piæ, & puluere sacchari candi sæpè admota locis affectis *optima.*



## DE CVRAND. FEBRIB.

*Spuma  
maris.*

*Aqua  
præstan-  
tissima.*

*Medica-  
mentum  
optimum,  
quod dici-  
tur.*

omnes cicatrices, & maculas tollit. Eandem vim habet spu-  
ma maris. Post balneum frequens laua sæpè faciem, & alias  
partes affectas cicatricibus, & signis aqua calida cum farina  
orizæ, furfure, & amydo, & curabis. Hæc aqua calida eun-  
dem præstabit vsum, si ea sæpè calida lauentur partes: ℞. ra-  
dicis serpentariæ lib. j. foliorū, florum, & corticum fabarum  
viridium. m. iij. succi saponariæ ℥. iij. aquæ rosarū, & succi li-  
monum an. ℥. iij. misce, & fiat ex his aqua per distillationem.  
Idem præstat hoc medicamentum: ℞. pinguedinis gallinæ  
℥. j. gummi draganti, & arabici, florum fabarum an. ℥. j. fiat  
decoctum in aqua decocti furfuris, quo reseruato in vitreo  
vase laua partes has saltem bis in die. Hoc quoque medica-  
mentum est optimum in hoc genere remediorum: ℞. lithar-  
giri benè loti, cineris radicum cannarum, ossium canis, vel  
leonis, farinæ cicerum, & orizæ, seminum melonum, cucur-  
bitæ, been, colti an. ℥. ss. misceantur omnia, & cum mucilagi-  
nibus fœnugræci, seminis lini, & pauco melle fiat mixtura,  
quæ à nostris fœminis dicitur muda, quæ sæpè faciem, & a-  
lias partes his maculis laborantes prima nocte & summo  
mane lotas aliqua ex supradictis aqua, vel solo decocto fur-  
furis proculdubio curauit. Deoque auspice, cui laus & glo-  
ria sempiterna tribuenda est.

## De Exanthematis. CAP. X.

### Scholium.



Xanthemata Græcis ) *Quantis exanthema sit nomen  
generale, omnes cutis efflorescentias comprehendens specia-  
tim, per exanthemata, variolas & morbillos intelligimus.*

*Febres in sunt ergo duæ febres, quarum una synochos est, & altera tertiana  
variolis continua: quæ eam habent naturam, & constitutionem, ut celerem  
& mor- habeant motum, & statim crisi finiantur, ita ut synochos humorem  
billis. expellat ad cutem, qui facit variolas, quæ sunt tumores à nostris ap-  
pellati pigotæ: tertiana verò efficit morbillos, tumores latos & lena-  
tos parum, qui à nostris pallola dicuntur. Humor autem in his feбри-  
bus neque est permixtus cum sanguine mēstruo, neque est venenatus:  
sed aut est sanguis, aut bilis: quæ talem putredinem conceperunt, quæ  
cui vincitur, & expellitur: ita ut illos tumores efficiat. Inter hos tu-  
Discrimen mores est discrimen: morbilli enim sunt tumores sicci, & qui non ve-  
inter hæc. niunt ad suppurationem: bene tamen variolæ, in quibus statim hu-  
mor mutatur in pus: & sic vlcera multa efficit. Inde colliges, malum  
esse humorem, & recurrere ad interna, quia facit in ventriculo, inte-  
stinis, & aliis partibus multa vlcera quæ lethalißima sunt, quia ex  
ipsis*



ipsis lyenteria, & alia symptomata eueniunt. Quem metum non habemus in morbillis. Harum febrium curatio, cum sint pueres, ab obstructio-  
 Etione fiende erit inchoanda, ac proinde in principio sanguinem mittimus. Et cum natura statim vincens humorem in foco existentem efflorescentias faciat, aut verius tumores: proinde his apparentibus oportebit cessare à missione sanguinis, & motum naturæ iuuare. Quod motus naturæ præstabitur potu, alimentis, & medicamentis astringentibus, roboratione. rantes partes internas. Sic potus est secundum ius lentium quod astringit. Alimenta sunt pyra, malum granatum & similia. Nos solemus Alimēta. malum granatum totum contundere, succumque exprimere, cui permiscemus croci parum & syrupum de agresta, quod interdum propinamus sæpè. Medicamenta sunt syrupi astringentes, & alia similia. Medica-  
 Vnde videbis errare Amatium, & qui illum sequuntur in his examentis. thematis vtentes rebus sudorem mouentibus: hæc enim aperiunt meatus internos, & sic imminet periculum, ne humor ad interiora recurrat. Hoc autem timemus, non quia humor in transitu exulceret, vt omnes video sentire, humor enim benignus est, & à natura victus: sed ne fiant in solidis partibus interni tumores, quos variolas appellamus. Atque hæc sufficiant. Sitque laus, gloria, & honor Omnipotentis Deo semper.

F I N I S.



## Medica disputatio.

An cannabis, & aqua, in qua mollitur, possint aerem inficere.



Vm febrium tam multarum, tamq; grauium, quæ proximo autūno Valentiam inuasert, causam eruditissimi medici scrutarentur, in eam opinionem quidam inciderunt, vt hæc omnia detrimenta, quæ non solum ad Valentiam, sed etiam oppida finitima rediissent, ad congeries aquarum, in quibus cannabis emolliretur, referrent. Qua sentētia intellecta meam vt proferrem, iusserunt, grauiissimi inquisitores nostri, quorum familie ego medicus præpositus sum. Quibus vt libentissime parerem, quid sentirem, volui declarare. Cannabem igitur, & aquam, in qua infunditur atque mollitur, aerem inficere atque corrumpere qui censent, ex ingrato odore demonstrare conantur, qui effectus a putredine cum sit, maximam vim affert ad aerem alterādum, quo alterato necesse est morbos procreari. Quod argumentum videtur Galenus in libello de theriaca ad Pi-



# DE CVRAND. FEBRIB.

sonem Hippocratis exemplo confirmare his verbis. Quam ob rem inquit Hippocratem illum multis modis admirandum laudo, qui luem illam ex Aethiopia Græcos inuadentem non aliter curauerit, quam aeris mutatione, & alteratione, ne talis amplius inspiretur. Præterea Auicenna sententia prima, quarto libro, tractatu secundo, capite primo visus est, velle aerem infici posse ab aqua, in qua cannabis maceraretur his verbis: putredo accidit aut propter cibum malum, quum est præparatus, vt putrescat illud, quod generatur ab eo propter malitiam suæ substantiæ, aut propterea quod velociter recipit corruptionem, quanuis sit bonæ substantiæ, sicut lac: aut quia aquosus nutrimenti malis remouens sanguinem à substantia sua, sicut illud, quod generatur à fructibus humidis, valde tardis ad digerendum, aut quoniam ex illis est, qui non conuertuntur ad sanguinem bonum, imò remanet humor malus, frigidus, quem abhorret calor innatus, & putrefacit illum, sicut ille, qui generatur à cucumere, & citrulo, pyris & similibus, aut propter malitiam artificij eius, aut horæ ipsius, aut ordinis eius, secundum quod scis: aut propter oppilationem prohibentem respirationem, & euacuationem propter complexionem corporis malam, cum non potest digestionem facere bonam: aut propter dispositiones extrinsecus ex aeribus malis, sicut est aer pestilentiae, & aer lacunarum & locorum infusorum, in quibus huiusmodi res madefiunt, vt linum, & spartum paulo post alias ferme putredinis causas scribit Auicenna, motum videlicet, & balneum à cibo, & solem in æstate, & alimenta calida in secunda mensa. Sed omnibus iis argumentis aduersatur experientia, cui magna fides habenda est autore Galeno libris prioribus de simplicium medicamentorum facultate: sunt enim vrbes, & oppida multa in Hispania saluberrima, in quibus magna cannabis copia feritur, & emollitur, Setabis videlicet, Tarraco, Alcagnicium, Requena, Vriellum, Vilanova infantium, & de Alcarras (sunt hæc oppidorum nomina) in quibus & plerisque aliis homines, & fanitate, & senectute fruuntur. Contra vero plurima oppida vidimus febribus vexata, in quibus nullus cannabis cultus est. Imò Valentia anno 1523. & 1530. maxima peste fuit correpta, quo tempore ne ferebatur quidem cannabis, nedum macerabatur: ab anno tamen 1530. ad hæc vsque tempora magna vis cannabis alitur, & molitur, nec pestilens constitutio genita est. Verum his experimentis multæ subiunguntur rationes, quarum prima est non solum non alte

*Experientia docet aquam cannabis non inficere aerem, Ratio contra experientiam.*



alterare aerem, sed putredinem noxiam expellere, & superare quæ posset in aqua gigni. Atque ut hoc intelligentius expediat, quid de cannabe scripserint physici, & medici veteres, videndum erit. Dioscorides ergo lib. 3. cap. 141. dicit, *Dioscorid.* simplicem esse cānabem asseruit, vnam syluestrem, quæ inflammationes lenit, tumores discutit, tophos articulorum, lapidosasque duricies dissipat, & funibus texendis est apta: alteram verò satiuam, cuius semen maiori copia sumptum genitale semen extinguit, eiusque succus auribus instillatus earum dolores curat. *Plinius.* Plinius verò libro 19. cap. 9. dicit, eam ingratum habere odorem, quando feritur, & quando vellitur, cuius semen Italorum est cibus, & post lib. 10. cap. 23. dicit cannabis in syluis nata est nigriore filo & asperiore, semen eius extinguere genituram virorum dicitur succus vermiculos aurium, & quodcunque intrauerit elicit, sed cum dolore capitis: tantæque vis ei est, ut aquæ infusus eam coagulare dicatur. Radix contractos articulos emollit in aqua coacta, itē podagras, & similes impetus. *Galenus.* Galenus post Hippocratem medicorum facile princeps i. de alimētorum facultatibus cap. de semine cānabis, asserit quosdam ipsum contusum cum aliis tragematibus, id est bellariis secundæ mensæ potus gratia comedere: & lib. 7. de facultatibus simplicium medicamentorum eadem, quæ Dioscorides scribit, additque, flatus eo dissipari. Cuius ergo tanta vis ut est hæc *Enecæ* omnia, quæ ab his autoribus scribuntur, efficiat, credi non *herbas.* facile potest, aerem infici ab eo posse, sed nec inficere posse *Ratio va-* credendum est, cum gramina omnia, & herbæ noxiæ ipsius *lidiſima* vicinitate pereant. Quod si hæ vires cannabi tribuuntur, non tantum putrefaciet aquam, quantum, quæ sit putredinem excutiet. Vires autem hæ cannabis, quæ calidissima & siccissima est, ac planè ignea, & ab scriptoribus proditæ sunt, & eas experimur quotidie. Tam acri ergo facultate prædita cum sit, agricolæ, ut ea uti possint, in aquis mergunt, ut humiditate & frigiditate contrariis qualitatibus eius vis vinci possit, quæ in pugna tam remissæ sunt vires harum qualitatum, ut cum neutra superet alteram, putredo noxia gigni non possit: quæ tamen caliditate & humiditate superante generatur. Ingratum verò odorem esse, & caput eo offendi ex Plinio scimus: non tamen valde putrem: nec enim id vllus autor affirmavit, nec ratione confirmari potest, sed cum tanta sit eius acrimonia, tamque ignea eius facultas, potest offendere non solum odoratum, sed caput etiā ipsum: at hoc ad gignēdos morbos populares, quales isti volebant,




# DE CVRAND. FEBRIB.

satis esse non constitit, nec vlla ratione demonstrarunt. Neque locus ex Galeno indicat veram esse illorum sententiam, neque eo vti potuerunt, nisi ostensum fuisset, aerem cannabis aquam posse infici, nam alioqui infecto aeri sola eius mutatione, & alteratione mederi possumus. De Auicennae autoritate ita iudico, vt contra nihil faciat, cum in ea nulla cannabis fiat mentio, & si vera esset, loca, in quibus spartum emollitur, essent insalubria quod experientia aduersatur, cum oppidum del Villar regni Valentini sit saluberrimum: infunditur tamen semper spartum. Præterea si in his omnibus esset credendum Auicennae, alimenta mali succi, vt fructus ab eo dicti, & etiam lac optimi succi, & alia multa vt exercitationes, balneum, calida alimenta à cibo essent omnino prohibenda. Scio ego temperatam regionem esse omnium saluberrimam, quam non possident Valentini, vt Lefma eruditissimus credebat: scio & hanc paratam esse ad morbos humidos, & pituitosos. quauis fere omnes sint biliosi, & propterea multi apoplexia pereunt, plurimi morbo comitiali perimuntur: sed tamen hæc omnia non conuincunt ad cannabis lacunas causam morborum esse reiiciendam. Sed his omnibus omissis non esse hæc curanda vellem, sed dico regionem hanc non iis, sed aliis circumfusus aquis totam alterari, ideoque pars, quæ ad mare pertinet, est insalubrior, vt domus regia, & omnes domus, à via saguntina vsque ad mare non salubri loco sunt, sunt enim humiliores, nam loca montana salubria sunt magis. Si ingratus censeatur ab his odor cannabis, multo magis brutorum, & vermium, quibus nostra Valentia sæpissime est plena: si ingratus est odor cannabis, multo grauior est odor excrementorum corporis humani, quorum vacuatione carere non possumus, at multo magis iis abundant, quia cloacæ innumeræ sæuam exhalant graueolentiam, & semper apertæ sunt. Si principes ciuitates, & domus saluberrimas amant, & vaporum graueolentium expertes, eligant loca temperata, & alta, & à mari, & aliis aquis stagnantibus multum distantia, in quibus nulla arbor, nullaque herba aerem aliquando inficiant, qualis sunt nux, ficus, sambucus, helleborus, eruca & brassica. Sed cum ex his intelligi possit, pestilentium morborum aliò referendam fuisse causam, plures rationes non addam, cum tamen adiungi possint & rationi, & experientia consentaneæ.

*In Auicennae,  
Temperata omnium  
saluberrima,  
Valentia  
quibus  
morbis  
obnoxia.*

INDEX





# INDEX

RERVM, AC VERBORVM

quæ in contextu sunt, primus nu-  
merus folium indicat: a, pri-  
mam paginam: b, se-  
cundam.

## A

- A**cria nocent Diar-  
rhææ. 100.a  
Accipitris & mu-  
rium vis. 41.a  
Achorum descriptio causæ  
& notæ. 17.b  
Admonitio in sistendo fluxu  
sanguinis a capite. 72.a  
In partu difficili. 161.b  
In quartana. 190.b  
Adeps caprinus curat ven-  
tris profluuium. 101.a  
Aerem salubrem efficiantia.  
199.b  
Aetius reprehenditur. 23.a  
145.b  
Albuginum oculorum de-  
scriptio causæ & curatio.  
59.b  
Alexandri Tralliani medi-  
camentum purgans pi-  
tuitam lethargi. 29.b  
Algalia quando necessaria.  
135.b  
Amati lusitani error. 97.b  
Amor insanus quid. 43.b  
Amoris insani præseruatio.  
ibidem  
Animæ curatio. 199.b  
Anasarcæ curatio. 122.b  
Ani, procidentia descriptio  
& causæ. 150.b  
Curatio. ibid.b  
Anodyna in arthritide.  
168.b  
Anginæ descriptio & causæ.  
68.b  
Causæ notæ & curatio. 69.a  
Ante balneum quæ seruan-  
da. 196.b  
Antiquæ cephalalgia cura-  
tio. 23.a  
Antidotum nobile ad pe-  
stem. 203.a  
An secunda sit vena in omni  
febre putrida. 181.a  
A pleuritide suppurata pau-  
ci euadunt. 78.b  
Apium & alia multa epile-  
psiam detegunt. 36.a  
A pituita fere semper epilep-  
sia. ibidem  
Apoplexiæ descriptio & cau-  
sæ. 46.a  
Notæ & curatio. ibid.b  
Apoplexiæ topica auxilia.  
47.b  
Apoplexiæ vitæ & mortis  
exploratio. 48.a  
Apoplectici cur non sepe-  
liendi nisi post tres dies.  
ibidem

Apo



# INDEX.

- Apophlegmatismi, mastica-  
 toria barbari vocant. 47.a  
 Apoplexia proxima epile-  
 psia. 38.a  
 Appetentia immodica, &  
 eius causa. 94.a  
 Appetentia cur necessaria.  
 95.b  
 Appetentia quomodo fiat &  
 quid sit. ibid.  
 Apparantia bilem cum pi-  
 tuita & vacuantia. 186.b  
 Aqua ligni guaiaci. 12.b  
 Aqua smilacis asperæ. ibid.  
 Aquæ faciem tersiorem &  
 candidiorē reddentes. 66.a  
 Aqua efficacissima & ap-  
 probata. 59.b  
 Aqua Ceraforum præstan-  
 tissimum remedium in e-  
 pilepsia. 36.b  
 Aqua præstantissima in Ta-  
 be. 84.b  
 Aquæ carnis laus eius præ-  
 paratio. 194.b  
 Aqua roris marini utilissi-  
 ma resolutis. 50.a  
 Aqua carnis hecticis. 194.b  
 Aquæ ex limacibus laus  
 195.a  
 Ardoris urinæ descriptio,  
 causæ, & notæ. 137.b  
 Ardoris urine curatio. 138.a  
 Arabum opinio in Iscuria.  
 134.b  
 Arthritidis descriptio spe-  
 cies & causæ externæ. 167.a  
 Artrithide pauci laborabāt  
 Hippocratis tēpore. ibid.  
 Artrithide laborantes Eu-  
 nuchos vidit Galenus, non  
 autem pueros. ibidem  
 Artrithicus visus puer 7.8.9  
 annorum. ibidem  
 Artrithis hereditarius mor-  
 bus. 167.b  
 Arthritidis curatio. 168.a  
 Ascitis causæ & Anasarca.  
 122.a  
 Ascitis curatio. 123.b  
 Aspectum corroborantia.  
 58.b  
 Acuentia. 59.a  
 Asthma quid. 74.a  
 Asthma vt epilepsia acces-  
 siones habet. ibidem.b  
 Asthmatis curatio extra ac-  
 cessionem. ibidem  
 Asthma morbus cronicus.  
 ibidem  
 Auertentia sanguinis impe-  
 tum. 69.a  
 Auertentia pituitam. 21.b  
 Auertentia in accessione e-  
 pilepsia. 34.b  
 Auenzoar vixit 135. annos.  
 160.b  
 Augentia capillos. 7.b  
 Auctor quibus auxiliis cu-  
 rauerit febres compositas.  
 193.a

## B

- Balnei commoditas. 196.a  
 Balneum ex aqua frigida no-  
 cet hecticis. ibidem  
 Benedictæ Nicolai compo-  
 sitio. 5.b  
 Bene & liberaliter nutrien-  
 tia. 36.a  
 Bilis purgatorium mixtum  
 cum purgatorio pituitæ  
 purgat pituitam. 30.a  
 Bilis flaua coquenda est. 2.a  
 Bilem flauā coquentia sim-  
 plicia



# INDEX.

plicia & composita. 2.b  
Bilem atram concoquentia  
simplicia & composita. 3.a  
Bilem atram purgantia sim-  
plicia & composita. 3.b  
Bilis vacuatur in arthritide  
sine concoctione. 168.b  
Bilis turgentis purgatio.  
181.b  
Bilis non turgentis præpa-  
ratio & euacuatio. ibid.  
Bouis ortui propinqui caro  
est boni succi. 39.b  
Brafauoli error. 71.a  
Britannica febris sudatoria.  
203.a

## C

Calculi vesicæ causæ & no-  
tæ. 131.a.b  
Calculi renum notæ ibid.  
Calculi renum & vesicæ cu-  
ratio. 132.a.b  
Camphora calida. 87.a  
Cantharides. 134.b  
Cantharidum improbatio.  
223.a  
Cancris fluuiatiles. 194.a  
Capitis doloris nomina &  
causæ generales. 19.a  
Capitis doloris singularis  
causæ & notæ. 19.a.b  
Capitis doloris curatio. 19.b  
Capitis distillatio diarrhææ  
facit. 100.a  
Cardiacorum species. 199.b  
Carbunculi curatio. 203.b  
Cataplasma ad hydropem.  
125.a  
Caparū esus largus lethar-  
gum gignit. 29.b  
Cauterium in fluxu sangui-

*Cauterium ex Cantharidib. &  
melle amacardino, 169. b.*

nis quando necessarium.  
146.a  
Cibi fastidium quid, causæ,  
notæ, & curatio. 95.b  
Cinis scorpionum. 133.a  
Cinis leporis corticum ouo-  
rum gallinarum & morta-  
cillæ. ibid.b  
Clyster nutriens. 40.a  
Clyster ad somnum. 102.b  
Clyster ex iure gallorum.  
112.b  
Clyster communis colici do-  
loris. ibidem.a.b  
Clyster potentissimus in mo-  
la. 160.b  
Clyster periculosus haben-  
tibus herniam. 165.b  
Clyster in quartana. 190.a  
Choleræ descriptio causæ  
notæ & curatio. 97.a.b  
Colici doloris descriptio  
causæ & notæ. 110.a.b  
Colici doloris curandi re-  
gulæ obseruandæ. 111.a.b  
Colici forus & repellentia.  
112.b  
Colocynthidis substantia  
nocet intestinis. ibid.a  
Comitialis morbi descri-  
ptio, diuissio, causæ & notæ.  
33.b  
Comitialis morbus hæredi-  
tarius non curatur, non  
hæreditarius difficulter  
maxime à 25. annis. 34.a  
Composita lapidem frangen-  
tia. 134.b  
Composita pituitam conco-  
quentia. 3.a. purgantia. 3.b  
Concoctio quid indicat. 2.b  
Concoctione non præcedēti  
vacuatio nō facienda. ibid.  
Cond



# INDEX.

- Conditum in hectica. 195.b  
 Confectionis hamech compositio, & dosis. 5.a  
 Confectio purgans ad Gallicum morbum. 12.a  
 Confectio vtilissima mingentibus sanguinem. 140.a  
 Confectio diabete optima. 141.b  
 Confectio vtilissima conuulsioni. 49.b  
 Confectio expuentibus sanguinem. 82.b  
 Confectiones duæ in quartana. 191.a  
 Confectio laudatissima ad pestem. 203.b  
 Corizæ catharrhis rauca-do, tusses. 71.a  
 Correctio rigoris & frigoris in tertiana. 186.b  
 Corrigētia symptomata febrium putridarum. 182.b  
 Corroborandus ventriculus in tertiana notha. 187.b  
 Constantinus. 109.a  
 Consuetudo Carpentanorum in fumendis syrupis. 3.a  
 Cōsolida optima in hernia. 166.a  
 Cōuulsionis descriptio, species & diuisio. 50.b. 51.a  
 Conuulsionis causæ. ibid.  
 Conuulsionis notæ & curatio. 52.a  
 Conuulsionis purgatio sine concoctione. 52.a  
 Cōuulsioni admirabile medicamentū topicum. 52.b  
 Cucurbitula vomitum & deiectionem cohibet. 98.a  
 Curatio achorum cum pileis. 18.b  
 Curatio mixta doloris colici & renum. 112.a  
 Curatio Artrithidis calidæ. 168.a  
 Curatio frigidæ Artrithidis. 168.b
- D
- Decidētiæ capillorum descriptio causæ & signa. 1.a  
 Decidētia capillorum morbi Gallici symptoma est. 1.a  
 Decidentia capillorum curatio. 1.a  
 Decidentia capillorum à causa valida vnguentum. 7.a  
 Decidentia capillorū à causa frigida vnguentū. ibid.  
 Decoctum fumendum die purgationis melancholiæ. 40.a  
 Defluxus humorum à capite. 71.a  
 Dentium dolores, & de ipsis quoque denigratis & mobilibus & horum causis. 67.a  
 Dentium dolorum notæ & curatio. ibid.  
 Dentes maiori cum dolore medicamenti quam ferro euelluntur. 68.a  
 Dentium omnem dolorem curant serpentum exuiæ. ibidem  
 Dentibus enascentibus pueris multi morbi fiunt. ibidem.b  
 Deriuatio humorum in lethargo. 30.a  
 Deriuatio in vertigine pituit



# INDEX.

|                               |       |                             |        |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|--------|
| tuitosa.                      | 33.a  | sumpto medicamēto pur-      |        |
| Deriuantia pituitam.          | 22.a  | gante.                      | 2.a    |
| Diabetis descriptio & cau-    |       | Dosis syruporum.            | 3.a    |
| sæ.                           | 140.b | Dysenterię descriptio cau-  |        |
| Diabetis historia inaudita.   |       | sæ & notæ.                  | 106.a  |
| ibidem                        |       | Dysenterię curatio.         | ibid.b |
| Diabetis signa & curatio.     |       | Dysenterię antiquę curatio. |        |
| ibidem.                       |       | 107.b                       |        |
| Diaphœnicon compositio &      |       | Dyspnœę descriptio, causæ,  |        |
| dosis.                        | 5.a   | notæ.                       | 74.a   |
| Diarrhœę descriptio & di-     |       |                             |        |
| uisio.                        | 99.b  |                             |        |
| Diarrhœę notæ & curatio.      |       |                             |        |
| ibid.100.a                    |       |                             |        |
| Diligentior epilepsię cura-   |       |                             |        |
| tio in gratiam valentino-     | 34.b  |                             |        |
| rum.                          |       |                             |        |
| Discrimen doloris colici à    |       |                             |        |
| magnitudine & humore          |       |                             |        |
| acri.                         | 110.b |                             |        |
| Discutiētia reliquias in me-  |       |                             |        |
| lancholia & alterantia.       |       |                             |        |
| 40.b                          |       |                             |        |
| Dissipātia humores qui an-    |       |                             |        |
| ginam pepererunt.             | 69.b  |                             |        |
| Dissipantia in morbo late-    |       |                             |        |
| rali.                         | 78.a  |                             |        |
| Dissipantia in arthritide.    |       |                             |        |
| 169.a                         |       |                             |        |
| Discutientia pituitam.        | 22.a  |                             |        |
| Dissoluentia grumos san-      |       |                             |        |
| guinis.                       | 83.a  |                             |        |
| Distillationis à causa frigi- |       |                             |        |
| da curatio.                   | 71.b  |                             |        |
| Distillationis à causa calida |       |                             |        |
| curatio.                      | 72.a  |                             |        |
| Diuertentia in morbo co-      |       |                             |        |
| mitiali.                      | 35.b  |                             |        |
| Doloris aurium causę & no-    |       |                             |        |
| tæ.                           | 61.a  |                             |        |
| Doloris aurium curatio.       |       |                             |        |
| ibidem.b                      |       |                             |        |
| Dormiendūmne sit an non       |       |                             |        |



# INDEX.

tide. 78.b  
 Error in explicatione icteri. 119.b  
 Error in curandis hæmorrhoidibus. 147.b  
 Error iuniorum super affectione rhabbari. 97.b  
 Error quorundam in præparandis cantharidibus. 124.a  
 Errores digni memoria. 179.b  
 Error foëminarum in victu februm putridarum. 181.a  
 Error Arabum in hectica. 193.b  
 Error recentiorum in febre pestilenti. 200.a  
 Errhina ad lethargum. 30.a  
 Exempla duo vertiginis antiquæ. 33.a  
 Excitantia & liberantia epilepticum in accessione. 35.b  
 Extinguentia sitim in hectica. 196.a  
 Exanthematum descriptio, diuissio, & causæ. 206.b  
 Exanthematû origo. 206.b  
 Exanthematum notæ multæ. ibidem  
 Exanthematum curatio. 207.b

## F

Facultas argenti viui an timenda sit. 13.a  
 Facultas lapidis Smaragdi 102.a  
 Fastidienti melancholico omnia genera ciborum offerenda. 40.a

Fastidium cibi quid, & fa-  
 mes. 95.b  
 Fastidij cibi seu inappeten-  
 tiæ causæ, notæ, & curatio. 96.a  
 Febris sanguinem sinochus  
 putrida. 172.b  
 Febris tertiana exquisita. 184.a.b  
 Febris ardentis descriptio  
 causæ & curatio. 180.b  
 Febris ardentis & tertianæ  
 discrimen. ibid.  
 Febris compositæ difficilis  
 descriptio, difficilior co-  
 gnitio, & curatio. 192.b  
 Februm compositarum di-  
 uissio. ibidem  
 Februm compositarum no-  
 tæ, causæ, curationes. 193.a  
 Febris pestilens quid sit. 198.b  
 Febris pestilentis causæ, &  
 signa. 199.b  
 Febris pestilentis victus ra-  
 tio. 199.b  
 Febris pestilentis curatio,  
 ibidem.b  
 Febris pestilentis putridæ  
 curatio. 202.a  
 Figura naturalis partus. 162.a  
 Fluxus sanguinis quando si-  
 stendus. 146.a  
 Felicitas nostri temporis. 195.b  
 Foëminæ valétinæ damnan-  
 tur in curandis infantibus. 35.a  
 Foetus mortui signa. 162.a  
 Foetum mortuum expellen-  
 tia. ibid.  
 Foet



# INDEX.

- Fœtum mortuum suffitus expellens. 162.b  
 Formulæ purgantium omnines humores. 4.a  
 Formulæ omnium medicamentorum purgantium caput per loca propinqua. 47.b  
 Forma præparandi cantharides. 124.a.134.b  
 Frangentia lapidem à qualitate manifesta. 133.a  
 Frangentia lapidem simplicia ferme omnia. 134.a  
 Fuchsius notatur. 23.a
- G**
- Græcorum medicamenta purgantia vehementia. 77.b  
 Gallici morbi descriptio, causæ, & signa. 11.b  
 Gallici morbi curationes multæ. ibidem  
 Gallicum morbum iuvantia & nocentia. ibidem  
 Galli morbi antiqui curatio. 13.a  
 Grandiorum epilepticorum curatio. 35.b  
 Grauedo ad nares. 71.a
- H**
- Hæmorrhoidum descriptio, & differentia. 145.a  
 Hæmorrhoidum causæ, notæ, & curatio. ibidem.b  
 Hæmorrhoidum dolor quibus curatur. 148.a  
 Hæmorrhoides quatuor de causis ægre curantur. ibid.  
 Hæctica quid sit. 193.b  
 Hæctica notæ & curatio. 193.b  
 Hepatis obstructio. 117.b  
 curatio. 118.a  
 Hepatis inflammationis natura, causæ, & notæ. 115.b  
 Hepatis inflammationis in causa parte curatio. ibid.  
 Hepatis inflammati in gibba curatio. 116.b  
 Herba contra vermes. 143.b  
 Herniæ differentia, causæ, & notæ. 164.a.b  
 Herniæ flatuosæ curatio. 165.a  
 Herniæ carnosæ curatio. ibid.  
 Herniæ aquosæ & varicosæ curatio. ibidem  
 Hernia facile curatur in infantibus. 166.a  
 Hernia aliquando postulat operationem manuum. ibidem.b  
 Hieræ logodionis compositio, & dos. 5.b  
 Hieronymus Gabucinus. 143.b  
 Hieræ simplicis laus. 123.a  
 Historia scitu digna. 66.b  
 Historia puellæ habentis lumbricos multos. 142.b  
 Historia puellæ habentis lumbricum duodecim cubitorum. 94.b  
 Historia Arnaldi de ictero. 121.a  
 Historia in timpanite mira. 123.b  
 Historia de profluuiio mensium. 252.a  
 Historia mira in hæmorrhoidum curatione. 147.b  
 Hist



# INDEX.

- Historia admiranda in foemina pariente flatu. 160.b  
 Historia febris pestilentis. 199.b  
 Historia doctissimi Doleſæ. 194.a  
 Historiæ quorundam autorum quomodo, an vxores utrum gererent non cognouerunt. 160.b  
 Hædus bonus cibus etiam melancholicis. 39.a  
 Hollerius. 170.a  
 Homines Alexandria vefcuntur carnibus aſininis atque etiã camelinis. 91.a  
 Horrorem & rigorem tolerantia. 186.b. 191.a  
 Horroris in quartana curatio. ibid.  
 Hora balnei. 196.b  
 Humores lethargum gignētes repellentia. 29.b  
 Hydropis descriptio & species. 122.a  
 Hydropis ſigna communia. ibidem.b  
 Hydropis formarum diſtinctio. ibidem  
 Hypochondriaca melancholia quomodo dignoſcenda. 39.b quomodo iuranda. 41.a
- I
- Iacobi Syluij error. 195.a  
 Icteri descriptio & cauſæ. 119.b  
 Icteri notæ & curatio. 120.a.b  
 Ileus quid. 110. Curatio eiusdem. 113.b  
 Imbecilli aſpectus deſcriptio, cauſæ, & curatio. 58.a  
 Inciſio inter coſtas in tabe. 87.a  
 Inciſio quomodo faciendâ in hydropē, & eius duę admirandæ historiæ. 125.a  
 Incubonis deſcriptio, cauſæ, & notæ. 42.b  
 Incubonis curatio. 43.a  
 Incurabilis tremor. 55.a  
 Inſanientium præ amore deſcriptio, & notæ. 43.b  
 Infantium præſeruatio ab epilepſia. 34.a  
 In pharmacopolas. 35.b  
 Intemperies ſicca quibus alteratur. 40.b  
 Intestina lupi. 112.a  
 Iſchiadis doloris remedia validiora arthritidis. 169.b  
 Iſchuriæ deſcriptio, cauſæ, notæ, & curatio. 128.a
- L
- Lac virgineum. 66.a  
 Lactis chalybeati laus. 107.a  
 Lactis facultas. 195.a  
 Lactis genera. ibidem  
 Lac humanum melius. ibid.  
 Lacte ſumpto non dormiendum. 84.b  
 Lac an noceat hydropicis. 124.b  
 Lac humanum fœtum mortuum expellit. 162.b  
 Lac an noceat dyſentericis ſumptum per os. 107.a  
 Lac dari quæ prohibēt. 195.a  
 Lactis coagulationem quæ impediunt. ibid.  
 Lapidis lazuli vis. 3.b  
 Lapid



# INDEX.

- Lapidis armem & lazuli v-  
sus reformidatur. 40.a  
Lapidum renum, & vesicæ  
causæ discrimen, & notæ.  
131.a  
Lapidis renum, & vesicæ cu-  
ratio duplex. ibid.b  
Lapidem frangentia quali-  
tate manifesta. 133.a  
Lapidem fragentis compo-  
sita. 134.b  
Lapis Iudaicus. 133.a  
Lapis spongiæ. ibid.b  
Lapis lyncis. ibid.  
Lapis hominis & porci. ibid.  
Lapides gallorum. 134.a  
Lapis Aquilæ. 161.b  
Lapis cyaneus. 200.a  
Laus aquæ ex limacibus.  
195.a  
Laus cōfectionis Alkermes.  
200.a  
Lethargi descriptio, diuifio,  
causæ, & notæ. 29.a. 30.b  
Lethargi curatio. ibid.  
Lethargicorum pulsus & v-  
rina. ibid.  
Letharhicorum præcipua  
symptomata. 30.b  
Leucophagum hefticis con-  
fert. 194.a  
Liquor sputum promouens.  
78.a  
Lienis obstructionis descri-  
ptio, causæ, & curatio.  
127.a.b  
Loch ad sputum educendum.  
78.a  
Longa melācholicorum vi-  
gilia. 40.a  
Lucanicæ. 194.a  
Lumbricorum differentia,  
causæ, & notæ. 142.b. 143.a  
Lumbricorum curatio du-  
plex. ibidem  
Lunæ radij noxij sunt.  
199.b  
Lyenteria. 104.a

## M

- Medicamenta duo præstan-  
tissima ad vindicandos in-  
fantes ab epilepsia. 34.b  
Medicamentum visum ma-  
ximè confirmans. 60.b  
Medicamentum visui vtile.  
ibidem  
Medicamētum visui senum  
perutile. ibid.  
Medicamētum interius pus  
efficiens. 78.b  
Medicamenta necantia ver-  
mes. 143.b  
Medicamentum conseruans  
vterum in suo loco. 150.b  
Medicamētum optimum ad  
mensum fluorem. 152.a  
Medicamenta menses mo-  
uentia. 155.b  
Medici audaces taxantur.  
37.b  
Melācholiæ descriptio, cau-  
sæ, & diuifio. 38.b  
Melancholicorum imagina-  
tio incerta ratio redditur.  
39.a  
Melancholiæ curatio. 39.b  
Mel an dari possit dysenteri-  
cis cum Galeno. 107.a  
Mēsum immodicorum cau-  
sæ. 151.a  
Mēsum immodicorum no-  
tæ & curatio. ibid.  
Mensium suppressorum cau-  
sæ, notæ, & curatio. 154.b



# INDEX.

Micleta astringit satis. 101.b  
 Moderate dissipantia in ar-  
 trithide frigida. 168.b  
 Modus conficiendi aquam  
 carnis. 194.b  
 Molæ vteri descriptio & cau-  
 sæ. 160.a.b  
 Molæ vteri signa historiæ &  
 curatio. ibid.  
 Morbi comitialis ex lacte  
 coagulato in ventriculis  
 infantium curatio. 35.a  
 Morbillos origo. 207.a  
 Curatio. 208.b  
 Mouentia epilepsiam. 36.a  
 Mundellæ error in purgan-  
 dis peste laborantibus.  
 203.a  
 Muscus marinus. 144.a

## N

Narcoticorum vsus. 26.a  
 Narcotica quomodo secu-  
 riora. 102.b  
 Narcoticorum vsus in coli-  
 co dolore. 113.a  
 Narcotica quovetustiora se-  
 curiora. 102.b  
 Necantia vermes. 67.b  
 Nicolai Florentini curatio  
 rara. 37.a  
 Nicandri laus. 88.a  
 Notatur mulieres exhiben-  
 tes pueris cerusam, argen-  
 tū viuum & minium. 35.b  
 Notæ singularum causarum  
 distillationis & tussis. 71.  
 a.b  
 Notæ omnium causarum  
 fluxus sanguinis, & par-  
 tium a quibus fluit. 81.a  
 Nutriens clyster quādo me-

lächolicis necessarius. 40.a

## O

Obseruatio elegans in mis-  
 cendis medicamentis. 5.a  
 Obseruanda historia. 30.a  
 Obseruatio in curanda ver-  
 tiginē pituitosa. 32.b  
 Obstructionis hepatis cau-  
 sæ, notæ, & curatio. 117.b  
 Oculis noxia. 59.b  
 Odora vehementer vterum  
 ad se trahunt. 158.b  
 Oleum ad secundinam ex-  
 pellendam. 163.a  
 Ophthalmiæ diuifio, descri-  
 ptio, causæ, & notæ. 55.a  
 Ophthalmiæ curatio. ibid.b  
 Ophthalmiæ antiquæ cura-  
 tio. 56.b  
 Oribasij error. 115.b  
 Ortophnæa quid. 74.a  
 Ortophnææ notæ, & cura-  
 tio. ibid.b  
 Ossa mespilorum. 133.b  
 Ossium corruptio cauterio  
 eget. 13.b  
 Oxyrodinum lethargo vtile.  
 29.b

## P

Palpitationis descriptio no-  
 tæ & curatio. 86.b  
 Palpitatio a veneno. 88.a  
 Paraphrenitis quid. 25.a  
 Curatio. 26.a  
 Paralyfis descriptio. 48.a  
 Paralyfis causæ, notæ, & cu-  
 ratio. ibid.b  
 Paralyfi vtilis confectio.  
 49.b

Par



# INDEX.

- Paralyſi topica medicamen-  
ta. 49.b
- Paralyſis curatæ pulchra hi-  
ſtoria. ibid.
- Partus laborioſus & ſecun-  
dæ retentæ. 161.b
- Partum facillimum quæ ef-  
ficient. ibid.
- Pectinatio aſſidua capillos  
auget. 7.b
- Peſeiana non laudatur. 35.b
- Pentaphylli radix. 166.a
- Perdix aſſa & elixa aſtringit.  
100.a. *Peſtis, vide febr. peſtil.*
- Peripneumoniæ deſcriptio,  
cauſæ, & notæ. 76.b. 77.a
- Peſſi in mola. 160.b
- Petri Iacobi Steue laus. 98.a
- Phrenitidis deſcriptio. 24.b  
curatio. 25.a
- Phtifiſ deſcriptio & cauſæ  
eiufdem notæ. 83.b
- Phtifiſ antiqua incurabilis.  
85.b
- Phtifiſ furnaria vixit 28.  
annis. ibid.
- Picra vermes necat. 144.a
- Pilularum omnium ferme,  
quæ in uſu ſunt compoſi-  
tio & quantitas medica-  
mentorum valenter pur-  
gantium. 5.b. 6.a
- Pilularum uſus damnatur  
in morbis bilioſis. 133.b
- Pilulæ ex helleboro. 14.a
- Pilulæ nobiliſſimæ. 33.a
- Pilulæ ad epilepſiam. 37.a
- Pilulæ laudatæ in aſthmate.  
75.a
- Pilulæ menſes euocantes.  
156.a
- Pituitam concoquentia ſim-  
plicia & compoſita. 3.a
- Pituitam purgantia ſimpli-  
cia & compoſita. 3.b
- Pleuritidis deſcriptio, cau-  
ſæ, & notæ. 76.b
- Pleuritidis curatio. 77.a
- Pleuriticis quæ vena ſecan-  
da. ibid.b
- Pleuriticis quæ purgantia  
exhiberi poſſunt. ibid.
- Plinius. 132.b
- Pomum confert in conſtitu-  
tione peſtis frigida. 201.a
- Pomum in cauſa calida. ibid.
- Porrorum barbæ cum hor-  
deo viſ. 29.b
- Potiones vacuantes concre-  
tum lac in ventriculis in-  
fantium. 35.a
- Potus lethargicorum. 29.b
- Potus menſes ducens. 155.b
- Potus aquæ frigidæ in ſyno-  
cho impedimenta. 173.b
- Potus in quartana. 190.a
- Præſeruatio ab arthritide.  
169.a
- Præparatio aquæ ex anguil-  
la. 194.b
- Præcautio peſtis. 199.b
- Procidentia ani quomodo  
curanda in puero. 150.a
- Procidentia yteri. ibid.
- Promouentia ſputum & ro-  
borantia pulmones. 75.b
- Pulmo vulpis & Ericij. 85.a
- Puluis Ioannis de Vigo. 13.b
- Puluis ſaluberrimus ad me-  
lancholiam. 40.b
- Puluis ad dentes liueſcentes  
aut nigreſcentes. 68.a
- Puluis ad fulciendos dentes  
mobiles. ibid.
- Puluis Cimicis. 133.b
- Puluis anferis. 134.a



# INDEX.

Puluis pullorum hirundi-  
num. ibidem  
Puluis optimus ad resoluē-  
dos flatu in hidrope.  
124.b  
Puluis optimus in partu  
difficili. 163.a  
Punctura nerui conuulsio-  
nem efficit. 53.b  
Purgatio in hydrope per v-  
rinam. 124.b  
Purgatio in tertiana exqui-  
sita quādo facienda. 184.b  
Pyra partum impediunt.  
161.b

## Q

Quantitas clysteris in ven-  
tris profluuiis cur pauca.  
107.b  
Quartanæ diuifio, causæ, &  
notæ. 189.b  
Quartanæ longa curatio.  
190.a  
Quæ dicuntur medicamen-  
ta benedicta. 7.a  
Quæ Aureos reddant ca-  
pillos. 7.b  
Quæ nigros capillos effi-  
ciunt. ibid.  
Quæ in vertigine fugienda,  
32.a  
Quæ vena secanda in me-  
lancholia. 40.a  
Quæ abscessum rumpunt  
in peripneumonia, atque  
etiam in pleuritide. 78.b  
Quæ necessaria sint in hy-  
drope curanda. 123.b  
Quæ ano appofita hæmor-  
rhoidas sanant. 147.b  
Quæ hepati admouenda in

febre putrida, & quando.  
182.b

Quibus partibus admouen-  
dum vnguentum in cura  
morbi Gallici. 13.b

Quibus fiat reuulsio in ac-  
cessionibus vertiginis.  
32.a

Quotidianæ febris descri-  
ptio, causæ, & notæ. 188.b

Quotidianæ curatio. 187.a

## R

Raporum vis oculis prodest.  
58. b

Ratio cognoscendi quæ sint  
benigna, & quæ valentia  
medicamenta purgantia.  
4.b.5.a

Raucedinis, tussis, corizæ,  
catharri eadem ferè natu-  
ra. 71.a

Raucedo ad asperam arte-  
riam. ibid.

Raucedinis causæ. ibid.

Refrigerantia & corrobo-  
rantia iecur. 174.a

Refrigerantia cor, iecur, &  
totum corpus interius &  
exterius in febribus. 182.a

Reliquias materiæ ex oculo  
vacuantia & resoluentia.  
56.a

Remedium optimum ad la-  
uandum ventriculum &  
intestina à purgatione. 2.a

Remittentia feruorem san-  
guinis. 168.b

Repellentia humores angi-  
næ. 69.b

Repellentia medicamenta  
foris non sunt admouen-  
da



# INDEX.

da in pleuritide. 78.a  
 Resoluentia humores epilep-  
 sia. 37.a  
 Roborantia caput melan-  
 cholicorum. 40.b  
 Rubedo faciei, & eius cau-  
 sa, & reuulsio. 65.b  
 Ruptio abscessus in angina.  
 70.a

## S

Salubria medicamenta quæ  
 dicantur. 20.b  
 Sanguinem fluentem auer-  
 tentia. 63.a  
 Sanguinis è naribus fluentis  
 causæ & notæ. 62.b  
 Sanguinis profluuij curatio.  
 63.a  
 Sanguinem sistentia à tota  
 substantia. 64.a  
 Sanguinē expuentibus opti-  
 ma purgatio. ibid.  
 Sanguinē quæ medicamen-  
 ta purgantia sistunt. 82.a  
 Sanguinem fluentem nar-  
 cotica compescunt. ibid.b  
 Sanguinem sistentibus mis-  
 cenda pectoralia. ibid.  
 Sanguinis mictio. 139.b  
 Sauanarola laudatur. 190.b  
 Schirrus lienis quibus cu-  
 ratur. 127.b  
 Secundinē expellentia. 162.b  
 Sectio venæ quando simul  
 ex duabus venis. 202.b  
 Sectio venæ an conueniet in  
 febre putrida. 181.a  
 Sedantia singultum. 93.b  
 Signa causæ sine humore &  
 cum humore cuiuscūque  
 doloris capitis. 19.b  
 Singultus descriptio, & cau-

sa. 93.a  
 Singultus notæ & curatio.  
 ibid.b  
 Sistentia fluxum humorum  
 à capite. 72.a  
 Sitim extinguentiæ. 196.a  
 Somni profundi lethargico-  
 rum curatio. 30.b  
 Somnus arcendus sumpto  
 veneno. 120.a  
 Somnus quando cauendus  
 in accessionibus febrium.  
 184.b  
 Spatium accessionis tertia-  
 næ exquisitæ. ibid.b  
 Species medicamentorum  
 cardiacorum. 200.b  
 Spiratio lethargicorū qua-  
 lis. 29.a  
 Sputi sanguinis causæ, & cu-  
 ratio. 81.a.b  
 Sputi sanguinis reuulsio.  
 ibidem  
 Sputo sanguinis vtilia. ibid.  
 Stercus lupi à tota substantia  
 colicum dolorem mirum  
 in modum sanat. 112.a  
 Scillæ vis ad morbum comi-  
 talem. 37.b  
 Suffusionis descriptio & cau-  
 sa. 60.a  
 Suffusionis curatio. ibid.  
 Suppurationis descriptio,  
 causæ, & notæ. 83.a  
 Suppurationis curatio. ibi-  
 dem.b  
 Suppurati loci cognitio.  
 60.a  
 Suppressionis vrinæ descri-  
 ptio, causæ, notæ, & cura-  
 tio. 128.a.b  
 Syncope. 86.b, curatio e-  
 iusdem. 88.a



# I N D E X.

Synochi, descriptio, diuifio,  
causæ, notæ, & curatio.  
172.b.173.a  
Syrupus ex decocto ligni  
guaiaci. 12.a  
Syrup.vtilissimus in hepatis  
obstructione. 193.a  
Syrup.in quartana secundo  
loco. 190.b  
Syrup.ad febres compositas.  
193.a

## T

Tabes. 83.a  
Tapfus barbatus tenesmo  
vtilis. 109.b  
Tempus curandi morbum  
Gallicum. 12.b  
Tentatoria curatio in pleu-  
ritide. 78.b  
Tenesmi descriptio. 109.a  
Tenesmus vterum gerenti-  
bus molestus. ibid.  
Tenesmi causæ, notæ, & cu-  
ratio. ibid.b  
Tenesmus quomodo abor-  
sum faciat. ibid.  
Tertianæ exquisitæ descri-  
ptio, causæ, notæ, & cura-  
tio. 184.a.b  
Tertianæ notæ descriptio,  
diuifio, causæ & notæ.  
186.a.b  
Tertianæ nothæ curatio.  
ibidem  
Theriaca magna an sanos  
veneno afficiat. 35.a.b  
Theriacæ commendatio.  
201.b  
Theriacæ & Mithridati vis.  
191.a  
Timoris vis. 191.b

Topica ad lethargum. 30.a  
Topica ad sputum excitā-  
dum. 75.b  
Tormentilla. 201.b  
Tremor ex imbecillitate ner-  
uorum. 54.b  
Tremoris notæ, causæ, & cu-  
ratio. 55.a  
Tres formulæ purgantes bi-  
lem flauam. 3.b  
Tres formulæ purgantes pi-  
tuitam. ibid.  
Tussis causæ, & curatio. 71.b  
72.a

Tympanitæ causæ. 122.b  
Tympanitæ notæ & diffe-  
rentiæ. ibid.b  
Tympanitæ curatio. 123.a

## V

Vaccarum stercus vtile co-  
lico dolori. 112.b  
Valentinæ mos ad tuen-  
dos infantes ab epilepsia.  
34.a  
Valleriana. 166.a  
Variæ melancholicorum i-  
maginationes. 39.a  
Vena quæ secanda in quar-  
tanæ. 190.b  
Venenum conuulsionem fa-  
cit. 51.a  
Venenum conuulsionem fa-  
cit. 51.a  
Venenum educentia. 53.b  
Ventriculi imbecillitas, do-  
lor, inflammatio. 90.b  
Ventriculi gallinarum mer-  
gi & struthiocamelli an  
corrobovent nostrum ven-  
triculum. 92.a  
Verbasculum. 37.a  
Vert




# INDEX.


|  |         |  |                     |
|--|---------|--|---------------------|
| Vertiginis descriptio & cau-<br>sa.                        | 32.a    | obstructis admouenda.  | 187.b               |
| Vertigo non differt ab sco-<br>tomia.                      | ibid.   | Vnguentum ad quartanam.  | 191.a               |
| Vini generosi vsus.  | 95.a    | Vngula mulæ.   | 152.b               |
| Vini multi vsus.   | 53.b    | Vomitus prouocãdus in do-<br>lore colico.  | 113.a               |
| Vinum Alkekengi valenter<br>prouocat vrinam.               | 130.a   | Vomitus excitatio in ter-<br>tiana spuria.   | 187.a               |
| Vini Alkekengi confectio.                                  | ibidem  | Vomitus utilis in tertiana.  | ibidem              |
| Vires theriacæ & mitridati.                                | 190.b   | Vomitus laus in quartana.  | 191.a               |
| Vis cantharidum.   | 134.b   | Vrinæ suppressio.  | 128.a               |
| Visus imbecilli descriptio,<br>causæ, & notæ, curatio.     | 58.a    | Ardor.   | 137.b               |
| Visum acuentia.  | 59.a    | Vfus pilularum damnatur<br>& medicaméta vehemen-<br>ter purgantia in morbis<br>biliosis. | 173.b               |
| Visui quæ nocent exterius<br>& interius.                   | 58.b    | Vteri procidentia descriptio,<br>& causæ.  | 150.b               |
| Vnguentum expertum ad<br>morbum Gallicum.                  | 13.a    | Vteri procidentia notæ, &<br>curatio.  | ibid.               |
| Vnguētum humectans me-<br>lancholicos.                     | 41.a    | Vteri suffocationis varia de-<br>scriptio, & nomina.                                     | 157.b               |
| Vnguentum filij Zachariæ.                                  | 109.b   | Vteri suffocationis causæ,<br>notæ, & curatio.   | 158.a               |
| Vnguentum optimum ad<br>suppressam vrinam.                 | 129.b   | Vtero admouenda in proflu-<br>uio mensium.   | 152.b               |
| Vnguentum optimum ad<br>lapidem renum & vesicæ.            | ibidem  |  |                     |
| Vnguentum ad hemorrhoi-<br>das.                            | 147.a.b | X  |                     |
| Vnguentum ad partum dif-<br>ficilem.                       | 163.a   | Xyloaloe.  | 199.b               |
| Vnguentum optimum bi-<br>liosus & febribus veneno-<br>sis. | 174.a   | Z  |                     |
| Vnguenta spleni & iecori                                   |         | Zaphyrus.  | 199.a. 201.a. 208.a |
|  |         | Zebet.   | 158.b               |
|  |         | Zedoaria.  | 200.a               |

FINIS INDICIS.

















29 50







29 50